




Baccanelli  
De Consensu Medicor

1556.









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
597/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
597/A/1






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
597/A/1


A. XXIX. Bac

597 <sup>1/2</sup> A/1











IOANNIS BACCA:  
NELII MEDICI RE  
GIENSIS, DE CON-  
SENSV MEDICO.


RVM, IN CVRAN-

dis morbis, Libri  
quatuor.

Eiusdem de consensu Medicorum in co-  
gnoscentis simplicibus Liber.

*et non respexit*

*Beatus uir cuius est dominus spes eius*



*in vanitates et infanias falsas.*

VENETIIS IN VICO SANCTAE  
Marie Formose ad signum Spei.

M D LVI.

R. BLANCHARD

PROF. FAC. MED. PARIS



IOANNIS BACCA

NELLI MEDICINAE

GIBENSIS DE CON

SENSU MEDICINAE

RVM IN CURA


DE MORBIS LIBRI

QUINTUS

Ex libris de consensu Medicorum in con

sententia impensis Libris

et non aliis



VENETIS IN VICO SANCITAE

Libreria de Giovanni de

M. D. L. V.

M. MANCINI

PROPRIO



# IOANNES BACCANELLIUS

## AD LECTORES.



EAS lucubrationes, quas prælo excudendas olim tradideram, adeo lectores candidi Typographus deturpauit, ut uix scirem tam foedas ac mutilas, cum ad me redirent, agnoscere. Ego uero tametsi rudis primum, non adeo tamen obtusi sum pectoris, ut quæ in eis supersunt ac desint non aperte intelligam, nec me adhuc decipit, quæ plerosque infatuat φιλαυτία, ut pudenter ignorem, minus satis fuisse eas in tenebris delituisse, quàm inscitia tam ignaui in publicum prodeuntes damnari, Quare nunc ne chorabo siue licio qui χρυσία καλχέον commutabat, stultior uidear. Rursus ut candidæ simplices & sine labe ad uos redeant, denuo eas resarcire coactus sum, Pleraque etiam his adneximus, ut si quid frugi uobis attulerint, non rugosa fronte tandem legantur.

Valete.

( 2



IOANNES BACCANELLIUS  
EXCELLENTISSIMO MEDICO

Ioanni scutellario ex ordine equestri  
dignissimo ac viro unde =  
cunque doctissimo.

S. P. D.

\*



ERTVM est mi doctissime Io-  
annes quòd olim elegeram, quæ-  
dam medicorum dogmata, ad me-  
dendi normam satis (meo iudicio)  
oportuna, tum ut inde labili memo-  
riæ quandoque alijs in rebus occu-  
pata, succurrerem, cum etiam illis satisfacerem, qui  
non nisi authoritatibus etiam si mille rationes proba-  
tissimæ adducerentur, acquiescere nolunt. Certe ut in-  
genue fatear. Quod ex mea inuentione non poteram,  
ut græce loquar συλλεξαμενος γὰρ πολλὰς τῶν παλαιῶν ἐκεί-  
νων βιβλῶν ἀεὶ δὲ ἐν μέσῳ τοῦ τῶν ἰμῶν τῶν ἰμασῶν ἰδρύσας, ac  
flores uarios ueluti ex pratis relegēs ita effeci, ut quod =  
prima nauigatione non poteram, πρὸς τὸ ν δέυτερον ἀπεί-  
δοι me contulerim ac expediuerim. Sed opus adeo uti-  
le ac gratum esse non potest, ut tuo excellenti ingenio  
possit satisfacere, Quanquam (ni fallor) nihil in eo di-  
ctum uel excogitatum est, quod authoritate non com-  
probetur, quod planum non sit, quod non remedijs ful-  
citum, quod breuitatem etiam non amplectatur: in quo  
multa uno intuitu uisuntur ac comprobantur, quæ sic-  
co pede (ut aiunt) forte intacta dimitterentur. Non au



derem tamen (quod expostulas) ut formis excussum  
 istud opus in publicum prodiret, Ne mihi nouo homi-  
 ni & uix intra proprios lares cognito, id mihi uitij  
 daretur quod scilicet plura uoluerim amplecti & ex-  
 primere, quæ semidocto cuius homini nota ac uulga-  
 ta sunt. Et ita trita ac explosa ut uix de illis mentio  
 fieri debeat. Urget tamen me tua quotidie humanitas  
 & potissimis præcipue rationibus adhortatur, ut illud  
 iam iam in lucem pariam, & alios iuuenes huiusce  
 mei laboris participes efficiam. Certe uereor ego, Si  
 tuæ uoluntati obtemperare uoluerò, Ne uelut inter olo-  
 res anser primum obstrepere uidear. Et quum plurimè  
 nominis apud te sim. Ne deinceps de me id fiat, ut est  
 apud Theocritum quòδ τοῦτον ἔχεις λαβὰς οὐκ ἔτι ποικίλα  
 φαντασία λαβὴν ἔχοντα πολὺν ἀριόδον. Nosti enim (ita  
 uaria sunt hominum ingenia.) Quod uni placere so-  
 let multis non placere posse, Nec te præterit, quòδ in di-  
 uino illo Platone confusionem criminantur, in Aristotele  
 tenebrosam obscuritatem, in Plinio turbulentam  
 quandam congeriem, In Paulo Aegyneta miram bre-  
 uitatem, In Auicenna etiam nuper emendato quandam  
 nominum barbariem, In Galeno nimiam prolixita-  
 tem & ad praxim non desyderatum ordinem, In aliis  
 confusionem potius quàm compositionem, Qui dum  
 latini uideri non possunt, interdum ita loquuntur, ut  
 uix a paucis quid uelint intelligantur, Quid dicam de  
 Hippocrate? Qui modo laudatur, modo à Galeno  
 damnatur ac reprehenditur, Hunc deinde Auerrois  
 pluribus in locis, alioqui doctissimum, etiam redar-  
 guit. Postremo Thessalus omnium placita Medico-



rum renuit, ac confutat, adeo, ut nihil sit in scientijs ab  
omni parte beatum, Quare si uera hæc tibi esse uiden  
tur, existimare poteris, puxilla hæc mea, quæ nec no  
mine digna sunt, Si in lucem exierint, quo tandem ap  
pullerint, ac peruenerint, ut τιμώτερα, sicuti dici solet,  
πολλῶν γραφισμένων χαρτίων. Verum si his rationi  
bus acquiescere nolueris, ecce mitto tibi librum, ut tuo  
arbitratu eo utaris ac abutaris, Expunge ac reseca,  
Quod est superfluum, Quod uero deficit adiunge, Fac,  
ut lubet, modo id intelligas animi nostri pignus apud te  
esse, & tenax nostri amoris intimi quoddam uincu  
lum, Vale & ut facis me ama, Ex ædibus nostris. s. Ca  
lendas Maij, Anno 1550.



IOANNES BACCANELLIUS  
STVDIOSIS IUVENIBVS  
REGIENSIBVS

Χαίρειν.

\*



AE PENVMERO ac diu cogitavi doctissimi iuvenes, quo pacto hanc mei animi in uos obseruantiam, qua semper eruditissimos quosque homines amplecti soleo, possem attestari ac palam demonstrare, sed hucusque nunquam mihi datum est, Vt aliqua mei ingenij industria, uos insigni encomio, aut aliquo magno munere ornare potuerim. Quum nec ornatissima sermonis integritas, neque rerum locupletissima suppellectilis mihi adfuerit, Sed alij ingenio doctrina, & rebus longe inferior, nil tandem prestare posse cognoscebam, quam meram & insignem mei ignorantiam, In qua cum diu immersus sim, nec à tam innolucris scirpo me absolvere sciam, Id certe agere tentavi, ut quod de proprio & peculiari non possum, alieno aere soluere procurauerim: Extant enim apud me quaedam ex Galeno & Hipocrate alijsque doctissimis Medicis excerpta dogmata mirum in modum ad *ὑγιαίνοντα* facientia, atque in ordinem redacta. Quae & si uobis condigna nec foecunda munera esse uideantur, Netamen meae in uos obseruantiae defensor uidear, Vobis dicare, donare, & consecrare constitui, Id existimans quod si alicui uestrum non placeat



cuerint, Saltem fore aliquem inter uos, Qui meum  
hunc animum, ne dicam laborem, interdum laudauerit  
ac contra æmulos siquid secus ac scripsi, senserint,  
uel publice blaterare uoluerint ualidissimis rationibus  
propugnauerit. Accipite igitur hæc qualiacunque sint  
hilari animo, Et uestro iure fruimini. Scio enim quod  
si quid eritis *θηρωμενοι παρ αυτων* non nisi gratissima esse  
poterunt. Vos interim illius apophthegmatis ne ob  
liuiscimini, quod *ως η μνη θρασος α πο του περιχαριστος αρεας  
λαβειν το φως, η διψυχη απο των μαθηματων.*

Valete.



# I N D E X.

<b>A</b>	<b>Abſinthium</b> pag. 770	<b>Alfeniati quid ſit</b>	227
	<b>Abſinthii ſucc<sup>o</sup> ma-</b>	<b>Allia</b>	773
	<b>gis ſtomacho con-</b>	<b>Alipia</b>	ibidē
	<b>ferat quam ipſa herba p. 410</b>	<b>Alchechengi</b>	810
<b>Abrotanum</b>	770	<b>Aloes</b>	774
<b>Abſtergentia quid agāt</b>	764	<b>Alſcebram</b>	850
<b>Acacalis</b>	770	<b>Althea</b>	774
<b>Acatia</b>	ibidē	<b>Alteratricis officium</b>	34
<b>Acanthion</b>	771	<b>Alteratio corporis quot mo-</b>	
<b>Acanthum</b>	ibidem	<b>dis fiat</b>	38
<b>Achillea</b>	ibi.	<b>Alteratio duplex</b>	66
<b>Acinus</b>	ibidē	<b>Alteratio quid ſit</b>	67
<b>Acidorum aſtiones</b>	764	<b>Alteratio concoſtio humo-</b>	
<b>Acorus</b>	771	<b>rumque preparatio ac dige-</b>	
<b>Aconitum</b>	772	<b>ſtio quō differant</b>	ibidem
<b>Adiantum</b>	ibidem	<b>Alteratio p ſe an ſit cauſa do-</b>	
<b>Ad ſuppuratiōem &amp; ad puſ-</b>		<b>loris</b>	1:6
<b>ſiniri an idem</b>	692	<b>Altuabil quid ſignificet</b>	727
<b>Aegylops</b>	772	<b>Althoin quid ſit</b>	678
<b>Aegwov</b>	843	<b>Alumen &amp; eius ſpecies</b>	774
<b>Aer &amp; aqua an poſſint putre-</b>		<b>Alypon</b>	773
<b>fieri</b>	630	<b>Alyſma</b>	ibid.
<b>Aetas quid</b>	14	<b>Alyſon</b>	774
<b>Aetates quot ſint</b>	ibi.	<b>Amara quid agant</b>	764
<b>Aetatum tēperamenta quot</b>		<b>Ambroſia</b>	775
<b>ibidem</b>		<b>Ambra odorifera</b>	ibidē
<b>Aetates an ſint plures quam</b>		<b>Amiantus</b>	ibidem
<b>quatuor</b>	ibidem	<b>Amylum</b>	ibidem
<b>Aetates an poſſint p̄ſiniri. 15</b>		<b>Amini ſive Ameos</b>	ibid.
<b>Aetatū doſtrīa an ſit utilis 15</b>		<b>Ammoniacū &amp; ei<sup>o</sup> ſpecies</b>	776
<b>Aetas nō dicitur cal. uel frig.</b>		<b>Amomum</b>	ibid.
<b>niſi ratione ſubieſti</b>	16	<b>Ampelitis</b>	ibidem
<b>Aegritudines compoſitionis</b>		<b>Ampelopraſton</b>	ibidem
<b>quot</b>	39	<b>Anagallis</b>	ibidē
<b>Agallochon</b>	772	<b>Anagiris</b>	ibidem
<b>Agaricum</b>	ibidem	<b>Anadoſis quid ſit</b>	68
<b>Ageraton</b>	773	<b>Anchuſa</b>	777
<b>Alcea</b>	ibid.	<b>Androſemon</b>	ibidem
<b>Alcuabe quid ſit</b>	97	<b>Anemone</b>	ibidem



# I N D E X.

Anethum	ibidē	appetitus canini signa	398
Angelica	778	appetitus canini cura	399
Angina quid sit	308	appetitus canino conferen-	
Anginæ differentia	ibidē	tia	401
Anginæ causæ	309	appetitus canini Pronostica	
Anginæ indicia	310	ibidem	
Anginæ cura	311	apetitui canino an semper ubi	
Anginæ conferentia	314	num conferat	404
Anginæ pronostica	ibidē	aperitiua in sputo sanguinis	
Anginæ an conueniant reper-		ex retentione mestrurorum	
culsiua	315	facto an conferat	349
Angina an magis a pituita q̃		Apertio quid referat	43
a ceteris humoribus fiat ib.		aphace	779
Anima quomodo a natura di-		apium	ibidē
stinguatur	1	apios	ibidem
Animæ sedes ubi	33	apiastrum	ibidem
Animalis uirtus ex motu co-		apium raninum	838
gnoscutur	45	apoplexia quid	171
Anisum	776	apoplexia acutissima	17
Anonis	ibidē	apoplexiæ causæ	ibidē
An omni anginæ conueniat		apoplexiæ signa	173
sectio uenæ	315	apoplexiæ cura	175
Anhelitus an sit morus natu-		apoplexiam excitantia	181
ralis uel uoluntarius	335	apoplexiam curantia	ibidē
An in difficultate spirandi de-		apoplexiæ incurabilis cogni-	
tur uinum	ibidē	tio	182
Anodyna duplicia esse	768	apoplexiæ pronostica	181
Anchemus	778	apoplexiæ species an sint tan-	
anthyllis	ibidem	tum tres.	183
anthirrhinon	ibid.	apoplexia an a calido humo-	
anthera	ibid.	re fiat.	ibidem
antimonium	848	apoplexia an a simplici frigo-	
aparine	779	re fiat	ibidē
Αρωππο, Αρωππονα	311	apoplexia fortis an possit sa-	
appetitus caninus quid	396	nari	ibidem
appetitus duplex	ibidē	Apostema duplī gñatur	669
appetentia quot modis læda-		Apostematum dolores sedan-	
tur	397	tia	677
appetitus canini causæ	ibid.	Apostemata maturātia	ibi.



# I N D E X.

Apoſtemata an tātum calida	Asparagus	ibidem
que a ſanguine & bile 678	Asphodellus	ibidem
Apoſtema an ſit morbus ibi.	Asplenon	ibidem
Aperiētia & rarefaciētia quo-	Aſter atticus	ibidem
modo differunt 766	Aſtragalus	783
Aphteoris 301	Aſthma quid	330
aphtarum cauſæ ibidē	Aſthmatis cauſæ	ibidem
aphtarū inducia & cura 302	Aſthmatis indicia	332
aphtas curantia ibid.	Aſthmatis cura	333
aphthis nocentia 303	Aſthmati conferentia	334
aphtharū pronosti- ibidē	Aſthmatis pronostica	335
arbutus. 780	Aſthma an ſit uerus morbus	
arction ibid.	pulmonis	ibidem
argemone ibidem	Aſthmati an conueniant ual	
argentum uiuum ibidē	de ſoluentia	ibidem
ariſtolochia ibidem	de ſoluentia quid	317
Ariſtoteles an ſibi aduerſetur	Athara	783
in putrefactione aeris 630	Atrabilis quid	214
armenius lapis 781	Attractylis	783
aron ibidem	Attrahētia ex qb <sup>o</sup> cōſtēt	767
artemiſia ibidem	Atramentum ſutorium	792
arteriarū tres dimēſiones 50	Atriplex	783
arteriæ an tantum moueātur	Attractricis officium	34
motu pulſus 52	Auctio quid	32
Ars curatoria quoruplex 56	Autrix & nutrix an ſint idē	34
Arquatus & aurigo 427	Auditui nocentia	266
Articularis morbus 157	Auditum acuentia	284
Articularis morb <sup>o</sup> cauſæ ibi.	Auellana	783
Articularis morbi ſigna 338	Auena	ibidem
Articularis morbi cura 359	Auena ſylueſtris	787
Articularis morbi pronosti-	Auicenna locus corruptus ac	
ca 563	reſtitutus	699
Aſaron 781	Auic, cōcordatur cum raze in	
Aſſa ſætida 817	cura eryſipell.	ibid.
Aſclepias 781	Auricula muris	825
Aſcalonia uulgaris 787	Auſonij epigramma de inten	
Aſciti an ſemper incifio con-	tionibus medic.	166
ſerat 460	Azaranius prohibet ſecari ue	
Aſpalatus 782	nam in phrenitide.	135



# I N D E X.

Anethum	ibidē	appetitus canini signa	398
Angelica	778	appetitus canini cura	399
Angina quid sit	308	appetitus canino conferen-	
Anginæ differentia	ibidē	tia	401
Anginæ causæ	309	appetitus canini Pronostica	
Anginæ indicia	310	ibidem	
Anginæ cura	311	apetitui canino an semper ui-	
Anginæ conferentia	314	num conferat	404
Anginæ pronostica	ibidē	aperitiua in sputo sanguinis	
Anginæ an conueniant reper-		ex retentione mēstruorum	
cussiuæ	315	facto an conferat	349
Angina an magis a pituita q̃		Apertio quid referat	43
a ceteris humoribus fiat ib.		aphace	779
Anima quomodo a natura di-		apium	ibidē
stinguatur	1	apios	ibidem
Animæ sedes ubi	33	apiastrum	ibidem
Animalis uirtus ex motu co-		apium raninum	838
gnoskitur	45	apoplexia quid	178
Anisum	776	apoplexia acutissima	17
Anonis	ibidē	apoplexiæ causæ	ibidē
An omni anginæ conueniat		apoplexiæ signa	173
sectio uenæ	315	apoplexiæ cura	175
Anhelitus an sit motus natu-		apoplexiam excitantia	181
ralis uel uoluntarius	335	apoplexiam curantia	ibidē
An in difficultate spirandi de-		apoplexiæ incurabilis cogni-	
tur uinum	ibidē	tio	182
Anodyna duplicia esse	768	apoplexię pronostica	181
Anthemus	778	apoplexiæ species an sint tan-	
anthyllis	ibidem	tum tres.	183
anthirrhinon	ibid.	apoplexia an a calido humo-	
anthera	ibid.	re fiat.	ibidem
antimonium	848	apoplexia an a simplici frigo-	
aparine	779	re fiat	ibidē
Αντισπασμ, Αντισπασμ	311	apoplexia fortis an possit sa-	
appetitus caninus quid	396	nari	ibidem
appetitus duplex	ibidē	Apostema duplī gñatur	669
appetentia quot modis læda-		Apostematum dolores sedan-	
tur	397	tia	677
appetitus canini causæ	ibid.	Apostemata maturātia	ibi.



# I N D E X.

Apostemata an tantum calida		Asparagus	ibidem
que a sanguine & bile	678	Asphodellus	ibidem
Apostema an sit morbus	ibi.	Asplenon	ibidem
Aperiētia & rarefaciētia quo-		Aster atticus	ibidem
modo differunt	766	Astragalus	783
Aphteoris	301	Asthma quid	330
aphtarum causæ	ibidē	Asthmatis causæ	ibidem
aphtarū inducia & cura	302	Asthmatis indicia	332
aphtas curantia	ibid.	Asthmatis cura	333
aphthis nocentia	303	Asthmati conferentia	334
aphtharū pronostica	ibidē	Asthmatis pronostica	335
arbutus.	780	Asthma an sit verus morbus	
arction	ibid.	pulmonis	ibidem
argemone	ibidem	Asthmati an copueniant ual	
argentum uiuum	ibidē	de soluentia	ibidem
aristolochia	ibidem	oxytocica quid	317
Aristoteles an sibi aduersetur		Athara	783
in putrefactione aeris	630	Atrabilis quid	214
armenius lapis	781	Attractylis	783
aron	ibidem	Attrahētia ex qb <sup>o</sup> cōstēt	767
artemisia	ibidem	Atramentum sutorium	792
arteriarū tres dimēisiones	50	Atriplex	783
arteriæ an tantum moueātur		Attractricis officium	34
motu pulsus	52	Auctio quid	32
Ars curatoria quoruplex	56	Autrix & nutrix an sint idē	34
Arquatus & aurigo	427	Auditui nocentia	266
Articularis morbus	357	Auditum acuentia	284
Articularis morb <sup>o</sup> causæ	ibi.	Auellana	783
Articularis morbi signa	358	Auena	ibidem
Articularis morbi cura	359	Auena syluestris	787
Articularis morbi pronosti-		Auicenna locus corruptus ac	
ca	363	restitutus	699
Asaron	781	Auic, cōcordatur cum raze in	
Assa fætida	817	cura erysipell.	ibid.
Asclepias	781	Auricula muns	825
Ascalonia uulgaris	787	Ausonij epigramma de inten	
Asciti an semper incisio con-		tionibus medic.	166
ferat	460	Azaranius prohibet secari ue	
Aspalatus	782	nam in phrenitide.	135



# INDEX.

<b>B</b> acchara	781	Bromos	787
Baccharis	783	Bruscus	774
Balneum quid perficiat in-		Bubonium	783
ophthalmia	242	Buccinae	787
Balneum quibus casibus nō		Buglossum	ibidem & 795
conueniat	576	Buglossum sylvestre	803
Ballote	784	Bulbus	787
Balneum an conferat ante cly-		Bulimus quid sit	402
steris impositionem	89	Bulimi causae & signa	ibidem
Balsamum	784	Bulimi cura & pronostica	403
Balsamina	854	Bulinus an idem cum appeti-	
Barachion quid sit	678	tu canino	404
Barba hirci	784	Bulimo an cibi crassi confe-	
Barba syluana	773	rant	ibidem
<i>Batrachis</i> quid	299	Bunium	787
Batrachi causae & indicia	300	Buphthalmos	788
Batrachi cura	ibidem	<b>C</b> acalia	788
Bdellium	784	Cachochymia	54
Beta	785	Cachexia quid	444
Beta aquatica	773 & 837	Cachexia an semper precedat	
Betonica	785	hydropen	460
Bedeguar	847	Cadmia	788 & 836
Bilis quid & eius diuifio	23	Calamintha	ibidem
Biondela	792	Calamentum	ibidem
Bistorta	787	Calam <sup>o</sup> aromaticus	771 & 788
Bislingua	812	Calefactoria an in febre pesti-	
Bitumen	785	lentiali conueniant	630
Blatae	ibidem	Calx uiua	789
Blitum	786	Calidum duplex	11
Bolus Armenius	818	Calidum quot modis dica-	
Borax	794	tur	ibidem
Botrys	786	Calidiora membra quae ibid.	
Bognacha	778	Calculorum renum pronos-	
<i>Gporxos</i>	317	tica	514
Brancha ursina	772	Cal culian possint generari a	
Brassica	786	cal. temperato	514
Britanica	ibidem	Calculosis dormire sup dor-	
Brionia	853	sum an noceat	ibidem
Brassica canina	800	Caloris duplex generis	565



# INDEX.

Calor naturalis & extraneus	38	Causæ salubres & isalubres	38
an idem	ibidem	Causæ morbi quot sint in ge-	
Calor an accendi possit tan-		nere	39
tum in spiritibus	573	Causæ morborū, calidorum	
Calor hecticæ non transit de		quot	ibidem
specie in speciem	582	Causæ frigidorum siccorum	
Calor hecticæ an magis appa-		humidorum quot	40
reat assumpto cibo	ibidem	Causæ morborum an semper	
Cancamon	789	considerandæ	41
Cancer quid sit & eius diui-		Causæ breuitatis febriū qua-	
sio	744	tuor	592
Cancro causæ & indicia	ibi.	Causus febris qd & eius cau-	
Cancro curatio	747	sæ	611
Cancro conferentia	750	Causi febris signa	612
Cancro prælagia	752	Causi febris cura & pronosti-	
Cancro occulti qui sint	ibi.	ca	613
Cancer an mutet locum	753	Causæ cephalæ	104
Cancro an curari possint	ibi.	Caustica quæ	ibi.
Cannabis	ibidem	Causæ æternæ an in omni af-	
Camphora	ibidem	fectu inquirendæ	692
Capparitis	790	Causa coniuncta an detur a	
Capillus ueneris	772	morbo distinctu	678 & 681
Caput ledentia	124	Causa reuersiōis febriū q	638
Capilli cur defluant	357	Cauterium ex ære an sit effi-	
Cardamomum	790	ficax	101
Carum. i. carui	ibidem	Cauterium an tuto capiti sit	
Cardiaca passio	369	applicandum	ibidem
Carduus	790	Cauterium an satius potētia-	
Carum	ibidem	le quàm actuale	ibid.
Carlina	793	Cauterizator quid cauere de-	
Carthamus	796	beat	100
Cassia	790	Cauterium an in omni tem-	
Castoris	791	pore fieri possit	ibi.
Castanea	ibidem	Cauterij actualis uires & u-	
Catharrho conferentia	322	sus	98
Cattaracta oculorum	247	Cauterium potentiale quid	
Cataputia	817	sit	98
Caucalis	791	Cauterium quotuplex sit	ibi.
Cauda æquina	812	Cedrus	791



# I N D E X.

Cedrinus liquor	791	Chrysanthemum	ibidem
Celsus an a Galeno dissentiat		Chrysocola	794
in cucurbitulis	64	Chiyraga quid	557
Centinodia	836	Cibi melancholici qui	216
Centaurium maius	791	Cibandū aliquando in mor-	
Centaurium minus	ibidem	bi uigore	59
Cephalea quid sit	103	Cichorium	794
Cephalea quomodo uocatur		Cicuta	ibidem
ab Auicenna	ibidem	Cinnabaris	ibidem
Cephalea quem locum occu-		Cinnamomum	795
pat	ibidem	Circea	ibidem
Cephaleæ signa	106	Cirsion	ibidem
Cephalea quur dolorem per		Cistos	ibidem
interualla efficit	108	Citria	ibidem
Cephaleæ cura	108 & 113	Citrach	782
Cephaleæ & hemicranie pro-		Clematidis	795
nostica	124	Clymenon	796
Cephalea an a cephalalgia dif-		Clyster qd sit & eius usus	86
ferat	125	Clysteres an ascendunt ad ie-	
Cepe cur noceant capiti	142	junum intestinum	ibi.
Cedronella	776 & 780	Clysteres naturæ opus inter-	
Centum capita	782	rumpunt	87
Cerebri uentriculos inspirant	165	Clysteribus imponendis an ser-	
Cerebri subia an possit in-		uanda sit hora	ibidem
flammari	138	Clysteres an frequentari pos-	
Chalcanthum	792	sint	89
Chamecissos	ibidem	Clysteri imposito an sequa-	
Chamedaphne	ibidem	tur ulla læsio	ibi.
Chamedrys	ibidem	Cnicus	783 & 796
Chamomilla	778	Condrilla	796
Chamelea	792	Conyza	ibidem
Chameleon	793	Color est certissima nota suc-	
Chamepitys	ibidem	corum	594
Chamefyce	793	Contraria contrarijs curan-	
Charabe	803	tur	43
Charabitus quid	128	Côcoctio duplex & qd sit	67
Chathartica, quomodo sint		Concoctio præcedit ad dige-	
duplicia	768	stionem	69
Chelidonium	793	Côcoctio an a frigidis fiat	70



# I N D E X.

Conuulsio quid sit	196	Condescentia quid agant	767
Conuulsio an sit morbus uel symptoma	197	Cōstringentiū actiones	ibi.
Conuulsionū diuissio & causæ	198	Corallium	796
Cōuulsio an sit curabilis	200	Colta	774
Conuulsio quòd fieri possit a flatu	ibidem	Colocynthis	799
Conuulsionum signa	201	Conditi	817
Conuulsionum cura	203	Corallina	825
Cōuulsionū pronostica	209	Cordialis medicina quot modis dicatur	375
Conuulsio ex helleboro quo modo intelligitur	210	Cordi nocentia & conferentia	376
Conuulsio de inanitione an semper mortalis	212	Coriandrum	797
Conuulsio de repletionē an a febre semper curari possit	ibidem	Coriza	316
Cōuulsio incurabilis quæ ibi.	ib.	Cornu cerui	797
Columella quid sit	305	Cornus arbor	ibidem
Columellæ indicia	306	Coronopus	ibidem
Concoctio quot modis lædatur	389	Corpus fluidum quomodo intelligatur	43
Concoctionis corruptæ causæ	390	Corpus respirare etiam per uenas	53
Coitus an ualeat in morbis pituitosis	546	Corporibus sanis quod nutrimentum	60
Colicæ an in principio conueniant narcotica	413	Corruptionis aeris causa	618
Concoctionis corruptæ signa	392	Costus	797
Concoctionis corruptæ cura	ibidem	Cotonea	798
Concoctionis corruptæ pronostica	395	Crimmon	ibidem
Concoctio an lædatur a siccitāte & humiditate absque alijs qualitatibus	ibidem	Chrithmon	ibidem
		Crocodilion	ibidem
		Crocus	ibidem
		Cucurbita	ibidem
		Cucumis	799
		Cucumis syluestris	ibidem
		Cucurbite syluestris	ibidem
		Cupressus	800
		Cura singulorū morborum in genere	42
		Curationis præcipua intentio quæ	ibidem



# I N D E X.

Cuscuta	800	Dentes an per se patiatur	295
Cucurbitularum usus & dif-		Dentes an ab aliis ossibus dif-	
ferentia	89	ferant	296
Cucurbitula quid sit	ibid.	Dentes an possint apostema-	
Cucurbitis itepestiue posi-		ri	ibidem
tis quid sequatur	ibidem	Destillatio quid sit	317
Cucurbitularū iuamēta	92	Destillationum causae	ibidē
Cucurbite an in pncipio mor		Destillationum indicia	318
bi admouendae	93	Destillationum cura	320
Cucurbitae an repletis conue		Destillationū pronostica	323
niant	ibidem	Destillationes quae uerae uo-	
Cucurbitae incidende an sit		centur	ibidem
terminus	ibidem	Desyderiū coitus an sit ex ce-	
Cucurbitis positis an ciban-		rebro	546
di hora determinetur	ibi.	Deriuatio quid sit	83
Cucurbitae stāte cruditate an		Deriuatio quō fiat	ibid.
admouendae	95	Diabetis signa & eius cura	20
Cucurbite an i frigida & sic-		Diabeti conferentia, & eius	
ca temperie conueniāt	ibi.	pronostica	522
Cur detergēti magis profuit		<i>diatrixi</i>	56
sudor	643	Dictamus	802
Cucurbitae an iuuent in cura		Differentiae partium sunt qua-	
stramarum	733	tuor	28
Cyanon	ibidem	Difficultas spirandi an proue-	
Cyclaminus	ibidem	niant tantum a laesione spiri-	
Cynoctonon	772	tualium an etiā ab aliis	335
Cyminum	800	Digestio quid sit	67
Cynocrambae	ibidem	Digestio an sit humorum al-	
Cynoglossa	801	teratio	69
Cyperus	ibidem	Digestio duplex	70
Cytisus	ibid.	Digestio an tantum humori	
<b>D</b> Aphnoides	801	putrido conueniat	597
Daucus	ibidem	Dipsacus	802
Diabetes & eius causae	520	Discordia auicen cum Gale-	
De dolore i genere & eius spe-		no in cura appetitus cani-	
cie	491	ni	400
Delirium sit interdum nō pa-		Diurectica an i principio cal-	
tiente cerebro	138	culi conueniant	514
Dentibus nocentia	294	De odoribus	762

Dies



# I N D E X.

Dies iudicatorij qui sint	644	Dolor iuncturarum	557
Dolor an fiat ab humido tan- tum	126	Doloribus iuncturarum con- ferentia	566
Dolor an fiat a solutione con- tinui tantum	ibidem	Dolores & febres an indecli- natione accidunt	672
Dolor aurium quid	259	Dolor an fiat ab inflatiōe	760
Doloris aurium causæ	ibi.	Dracunculus	802
Doloris aurium indicia	260	Dryoptetis	ibidem
Doloris aurium cura	261	δυσουπία	566
Dolorem aurium curantia	266	Dysenteria quid & eius cau- sæ	467
Doloris aurium pronostica	267	Dysenteriae signa	468
Dolor aurium an sit periculo- sus	ibidem	Dysenteriae cura	469
Dolor dentium	291	Dysenteriae conferentia	474
Doloris dentium causæ	292	Dysenteriae pronostica	475
Doloris dentium signa & cu- ra	ibi.	Dysenteria sanguinea an bi- liosa deterior	476
Dolores dentium curantia	294	Dysenteria ab attrabile an se- per lethalis	ibid
Doloris dentium pronostica	295	δυσπνοία & eius causæ	330
Dolores dentium an magis calid. quàm frigid. fiāt	ibi.	Ebenus	802
Dolor stomachi & eius cau- sæ	404	Ebulus	803
Doloris stomachi signa	405	Ebur	ibidem
Doloris stomachi cura	406	Echion	ibidem
Doloribus stomachi confe- rentia & nocentia	409	Echinus	ibid.
Doloris stomachi pronostica	410	Electrum	ibidē
Dolori maximo an semper phleb. conferat	411	Elleborus	804
Dolor colicus quid	492	Elemētum physicum quid	5
Doloris colici causæ	493	Elementum medicū quid	ib.
Doloris colici signa	495	Elementa quot sint	6
Doloris colici cura	ibi.	Elementa hominis quæ	ibid.
Dolori colico nocentia & cō- ferentia	500	Elementorum doctrina an sit utilis	7
Doloris colici pronostica	501	Empiema quid	351
		Empiematicus causæ	352
		Empiematicus signa	ibidē
		Empiematicus cura	354
		Empiematicus pronostica	356
		Empiema an per unctionē uel	

((



# I N D E X.

incisionem curandum	358	Error Ioannis de Vigo in spha-	
Emplastica quæ sint	766	celi ethymo.	710
Emollientium et pus mouen-		Error Andreæ Bellunensis	95
tium differentia	765	Error Dini alius	630
ἐμψύσματα quid sit	753	Endiuia	794
Emphysema an differat ab		Eryngium	804
empneumatosi	754	Erysipelas an inter inflamma-	
Emollientia	737 & 741	tiones enumeretur	768
Epithimum	804	Erysipelatis definitio & diui-	
Ephemeron	ibidē	sio	694
Ephemera	573	Erysipelatis causæ & indi-	
Ephemere pronostica	577	cia	695
Ephemera an coniungi possit		Erysipelas quomodo a seg-	
cum putrida	ibi.	mone distinguatur	696
Epilepsia quid	158	Erisipelatis curatio	697
Epilepsia an sit morbus uel		Erysipelas & ignis sacer an sē	
symptoma	ibidem	per idem	702
Epilepsiam excitantia curan-		Erysipelas an sit tumor præ-	
tiaque	168	ter naturalis	ibidem
Epilepsia per consensum an		Eruca	805
post pubertatē curetur	170	Eruum	ibidē
Epilepsia an curetur per om-		Esula rotunda	833
nem mutationem calid. &		Esula maior	66
sic.	ibidem	Euacuatio quot modis fiat	75
Epilepsia an habeat cū apo-		Euacuationi quot requirun-	
plexia eandem causam & lo-		tur	76
cum affectum	ibidem	Euacuatio nimia morbum	
Epilepsie causa immediata an		parit	78
sit uapor absque materia fo-		Euacuationes quando nō de-	
uente	ibidem	beant fieri	80
Epulis quid sit	296	Euacuatio an fieri possit in	
Epulotica quæ	769	principio morbi materia nō	
Error eorum qui apoplecti-		turgente	ibidem
cum interdum dormiri non		Euacuatio an sit optima si	
permittunt	180	copia humorum exeat	ibid.
Error Auic. & Serapionis	614	Eupatorium	805
Error Razes error Arculāi	776	Euphorbium	806
Error Dini in scirrho	742	Excrementa quandoque, par-	
Error Auic. in herpete	703	tes quandoq; signa sunt	45



# I N D E X.

Extremis morbis extrema re-	Febris hectica cura	580
media	Febris hectice pronostica	582
<b>F</b> aba	Febris hectica an possit per	
Faba crassa	se incipere	ibidem
Facultas est triplex	Febris hectica cur difficilis	
Facultas animalis	cognitionis & facilis cura-	
Facultates omnes ubi collo-	tionis	ibidem
centur	Februm putridarum diuisio	
Facultates corporis propriæ	& numerus	583
quot sint	Februm putridarū signa in	
Facultates naturales an sint	genere	586
i qualibet parte corporis	Febres biliosa quot	588
Facultates an alibi sint quàm	Febris tertiana pura	587
inanimato corpore	Febris tertianæ causæ signa	
Facultatū cognitio an sit uti-		588
lis	Febris tertianæ puræ cura	589
Facultas uitalis an naturali	Febris tertianæ pronostica	592
sit prior	Febris tertiana notha	ibidem
Facultates simplicium quomo-	Febris tertianæ nothæ causæ	
do cognoscantur	& signa	493
Farfara	Febr. tertianæ nothæ cura	594
Febris quid & unde dicatur	Febris tertianæ nothæ prono-	
nume.	stica	596
Februm diuisio	Februm prorogationis cau-	
Febres accidentales quæ ibid.	sa	ibidem
Februm causæ in genere	Febris tertiana an possit co-	
Februm tempora quot	gnosci per accessionem de	
Febris an sit cōplexio calida	tertio in tertium	ibid.
& sic.	Febricitatibus an omnes fru-	
Febris an diuidatur in mor-	ctus noceant	ibidem
bum & accides	Febribus an aliquod uinum	
Febris ephemera	conueniat	ibidem
Febris ephemeræ causæ & si-	Febris sanguineæ genera	606
gna	Februm sanguinis causæ	607
Febris ephemeræ cura	Februm sanguinis signa	608
Febris ephemera an sit acci-	Februm sanguinis cura	ibid.
dentalis	Februm sanguinis pronosti-	
Febris hectica & ei <sup>9</sup> causæ	ca	610
Febris hectica indicia	Febris causon	611



# INDEX.

Febris hepiala	614	stypica	485
Febris lypiria	616	Fluxus hepaticus an requirat	
Febris quotidiana	598	tenuē uictum	ibidem
Febris quartana	602	Fluxus hepaticus an sit faci-	
Febres quomodo accedāt in		lis curationis	ibidem
tumoribus	671	Fluxus sanguinis narium &	
Febris pestilēs quid sit & eius		eius cura	647
causæ	619	Fluxus sanguis nariū in quar	
Febris pestilētis indicia	621	tana cur nō cohibēdus	649
Febris pestilētis præfagia	629	Fluxus sanguis narium par-	
Febri pestifere an uinum con		uus, malus	652
ueniat	630	Fluxus sanguinis narium in	
Febris an a frigido possit fie-		quartana malus	ibid.
ri	632	Folium indicum	821
Febris an sit morbus causa		Fraxinus	807
uel accidens	ibidem	Frasinella	836
Feniculum	806	Frigus quid sit	632
Fenugræcum	807	Frigoris causæ & curatio	634
Ferula	806	& infra	
Ficus	ibidem	Frigus an sit causa tātum tre-	
Filix	ibidem	moris	640
Finis medicinæ quid		1 Fumaria siue fumus terre	807
Flos æris	806	Fungi	ibid.
Fluxionum differentiæ	310	Albanum	807
Fluxus in apostematis hepa-		Gal. an monstrauerit de	
jis an mortalis	426	secunda uena per urinā	49
Fluxus uehemens an in prin-		Galega	8
cipio, pescendus	476	Galiopsis	807
Fluxus hepaticus	477	Gallion	ibidem
Fluxus hepatici causæ	478	Gāgreña & sphaceli defin.	710
Fluxus hepatici species no-		Gangrænæ & sphaceli causæ	
uem	477	710 & 716	
Fluxuū hepaticorū signa	480	Gāgreñe & sphaceli indicia &	
Fluxuū hepaticorū cura	481	cura	712 & infra
Fluxui hepatico conferen-		Gangrænæ conferentia & præ	
tia	484	sagia	715
Fluxuum hepaticorum pro-		Gangræna an a sphacelo dif-	
nostica	ibidem	ferat	716
Fluxui hepatico an cōueniāt		Gāgreña an ossib <sup>9</sup> accidat ib.	



# I N D E X

Garrus	808	Hectica	578
Garyophyllum hispanicū	811	Heliochrison	811
Generatio nō est simplex natura actio	31	Heliotropium	ibidem
Genista	808	Helxine	ibid.
Gentiana	ibidem	Hemicrania quid	119
Geranion	ibidem	Hemicranie causę & signa	120
Gingidium	808	Hemicranie cura	121
Gir	809	Hemerocallis	811
Glaucoma quid	247	Hemionitis	ibidem
Gladiolus	809	Hepatis imbecillitas quid	411
Glaucium	ibidem	Hepatis imbecillitatis causę ib.	
Glaux	ibidem	Hepatis imbecillitatis signa	412
Glycyrrhiza	ibid.	Hepatis imbecillitatis cura	413
Gingiuarum affectus	296	Hepatis imbecillitati nocetia	
Gingiuarum aff. causę	297	conferentia	416
Gingiuarum affect. signa	298	Hepatis imbecillita. pronost. ibi.	
Gingiuę cur corrodat	439	Hepati super calefacto an cō-	
Gonorrhea	840	ueniat cerusa	416
Gonorrheę causę & signa	541	Hepatis apostematib⁹ an cō-	
Gonorrheę conferentia	543	ferant styptitiora q̄ in mor-	
Gonorrheę pronostica	ibid.	bis stomachi	ibidem
Gonorrhea an sit propria passio pudendi uel ex pultrici		Hepatis apostemati an conse-	
facultatis	139	rat sectio uenę in pede an in	
Gonagra quid	557	brachio	ibidem
Gramen	810	Hepatica	818
Grauedo	317	Hepiala febris quę	614
Gurgulio	304	Hepialę causę & signa	615
Gutturi nocentia	313	Hepialę cura & pronostica	616
<b>H</b> alicacabus	810	Herba gatta	788
<b>H</b> alcionium	ibid.	Herba stella	797
Handacoca	820	Herba gruaria	808
Harundo	810	Herba lanaria	839
Hastula regia	782	Herba argentina	849
Harmel	774	Hermodactillus	804
Hedera	810	Herniarum species	535
Hedera terrestris	782	Herpetis defini. & diuisio	703
Hedysaron	810	Herpetis causę & signa	704
		Herpes quomodo differat ab	
		erysipelate	ibidem



# I N D E X

Herpes quomodo differat a	di & maturandi	ibid.	
phagedena & cancro	705	Humiditas quomodo effi-	
Herpetum curatio	ibid.	ciat dolorem	126
Herpeti conferentia & pron-		Hyacinthus	813
ptica	708	Hydropiper	ibidem
Herniarum species	525	Hypops quid sit	448
Hiberis	812	Hydropis tres species	449
Hibiscus	774	Hydropis causæ	450
Hieracium	832	Hydropis signa	452
Hippoglosson	ibidem	Hydropis curatio	453
Hippuris	ibidem	Hydropum signa	458
Hippocrates per unum exem-		Hydropi tussis an semp ma-	
plum multa notat	651	la	ibidem
Hirudines sanguinem tatum		Hyoſciamus	813
cutaneum extrahunt	97	Hypecoon	ibidem
Hirudines quales applicari de-		Hypericon	ibidem
beant	96	Hypolarca an deterior ascite	
Homo an possit uiuere sine	459		
cibo per plures dies	395	Hypo quistidos	795
Hordeum	813	Hypostasis situs consyde- rans	48
Hordeum murinum	ibidem	Hyssopus	814
Horror an gignatur ab exte-		I Aspis	814
riori causa	640	Ictericia quid	427
Horror quid sit	732	Ictericici cur flatuosi nō sūt	435
Horror quomodo differat a		Ictericia ante septimū an sem-	
tremore & rigore	ibidem	per mala	ibidem
Horroris causæ	634	Ictericia post . 7. sine hepatis	
Horroris curatio	635	tumore an bona	ibid.
Humidiora membra quæ	12	Igni sacro conferentia & eius	
Humores quid sint	17	præſagia	700
Humores unde generentur &		Ileus quid & eius causæ	502
quomodo	ibidem & infr.	Ilei signa	503
Humor quid est	ibidem	Ilei curatio	504
Humor malus an possit nutri-		Ileo nocentia & confere- ntia	ibidem
re	26	Ilei pronostica	506
Humores cal. et tenues nū pre-		Ile <sup>o</sup> an possit generari ex si- gna	509
paratione indigeāt antequā			
euacuentur	70		
Humores crassi an sint coquē-			



# INDEX

Isleus an possit curari per flu-	Iris	815
rum urinæ	ibidem	815
Inditiū sectionis uenæ a qui-	Isatis	815
bus sumitur	Ischuria quid	523 & 529
Inflammatio quid sit	Ischuriæ causæ & signa	529
In omni tussi sicca num cōue-	Ischuriæ curatio	531
niāt pillulæ bichichiz	Ischuriæ & stranguriæ confe-	532
Inflammatio iocinoris quid	rentia	532
& causæ	Ischuriæ pronostica	ibid.
Inflāmatio hepatis signa	Ischias quid	557
Inflammationis hepatis cu-	Isopyron	815
ra	Iua	793
Inflammationis hepatis pro-	Incus	815
nostica	Iuniperus	ibidem
Indicus lapis	Ixia	816
Intybum	Ixus	ibidem
Inula	L	
In inflāma. hepatis an conue-	Abrum ueneris	802
niāt aqua hordeacea	Lac an possit adhiberi in	
Inuolūtario exitui urinæ con-	ophthalmia	243
fer.	Lac an phthificis conferat	358
Infania quid	Lacha	816
Indicia morbi a quibus affu-	Lactuca	816
mi debeant	Lac proritantia	769
Inflammatio quid sit	Laxantium & tradentiū qua-	
Inflammationis curatio	litates	766
Inflāmationi conferentia	Ladanum	816
Inflatio quid sit	Lagopus	ibidem
Inflationum causæ	Lambrusca	ibidem
Inflationum notæ	Lanaria	ibidem
Inflationes facientia & earum	Lapathum	817
remedia	Lapsana	ibidem
Inflationum pronostica	Lapis renum & uesicæ	508
Inflationes an secāde sint	Lapidē gñantia & curāria	513
Inflationes an omnes dissol-	Lapis renum num auferri pos-	
uantur a febre	sit per incisionem	514
Indurātia ex qbus cōstet	Lappa minor	780 & 854
Iocinoroli qui dicantur	Lapis lazuli	800
tion	Lafer	817
	Lathyrus	ibidem
	Latarola	796



# I N D E X

Laurus	817	Lienis signa	437
Laureola	792	Lienteria num detur in qua	
Laurus alexandrina	817	ad sint semp acidu ruſt.	466
Lemnia terra	818	Ligusticum & læuisticum	818
Lentes	ibidem	Lilium	819
Lens palustris	ibidem	Lilium syluestre	818
Lentiscus	ibidem	Limonium	819
Lepidium	ibidem	Linum	ibide
Lethargus qd & unde fiat	140	Linguae batrachus quid	299
Lethargi causæ	142	Lingua ceruina	782 & 834
Lethargia notha	ibidem	Lingua bouis	787
Lethargi indicia	143	Lingua canina	808
Lethargi & phrenitidis discri-		Linguae asperitas qd sit & eius	
men	ibidem	causæ	652 & 654
Lethargi & apoplexiæ discri-		Linguae asperitatis curatio	653
mē	ibidem	Lippitudo quid sit apud ara-	
Lethargi curatio	144	bes	238
Lethargum generantia & pro		Lippitudo quid	213
nostica	147	Lippa quid apud Arabes	238
Lethargus an fiat primo in ce-		Lipyria quid	616
rebro	156	Lipyriæ causæ & signa	617
Letharg <sup>o</sup> angigiri possit a me-		Lipyriæ cura & pnostica	ibi.
lancholia	ibidem	Lipyria an sit febris	ibidem
Lethargo an competat sectio		Lipyria an possit esse febris in	
uenæ si ab humiditate & fri-		terpell.	ibid.
giditate fiat	ibide	Lithargyros	819
Lethargo an repellentia occi-		Lithospermon	ibidem
piti adhibeantur	ibi.	Loc <sup>o</sup> affec. in hemicrania	119
Leuitatis intestinorum cau-		Locus affectus i lethargo	140
sæ	ibidem	Locus aff. in paralitide	276
Leuitatis intestinorum si		Locus aff. in dolore detiū	292
gna	462	Loco dolenti q concurrāt	725
Leuitatis intestinor. cura	463	Locus Auicē. explanatus	755
Leuitati intestinorum confe-		Lolium	820
rentia	465	Lotiū quid & eius diuifio	46
Leuitatis intestinorum pro		Lotium optimum quod	47
nostica	ibidem	Lotium an sit excrementum	
Leuropyia quid	461	tantum renum	48
Lichen	818	Lotus egyptia	820



# I N D E X

Lotius fatiua	ibidē	Melācholia morbus quid	213
Lupini	ibidē	Melancholia morbi spēs ibi.	
Lychnis	ibid.	Melancholiæ causæ	214
Lycium	ibidē	Melancholiæ signa	218
Lycoplis	821	Melancholiæ sine materia cu	
Lincurion	ibidem	ra	221
Lypsoxia & syncopis an diffe		Melancholiæ cum materia cu	
rant	378	ra	223
Lyfimachia	821	Melancholiæ per consensum	
<b>M</b> Acer	821	cura	224
Malua syluestris	773	Melācholia per inferiora pur	
Malus habitus quid	792	ganda	226
Mali habitus causæ	ibi.	Melancholiam incitātia ibid.	
Mali habitus signa & cura	793	Melancholiam curantia ibi.	
Malo habitui coferentia	448	Melancholiæ pronostica	230
Mali habitus pronostica	796	Melancholici cur fiant epilē-	
Maiorana	842	ptici	231
Mandragora	822	Melancholia morbus quo -	
Manna	ibidē	modo differat ab humore	
Malabatrū	821	melancholico	232
Malua	ibidē	Melancholia confirmata an	
Marubium	822	possit sanari	231
Marum	823	Mellilotus	823
Marasmus	351	Mellissophillon	ibidem
Marchesita	837	Mellilotus uulgaris	820
Marubium nigrum	784	Menstruorum suppressio	547
Matricaria	832	Mensium suppressionis cau -	
Maturatio expectanda	832	sæ	548
Medica herba	823	Mensiu suppressionis signa	549
Medion	ibidem	Mensium suppressionis cu -	
Medicina quid	1	ra	550
Medicationis diuifio	66	Menses prouocantia	551
Medicamenti purg. nō potest		Mensium suppressionis pro -	
dari certa quantitas	76	nostica	552
Medicamentorū species quot		Mensium profluuium & cau -	
sint	80	sæ	553
Melancholia quid & eius di-		Mensium profluui signa & cu	
uifio	24	ra	ibidē
Melancholiæ generatio ibid.		Menses suppressoria	556



# I N D E X

Mensium profluii pronostica	gnoskitur	39
ibidem	Morbus ueteranus qui	140
Menses excitantia	769 Morbus comitialis qd fit	157
Mentha	823 Morbus comitialis quot mo-	
Mentha florentina	798 dis accipiat	158
μελαιθρον	809 Morbi comitialis causæ ibi.	
Memithæ	ibidem Morbi comitialis signa ibidē	
Membra quid sint	17 Morbi comitialis cura	162
Membrorum diuifio	18 Morbum comitalem curan-	
Memoratricis officium	31 tia	168
Memoria quid	36 Morbi cōitialis pnostica	169
Membra frigidiora quæ	11 Morborum acuterum cur nō	
Membra cur sensus impressio	sunt certa præfagia	306
nem non recipiunt	18 Morbus regius quid	427
Meon	824 Morbi regii causæ	428
Mercurialis	824 Morbi regii signa	429
Mezereon	792 Morbi regii cura	430
Millefolium	824 Morbo regio cōferentia	433
Mira sole	839 Morbus regius ante septimiū	
Modi reuulsionē an sint	sex cur malus	434
tantum	126 Morbi regii pronostica ibid.	
Modus cibādi in morbis	ac. Momordica	854
cum apostemate	135 Morbi dierum imparium cur	
Mod⁹ segregādi lac a sero	227 citius terminentur	644
Mollientia an in phlegmones	Morsus gallinæ	766
augmento competant	686 Motus conuulsiuus an natu-	
Mora	824 rali differat	212
Morbus quid sit	36 Motus an in phlegmone con-	
Morbor. genera quot sint	37 ueniat	692
Morbi an cognoscantur non	Motus an calefaciat	643
cognito affectu secundū	na Muliana	792
turam	41 Mumia	825
Morbi similes an distinguā	Muscus arborum	824
tur ab instrumentariis	ibid. Muscus odoratus	825
Morborum numerus an sit	Muscus marinus	ibidem
nece.	ibidē Myosotis	ibidem
Morbi cōs an cognosci pos-	Myrrha	ibid.
sint per urinam	ibidē Myrrhis herba	ibi.
Morbi status uere non præco-	Myrtus	826



# INDEX

<b>N</b> Aphtha	826	<b>O</b> bservationes in cura ce-	
Napellus	ibid.	phaleæ	III, & 121
Naptum	ibidem	Observationes in purgatio-	
Narcissus	ibidē	ne capitis	113
Nardus	ibidem	Observationes in sectione ve-	
Narcaphthon	827	nę in phrenit.	136
Naturalis scientia medico ne		Observationes de euacuatio-	
cessaria	2	ne in phrenit.	137
Natura quid sit	3	Observationes in uertiginis	
Natura humana quid	3	cura	155
Natura quot modis accipit	4	Observatiōes i apoplexia	180
Natura non tollerat fortes &		Observatiōes i paralyt. d	193
diurnas passiones	555	Observationes in cura spaf-	
Nausea qd & quotuplex	380	mi	208, & infra
Nauseæ causæ	ibidē	Observationes in cura melan-	
Neoterici facta incisione qui-		cholæ	228 & infra
bus utantur	690	Observationes in ophtal-	
Neruis an usus calidus fre-		mia	243
quę profit	196	Observationes in cura dolo-	
Neruis calor quid efficiat	196	ris aurium	265
Nephritis qd & eius causę	515	Observationes in cura soni-	
Nephritidis signa	516	tus aurium	278
Nephritidis curatio	517	Observationes in dolore den-	
Nephritidis pronostica	519	tium	294
Nepita	788	Observationes in gingivarū	
Nerui an oriantur a corde	212	affectibus	299
Nerion	827	Observatio in curandis aph-	
Nigella	809	this	303
Notæ temperaturarum in ge-		Observationes in angina	313
nere	11	Observationes in cura destil-	
Nutritio quid sit	26	lationum	313
Nutritiōi necessaria quę	32	Observatiōes i cura tussis	327
Nutrimētum non datur ra-		Observationes in cura asth-	
tione morbi sed uirium	6	matiss	333
Nutrire in accessionibus quā		Observationes in peripneu-	
doque licet	64	monia	340
Nutrimētum viscosum an no-		Observationes in cura sputi	
ceat hepati	426	sanguinis	347
Nymphæa	827	Observatiōes in cura empie-	



# I N D E X

maticis	355	do sudorem	643
Obferuatiões i pleuritide	366	Obferuatiões circa fluxus fan-	
Obferuatiões in cura paffio-		guinis narium	650
nis cardiacæ	375	Obferuationes circa asperita-	
Obferuationes in cura uom-		tem linguæ	655
rus	385	Obferuationes circa ftupefa-	
Obferuatiões in cura coctio		cientia	658
nis corruptæ	393	Obferuationes circa fitis re-	
Obferuationes in dolore fto		media	662
machi	409	Obferuationes in ualentibus	
Obferuationes inflammatio-		medicamentis tumorū	676
ne hepatis	424	Obferuationes in repellenti-	
Obferuationes in cura sple-		bus medicamentis	ibid.
nis	441	Obferuationes in refoluenti-	
Obferuationes in cura mali		bus medicamētis	ibidem
habitus	447	Obferuationes in fectione tu-	
Obfer. in cura hydropis	457	morum	ibidem
Obferuationes in leuitate in-		Obferuationes poft euacua-	
teftinorum	465	tionem puris	677
Obfer. in cura dysenterie	473	Obferuationes in cura phleg-	
Obfer. in fluxu hepatico	483	mones	690
Obferu. in dolore colico	498	Obferuationes in renulfione	
Obfer. in cura nephritidis	520	& derinatione phlegmones	
Obfer. in cura herniorū	539	ibidem	
Obferua. in gonorrhœa	542	Obferuationes circa reprimē	
Obferuationes in morbo ar-		tia & refoluentia	ibid.
ticulari	561	Obferuationes in fcarificatio	
Obfer. in tertiana notha	596	ne	ibidem
Obferuationes in q̄rtana	646	Obferuatio. in cura & in eua-	
Obferuationes in admouen-		uatione eryfipelatis	668
dis cucurbitulis	93	Obferuatio circa repellentia	
Obferuationes circa fectionē		in eryfipellate	700
uenæ in peftilentia	627	Obferuationes in gangrenæ	
Obferuationes in cura febris		cura	715
peftiferæ	626	Obftruentia & abftergentia	
Obferuatiões circa caufas	628	quæ	766
Obferuationes in alteratione		Obferuatio circa fpōgiam in-	
feb. peftiferæ	ibi.	oedemate	728
Obferuationes in reftringen-		Obferuat. circa ligaturas oc-	



# I N D E X

dematis	723	Oedema nūdum an per se do-	
Observatio circa poscam	ib.	lorem efficiat	ibidē
Observationes circa stru-		Oedema an fiat de dolore ib.	
mas	731	Oleander	827
Observationes in scirrhī cu-		Olostreon	818
ra	740	Olyra	ibidem
Observationes in administra-		Oliuella	837
tione aceti	ibidem	Oenanthe	818
Observationes circa hume-		Operatio naturalis quibus p-	
ctantia & exsiccantia	741	ficitur	28
Observationes circa adipēs &		Operatio quot modis lædi-	
mollientia	ibidē	tur	37
Observationes in cura can-		Ophthalmia quid	232
cri	751	Ophthalmiæ species quot	
Obstructio cui morbo refe-		sint	ibidē & inf.
renda	43	Ophthalmiæ causæ	234
Obstructio an sit causa mis-		Ophthalmiæ signa	236
sionis sanguinis	74	Ophthalmiæ ueræ cura	238
Oculi an sint complexionis		Ophthalmiæ cura localis	239
igneæ	246	Ophthalmiæ nocentia & ui-	
Oculorum doloribus an p-		sum debilitantia	244
sint stupefacientia	ibi.	Ophthalmiam curantia & ui-	
Oculus bouis	788	sum roborantia	ibidē
Ocra	828	Ophthalmiæ pronostica	245
Ocymoides	ibidē	Ophthalmia quomodo co-	
Ocymum	ibidem	gnosciit longo duratura ibi.	
Ocymum aquaticum	ibidē	Opium	829
Odorū definitio quæ sit	763	Opopanax	ibidē
Oedematis definitio & diui-		Orthopnea & eius causæ	330
sio	718	Orthopneæ indicia	332
Oedematis causæ & indicia		Orthopneæ cura	333
ibidem		Orthopneæ conferentia	334
Oedematis curatio	720	Orthopnea an possit fieri abs-	
Oedematis accidentis nulla		que febre	335
propria cura	721	Origanus	829
Oedemati conferentia & pre-		Orminum	ibidem
lagia	724	Ornithogalos	ibidem
Oedema an idem cum infla-		Orobanchæ	830
tione	725	Oryza	830



# INDEX

Ossa etiā apostemantur testæ	παραίμια	304
Auc. & quæ modo	140	Pardalianches 772
Osyris	830	Paritaria 811
ὠσάρις	259	Pastinacha sylvestris 801
Oxyrhodinū an applicandū	Pastinacæ	832
frig. uel cal. i phrenitide	37	Pastinacha piscis ibidem
Oxyachantha	830	Pauarina 776
Ozena quid	288	Paulus an diffinit a Galeno
Ozenæ causæ	289	in cura phlegmonis 698
Alurus	830	Papauer sylvestris 777
palma	ibidem	Peonia 830
Palpitationis cordis pronostici	Peplus	833
ca	377	Peripneumonia quid & eius
Palpitatio & tremor a idē	378	causæ 337
Panax	831	Peripneumoniæ indicia ibi.
Pancration	ibidem	Peripneumoniæ cura 339
Panicum	ibidem	Peripneumoniæ cōferētia 340
Papaueris genus	ibidem	Peripneumoniæ pronostica 341
Papauer cornutum	ibi.	Peripneumoniæ an fiat pitui
Papyrus	832	ta per uiam fluxus 342
Paronychia	ibidem	peripneumōia cur fiat a pleu
Parthenium	ibidem	ritide & non econuerso 341
Partes medicinæ quot	2	peripneumonia pituitosa an
Paraphrenitis an a calid. nu-		sit biliosa deterior 342
de fieri possit	139	Peripneumoniæ ab aliis mor
Paralysis quid	184	is ortæ, an phlebotomia cō
Paralytidis causæ	186	ferat ibidem
Paralytidis signa	188	Personatia 780
Paralytidis cura	ibidem	Perficaria 813
Paralytidem generantia	194	Pestilentie quæ supueniūt 621
Paralytidem curantia. ibidem		Pestilentie curatio 623
Paralytidis pronostica. ibid.		Pestem curantia & perseruan-
Parorasis an sit species suffu-		ptia a peste 629
sionis	258	etrofelinum 779
Parotides quid sint	285	Peucedanum 833
Parotidū causæ & indicia. ibi.		Phalaris ibidem
Parotidum cura	286	Phaselus ibidem
Parotidum pronostica	287	Pharmaca si plura miscean-
Parulis quid sit	296	tur sint eiusdem naturæ 79



# I N D E X

Pharmacha an proprios hu- mores attrahant	79	Pharmacum benedictum qd fit	628
Pharmaca an a nutrimento differant	ibidem	Phlegmone quid fit	682
Pharmacum an in omni tem- pore possit exhiberi	80	Phlegmões causę & signa	684
Pharmaca an indifferenter o- mnes humores purgent. ibi.		Phlegmone an maioris inflā- mationis erysipelate	702
Pharmaco assumpto an dor- miendum sit	83	Phlegmaticis apostematibus conferentia	724
Phrenitidis diuifio & defini- tio	117	φλογωσις quid sit	682
Phrenitidis causę	128	Pilulę Ruffi compositio	632
Phrenitidis indicia	129	piperitis	812 & 818
Phrenitidis cura	131	pityusa	834
Phrenitidis pronostica	138	pituita qd & eius diuifio	20
Phrenitis quęnam mitior	139	pituita quomodo falsa fieri possit	12
Phrenitis an fieri possit absq̃ febre	ibidem	pituita non potest adeo affari ut nigra euadat	217
Phrenitis a sanguine an sint si- gnum exitiosum	ibidem	platanus	834
phthisis	351	plantago	ibidē
phthisis causę	ibid.	plethora qd & quotuplex	53
phthisis indicia	352	plethora quomodo curat	54
phthisis cura	354	plenitudo an ad uasa uel ad uires pertinet	55
phthisis pronostica	356	plenitudo an semper indicet de secanda uena	72
phthisis an a siccita p se fiat	355	pleuritis qd & quotuplex	360
phthisici an zuchar. rosaceum recens conferat	ibid.	pleuritidis causę	ibidem
phthisi an abstergentia solum conferant	ibidē	pleuritidis indicia	361
phu	833	pleuritidis cura	363
phycus marinus	834	pleuritidi conferentia	366
phyllitis	ibidem	pleuritis an fieri possit absq̃ febre	368
phyllyrea	ibidem	pleuritis an a tenui pituita fi- at	ibidem
phyllon	ibidem	pleuritidi factę an repercussi- ua conferant	ibidem
phrenitidi an aqua frig. con- ueniant	139	pleuritis an deterior in fini- stro q̃ in dextro latere	ibi.
phillofella	829	podagra quid	557



# I N D E X.

politrichon	772	pulsus uehemens qui	50
polipus quid	288	pulsus plen <sup>o</sup> & uacuus qui	51
Polypi causæ & cura	289	pulsus ex temperie ætate ibi.	
polypum & ozenas	curan -	pulsus ex anni temporibus &	
tia	291	regione	52
polypi & ozenæ	pronosti -	pulsus uirorū & foeminarum	
ca	ibidem	discrimen	ibidem
polium	835	pulsus ex somno & uigilia ib.	
polemonia	ibidem	pulsuum genera an decē pau	
poligonon	ibidem	ciora	ibidem
polipodium	836	pulsus an dilatetur ex reple-	
pompholix	ibidem	tione	ibidem
populus	ibidem	Pulmo an sit instrumentum	
porrum	ibidem	anhelitus proprium	335
portulaca	ibidem	pulmo an ulcerari possit ab	
potamogeton	837	humido tantum	357
potentia quid sit	29	pulicaria	796
porandello	776	pulegium	837
portulaca syluestris	ibidem	pumex	ibid.
Potus triplex	664	purgatio quid sit	76
Potus an sitienti sit propina		purgatio an nō indigētibus	
us	ibidem	proficiat	79
præparatio an sit idem cū di		purgare an liceat in die creti-	
gestione & coctione	69	ca	ibidem
pparatio quot modis fiat	70	purgatio quur difficilis sub	
priapismus quid & eius cau-		cane	82
sæ	543	putredo an sit causa mitten-	
priapismi indicia & cura	544	di sanguinem	75
propositum artis medicæ est		putredo quid sit	683
sanitas	1	putredinis causæ	ibid.
principium & elementum an		pyretrum	837
idem	7	pyrites	ibidem
Prohibentia tumores & apo-		<b>Q</b> ualitates due an sint in	
stemata	677	elemento	7
psyllium	837	Quartana quid	602
ptarmice	837	Quartanæ causæ & signa ibi.	
pubertatis tempus	15	Quartanæ cura	604
pubertas quot ānis duret	169	Quartanæ pronostica	606
pulsus quid & eius diuifio	48	Quatuor tēpora an repian-	
		tur	



# INDEX

cur in omni morbo	571	Ramicum causæ	536
Quatuor ad effectum produ-		Ramicū signa & cura ibidem	
cendum concurrunt	620	Ramicum pronostica	540
Qualitates gustus q̄ sint	764	Raphanus	818
Quæ uena secāda in febre pe-		Ratiocinatricis officium	31
stienti	626	Rō diversitatis febriū q̄	586
Quercus	838	Raucedo	316
Quinque folium	ibid.	Reficiētia an p̄cedere debeāt	
Quid frigidior pituita an a-		stlyptica in sincopi	378
trabilis	25	Regio cōsiderāda intempera-	
Qui multam & qui paucā se-		turis	12
ctionem uenę expostulāt	72	Renum & uesicæ calculi	507
Qui apti non sint ad pur.	78	Renū & uesicę calcul. cāe ibi:	
Quid cauendum in cura stru-		Renū & uesicę calc. signa	508
marum	729	Renū & uesicę calc. cura	510
Quot modis dicatur aliquid		Repletio duplex	54
frig. uel cal.	11	Repletio nimia quid agat	54
Quo ex pituita fieri possit me-		Resolutio an fiat sensu tantū	
lancholia	25	omisso	195
Quod uitandum in medica-		Reuulsionū modi quot	126
mentis purgantibus	77	Reuulsio quid sit	83
Quot de causis in principio		Reuulsio quomodo fieri de-	
morbi euacuatur	81	beat	ibidem
Quo aliquid per se uel per cō-		Remedia Rigoris cui parti ap-	
sensum affici cognoscat	215	plicanda	738
Quo stat <sup>o</sup> mor. p̄cognoscat	571	Reprimentia cur in principio	
Quodnam pharmacum in fe-		competant	689
bre pestilenti competat	628	Repellentiu qualitates q̄	767
Quot modis extinguat̄ sitis	662	Renēs expurgantia	770
Quotidiana febris quę & ei <sup>o</sup>		Rhabarbarum	839
causæ	598	Rhamnus	838
Quotidianæ signa	599	Rhaponticum	839
Quotidianę simpl. cura	600	Rhodia radix	ibidem
Quotidianæ pronostica	602	Rhus obloniorum	ibidem
Quir in paralyſi sensu rema-		Ricinus	ibidem
nēte solus mot <sup>o</sup> amittit̄	185	Risus an possit esse in melan-	
<b>R</b> adix	838	cholia	230
Radicula	ibidem	Rigor quid sit	733
Rapunculus herba	ibidem	Rigor quomodo ab horrore	
Ranunculus quid sit	292	differat	ibidem
Ramicum species	535	Rigoris causæ	634

(((



# I N D E X

Splenis affectus & causæ	436	Strumarū causæ & idicia	727
Splenis cura	437	Strumas curantia	731
Spleni nocētia & curātia	442	Strumarum præfagia	732
Splenis pronostica	443	Strumę an differāt i stoma.	733
Splen cur non accidit cathar		Strumę an i māmīs oriant i b.	
rum habentibus	443	Sudor in lethargo deñ cit ui-	
Splenis hūores an educi pos-		res	148
sint per vias urinæ	ibidē	Sudor qd sit & eius causę	641
Splenis omni duritiei an con		Sudoris supflui curatio	642
ferat omne lac	ibid.	Sudoris supflui præfagia	644
Spuma maris	810	Sudores quot modis iudican	
Sputū sāguinis & ei <sup>9</sup> causę	343	tur	ibidem
Sputi sanguinis signa	344	Sudoris copia quō fiat	645
Sputi sanguinis cura	346	Sudor an possit in somno cō-	
Sputū sāguinis cohibētia	348	tigere	ibidem
Sputi sanguinis pnoistica	349	Sudores frigidi an frigidā ma-	
Sputū sanguinis cū tussi an		teriam significēt	ibidem
semper a spiritalibus mem		Sudor an sit superfluitas ter-	
bris proveniat	ibidem	tis digestionis	646
Sphacelus & Gangtēna an ab		Sudor plurim <sup>9</sup> an malus	ibi.
eadem causa	716	Sudor i febrib <sup>9</sup> an sp bon <sup>9</sup>	ib.
Sputum facilitantia	770	Sudor ab exerc. an sit mal <sup>9</sup>	ib.
Stachys	848	Sudor pessimus qui sit	ibi.
Stacte	ibidē	Suppurationis signa	673
Stebe	ibidem	Suffusio oculorum quid	247
Sternutamētum an sit in de-		Suffusiois cāę & ei <sup>9</sup> spēs	248
stillatio salubre	323	Suffusionis signa	250
Stibium	848	Suffusionis cura	253
Strangulatio quid	308	Suffusionū obseruatiōes	256
Strangulatione an fieri possit		Suffusiones curantia ac perse-	
ex inflāmatione asperę arte-		uerantia	ibidem
riæ	306	Suffusionum pronostica	257
Stranguria quid	524	Suffusio omnis an p chyrru-	
Stranguria cuius sit facultatis		giam possit curari	258
symptoma	525	Sumach	839
Stranguriæ conferentia	528	Surditas quō a <sup>1</sup> graui auditu	
Stranguriæ pronostica	529	diff.	279
Styrax calamita	848	Surditatis causæ	ibidem
Styrax liquida	ibidē	Surditatis signa	281
Strumarū definitio & dñia	625	Surditatis cura	282



# I N D E X.

Surditatis pronostica	284	Thimelea	792
Subuersio	380	Turbit album.	773 & 852
Symptomata alia febrîū q̄	665	Thymbra	850
Sycomorus	848	Thymus	ibidem
<i>σλωγχι</i> quid	308	Tignamo	827
Syncopæ causæ	370	Tinelmus qd & ei <sup>o</sup> causæ	486
Syncopæ indicia	371	Tinelmî signa	487
Syncopæ cura	372	Tinelmî cura	488
Syncopæ pronostica	377	Tinelmî conferentia	490
Syncopa frequenter accidens		Tinelmum inducentia	ibid.
an sit signum mortale	378	Tinelmî pronostica	ibidem
Syngultus nō definens quid		Tinnitus aurium quid	274
signif.	387	Tithymali genera	850
<b>T</b> Abes quid sit	351	Tonsillæ unde dictæ	304
Tabis species quot	ibi.	Tonsillarum causæ,	305
Tabidis conferentia	356	Tonsillæ quid sint	ibid.
Tact <sup>o</sup> sol <sup>o</sup> idicat de tēperie	13	Tonsillarum cura	306
Tamarix	848	Tagacantha	850
Tamarindi	849	Tragion	ibidem
<i>ταραξις</i> quid	234	Tragum	851
Telepium	849	Tragoriganus	ibidem
Tēp <sup>o</sup> morē ciborū in stoma-		Tremor in paralytide cur bo	
cho an possit assignari	395	nus	195
Tempus purgandi quod	77	Tremoris cordis cura	372
Temperies quintuplex	8	Tremor quid sit	732
Temperies quid	ibid.	Tremor quō a rigore diff.	ib.
Temperaturę quot sint	ibid.	Tremoris causæ	632
Temperies æqualis quid	ibi.	Tremoris curatio	635
Temperies ad iustitiā quid	11	Tribulus	851
Tēperaturę singulorū mem-		Trifolium	ibidem
brorum per se consyderan-		Trifolio canallino	801
dæ & in totius	12	Trinitas	851
Tpa an sint diuersa quo ad cō		Tripodium	ibidem
coctionē & sytopmata	678	Tubera	852
Teucrium	849	Tussilago	ibidem
Thaliætron	ibidem	Tumores an fieri possint in	
Thlaspi	ibidem	guttare absque dolore	315
Thapsia	ibidem	Tumor quid sit	666
Theriaca an uenenosa & non		Tumorū diuisio in gñe	667
exhibenda	506	Tumorum causæ	668



# I N D E X

Tumorū signa	671	Venæ sectio an fieri possit	
Tumorū curatio in gñe	672	die iudicatoria	ibidem
Tumores maturantia	671	Venæ sectio an fieri possit	
Tumor & apostema an idem		que ad sincopum	
671 & 675		Vene sectio an in feb. pestil.	
Tumor an sit morbus	678	phlegmatica cōpetat	
Tūor an possit eē siptoma ib.		Vertiginis causæ	
Tumor an morbus simplex		Vertigo quid	
uel compositus	ibidem	Vertiginis indicia	
Tussis quid sit	324	Vertiginis cura	
Tussis causæ	ibid.	Vertiginem generantia	
Tussis signa	325	Vertiginem curantia	ibidem
Tussis cura	326	Vertiginis pronostica	ibid.
Tussi nocētia & cōferētia	327	Vertigo per cōsensum an a	
Tussi pronostica	328	buenda capiti	
Tussis ā a nuda itēpie fiat ib.		Vertigo omnis an pfectio	
Tussis sicca an fiat semp abs.		arteriæ curanda	ibid.
que materia	329	Venerem prohibentia	
Tussis causa an sit cal. & sic.		Viēt° ratio a qbus sumitur	
tantum	ibidem	Viēt° ratio i logo morbo q	
Tussi sicce omni an iuuēt pil		Viēt° rō hēt duo extrema	
lulæ bichichiz	329	Viētus instituendus ratios	
Tussis in hydropē an sit si-		status morbi	ibidem
gnum malum	459	Viētus ratio duo respicit u	
Tympanias an a frig. fiat ibi.		res & morbum	
Typha	852	Viētus ratio p ætates quæ	
<b>V</b> acuatio quid sit	83	Viēt° rō ex tpibus anni q ib	
Vacuatio an reuulsioni		Viētus ciborum qualitate	
postponatur	85	Viēt° ratio uniuersalis & pa	
Vacuatio nimia quomodo		ticularis	
cognoscatur	665	Viētus plenus an oibus mo	
Vrbenaca	853	bis conueniat	
Verbasum	ibidē	Viēt° tenuis ā sit exhibēd°	
Verucaria	811	Viētus scopus an tantum su	
Vernix scriptorum	815	matur a uiribus	ibid.
Venæ sectio quid	71	Vinum quur in paralyfi no	
Venæ sectio quo tempore fie		conceditur	190
ri debeat	ibidem	Vincetoxico	78
Venæ sectio an fieri debeat		Vinca prouincia	792 & 796
morbomona assistente	74	Viola	85



# I N D E X

Visio a fiat extra mittendo	227	Vrinæ stillicidiū & causæ	524
Vinū a i syncopi exhiben	378	Vrinæ stillicidij cura	527
Vigilię descriptio & ei <sup>o</sup> cāe	655	Vrinæ retentio	529
Vigiliarū signa et curatio	656	Vrinæ incontinentia & eius	
Vigilia & somnus quotuplici-		causæ	533
ter modum excedunt	659	Vrię icōtinētię fig. & cura	534
Vinū an def i infāmatiō ib <sup>o</sup>	692	Vrinā prouocantia	770
Vitis alba	853	Vrtica	854
Vitis nigra	854	Vrina aquosa quæ	138
Viticella	ibidem	Vmbilicus ueneris	852
Vitis syluestris	ibidem	Vfnea	824
Virt <sup>o</sup> dicit quatuor modis	29	Vtrū sint qtuor tātū tēpamē-	
Virtus siue facultas quid	30	torum coniugationes	9
Virtutis nutritiue officiū	31	Vtrum simplices dentur tem-	
Virtus augmentatiua qnid	32	peraturæ	ibidem
Virtutis uitalis officium	33	Vtrū sit natura tēperata cali-	
Virt <sup>o</sup> ratiocinatrix quō ab in-		da & humida	ibidem
tellectu differat	ibidē	Vtrum humiditas stet cum	
Virium maxima dignitas	45	abundandi calore	ibid.
Virtus uitalis ex pulsu cogno-		Vtrum tēperies & mixtio sint	
scitur	ibidem	idem	ibidem
Virtus naturalis ex egestioni-		Vtrū ętas describatur per qua-	
bis sanguineis cog. ibidem		litatem uel quantitatem	15
Vlcus aurium quid	268	Vtrum semū sit frig. & humi-	
Vlceris aurium causæ	269	dum simpliciter	ibid.
Vlceris auriū signa & cura ib.		Vtrum iuuenes sint pueris ca-	
Vlcera in omnia siccāda	709	lidiores	17
Vlcerum breuis gali cura	273	Vtrum pituitæ sint tantū tres	
Vlcera auriū mūdificātia	273	species	28
Vomit <sup>o</sup> quid	379	Vtrū solus sanguis nutriat	16
Vomit <sup>o</sup> causæ	380	Vtrum humor naturalis non	
Vomit <sup>o</sup> signa	382	nutriens sit malus	ibidē
Vomit <sup>o</sup> cura	383	Vtrum detur sanguis ab alijs	
Vomitui conferentia	386	humor distinctus	ibidē
Vomit <sup>o</sup> pronostica	ibidē	Vtrum humorum generatio	
Vomit <sup>o</sup> an semper possit pro-		fit reciproca	ibid.
uocari	388	Vtrum humorum cognitio	
Vomit <sup>o</sup> an citetur tantum		fit utilis	ibidem
a re graui & mor.	ibidē	Vtrum uictus tenuis sit ple-	
Vomit <sup>o</sup> an cōferat in syn co-		no pręferendus	49
gi ex consensu pētrici ibi.			



# I N D E X

Tumorū signa	671	Venæ sectio an fieri possit in	
Tumorū curatio in gñe	672	die iudicatoria	ibidem
Tumores maturantia	671	Venæ sectio an fieri possit us	
Tumor & apostema an idem		que ad sincopum	378
671 & 675		Vene sectio an in feb. pestilēti	
Tumor an sit morbus	678	phlegmatica cōpetat	626
Tūor an possit eē siptoma ib.		Vertiginis causæ	149
Tumor an morbus simplex		Vertigo quid	148
uel compositus	ibidem	Vertiginis indicia	150
Tussis quid sit	324	Vertiginis cura	151
Tussis causæ	ibid.	Vertiginem generantia	155
Tussis signa	325	Vertiginem curantia	ibidem
Tussis cura	326	Vertiginis pronostica	ibid.
Tussi nocētia & cōferētia	327	Vertigo per cōsensum an atri	
Tussi pronostica	328	buenda capiti	156
Tussis ā a nuda itēpie fiat ib.		Vertigo omnis an pfectionē	
Tussis sicca an fiat semp abf-		arteriæ curanda	ibid.
que materia	329	Venerem prohibentia	549
Tussis causa an sit cal. & sic.		Viēt <sup>o</sup> ratio a qbus sumitur	57
tantum	ibidem	Viēt <sup>o</sup> ratio i lōgo morbo q̄	58
Tussi sicce omni an iuuēt pil		Viēt <sup>o</sup> rō hēt duo extrema ib.	
lulæ bichichiz	329	Viētus instituendus ratione	
Tussis in hydropē an sit si-		status morbi	ibidem
gnum malum	459	Viētus ratio duo respicit ui-	
Tympanias an a frig. fiat ibi.		res & morbum	59
Typha	852	Viētus ratio p ætates quæ	61
<b>V</b> acuatio quid sit	83	Viēt <sup>o</sup> rō ex tpibus anni q̄ ibi.	
Vacuatio an reuulsioni		Viētus ciborum qualitate	62
postponatur	85	Viēt <sup>o</sup> ratio uniuersalis & par-	
Vacuatio nimia quomodo		ticularis	63
cognoscatur	665	Viētus plenus an oībus mor-	
Vrbenaca	853	bis conueniat	64
Verbasum	ibidē	Viēt <sup>o</sup> tenuis ā sit exhibēd <sup>o</sup>	64
Verucaria	821	Viētus scopus an tantum su-	
Vernix scriptorum	815	matur a uiribus	ibid.
Venæ sectio quid	71	Vinum quur in paralyfi non	
Venæ sectio quo tempore fie		conceditur	190
ri debeat	ibidem	Vincetoxico	782
Venæ sectio an fieri debeat		Vinca prouincia	792 & 796
morbo non assistente	74	Viola	853



# I N D E X

Vifio a fiat extra mittēdo	227	Vrinæ stillicidiū & cauſe	524
Vinū a i ſyncopi exhibē	378	Vrinæ ſtillicidij cura	527
Vigilię deſcriptio & ei <sup>9</sup> cāe	655	Vrinæ retentio	529
Vigiliarū ſigna et curatio	656	Vrinæ incontinentia & ei <sup>9</sup> cauſe	533
Vigilia & ſomnus quotiplici- ter modum excedunt	659	Vrię icōtinētię ſig. & cura	534
Vinū an deſ i iſſāmatiō ib <sup>9</sup>	692	Vrinā prouocantia	770
Vitis alba	853	Vrtica	854
Viticella	ibidem	Vrina aquoſa quæ	138
Vitis ſylueſtris	ibidem	Vmbilicus ueneris	352
Virt <sup>9</sup> dicit <sup>r</sup> quatuor modis	29	Vſnea	824
Virtus ſiue facultas quid	30	Vtrū ſint q̄tuor tātū tēpamē- torum coniugationes	9
Virtutis nutritiue officiū	31	Vtrum ſimplices dentur tem- peraturæ	ibidem
Virtus augmentatiua qnid	32	Vtrū ſit natura tēperata cali- da & humida	ibidem
Virtutis uitalis officiū	33	Vtrum humiditas ſit cum abundandi calore	ibid.
Virt <sup>9</sup> ratiocinatrix quō ab in- tellectu differat	ibidē	Vtrum tēperies & mixtio ſint idem	ibidem
Virium maxima dignitas	45	Vtrū etas deſcribatur per qua- litatem uel quantitatem	15
Virtus uitalis ex pulſu cogno- ſcitur	ibidem	Vtrum ſemiū ſit frig. & humi- dum ſimpliciter	ibid.
Virtus naturalis ex egeſtioni- bus ſanguineis cog. ibidem		Vtrum iuuenes ſint pueris ca- lidiores	17
Vlcus aurium quid	268	Vtrum pituitæ ſint tantū tres ſpecies	28
Vlceris aurium cauſe	269	Vtrū ſolus ſanguis nutriat	26
Vlceris auriū ſigna & cura ib.		Vtrum humor naturalis non nutriens ſit malus	ibidē
Vlcera in omnia ſiccāda	709	Vtrum detur ſanguis ab alijs humor diſtinctus	ibidē
Vlcerum breuis gali cura	273	Vtrum humorum generatio ſit reciproca	ibid.
Vlcera auriū mūdificātia	273	Vtrum humorum cognitio ſit utilis	ibidem
Vomit <sup>9</sup> quid	379	Vtrum uictus tenuis ſit ple- no præferendus	46
Vomit <sup>9</sup> cauſe	380		
Vomit <sup>9</sup> ſigna	382		
Vomit <sup>9</sup> cura	383		
Vomitui conferentia	386		
Vomit <sup>9</sup> pronoflica	ibidē		
Vomit <sup>9</sup> an ſemper poſſit pro- uocari	388		
Vomit <sup>9</sup> an citetur tantum a re graui & mor.	ibidē		
Vomit <sup>9</sup> an cōferat in ſynco- pi ex conſenſu vetriculi ibi.			



# INDEX

Vtrum plenus uictus in mor- bis longis fit necessarius ib.	Vtrum siccationis terminis in ulceribus detur	709
Vtrum fit incipiendum a te- nui uictu & procedendum ad pleniorē	Vtrum cruentū & sordidum sint ulceris diff.	ibidem.
Vtrū i cibo cōsyderētur tātū qualitas & nō quātitas ibi.	Vuululæ morbi quot	305
Vtrū in febribus caro fit ex- hibenda	Vuluaria	777
Vtrū omnis interna phlemo- ne fit lethalis	X Anthion	854
Vtrum in sphacelo corpus fit purgandum	X Xyris	855
	Z Ea	885
	Z Zithum	ibid.
	Zedoaria	ibidem
	Zingiber	ibidem
	F I N I S.	

## AVTHORES QVORVM PRAECIPVE

Authoritates in hoc opere citantur  
sunt infra scripti uidelicet

Hippocrates	Auicennas
Plato	Auerois
Aristoteles	Razes
Galenus	Serapio
Aetius	Haly abbas
Paulus oegyneta	Azaraius
Alexander tral.	Nicolus florentinus
Cornelius Celsus	Conciliator
Oribasius	Mesues
Dioscorides	Gordonius
Teophrastus	Michael sauonarola
Theophilus	Marcus catinarius
Plinius	Arculanus
Phylaretus	Guielnus Placentinus
Platearius	Ioannes Manardus

Epigrama eiusdem Authoris  
Ad lectorem.

Scripsimus in numeros Medicorum in codice census  
Lusimus, Hæc tibi sint seria dicta loco  
Vale.



# IOANNIS BACCANELLI

MEDICI REGIENSIS,

DE CONSENSV MEDICORVM

*In curandis morbis.*

*Lib. primus.*

## Quid sit Medicina.



MEDICINA est scientia corporis humani sanitatem reficiens uel conseruans; uel, Medicina est adiectio & ablatio, uel Medicina est scientia sanitatis conseruatric morborumq; repultrix, uel, Medicina est quæ sanis uictus rationem præscribit & egrotos curat. Quæ definitiones ueræ non sunt medicinæ. Non. n. hæc ipsa efficit, Sed ex illis quæ efficit, hæc proueniunt, idq; non semper. Quare medicina erit scientia salubrium in salubrium & neutrorum.

## Loci consentientes ex uera Medicina.

Galenus und. Meth. cap. 12. Medicina appositio est & detractio, deficientium quidem appositio redundantium detractio; Et hæc intelliguntur de 1. 2. & 3. descriptione. De 4. loquitur Gal. lib. finitionum med. in principio; Sed quod hæc non sint ueræ definitiones ex sequentibus locis monstratur: Gal. in lib. de sectis ad eos qui introducuntur. Propositum artis medice est sanitas finis uero eius adeptio, quibus autem quis absentem sanitatem recuperet uel præsentem conseruet, medicis cognoscere est necessarium. Porro quæ absentem sanitatem restitunt, curationes & auxilia uocantur, quæ præsentem, conseruant salubris uictus est ratio. Quod si ita est, medicina igitur non erit conseruans uel reficiens sed salubrium in

R. BLANCHARD

PROF. FAC. MÉD. PARIS

A



## 2 DE CONSENSV MEDICORVM

salubrium & neutrorum scientia. Quod probatur ex Gal. p. art. med. cap. 2. Auic. medicina est scientia qua humani corporis dispositiones noscuntur ex parte qua sanantur uel ab ea remouentur, ut habita sanitas conseruetur & amissa recuperetur. Si scientia est qua noscuntur humani corporis dispositiones. Id igitur non erit, Quod adijcit uel aufert, quod reficit uel conseruat, nec quod egros ad sanitatem perducit.

Quot sint partes Medicinæ.

Partes medicinæ sunt quinque. Prima est φυσιολογικη. i. rerum naturæ contemplatio. Secunda est αιτιολογικη καὶ παθολογικη. i. causarum et affectuum consideratio. Tertia est quam υγεινῶν sanitatis tuende ratio. Quarta est σημειωτικη. i. signorum offeruatio. Quinta est θεραπευτικη. i. medendi modus Physiologica naturam hominis considerat & elementa quibus componitur & generationem eius, & partes corporis tam intrinsecas quam extrinsecas: αιτιολογικη unius cuiusque morbi causas & effectus inquirat. υγεινῶν sanitatem tuetur præcauendo ne corpora in morbos incidant, & ubi inciderint ad sanitatem reducit. σημειωτικη signorum notitiā. Præteritorum cognitionem, Præsentiam inspectionem & futurorum presagia nobis declarat. θεραπευτικη tres in partes diuisa est, una que uictu curat, altera quæ medicamentis, tertia quæ manum admouet.

Loci consentientes de naturæ contemplatione.

Gal. lib. de constit. art. med. cap. 13. φυσιολογικη non est inter minimas naturalis contemplationis partes recesenda, imo opus erit illum in ea esse probe exercitatum. Et primo de elementis. Naturalis scientia corpora quæ generantur ac intereunt, quæque prorsus sunt exposita transmutationi contemplatur. Quibus deinde ablati pariter & medicina tollitur. Primum quidem ob id, quæ sit quasi generationis & interitus mi-



nistra, & meth. tertio cap. quarto. Nihil posse medicū inquit de ulla similiarium partium agitare sine naturali scientia. Et tertio meth. cap. 7. in eius modi sermonis nostri de cursu per spicuum planē, sit tum ægri nostram esse considerandam tum cuius q̄ hominis esse propriam curationē &c. Et in lib. quod optimus sit medicus & phy. hæc ars docet corporis nosse naturam tum eam quæ ex primis constat elementis tumq; constat ex secundis: De cæteris medicinæ partibus deinceps suis locis loquemur.

### Quid sit Natura.

Natura philosophice sumpta est, quæ deorum hominum syderum plurimorumque corporum essentiam potentiam vires que complectitur.

Natura humana est temperies uel quædam facultas qua animal regitur.

### Loci consentientes de Natura philos.

Plato loquens de natura deorum. uim quandam esse dixit rationis atq; ordinis participem, cuius solertiam inquit Cicerō de natura deorum. Nulla ars nulla manus nemo opifex consequi potest imitando: Gal. lib. finit. med. de mente platonis, natura est uis quæ ex se ipsa mouetur, auctor formationis generationis & perfectionis. Aris. sec. physic. Natura est principium motus & quietis in quo est primo & per se.

### Loci consentientes de natura humana.

Gal. tert. de temper. & secun. aphor. com. 34. Natura humana nihil aliud est quam ex primis quatuor elementis conflata temperies, uel facultas quædā uniuerſi corporis rector. Et quin. de Simpto. cau. in principio. Natura est omnis illa facultas qua animal regitur. siue illa pendeat a uoluntatis nostre imperio siue secus; & sext. de simpto. cau. cap. pri. Natura est aggregatio omnium uirtutum, quæ totum corpus re-



#### 4 DE CONSENSV MEDICORVM

git, & lib. fin. med. Nam est spiritus calidus, qui ex sese pro seminarijs rationibus mouetur, ac certis temporibus homines generat perficit & conseruat.

Quot modis accipitur natura.

Accipitur natura quadrifariam. primo pro facultate naturali, secundo pro consuetudine, tertio pro temperie & compositione naturali: quarto pro naturali calore.

Locis consentientes ex uera Medicina.

Quod pro naturali facultate natura accipiatur hi sequentes loci attestantur. Gal. quinto de sym. cau. cap. 2. Nam si morbus facultatem uicerit. i. naturam, membrum haudquaquam poterit transferre. Si superior manserit facultas. i. natura nihil eam impediet & paulo inferius, Natura facultas attollit & sustinet. i. natura hoc efficit, & quarto de uic. in mor. ac. Scire oportet naturam haudquaquam quiescere sed interdum contentos humores ita aggredi ut a bonis eos seperet & c. i. Naturam esse facultatem qua boni humores retinentur & prauis reijciuntur. Pro secundo de consuetudine Gal. 2. de temp. consuetudo est natura acquisita & Hip. lib. de Aere & aqua, ite auerois pri. phy. & Arist. in predicamentis consuetudo est altera natura. Pro tertio de temperie: Gal. 2. de temp. haec in nostra regione, quae utique est temperata, subiectarum partium naturam prodit. i. temperiem demonstrat. Nam temperaturas iuxta regiones ibi consyderat. & Auic. humor & natura mutant animam. i. humor & temperies pro compositione sic. & intelligitur de natura medicinarum. unde citatur poeta in lib. de natura humana ita loquens.

Sic ait a Maia genitus, medicamen & offert.

Euulsam terra, naturamque edocet eius. i. compositionem eius Explanat. Pro quarto de naturali calore, Gal. lib. de tre. & pal. cap. 6. Natura et anima nihil aliud quam calidum est,



q̄ semper mobile est. Distinguit autē naturam ab ipsa anima primo de potentijs naturalibus, dum dicit, & motor in corpore. aut est natura aut anima. hic pro calido intellige calorem innatum qui teste Gal. aphor. pri. comm. 15. est facultatis nos gubernantis robur & omniū naturalium operum causa.

### Quid est elementum.

Elementum philosophice sumptum ita describitur. Elementum dicitur id ex quo quidpiam primo componitur & est in eo, indiuisibileq; existit specie in aliam specie. Medice sic, elementum est minima rei particula cuius est elementum.

### Loci consentientes de elemento phy.

Aristo. 5. met. tex. 4. στοιχίον λεγεται ἐξ ὧν συγχεिताί τῶν πρώτων ἐνυπάρχοντος ἀδιαίρετου τῶ ἐίδει εἰς ἑτερον εἶδος. Similiter secundo de generatione a principio, & ter. coeli, & de sensu & sensato tex. 20.

### Loci consentientes de elemento Med.

Gal. 8. de plac. Hip. & plat. Nominatur utiq; elementum quodcunque minima sit pars illius rei cuius fuerit elementum, similis sententia est pri. elementorum cap. pri. item primo elementorum ad medium. si elementum sit minima & simplicissima rei particula, atq; hoc si sensu metiri oporteat profecto os & similia omnia erunt humanorum corporum elementa, & Auic. pri. can. cap. 3. elementa sunt corpora, & sunt primæ partes humani corporis & aliorum, que in partes diuersarum formarum diuidi minime possunt, intellige quatuor elementa sub ratione elementi hic definiri, nam dixit sunt corpora, ut primam materiam facultates & id genus alia excluderet. Dixit primæ partes ut ne quis de humoribus membrisue simplicibus ut carnos &c. que in componendo non sunt prima intelligeret, Cetera in descriptione sunt nota.

### Quot sunt elementa.



6 DE CONSENSV MEDICORVM

Vniuersalia elementa sunt quatuor a prima materia ut  
Ignis Aqua Terra Aër ; particularia erunt duo Membra sim-  
plicia & humores .

Loci consentientes de uniuers. ele. & de particular.

Arist. secundo de generatione probat per quatuor qualita-  
tes esse quatuor elementa , nam sicut sunt quatuor qualitates ut  
calida frigi. humi. sicc. ita erunt quatuor coniugationes ut  
cal. cum hum. uñ Aër , cal. cum. sicc. uñ Ignis , frigi. cum hum.  
uñ Aqua , frig. cum sicc. uñ Terra . Probat etiam hæc esse qua-  
tuor per binas essentiales formas elementorum quæ sunt gra-  
uitas & leuitas ; Auic. et Auer. similiter isdēmet & argumen-  
tis hoc probant : De particularibus elementis Gale. secundo  
elementorum Hominis uero propria elementa sunt ipse par-  
ticulæ minimæ , quæ similes appellatur de quibus inquit pau-  
lo post indiffinitionum pertractationibus sermo erit , & secun-  
do element. in primo sanguis . n. pituita & utraque bilis sunt  
non modo generationis hominum sed cæterorum animalium  
sanguine prædictorum elemēta , probatur etiam tali ratione ,  
id esse elementum dicitur q̄ est principium omnium corporis  
particularum sed sanguis cū alijs humoribus in utero matris  
est huius modi , igitur sanguis & cæteri humores erunt ele-  
menta .

Authores erronei dissentientes circa elementa .

- 1 Adserere elementa esse unum ut plerique phylosophi ,
- 2 Adserere duas qualitates in sumo in elementis dari.
- 3 Adserere idem esse principium & elementum .
- 4 Adserere elementorum doctrinam esse medico inutilem ac  
superfluam .

Confutatio dissentientium ex uera Med .

Confutat eos Gal. primo de elementis , si unum est , uel erit  
patibile uel impatibile , non patibile , quia unum quatenus unū



non habet in quod transmutari, uel a quo pati possit, non im-  
patibile, quia tunc id alteratione & sensu careret igitur plu-  
ra quam unū. Arist. primo phys. contra hos inquit, Quicunq;  
ens unum esse pronuntiant. naturalis philosophiæ princi-  
pia tollunt. Quum maxime in physica contemplentur corpo-  
ra que generantur & intereunt & transmutationi sunt expo-  
sita; Que si auferantur tunc medicina tollitur. Ad secundum.  
Arist. secundo de generatione inquit q, ignis est magis calidus  
quam siccus Aër magis humidus quam calidus. Igitur due  
qualitates non sunt in sumo in elementis. Obiectio.

Quomodo dicis hoc; Nam Gal. quem tantopere sequeris: de-  
ri has qualitates in sumo docet primo elementorum?

Responsio. Quod in igne sit sumus calor & suma siccitas, uerum est, ut Gal. asserit, si modo intellexeris in superlati-  
uo gradu has qualitates reponi non debere, sed quod sint due  
qualitates in sumo .i. simplices & sine ulla admixtione. Ad  
tertium Gal. pri. de elementis. principia sunt eiusdem generis  
quorum sunt principia, sed elementa non sunt huius modi.  
Igitur sunt diuersa. Quod principia sint eiusdem generis,  
probatur ab ipso, nam simplex qualitas ita qualitatis compo-  
sitæ sicut simplex corpus corporis compositi est principium.  
Differunt etiam quia elementum dicitur de causa materiali  
intrinseca; At principium de causa finali & efficiente extrin-  
seca ut Arist. 12. meth. Quod uero elementum dicatur de cau-  
sa materiali probatur ex Arist. 8. metha. dum inquit elemen-  
tum est materia cuius est elementum.

Ad quar. quod hæc doctrina elementorum non sit inutilis  
neque superflua probatur a Galeno primo de elementis, tri-  
bus medijs; primo quia omne quod nostris corporibus offer-  
tur non impermixtum est, sed cum altero semper mixtum,  
secundo quia omnibus elemētis ut Aqua Aëre Terra Igne sem-



### 8 DE CONSENSV MEDIGORVM

per utimur . tertio quia hæ qualitates possunt omnem substan-  
tiam transmutare , unde fit si quid in qualitatibus modum ex-  
cesserit , comprimi indigeat , & si quid defuit restituatur , igi-  
tur nec inutilis uel superflua , de elementorum utilitate lege  
uberius Auic. cap. de elementis .

De temperaturis & primo de earum descriptione .

Temperies quæ a græcis *κρᾶσις* dicitur duplex , est qua-  
rum altera qualitas est . quæ ex elementorum qualitatibus cō-  
ficitur . Altera quæ ex mixtorum etiam inuicem actione &  
passione resultat .

Loci consentientes ex uera Medicina .

De utraque loquutus est Auic. pri. pri. cap. de complexio-  
nibus Complexio est qualitas , quæ ex actione & passione di-  
uersarum qualitatum in elementis inuentarum prouenit quo-  
rum partes ad tantam paruitatem sunt redactæ , ut plurimum  
cuiusque earum , plurimum alterius contingat . Ac si dicat tē-  
peries est quoddam aggregatum non ex actione & passione  
mixtorum , sed ex qualitatibus elementorum ut res natura-  
les & corporeas excluderet , Nam dictum est etiam alibi ab  
ipso quod ex primis elementorum qualitatibus remissis quæ-  
dam media qualitas constituitur quæ corporis mixti est pro-  
pria qualitas constituitur quæ corporis mixti est propria  
qualitas , uide fusius de his. Arist. quar. Methe.

Quot sunt temperaturæ .

Nouem sunt temperaturæ , octo inæquales , & una equa-  
lis , unde inæqualium quatuor sunt simplices , ut calida , frigida ,  
humida , & sicca , quatuor ex his compositæ , ut calida & hu-  
mida , calida & sicca , frigida humida , frigida & sicca æqualis  
est qua corpus incolume cū moderatione quadam seruatur .

Loci consentientes ex uera Medicina .

Quod nouem sint , probatur ex Auic. pri. pri. cap. de com



plex. dum inquit postquam de complexione temperata diximus, ad loquendum de distemperatis redeamus; Igitur datur temperata complexio, quod uero distemperatae sint octo, paulo inferius dicta resumens inquit unaquaeque ante harum octo complexionū, aut est cum materia aut sine materia &c. Gal. pri. de temper. cap. pri. unum igitur & primum id est, q. temperatam naturam. dicimus, quae tamen non uirtute modo, sed etiam uiribus reliquis praestat. Et pri. de temper. probat etiā q. detur ista temperata natura tali ratione, caliditas stat cum excellenti siccitate & cum excellenti humiditate, igitur cum medio inter eas, & sic datur natura media contra philosophos. Quod uero sint nouem temperaturae probatur rursus ex Gal. pri. de temp. cap. 8. dum inquit. Et siquidem haec sic se habet, sicut certe se habet, cur nouem dicere uniuersas temperamentorum differentias dubitemus, temperatā quidem unā, non temperatas octo, Quarum quatuor simplices sint cal. fri. hum. sic. quatuor compositae ut cal. hum. &c. Quid uero sit temperies equalis, Gal. pri. de temper. cap. 6. equalis siue temperata ea est quae ex contrarijs aequa prorsus inter se portione coeuntibus constat.

Authores erronei dissentientes circa temperamenta.

- 1 Adserere cum antiquis non esse nisi quatuor temperamentorum coniugationes duas humidas, & duas siccas atque has a calore & frigore diuisas,
- 2 Adserere cum aueroistis simplices non dari temperaturas,
- 3 Adserere temperatam naturam esse calidam & humidam,
- 4 Adserere humiditatem non posse cum abundanti calore consistere aut siccitatem cum uehementi frigide.
- 5 Adserere temperiem & mixtionem esse idem.

Confutatio dissentientium ex uera Med.

Confutant antiquorum opiniones loci superius citati de

R. BLANCHARD

PROF. FAC. MÈD. PARIS



nouem temperaturis ex Auic. et Gal. Consultat etiam eos Gal. primo de temper. cap. 3. Inquiens q̄ antiqui; Quum de sanitatis tuendæ uicium inuestigant, calidius iusto corpus iubent refrigerare, ut omnes exuberās æquent sed quomodo inquit hoc fieri potest, nisi temperatam quādam naturam constituent ad quam sunt intenti, quam si constituerint, tunc erunt quinque & non quatuor & c.

Ad secund. Auerois suis met uerbis uincitur, Quum tertio colliget species octo morborum enumerat, inter quas quatuor simplices reponit, erunt igitur per ipsum quatuor simplices a compositis separatæ: Gal. pri. de temper. cap. 8. hanc etiam opinionem improbat hoc modo concedis alteram esse temperiem humidam & calidam, & alteram siccam, & calidam, si non erit igitur necesse siccam esse, quæ calida est, quoniam & eam esse humidam licet: tunc igitur eam esse mediam licebit; & sic calida tantum: Quod etiam de frigida et de alijs similiter est ratiocinandum: Igitur quatuor erunt simplices temperature.

Ad tert. hipp. ter. Epidimion, si totus inquit annus calidus & humidus fuerit tunc necesse est q̄ magna succedat pestilentia: Igitur q̄ erit calidum & humidum non erit temperatum: Preterea Gal. pri. de temper. cap. 4. ad hoc probandum tali utitur ratiocinio, Quod est putredine aptum, idest pessimum temperamentum; Sed natura calida & humida est putredini apta, igitur erit pessima: unde optimam esse concludit temperiem, quæ in quatuor qualitatuum mixtionis æqualitate consistet.

Ad quar. Impugnat Gal. pri. de temper. & omnis scola medicorum, nec non & ipsa experientia; Nam aqua ex calore feruenti humida manet; Verum num calida magis uel humida dicatur, ab eo q̄ in mixtura pollet inquit Gal. appellatio



sumitur, ut si maior erit portio humiditatis quam caliditatis, humida dicetur & c.

Ad Quint. lege Arist. secundo de gene. cap. de mixtione ubi omnes dicunt temperiem esse mixtionem, sed non econtra: Item mixtio significat motum unde complexio peruenit et sic idem non sunt & c.

Quot modis aliquid dicatur esse calidum uel fri.

Bisariam calidum dici potest, Absolute, & sic omnes qualitates absoluto sermone inueniuntur in elementis, aut per collationem, & sic trifariam, aut per collationem ad medium, siue ad pondus siue ad iustitiam, aut ad seipsum, aut ad extraneum medium, ad iustitiam rursus duplici modo sumitur. scilicet secundum genus, ut animal in genere animalis dicitur calidum, uel secundum speciem, ut homo in specie hominis est temperatus. Calidum etiam dupliciter intelligitur, energia, quum id sit actus uel potestate quum id nondum sit, sed id fieri facile possit.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. Primo de temper. cap. 6. Calidum dicitur per collationem, uel per absolutum sermonem, et hoc simpliciter, uel per mixtionem, uel secundum genus uel secundum speciem, ut Animal in genere animalis est calidum. Secundum speciem, ut bos leo canis unde medium temperie in toto genere animalium, homo est, medium in temperie in hominum specie est, quem greci ἀχρετοι. i. bene temperatum uocant & c. Quod uero detur temperies ad iustitiam, in hoc capite ad finem ita inquit Gal. temperies ad iustitiam est. quæ eo quod pro dignitate conuenit, æqualitatem explorat; Auic. latius de his omnibus pertracta cap. de complexionibus.

De membrorum temperaturis.

Calidiora in corpore membra uicissim se comitantia sunt spiritus cor sanguis, hepar, caro, muscoli, splen, renes tunicae



arteriarum uenarumq; & cutis.

Frigidia sunt, Pituita, pilli, Os, cartilago, ligamentum, tendones membranæ, Nerui, nuca, cerebrum, adeps, pinguedo.

Humidiora sunt Pituita, sanguis, adeps, pinguedo, Cerebrum, nuca caro mamillaris, testiumq; pulmo, hepar, renes, muscoli, cutis.

Sicciora sunt, pilli, os, cartilago, ligamentum, tendones membranæ, arteriæ, uenæ, nerui motrices, cor, nerui sensus.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. pri. de temp. cap. ult. cor, tum natura, tum omniū animalis particularum maxime sanguineum, tum uero calidissimum, proximum illi iecur, & sic ibi de singularum partium temperie membratim pertractat; Auic. pri. pri. cap. 2. de complex. hæc diffusius enarrat.

De notis temperaturarum in genere.

Cognoscuntur temperaturæ ex: habitu totius corporis, ex operationibus, ex regione, ex colore, ex tactus ratione, & ex ætatibus.

Loci consentientes ex uera medicina.

Gal. secun. de temperamentis cap. 4. Pinguiores omnes sunt frigidi, sicut mari fœmina. Si quidem adeps ex habitus frigidityte gignitur, corpulenti calidiores quia carnis abundantia, a multa sanguinis abundantia oritur, Mediocritas uero quæ inter hæc reperitur, temperata naturæ est nota, & sic ex habitu totius corporis cognoscuntur, temperamenta, Auic. prima pri. cap. de complexio. inuestigat etiam ipse notas temperamentorū ibi fœminæ frigidiores secū dū diuersitatē &c.

Ex operationibus sic. Gal. sec. de temper. cap. 6. At ubi uaria partium temperies est ex una earum pronunciare de toto corpore non licet, sed adeundæ singulæ, sunt, æstimandumq; quo temperamento, uentriculus, quo, pulmo, quo, cerebrum



ac reliquarum per se unaquæq; seorsum fit, atq; hæc ex functionibus &c. & pri. temperaturarum cap. 6. optime se habere aliquid pro sua natura, ex ipsis functionibus intelligitur, quippe animal & stirpem optime se habere dicimus quum optime suam functionem obeunt, igitur ex operationibus temperies agnoscitur.

Ex regione. Gal. 2. de temper. cap. 6. Pensitandus & continentium partium affectus est quarum omnium extrema cutis est; Sed corporis temperies in his regionibus quæ a temperie recesserunt, inæqualis uisitur, externis. s. & internis partibus non adeundem modum se habentibus, Gallis. n. & Germanis & omni thracio & scythico generi, frigida & humida cutis est, Ideoq; etiam mollis alba & pillis nuda, Aethiopibus uero & Arabibus qui ad meridiem incolunt, natura cutis exambientis æstu, & naturali calore foras acta, usta, dura, sicca, nigra, redditur, toto corpore, naturalis quidem caloris exiguum obtinente portionem, sed alieno atq; a scititio incaléscente. Hoc etiam probatur ex Auic. cap. allegato ibi Septentrionales sunt humidiores & scimiliter nautæ &c.

Ex colore; Gal. de tuenda sanitate, succorum corporis color est certissima nota, nam rubeus, croceus, luteus, ac pallidus caliditatem demonstrant Liuens Plubeus albus frigiditatem, Aetius ser. pri. cap. de uiribus simpl. Amplius uero nihilo magis ex coloribus conijcere possumus de iisdem, In singulis. n. coloribus inueniuntur & calida & frigida & sicca & humida &c. Ex tactus ratione: Gale. secundo de temper. cap. 3. ergo calidi frigidiq; corporis, solus tactus est iudex, humidi & sicci, una cū tactu ratio &c. Et sec. de tēp. cap. 2. calidū q; in ætatibus cognoscere cupimus primū et maxime, tactu iudicemus.

De notis temperaturæ optimæ.

Temperaturæ optimæ signa sunt quum corpus, neque den



14 DE CONSENSV MEDICORVM

sum, neq; rarum neq; duarum neq; molle neq; hirsutum, neque glabrum, sed medio quodammodo se habeat, de temperamento calido frigido humido sicco in particulari non me extendā neq; de singulis partibus corporis loquendo, Nam Gal. in arte med. cap. 52. & Aet. ser. quar. cap. 77. & Paul. Aeg. lib. secund. cap. 63. usque ad. 73. De his fusius loquuntur Notato tamen q non ex temperie unius particula tantum, est pronuntiandum de toto corpore, sed singulae partes per se considerande sunt.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. pri. de temper. cap. 9. quod omnium extremorum calidi. s. frigidi hum. sicci medium est quod induritie mollitieq; medio statu consistit id corpus erit temperatum. & in lib. de opt. corp. const. cap. 4. Porro corpus etiam, quod conspiciamus neque densum, neque rarum neq; durum neq; molle &c. optime temperatum est: &c. Vide etiam de his Aetium serm. quar. cap. 59. diffusius loquentem.

De Aetatum temperaturis & de earum descrip.

Aetas siue αἰών est, spatium in quo animal crescit stat de- crescit & manifeste declinat, & diuiditur in quatuor partes, In adolescentiam quæ est calida & humida. In iuuentutem quæ est calida & sicca; In senectutem quæ est frigida & sicca; & in ultimum senium quod est frigidum & siccum.

Loci consentientes ex uera medicina.

Quod ita describatur Aetas habes ex Alberto Magno in lib. de senectute & iuuentute, dum inquit Aetas est spatium tēporis in uiuente derelictum in quo uirtus uite, secundum om- nem suæ operationis modum perficitur. Gal. quar. de salub. die- ta tex. 7. Aetatum temperamenta sunt quatuor humida & ca- lida puerorum sicca & calida aduultorum, sicca & frigida eo- rum qui in etate inclinata sunt, humida & frigida senum, & Aui. prima pri. cap. 3. de complex. etatū. Aetates omnes sunt



quatuor ætas adolescentiæ quæ durat usque ad. 30. annum. Aetas consistendi quæ durat usque ad. 40. Aetas minuendi cum uirtus non amittitur quæ est usque ad. 60. annum, & Aetas minuendi cum manifesta uirtutis imbecillitate quæ durat usque ad finem uitæ.

**Obiectio.**

Plures uidentur esse ætates quam quatuor siquidem Auic. octo. Gal. & Hipp. plures etiam enumerant.

**Responsio.**

Ætates in genere sunt quatuor, sed in specie plures, Nam Hip. teste Gal. Aphorif. 3. Aphorif. 26. Mentionem facit de recens natis puerulis, deinde de illis qui dentire incipiunt, deinceps de his qui mediam ætatem habent, quæ ad duodecimum & tertiumdecimum annum progreditur; & est ætas proxima pubertati. Nam pubertatis tempus incipit post quartumdecimum annum & durat usque ad uigesimumquintum teste Gal. aphor. 5. aphor. 7. Adolescentia igitur comprehendit sub se infantiam pueritiam & pubertatem, sic iuuentus ac senectus, alias ætates sub se habet quæ tandè ad capita redacta in genere sunt quatuor, possent etiam reduci ad duo capita, ut phylosophi ad profectum. s. & defectum, uel ad trinam diuisionem si his addamus statum, sed nos ad quaternam diuisionem ætates reduximus, eo quod temperamenta sunt quatuor.

**Autores erronei dissentientes circa ætates.**

- 1 Adserere ætatem per quandam qualitatem describi debere & non per quantitatem.
- 2 Adserere senium esse frigidum & humidum simpliciter.
- 3 Adserere Aetates posse præfiniri.
- 4 Adserere in ætatibus fundari temperaturas. seu dicere ætates temperatas uel distemperatas absque ulius subiecti intelligentia.
- 5 Adserere ætatum doctrinam esse inutilem.

**Cunfutatio dissentientium ex uera Medicina.**



Quod non per qualitatem probatur ratione: quia interrogatus, quotennis es respondetur per numerum ut biennis triennis, qui est quantitas discreta, non qualitas. Præterea Aetas nihil aliud est, quam distantia a primordio uitæ usque ad finem quæ distantia quantitate non qualitate determinatur. Hanc tamen dico non esse ueram definitionem, sed quandam descriptionem necessitate datam. Nam quod loco generis ponitur, non conuenit rei descriptæ.

Ad secundum Gal. 2. de tempera. cap. 2. Senum inquit temperies est frigidissima & siccissima, non autem humida. Quod probatur tali ratione ab ipso: Omne id siccum dicitur, quod nutrimentum intra se trahere non potest. Senum autem temperies ob excrementa superflua, nutrimentum intra se trahere non potest. Igitur senum temperies erit sicca. Pro exemplo sint Arbores nam quotiens senescunt magis exsiccantur. Et Auic. prima pri. cap. de complex. ætatum inquit Senes et decrepiti præter hoc quod sunt frigidiores adhuc etiam sunt sicciores. Obiectio.

Dictum est superius ex Gal. temperiem senum esse frigidam & humidam. Quomodo nunc probas esse siccam. Responsio. Gal non iuxta propriam opinionem loquutus est, sed id de mente aliorum dissimulare uoluit, sicuti uberior per totum illud commentum demonstratur. Ad tertium Gal. 3. pronosticorum commen. 28. Ob id igitur Hippoc. quandoque inquit trigessimum commemorat, sæpe etiam trigessimum quintum, quia aliæ alijs accidunt mutationes, fieri non potest, ut una mensura forma, ac cunctis promiscua finiatur.

Ad quartum Gal. 2. de tempera. ca. 2. Intelligamus inquit recens formatum animal in utero matris, quo sciamus, qua ratione humidissimum callidissimumque sit. Nam prima eius constitutio ex semine & sanguine est, quæ humide & calide res sunt



sunt igitur hic de complexione subiecti, non autē de ipsa etate calida & humida loquitur. Dicitur n. etas calida & humida prout est in corpore calido & humido, posset probari hoc ex mille locis, sed tantum hic locus ad probandū sat sit.

Ad quintum Gal. 2. de tempera. ca. 2. Verum quum ad eam quæ nunc sunt proposita magis urgeat etatum consideratio. Quæ etiam maximam nobis ad causarum inuentionem facultatem suggerit, huic nunc insistamus & c. Ex quibus uerbis doctrinam etatum non inutilem esse nobis demonstrat.

**Obiectio.** Quos putas esse calidiores puerulos an iuuenes?

**Responsio.** In calore tria considerantur, quantitas, s. natiue humiditatis & sanguinis influentis qualitas, i. ipsa caliditas, & fomes ipsius caliditatis, quæ est caloris essentia. Dico igitur si iuxta humiditatem natiuam quantitas caloris consideretur, q. pueruli sunt iuuenibus calidiores. At si iuxta sanguinem influentem q. iuuenes sunt puerulis calidiores quia sanguine magis abundant. Sic etiam Gal. 3. de tempera. ca. 4. considerat. In calore qualitatem & substantiam, quem legere poteris, aduerte tamen has diuisiones, quoniam omne dubium remouere circa hæc poteris.

#### De Humorū definitione & diuisione.

Quoniam humores ex primis elementis orti, sunt causa generationis & corruptionis hominum idcirco duplicem etiam definitionem sortiuntur uniuersalem, s. & particularem, uniuersaliter sic, Humores sunt corpora, quæ ex prima ciborum mixtione generantur. Particulariter sic, Humor est corpus humidum currens, quod ad membra conuertitur. Generantur humores ex alimento quod ab innato calore alteratur.

#### Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. 2. de elemē. Quatuor humores ex primis elementis ortos constat, materiam q. esse generationis hominis, causam.



q; esse corruptionis omnimodam si quid in generatione animalis deesset, quoniam uno quidem deficiente humore totum animal interit ac deperditur. Auic. prima. i. ca. de Membris, Membra sunt corpora, quæ ex prima humorum commixtione generantur. Quemadmodum humores sunt corpora, quæ ex primo ciborum commixtione generantur. Et ca. de humoribus. Humor est corpus humidum fluidum liquidum, in quod in primis nutriendum conuertitur. Ac si diceret, est corpus humidum. i. actu fluens. i. substantia fluida. Nam aliquid esse humidum dupliciter intelligitur, natura, uel substantia. Nam quedam res dicuntur in substantia humida, quæ natura & potestate sunt sicca & sic econuerso, quedam uero utroque modo tantum natura quam substantia humida dicuntur. Idcirco dixit humidum fluidum. Gal. aphor. 5. aphor. 39. Superfluum id quod ex alimento relinquitur humor existit nature partis similis. Et secundo de facul. naturalibus cap. 8. Demonstratum est inquit, Alimentum dum inuenis ab innato calore alteratur. Sanguinem quidem ex mediocri calore fieri reliquos uero succos ex eodem modum non seruante: & sic habes quomodo generentur humores.

De alia diuisione de his qui nutriunt humoribus.

Ex his qui nutriunt humoribus. Quedam sunt primæ & secundæ humiditates, Quarum primæ sunt humores, Secundæ rursus bipartiuntur. Nam quedam sunt superflue quedam non: Non superflue erunt quæ a principali dispositione conuerse ad membra relegantur & iuxta Auic. placitum erunt quatuor. scilicet nomen non habens, Ros, Cambium, Glutem, Humorum uero, a quibus hæ humiditates proueniunt, sunt quatuor genera, ut genus sanguinis, pituitæ, bilis, Melancholiæ.

Loci contentientes ex uera Medicina.

Auic. pri. pri. cap. de humi. Humiditates quedam sunt pri



ma quedam secunde, Primæ sunt quatuor humores, Secunda uero que non sunt superfluitates sunt humores, quia dispositione principali conuersi ad membra relegantur & sunt nomen non habens, ros, cambium, gluten. Et Gal. 10. Meth. ad finem, loquens de hectica de his mentionem facit, primam, uocans natiuam humiditatem, alteram nomen non habens similiter de diff. feb. Et Auic. prima quarti & dicitur. 12. de animalibus, De his etiam uide de hectica. Quod uero humorum genera sint quatuor probatur ex Gal. 2. de elemen. dum inquit conabor ea explicare, unde adductus est Hippoc. ut sentiret humores quatuor, materiam esse generando homini. Et lib. finit. Med. Humores quatuor sunt ex quibus animal consistit, Sanguis pituita & duæ biles flaua. s. & atra & sic sunt quatuor humorum genera.

De humoribus in particulari & primo de sanguine.

Αἷμα .i. sanguis humor est calidus & humidus ex ipsius chyli temperatiori parte progrediens: Qui naturalis est & non naturalis: Naturalis qui mediocris substantia, rubido calore, malo carens odore, sapore dulci, mitis ac benignus existit: Nō naturalis, qui ab isto degenerat, et hæc bifariā, uel sui, uel alterius ratione. Ratione sui dum mutatur propria substantia, & hæc dupliciter, uel quia nimis crassa, aut nimis tenuis, uel quia aduritur, & sic pars tenuior in flauā bilem uertitur, Crassior in atram, Ratione alterius, quum alius humor illi permiscetur, & tunc uario modo hoc contingere potest, prout uariæ bilis species & pituitæ & melancholiæ sanguini admiscuntur, locus in quo consistit est cor, in quo perficitur hepar, in quod influit uenæ & Arteriæ.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Quod sit calidus & humidus probatur ex Gal. 2. de Mor. cau. cap. 4. quum dicat, Nempe quod flaua bilis potestate cali-



da est & sicca. Atra uero sicca & frigida, Sanguis calidus & humidus pituita frigida & humida. Et primo de naturalibus facul. cap. 9. idem asserit. Auic. prima pri. cap. de humor. Sanguis uero natura calidus & humidus existit, cuius duæ sunt species naturalis & non naturalis &c. Gal. lib. de Atrabile ca. 2. Igitur magna ex parte rubeus color in hoc humore exuperat & talis exacte optimus sanguis existit, & paulo inferius sanguis maiori, ex parte dulcis apparet. Et secundo de tempera. ca. 3. Succorum optimus & maxime proprius ac domesticus sanguis est, igitur a temperantiori parte progreditur. Et secundo de facul. naturali cap. 8. Sanguis fit a mediocri calore, bilis ab immodico. Igitur sanguis a parte temperata oritur, & hæc de naturali sanguine. De non naturali, dum mutatur propria substantia, ut pars tenuior in bile, habes ex Gal. 2. de diff. feb. cap. 9. ubi inquit pars sanguinis subtilior ac pinguior omnino inflauam conuertitur bilem, quæ autem crassior in atram. Itidem ait. 2. de cris. ca. 12. Quod uero sanguini alius humor misceatur, habes ex Gale. lib. de plenit. ad medium. Quum tumor inquit præter naturam ad quamcunque substantiam pertinere possit siue is sincerus sanguis sit, siue biliosus, siue serosus siue pituitosus &c. i. quum bilis aut pituita sanguini miscetur. De loco sanguinis, Gale. 1. de temper. cap. ult. Sanguis ipse a corde suum accipit calorem. Et. 6. de plac. Hip. & Plat. At qui in dextro sinu continetur sanguis, eandem speciem habet, quam omnis alius, et is qui in Iecore habetur &c. hic etiam ab ipso probatur cor et Iecur esse sedem sanguinis, ipsumque Iecur, uniuersam sanguinis speciem absolvere & quod sanguis humidi, temperamento, rubri, colore, cuius sane in Iecore est prima generatio. Riuus autem & uena id toti corpori traducunt, distribuuntque. At sanguinis flauis tenuis spumosi prima in sinistro cordis sinu est origo, uerum talem Arteriarum di-



spensant & intotum corpus deducunt & c. Vide de his etiam Gal. de facul. natural. diffusius.

De pituitæ diuisione & descriptione.

Φλεγμα. i. pituita duplex est naturalis & non naturalis. Naturalis est humor frigidus humidus substantia crudus, colore ad albedinem, sapore interdum dulci, quandoq; omnis qualitatis expers: Non naturalis est qui a sui natura degenerat, & hoc bisariam efficitur per se s. & per admixtionem. Per se quum a propria substantia egreditur, nam in substantiam aquosam uel flatusam, uel admodum tenuem cōuertitur, unde pituita aquosa flatusa & tenuis dicitur, Si uero crassior ac uiscosior reddatur, tunc pituita erit crassa uiscosa & mucilaginosā. Quæ si magis indurescat, Gypsea & uitrea dicetur pituita. Quæ si ultra putrescat & alteretur, fiet salsa uitrosa & corrosiua. Per admixtionem, quum illi alius misceatur humor. Nam sanguine admixto dulcis efficitur flaua bile, salsa, Melancholia, pontica acida.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Auic. prima pri. ca. de humor. phlegmatis aliud naturale, aliud non naturale: Naturale est quod aptum est in aliquo tempore fieri sanguis, quoniam est sanguis non plene concoctus. Vnde arist. 6. topic. inquit phlegma esse primum indigestorū a cibis proueniens. Gal. 2. de diff. feb. ca. 6. Quicumq; humor in corpore frigidus atq; humidus fuerit, hunc nos pituitā appellamus & sic erit humor frig. & humi. Et de Atrabile ca. 2. apparet pituita omnis qualitatis expers ueluti aqua. Verum, naturali qualitate mutata non modo salsa, sed acida etiā fit, quin & non raro dulcem qualitatem acquirit. Hunc itaq; humorē, qualiscunq; fuerit pituitam appellant, si modo albus extiterit. Et. 2. de diff. feb. ca. 6. alia est pituitæ species, quam pleriq; cum reatu expuunt sensibilem habens dulcedinem & c. Auic. pri.



primi cap. allegato octo species phlegmatis non naturalis enumerat, ut uidere poteris.

Obiectio.

Quomodo octo enumerat, quum iuxta Gal. sententiam ad summum tres tantum sint, ut salsa, dulcis, acida.

Responsio. Certum est Gal. non nisi tres enumerasse differentias pituitæ, ut. 2. de diff. feb. ca. 6. Item. 3. de loc. aff. ca. 7. Veruntamen pituitam possumus dupliciter considerare, uel in ratione saporis, uel in ratione suæ substantiæ si ratione saporis tunc erunt tres differentiæ, ut salsa, dulcis, acida, quâquã & insipida addi posset, sed ratione substantiæ erunt etiam quatuor, quæ primis copulatæ, erunt octo. Quod Gal. etiam non negaret, nam in lib. de plenit. ad finem, humorem crudum inter pituitæ species esse reponendum ait, qui crassior ac minus flatuosus est &c. Præterea. 14. Meth. ca. 17. dixit euacuationem bilis esse facilem, sed pituitæ crassioris & glutinosioris esse difficilem, Ergo datur pituita crassa, quæ & mucilaginosa esse potest. Rursus. 3. de loc. aff. ca. 7. mentionem facit de uitrea a proraxagora appellata. Item de aquosa, quæ nulla qualitate infecta, dici potest insipida & sic ratione substantiæ erunt aliæ species. Item. 3. de loc. aff. ca. citato, atræ bilis differre facit, ob substantiæ uarietatem, igitur a simili pituita etiam in substantia uariabit.

Obiectio.

Quomodo concordabis Auic. Gale. in ijs admixtionibus, Nam Gal. salsam fieri pituitam asserit, aut pp putredinem, aut pp falsæ serosæ humiditatis miscellam, Auic. uero ex miscella bilis cum pituita.

Responsio.

Quod fiat pp putredinem ut dixit Gal. 2. de diff. feb. cap. 6. etiam Auic. concedit inquit, Et nos quidem dicimus putredinem ipsum phlegma salsum efficere, ideo q̃ in ipso adustionem facit &c. Nec in humiditate serosa e Distat à Gale. Nam ipse sola inquit aquositas non facit salsum, quod uerū



est. Sed Gale. non solam sed salsam & serosam dixit, quod Auic. non negasset. Quod uero a bilis miscella fiat phlegma salsum, uerū est, Nam Arist. in lib. de sen. sensa. & 2. meth. salsum saporē affirmat esse eiusdem speciei cum amaro, Nā terreæ partes adustæ & amari saporis, si insipide humiditati, æqualiter misceantur fit salsedo, si uero humiditatem superent, amaritudo, Quare cum bilis amara quidem natura ac sicca sit, & pituitæ misceatur fieri potest, ut inde pituita salsæ euadat.

### De bilis definitione & diuisione.

χολη. i. bilis est humor calidus & siccus ex tenuiori et calidiori parte chyli, uel ex sanguine tenui & seruescente proueniens: Hæc duplex est, naturalis & non naturalis: Naturalis est humor calidus & siccus potestate, substantia tenui, flauo colore, aut rubro ad flauitiem declinante, sapore amaro: Non naturalis est quæ à iam dicta degenerat, Et hoc dupliciter per se & per admixtionem. Per se adhuc bifariam quum putrescit & adurit & tunc dicitur adusta per putredinem. Altero modo quum non naturalis uitellina dicta, colore quodam igneo, in hepate, aut uentriculo, aut in uenis concoquitur & tunc fit porracea, quæ et præsina dicitur et eruginosa: Per admixtionem non naturalis efficitur, quum illi alius humor admiscetur, et hoc multifariam. Nam si phlegma tenue & aquosum admisceatur, citrina siue crocea efficitur, si crassum & uiscosum uitellina, si adusta melancholia, fit bilis adusta & sic erunt sex species.

### Loci consentientes ex uera Medicina.

Quod bilis sit calida & sicca potestate probatur ex Gal. 2. de natu. fac. ca. 9. Bilis inquit flaua calida et sicca est, quantum uis sit ab aspectu humida. Quod uero sint sex bilis species habes ex Gal. lib. de atrabile ca. 2. ubi inquit Bilis. n. flaua sit pal



lida ex serosa, & tenui humiditate, Quæ ubi resoluitur λευκυτωδης .i. vitelina appellatur, est & bilis inquit ipse πρασειδης .i. porracea alia ιωδης .i. eruginea, alia ισατωδης .i. glauca, alia rubra sanguini tenuiori proxima & sic erunt sex species. Auic. prima primi cap. de humor. hanc totam diuisionem habet, lege eum uberius.

#### De melancholiæ definitione & diuisione.

Melancholia duplex naturalis & non naturalis: Naturalis est boni sanguinis fex ac ueluti limosa quedam superfluitas, siue crassior quidam sanguis, cuius color niger est, sapor uero acerbus uel acidus in massa sanguinaria existens ad alendas partes melancholicas progenitus. Non naturalis quæ a naturali degenerat, definiturq; in uniuersum. Quod sit humor frigidus & siccus ex crassiori portione chyli proueniens, Cuius species sunt quatuor: Prima quum Melancholicus humor naturalis dictus in sua propria substantia adurit & putrescit, fitq; bilis exquisita nigra quæ acida est et in terram effusa uelut Acetum feruet & terram attolit. Secunda est bilis atra ex adustione aliorum humorum. Quæ. n. fit ex flaua bile uehementer adusta. Non aliter ac exquisita atra terram radit ac attolit. Tertia species Melancholiæ non naturalis est quæ a lapidosa concretionem oritur. Quarta species quum alius humor ipsi melancholiæ naturali permiscetur, dumq; hoc fit dulcoratur & mitescit, modo neutra bilis adusta admisceatur, quia tunc uel acescit uel amarescit & erosionis fit particeps.

#### Loci consentientes ex uera medicina.

Gal. 2. de temper. ca. 3. Sanguis optimus succorum ac proprius huius ueluti sedimentum ac fex atrabilis est. Quæ idcirco tum frigidior tum crassior sanguine est, sicuti flaua bilis longe calidior. Et. 3. pronost. comen. 29. Atræ bilis generatio



duplex, Altera a sanguine crassiore, qui proportionem in uenis subsidenti in dolio uini feculae respondet, Altera a flaua bile uehementer assata, quae atrabilis alioqui malefica est ac de-  
 rodit partes in quibus abunde collecta est, Altera mitior, quam haec est, maxime quoties nondum traxit in animali moram, cum aliquo calore abundanti praeter naturam. Et. 3. de loc. aff. ca. 7. Melancholicos inquit esse in quibus siccitas & frigiditas dominatur & paulo inferius: Atrabilis ob substantiae uarietatem, non obscuras habet differentias: Nam alia est ueluti fex sanguinis, quae admodum spissa & fecibus uini non absimilis. Alia uero quam superior essentiae est multo tenuioris atque uomentibus causa & olfacientibus acida uidetur quae etiam terram radit attollit & fermentat, sed ea quam crassae feci similem esse dixi in terram effusa non inducit feruorem nisi forte in ardente febre ipsam praefari contingat. Hanc nominare consueui succum melancholicum aut sanguinem melancholicum. Vide etiam de his plura iuxta Gal. de atra bile ea. 2. & 2. de naturalib. facul. ca. 9. ad finem. Auice. prima pri. cap. de humor. Cholerae nigrae alia naturalis alia non naturalis. Naturalis est boni sanguinis fex & turbulentia & superfluitas in comparatione ad sanguinem. Melancholia non naturalis non est admodum hypostasis & fecis, imo est admodum adustionis & cineritatis, & tunc est multiplex uel est phlegmatis, uel cholerae uel sanguinis uel melancholiae cinis & sic erunt quinque species. Obiectio.

Quomodo dici potest cinis phlegmatis quum Manardus dicat non posse ex pituita tantam assationem fieri ut nigra euadat. Responsio. Dico quod pituita, si aduritur, Melancholia in qualitate si non in colore fieri potest. Obiectio.

Quid est frigidior pituita an atrabilis? Responsio. Si considerentur iuxta earum essentiam frigidior est pituita.



Si uero iuxta earum Impressionem, atrabilis, quia pituita est densior.

Authores erronei dissentientes circa humores.

- 1 Adferere cum Arist. solum sanguinem nutrire & ceteros humores esse superfluitates.
- 2 Adferere humorem naturalem esse malum, quum nutrire non possit.
- 3 Adferere sanguinem dari ab alijs humoribus in aggregatione distinctum.
- 4 Adferere uirium Robur sequi ad sanguinis copiam & ad eius paucitatem minui.
- 5 Adferere non dari quartam temperiem in succis quæ est frigida & sicca.
- 6 Adferere humorum generationem esse reciprocam ita ut ex sanguine fiat pituita.
- 7 Adferere humorum cognitionem esse inutilem cum Erasistrato.

Confutatio dissentientium circa humores.

Confutat primum Gale. 3. de Tempera. cap. 2. dum inquit, Omne animal conueniente sibi nutritur alimento, conueniēs cuiq; alimentum est, quicquid assimilari potest corpori quod nutritur. Et primo de natur. fac. ca. 2. Nutritio est ad id quod nutritur eius quod nutrit assimilatio. Igitur Melancholica membra, Melancholia, Pituitosa, ipsa pituita in nutritione indigebunt, & sic solus sanguis non nutrit. Auic. prima pri. cap. de humor. Qui solum sanguinem dicit nutrire mentitur, si. n. solus sanguis esset humor qui membra nutrit, omnia in suis complexionibus & essentijs similia forent &c. Igitur solus sanguis non nutrit.

Ad secundum probatur tali ratione, Humor malus potest nutrire, ergo bonus & naturalis, & malus nutrire possit pro



batur, quia ad benignum potest reduci.

Ad tertiū Gal. lib. de plenit. ad finem. Nam neq; fieri alioz qui potest, ut adeo sincerus in uenis reperiatur sanguis, quin illi aliquid aut bilis aut pituitæ aut serosi humoris permixtum sit, siquidem sincerus ab alio humore sanguis & impermixtus in uenis nusquam habetur. Et lib. de Atrabile cap. 5. Quod igitur in uenis & in arterijs humores omnes unā cū sanguine continentur, ostendit ipsius uarietas tum in colore tum in consistentia &c. probatur & ex Hippoc. lib. de natura humana, quem citat hoc in loco Gale. igitur sanguis ab alijs humoribus non distinguitur.

Ad quartum Auic. pri. pri. cap. de humor. Sunt quidam inquit qui opinantur corporis uirtutē sequi ad sanguinis multitudinem, et ipsius debilitatem sequi eius paucitatem, sed nō est ita, Quod uero attenditur est dispositio eius quantitatis quæ de eo corpus ingreditur.

Ad quintum Gale. 2. de natural. fac. ca. 9. contra Erasistratum hoc probat authoritate Medicorum et philosophorum, qui humores quatuor anni temporibus compararunt. Vnde inquit sicut quatuor sunt anni tempora ita quatuor erunt humorum temperaturæ. Præterea sicut dantur Morbi frigidi et sicci ita in humoribus quarta tēperies quæ est frigida et sicca.

Ad sextum Gal. 2. de uic. in mor. ac. comen. 31. Pituita processu temporis coquitur & sanguis efficitur sed nec flaua bilis, nec atra in sanguinis substantiam redeunt, igitur eorum generatio non erit reciproca, uel tali ratione, frigidum a calido fieri non potest regulatis a natura humoribus igitur nec a sanguine fiet pituita & sic non erit reciproca generatio.

Ad septimū Gal. 2. de nat. fac. ca. 8. Nunquid queso quemadmodum cibi concoquuntur in uentre est utile sciuisse, ita nōne paris momenti est, uel sanguinem bonum gigni uel nutrimentum



tum in uentre probe in chylum uerti, & paulo inferius. Non ne generandi hydropis causa ex sanguificationis defectu pro uenit. sicuti ex ciborum coctionis defectu diarrheea, ac si diceret, quomodo hæc capi possunt nisi humorum cognitione contemplatus fueris &c. & sic humorum cognitio non erit inutilis.

### De diuisione Membrorum in genere.

Membrorum alia sunt homœomera. i. simularia, alia organica. i. instrumentaria: Homœomera dicuntur, quæ communicant cum suis partibus in nomine & ratione, ut os, caro, Organica uero sunt, quorum nulla pars nec in nomine nec in ratione cum toto communicat, quum manus siue capitis pars, nec manus sit nec caput. Quæ diuisio a naturali operatione sumitur: Naturalis. n. operatio his tribus perficitur. s. temperie, compositione & unitate, quarum temperies simplicibus membris attribuitur, compositio instrumentarijs, & horum utrisq; unitas. Compositorum igitur quedam sunt principalia, quorum unum ad speciem conseruandam, ut testiculi, Reliqua ad individuum seruandum attribuuntur, his seruiunt, ut cerebro nerui, cordi arteriæ, hepatis uenæ, testiculis uasæ spermatica, ab his quoq; tanquã a principio dependent, stomachus, renes, intestina omnesq; muscoli, quæ præter proprias uirtutes sensu & uita cum uoluntario motu fruuntur.

### Loci consentientes ex uera Medicina.

Gale. de cõsti. art. Med. cap. 4. Nimirũ quum corpora quæ simularia appellantur ex dissectione apprehenderimus, compositorum pariter membrorum quæ instrumentaria nonnumquam nominare solemus, scientiam assequemur & sic duplicia sunt membra simplicia & composita. Auic. pri. pri. cap. de memb. Membrorum alia sunt simplicia, alia composita, simplicia sunt, quorum quancunque sensibilem partem assumpse



ris in nomine & definitione erit toti communicans, composita sunt illa, quorum quancunq; partem acceperis in nomine & definitione communicans non erit sicut manus & facies. Gal. in lib. art. med. ca. 9. Vniuersæ partium differentiæ sunt quatuor, nonnullæ earum principia, aliquæ ab his originem habent, aliquæ nec aliarum gubernationi præsumt neq; aliunde gubernantur, quum insitas habeant a natura potentias a quibus reguntur. Quædam sunt quæ insitas simul & aliunde emanantes habent. Principia igitur sunt cerebrum cor hepar testiculi, ab his oriuntur & subministrant nerui & spinalis medulla cerebro, cordi arteriæ, hepatis uenæ testiculis uasa seminaria. Et ca. 8. ar. med. Vitiæ genera eadem sunt his, quæ uirtutem perficiunt. Temperies quidem in consimilibus numerus formatio magnitudo & situs in instrumentarijs, utrisq; uero cõmunis unitas. Et de tot. morb. temp. ca. 7. Tria facultatum totum corpus gubernantium principia sunt cor, hepar, cerebrum, ex quibus oriuntur nerui uenæ arteriæ, hi & similes loci ea quæ dicta sunt probant.

#### De facult. naturalibus & de earum definitione.

Potentia siue facultas est cuiusuis operis & actionis causa & hæ duplex *ex præ. & i. actu*, altera potestate, hæc potentia siue facultas etiam dicitur uirtus & tunc quadrisariâ describi potest. Primo q. uirtus sit habitus penes quem aliquis dicitur bonus. Secundo quod sit quedam actiua qualitas, sicut dicimus elemēta habere quatuor uirtutes. i. quatuor qualitates. s. calidas frig. & c. Tertio describitur q. uirtus sit quedam forma specifica, sicut dicimus eupatorium habere uirtutem ad iecoris morbos. Quarto describitur q. uirtus sit animæ facultas qua suas peragit operationes.

#### Loci consentientes ex uera Medicina.

Arist. 2. ethic. uirtus est dispositio quedā animæ, per quā in



ter duo extrema tenemus medium, & hæc spectat ad moralem philosophum. Gale. 1. de cau. pulsuum, loquens de generibus pulsuum, inquit, Quando essentia incognita nobis est, hoc nomine facultatis eam appellamus. Alicuius. n. est facultas, & eius notio est relationi subiecta, ac si diceret eam facultatem dici de omnibus ad quæ referri potest & sic de habitu & de qualitate actiua dicitur. Gale. 1. de fac. simp. ca. 1. facultas causa quæ est effectrix, eaq; partim actu ut calefaciendi in igne, partim in futuro tempore ut calefaciendi pyretro, uel sic in animalibus describitur. Virtus siue facultas est anime potentia membris essentialiter attributa ad suas operationes peragendas.

#### De facultatum alia diuisione.

Facultas etiam triplex est, Naturalis, uitalis & animalis, triplex inquam in ratione non in substantia. Nam sicut in citro, color, odor, & sapor inueniuntur diuersi in ratione ijdē in substantia, ita in his facultatibus, naturalis locatur in hepate & est facultas, quæ nutriens in similitudinē nutriti trāsmutat. Hæc duo præsupponit generationem. s. & autionem. Nam generatio ita alterationem & formationem sicuti auctrix habet alteratricem & nutricem auxiliatrices, auctrix facultas est potentia, qua corpus in omnem dimensionem augeatur usq; ad augmenti finem, uocatur ab Auic. crescitua, Naturalis siue nutritrix facultas similiter agglutinationem & appositionem præsupponit. Assimilatio quæ in nutrice reponitur, quatuor has facultates supponit attractricem. s. retentricem alteratricem siue concoctricem, & expultricem. Facultas uitalis siue animosa est quæ uiuificat, & locatur in corde, a quo procedit uita ad singula corporis membra uiuificanda. Facultas animalis est potentia ipsius animæ in cerebro locata quæ in motricem & sensibilem aut in quaternas cerebri facultates



tes diuiditur, quæ sunt sensus communis imaginatrix ratiocinatrix quam cogitativam etiam dicunt, & memoratrix. Sensus communis est qui solus omnium aliorum sensuum sensata percipit. Imaginatrix quam Græci *φανταστικὴ* uocant, dicta est eo quod nobis uisa proueniant. Ratiocinatrix est quæ reuocat species subsensum ad iudicium, atque rerum imagines de potentia abstrahit. Memoratrix est quæ omne a ceteris facultatibus elaboratum est & receptum ueluti tutrix conseruat & fouet.

### Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. 9. meth. ca. 10. Gubernant animal tres diuersi inter se generis facultates toti corpori ex suo ueluti fonte quæque distributa (eas Plato uocat animas) Est. n. earum quedam ad nutriendum animal necessaria, ac, cum stirpibus communis quæ Iecur pro fonte habet, hanc appetitricem seu naturalem seu altricem appellare licet sicuti & animam aut facultatem. Altera est quæ non modo ut stirpibus, aut uita præditis sed etiam ut animalibus est anima insita, hæc in corde collocatur ceu insiti caloris fonte. Tertia anima ratiocinatrix in cerebro domicilium habet, ea uoluntarijs actionibus unâ cum sensibus præsidet.

### Loci de uirtute nutrice.

Aristo. 2. de anima uirtus nutritiua est potentia saluare sciens ipsum secundum quod est eius, Gale. 1. de naturalibus fac. cap. 12. At quod necesse sit nutritionem esse assimilationem nutrientis ei quod nutritur dare liquet. Auic. pri. pri. cap. de uirt. Virtus nutritiua est illa quæ nutriens in nutriti similitudinem conuertit, ideo ut per ipsum restorationem eius recuperet quod dissolutum fuit. Quod primum in naturæ operibus sit generatio probatur ex Gale. 1. de fac. nat. cap. 5. Generatio simplex quadam actio naturæ non est sed ex formatione



alterationeque composita, & cap 8 ubi animal magnitudinem perfectam adeptum est, usque ad ætatis uigorem nutritrix uirtus dominatur, cui auxiliatrices & ministræ sunt alteratrix & nutritrix. Et ca. 11. Ad hoc ut fiat nutritio suæ adherentia præcedat oportet, Sicuti etiam ut illa fiat appositio, exemplum habes de uirilagine quæ nutrimenti est adherentia sed non est assimilatio.

#### Loci de quatuor facult. nutritiue ministr.

Auice. pri. pri. cap. de uirt. ministr. Virtute nutritiue ministrantes sunt quatuor uirtutes attractiua retentiua digestiua et expulsiua, quæ uero sit unaquæque poteris ab ipso ediscere. Gal. 3. de temper. ca. 1. Quatuor nimirum dicimus totius corporis proprias facultates esse, attractricem alteratricem retetricem & quartam quæ alieni sit segregatrix, easdemque facultates esse factus esse totius in quouis corpore substantia & c.

#### Loci de uirtute auctrice.

Arist. 2. de anima uirtus augmentatiua est uirtus factiua quæ anti. Gal. 1. de fac. nat. cap. 7. Auctio est solius nature opus, ut corpus quod continuitatem suam & speciem quam prius habuit uniuersam seruet, in omnem partem extendere, quæ sine nutrimento affluente adherenteque fieri nequit. Auice. pri. pri. cap. de uirt. ministr. Virtus augmentatiua est uirtus quæ addit in diametris totius corporis secundum proportionalitatem, quousque corpus ad augmenti finem perducatur per illud quod ipsum ingreditur ex nutrimenta, itidem ait in sexto de naturalibus.

#### Loci de facult. uitali.

Gal. 5. de locis aff. cap. 1. Cor. innati caloris ueluti fontem esse, neque animal mori posse nisi cor afficiatur, iam declaratum est igitur cor est membrum uiuificans.

Auic. pri. pri. cap. allegato. Virtus uitalis est quæ cum recepta



cepta fuerit in membris preparat ea ad recipiendum uirtutem sensus & motus & operationes uitæ & c.

Loci de facultate animali.

Gale. s. de loc. aff. ca. 1. Ostensum est sensum & motum uniuersis corporis partibus a cerebro suppeditari & c. Et tertio de loc. aff. ca. 7. Rationi consonum uidebatur animam in cerebri corpore sedem obtinere atq; in ipso & rationis uim & sensibilibus imaginum memoriam residere & c. & sic animæ facultas in motricem & sensibilem potentiam diuiditur. Aristo. tertio de anima cap. 2. sensus communis est qui solus sensata aliorum sensuum percipit. Auic. primo can. ca. de uir. animali. Phantasia. i. imaginatiua est uirtus quæ formas perceptas a sensu communi custodit, & retinet eas post sensus absentiam. Themist. una cum Arist. Imaginatiuam esse potentiam animæ a sensibus ortam dicunt, Arist. primo ethic. facit differre uirtutem ratiocinatricem ab intellectu, eo qd causas cum effectibus conferre possit, sed intellectus causas tantum comprehendat. Gal. lib. fin. med. Sensus est affectus animæ per corpus nuntius rei quæ mouere idonea est. Aristo. lib. de memoria & reminiscem. Memoria inquit est habitus phantasmatum. i. imaginis. Auero. ibi memoria est reuersio in præsentem, intentionis iam in præterito comprehensæ. Auic. primo can. Memoria est thesaurus eius quod peruenit ad extimationem de intentionibus perceptis a sensu extra formas perceptas a sensu. Gal. lib. fin. med. Memoria est præteriti comprehensio, cuius presens fuit ex sensu perceptum.

Dissentientes circa facultates dictas.

- 1 Adferere facultates naturales non esse in qualibet parte corporis.
- 2 Adferere facultates esse remediorum indices.

C



### 34 DE CONSENSV MEDICORVM

- 3 Adserere facultatem nutricem & auctricem esse idem.
  - 4 Adserere facultates non alibi, quam in animato corpore posse reperiri.
  - 5 Adserere facultatum cognitionem esse medico inutilem.
  - 6 Adserere facultatem uitalem non esse naturali priorem.
- Confutatio dissentientium circa facultates naturales.

Ad primum Gale. s. de loc. aff. cap. ult. Est igitur communis sermo quem inuenire proposui de naturalibus facultatibus, quas in qualibet parte, quatuor generatim esse didicistis, primam uoco attractricem quæ parti peculiares succos alendi ipsos gratia & appetere & attrahere potest. Altera est quæ alteratrix dicitur, qua succus attractus similis euadit parti, quæ aliter, huic duæ aliæ ministrant retentrix & expultrix &c. & sic in qualibet parte erunt facultates, similis sententia est in lib. de plenit. circa medium.

Ad secundum Gal. de opt. secta ad Thrasybu. cap. 42. si constans uis remedium indicat. In sanis quoque quoniam constat, remedium indicabit, sed insanis remedium non indicat, ergo nec in aegris constans remedium indicabit.

Ad tertium Gale. primo de natural. facult. ca. 9. Quippe summa rei sic habet, generatio auctio & nutritio, prima naturæ operum ac ueluti capita sunt, ubi distinguit auctiorem a nutritione, igitur idem non sunt. Præterea tali ratione probatur, Quæcunque in fine & in quantitate materiæ differunt, non sunt idem, sed auctrix & nutritrix sunt huiusmodi, igitur idem non sunt, Quod differant in fine & in quantitate materiæ probatur ex hoc quia nutritrix indiuiduum tantum conseruat, Auctrix uero auget. Veruntamen dicimus unam & eandem substantiam esse, quæ duo hæc efficit.

Ad quartum Gale. primo de natu. facult. cap. 13. probat in magnete & in succino esse uim attractoriā, sicuti & in purganti



bus medicamentis & in stirpibus & in similibus esse alias facultates, igitur alibi quam in animato corpore reperiuntur.

Ad quintū Gal. 2. de naturali fac. ca. 3. Nisi. n. a natura facultas quædam naturalis unicuique instrumento statim ab initio sit tributa, durare animalia non poterunt, non modo tantum annorum sed nec paucissimorum dierum, igitur scire has facultates, non erit inutile. Præterea probat Gale. citra facultatē attractoriam de urinae secretionē neque de alimenti distributione, aut de nutritione non medico licere loqui igitur harum cognitio, non erit inutilis. Rursus quinto de loc. aff. ca. ult. has facultates inquit in qualibet affecta parte, utrum ualide sint, an infirmæ consideretis, hortor, & sic earum cognitio non erit inutilis.

Ad sextum Auice. prima primi cap. de uirt. uit. inquit q̄ preparat ad recipiendum alias uirtutes, igitur erit prior, Præterea id prius est, cuius instrumentum est primum sed instrumentum. s. cor uirtutis uitalis est prius factum quam hepar, igitur erit prius.

#### De sanitatis ac Morbi definitione.

Sanitas est harmonia siue cōcinnitas quatuor primorum elementorum qui secundum naturam in nobis sunt, uel sanitas est omnium nostri corporis partium naturalis quedam constitutio ex qua actiones naturales edimus, uel est naturalium uirium actio minime impedita, ad sanitatem requiruntur pulchritudo bonus habitus integritas, Pulchritudo erit si proportio membrorum cum coloris probitate adsit, Bonus habitus sit non qualis exercitatorum nam ne salubris quippe hic habitus est, sed sicut superius a nobis descriptus. Integritas erit sine quid circa animum mores & robur ac symetriā corporis desit. Morbus uero cum ex diametro sanitati opponatur, erit inconcinnitas siue intemperies primorum elemen-



torum qui in nobis sunt, uel erit partium præter naturã constitutio ex qua actio uitiata provenit, uel erit naturalium uirium præpeditio.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Quod sanitas sit harmonia &c. probatur ex Gale. 1. de tempe. cap. 1. Nam indicium inquit sani hominis ac temperatim est elementorum portionis æqualitas. Et tertio de Mor. diff. ca. 1. Sanitas est affectus secundum naturam ad faciendam actionem idoneus, nec refert si dixeris constitutionem siue affectum sicut nec actionem, nec actionis causam. Et primo meth. cap. 9. Sanitatem inquit esse ipsarum functionum constantiam aut affectum siue constitutionem partium, cuius ope functiones secundum naturam edimus. Et tertio meth. ca. 3. Quippe monstratum est sanitatem in similaribus corporibus ipsarum quatuor qualitatum esse iustam temperiem. Auice. secunda primi cap. de diuisione dispositionum corporis. Sanitas inquit est dispositio, per quam corpus hominis in sui complexione & compositione tale existit, ut ex eo operationes eius omnes proveniant in columnes. Quod uero pulchritudo requiratur &c. Gale. in art. med. cap. 8. Signa optimæ constitutionis sumuntur a commensuratione pulchritudine ab optimo colore, ac præterea ab earum quæ ipsis insunt uirtute operationum. De morbo uero sic. Gale. de constitutione art. med. ca. 12. Id quod excellenter sanum est, sit modo illud simile uel instrumentarium, omni ex parte moderatum existet, ægrum uero immoderatum, siquidem morbus immoderatio quædam est. Et secundo de natu. hum. commen. 1. Morbus est affectio quædam in animantis corpore, quæ primum actionem ledit. Et 3. de sympt. diff. cap. 1. Morbus est constitutio quædam præter naturam a qua primo actio uitiatur, quin si affectum dixeris a quo actio uitiatur, idem est &c. Et meth.



2. cap. 1. & 3. Nam contrarium sanitati affectum a quo laedi actionem diximus, morbum tantum appellamus, & similiter cap. ult. Quicumq; affectus functioni officit, is est morbus.

### De sex morborum generibus.

Sicuti naturalis operatio in his tribus consistit .s. in temperie compositione & unitate ut dictum est, ita morbus erit in triplici diuisione, nempe in complexione compositione & unitate soluta. In complexione ut calidus frigidus humidus & siccus, aut cal sicc. cal. hum. frigidus, siccus frigidus humidus. In compositione quadrupliciter in positione magnitudine figura & numero. In unitate simpliciter nempe in similaribus & instrumentarijs simul, & sic sex erunt in uniuersum morborum genera, unum quippe in similarium partium in temperantia, in organicis quatuor, in utrisq; unum, quod est soluta continuitas, leditur etiam operatio tripliciter debilitate uitiose aut quia nullo modo fit operatio.

### Loci consentientes ex uera Medicina.

Auice. secunda primi cap. 2. dicimus quod aegritudinum genera sunt tria loquendo de simplicibus aegritudinibus, Primum est similarium & est species male complexionis, Secundum est membrorum officialium, quæ sunt aegritudines compositionis, Tertium est aegritudinum communium, quæ aegritudines accidunt membris similaribus & instrumentarijs & c. Gale. 1. de diff. mor. cap. ult. Nempe dictum est q. alij sunt primorum similariumque corporum morbi, alij instrumentorum compositorumque, alij utrorumq; ut phlegmone & c. Et lib. de opt. corp. constitutione inquit quod temperamentum ex calido frigido humido sicco cõgmenti mensura definitum, similarium membrorum est sanitas & q. constructio par



tium ex positione magnitudine & figura & numero constituitur &c. Si igitur sanitas in ijs consistit simili modo & morbus in his erit, quum in eodem genere ambo constituantur teste Gale. meth. 1. cap. 7.

Quod uero sex sint morborum genera probatur ex Gal. 2. meth. cap. 6. dum inquit, Ergo sunt sex in uniuersum morborum genera, unum ipsorum similarium proprium nempe intemperies, quatuor ut modo dictum est instrumentorum cuiusq; & cum his sextum, quod tum similaribus tum instrumentalibus est commune ipsius unitatis solutio.

De causis salubribus & insalubribus.

Causarum alie sunt conseruatrices, alie effectrices, conseruatrices sunt quæ corpus in optima constitutione præseruant, Sed quia corpus alteratur et corrumpitur, idcirco quot modis alteretur dicamus. Alteratur corpus sextupliciter, primo ex aere ambiente, secundo ex motu & quiete, tertio ex somno & uigilia, quarto ex cibo & potu, quinto ex his quæ excernuntur & retinentur, sexto ex affectibus animi. In his causæ salubres & insalubres conseruatricesq; consistunt, Nā in his si modus seruetur conseruatrices sunt, sed ubi a modo recesserint insalubres redduntur, de his sex rebus non naturalibus in morbis a capite usque ad pedes de inceptis pertractabimus, causa etiam dispositionum corporis rursus alteratur ex frigore calore siccitate humiditate. Causæ uero morbi effectrices sunt tres procatasticæ & antecedentes & coniunctæ quæ diuiduntur per se uel per accidens.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. in art. med. cap. 84. Quia salubrium nonnullæ sunt conseruatrices, nonnullæ effectrices & Paulo infra si corpus esset impatibile & inalterabile semper optima constitutio perduraret, sed quia corrumpitur et alteratur idcirco eundem quum



ris status tenorem non seruat, &c. Et cap. 85. eiusdem lib. Quot igitur numero sint ea quæ ex necessitate corpus alterât, distinguentes proprium in singulis eorum causarum salubrium genus inueniemus. Vnum igitur erit ex ambientis aeris adhæsu. secundum ex motu & quiete &c. ubi sex res non naturales enumerat. Auic. secunda primi doc. secunda, cap. 1. causæ dispositionum corporis &c. sunt tres antecedentes primitiue & coniunctæ, et paulo inferius dicemus q̄ causæ quæ mutant dispositiones corporis & quæ conseruant, aut sunt necessariae a quibus impossibile est hominem egredi in toto tempore uitæ suæ, aut non necessariae, necessariarum sunt sex genera. genus aeris circundantis. genus motus & quietis &c. Gale. in art. med. ca. 80. Alteratur uero substantia a caliditate frigidityte humiditate & siccitate.

De causis morborum partium instrumentalium.

Dictum est q̄ ad composita membra quatuor spectant, positus siue situs formatio magnitudo & numerus. Primum situs uel est optimus, uel parū uariat, uel a modo recedit, uel ægrū plurimo recessu reddit. Formatio quoq; tripliciter leditur, uel in figura quum a cursu naturali mutatur in meatu uel orificio & hoc ratione obstructionis aut dilatationis, in membrorum superficie quum adest asperitas et lenitas, magnitudo dupliciter excessu & defectu, numerus similiter aut deficit aut superabundat, ut sextus digitus in manu, hæ omnes causæ, si modum excederint insalubres dicuntur, si uero a mediocritate non recesserint, erunt salubres de soluta unitate quū de chyrurgia tractabimus fusius loquemur.

Loci consentientes ex uera medicina.

Auic. secunda primi cap. 3. Compositionis ægritudines quatuor comprehenduntur generibus, ut ægritudines creaturæ, ægritudines quantitatis, ægritudines numeri & ægritudines



40 DE CONSENSV MEDICORVM

situs, ægritudines creaturæ. i. formationis uel sunt in figura uel in uis uel in receptaculis & uentriculis, uel in superficie &c. Gale. in art. med. cap. 87. Instrumentarium partium causæ salubres, aliæ sunt salubres erroribus qui in foramine consistunt, aliæ his qui in magnitudine uel numero uel positu &c. quæ fusius uidere poteris, lege etiam de his Gale. 1. de diff. morb. cap. 7. exempla in omni morbo afferentem.

De Morborum calid. frig. sic. & humid. causis.

Causæ morborum calidorum sunt quinque putredo, uicinitas ad corpus calidum, obstructio, cibus & potus calidus et motus uehemens, Causæ frigidorum sunt quatuor uicinitas frigidorum cibi potusque qualitas & quantitas, obstructio & raritas, otium & motus immodicus: Causæ siccorum sunt sex plurima transpiratio & pauca nutritio, alimenta siccantia, sollicitudo & uigilie, aeris constitutio sicca, aquæ nitrosæ & sulphurosæ aluminosæ, & medicamenta exiccantia, Causæ humidorum sunt his, e contrario oppositæ, ut alimenta humida, quies somnus potus plurimus &c. ex quibus facile morborum compositorum causæ intelliguntur.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gale. 2. de morb. cau. cap. 2. Corpora quæ plus satis incalescunt, ita uidetur affici, uel ob motum aliquem aucto calore, uel ob putredinem, uel ob calidiori corpori uicinitatem &c. reddit; rationem de unoquoque. Et cap. 3. eiusdem lib. frigidi morbi causæ sunt ut frigidorum uicinitas cibi potusque quantitas & qualitas, constipatio & raritas &c. reddens de singulis rationem. Et cap. 4. & 5. similiter de sicci & humidi morbi causa etiam rationem reddit. Auice. secunda primi doc. secunda summa secunda cap. 2. 3. & 4. idem asserit ut Galenus, quæ longum esset recensere, uide tu si lubeat eum fusius. Vide etiam Galenum primo de diff. feb. cap. 3. & 2. eius



dem cap. 9.

Autores erronei dissentientes circa sanitatē & morbū.

- 1 Adserere sanitatis cognitionem non esse medico necessariam.
- 2 Adserere morbos posse cognosci non cognito affectu secundum naturam.
- 3 Adserere morbos similium partium, non distingui ab instrumentarium morbis.
- 4 Adserere, scire morborum numerum non esse necessariū.
- 5 Adserere morbum in numero ab eo quod est in quantitate non differre.
- 6 Adserere causas morborum non esse semper considerandas.

Confutatio dissentientium circa sanitatem & morbū.

Confutat primum Gale. meth. 2. cap. 3. inquiens q. sanitatis egemus omnes ob actionem quæ est secundum naturam.

Nam sine sanitate actionem integram habere non possumus. Et nono meth. cap. 9. sicut primum propositum est in methodo, morbi sublatio, ita in opere de sanitate tuenda, est sanitatis tuitio, igitur erit necessaria.

Ad secundum Gale. meth. 2. cap. 4. Neceſſe tibi erit eo quod secundum naturam est prius præsumpto, ita quod est præter naturam inquirere. Nam si ipsum quod secundum naturam est, non nosti, nec quod egressum est a natura nosti, igitur primum sanitatem cognosces antequam morbum cognoscas.

Ad tertium Gale. 2. meth. cap. 6. exemplo probat. Nam quum crystallinus humor ex intemperie laborat, omnino læditur oculorum functio. Caterum non est ut eorum organa sint morbus. Præterea Hippoc. constituit aliud esse in corporibus similaribus morbi genus, aliud in instrumentarijs igitur distinguuntur.



#### 42 DE CONSENSV MEDICORVM

Ad quartum Gal. meth. 1. cap. 5. Quoniam omnis morbi curationem inuenire propositum est, necesse est, morborum numerum prius sciri.

Ad quintum Gal. de consti. art. med. cap. 12. Differt numeri morbus a quantitatis morbo, ex eo quod in hoc morbi genere particula nonnunquam integra, in illo uero portio quæpiam alicuius particule, aut amputanda est aut adijcienda.

Ad sextum Gale. pri. meth. cap. 8. tria rerum genera enumerans, primum genus corporum, alterum actionum, tertium inquit essæ genus causarum quæ hos affectus creant, quæ ad mendendi artem incipiendam primum sunt noscenda.

De cura singulorum sex morborum in genere.

Morbus in complexione per sui contrarium aufertur. Nā si calidus sit frigidus, si frigidus calido si humidus sicco & ecō uerso remouebitur, si ex utroque sit compositus utroque contrario indigebit, Si quidem contraria contrarijs curantur, Morbi in informatione, in nuper nato animali ad habitum naturalem tantum reducuntur, post hac emendari non possunt, similiter morbi in cavitae parui, quum adhuc augetur animal per quietem & alligationem redduntur. Magni uero per partium operationem & spiritus retentionem, Morbi in numero si ex aliqua particula deficiente fiant, eam efficere studebimus subministrando naturæ, si ex superabundanti hanc rescabimus, hæc omnia sanare possumus, sed q̄ omnia generentur, non æque possumus: morbis in magnitudine similiter excedentibus naturæ modum, ablatio & abolitio conuenit, deficientibus, resectio uel generatio, morbos insitu, si quæ particula a suo situ dimoueantur, ad suum locum reducendo, sanabimus.

Locis consentientes ex uera Medicina.

Gale. in art. med. cap. 89. Curatio unam præcipuam accom



munissimam habet intentionem, ad id, quod est dispositioni cōtrarium auferendæ. Calido enim affectui causa frigida contraria est, frigido calida, eademq; in cæteris proportionē seruata. Et cap. 93. eiusdem libri, in ijs igitur qui adhuc crescunt, possibile est plurium partium figuram emendare, in his autem qui iam aucti sunt minime. Et cap. 96. quum morborum in numero duplex sit differentia, quibus aliqua particula deficit, his intentio alteram efficere sub ministrando naturæ, At quibus superabundat, hanc resecare oportet aut scalpello, aut igne, aut medicamento quod urendi uim habeat, de alijs morbis lege cap. 97. & 98. eiusdem libri. Gal. 8. meth. cap. 3. illud esse uerissimum omnium inquit q, contraria contrariorum sunt remedia, & cap. primo eiusdem libri omnis excessus per contrarium excessum sanatur, similiter lib. 7. cap. tertio. & lib. 4. cap. 2. curabis inquit calidum refrigerando frigidum calefaciēdo &c. similis sententia est aphor. 2. aphorif. 22. & in mille alijs locis.

Obiectio.

Obstructio ad quem

horum morborum referenda erit?

Responsio.

Obstructio est compositionis morbus in meatu siue in orificio, fitque ex lentis ac crassis humoribus, curaturq; per apertionem quæ fieri solet per abstergentia atq; incidentia medicamina.

Obiectio.

Inteligis ne per

apertionem, uulgarem medicorum digestionem, an aliud ab hac distinctum. Nam digestio Auic. est tenuis materiæ incrasatio, uel crasse & lentæ extenuatio.

Responsio.

Inteligo per apertionem humorum ac meatuum præparationem. Nam humores oportet esse non tantum fluxui paratos, quam etiam aperta esse foramina per quæ debet purgatio fieri, ut Gal. aphorif. primo, comm. 24. Et secundo aphorif. mo. commen. 9. Nam tunc fluidum esse corpus pronunciat, quum tam in humoribus quam etiam in meatibus reſeratis,



fuerit apertum.

De Morborum indicijs in genere.

Indicia morborum uel a ratione temporis sumuntur, & sunt tria praesentia praeterita & futura. Nam uel morbum praesentem indicant, uel futurum esse praenunciant, aut memoriae subiiciunt, haec omnia interdum a medicis praenunciatiua uocantur, uel sumuntur a ratione suae essentiae & sic erunt quatuor. Primum ab exeuntibus in quantitate & qualitate mutatis & cognoscuntur a multitudine excrementorum siue per urinam per sudorem per uomitum per sputum & per secesum & per qualitatem mutatam sicut est totius corporis rubor uel pallor uenarum ac membrorum tumor &c. Secundum ab operatione laesa & cognoscitur a grauitate, a pigritia, a sensuum imbecillitate, a pulsu magno & pleno, ab hanelitu, a corporis extenuatione &c. Tertiū a proprijs morborum accidentibus sicut in pleuritide a tussi, a dolore, a febre. Quartum a membrorum positu ut a capite, a uentre, & ab alijs locis affectis. Vel sumuntur indicia a uiribus corporis & hoc trifariam, uel a uirtute animali & cognoscitur ex motu ex ratione & sensibus, uel a uirtute uitali & cognoscitur ex pulsu & ex spiratione, uel a uirtute naturali, & cognoscitur ex urinis & ex egestionibus. Horū quaedam sunt salubria q̄ salutem, quaedā insalubria q̄ mortē praedicere solent.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gale. in art. med. cap. 7. Signa sunt salubria & insalubria quae praesentem indicant egritudinem & futuram praenunciant, atque praeteritam memoriae subiiciunt, & paulo inferius, Haec quoq; secundum tria tempora salubria & insalubria dicuntur, quorū usus maior est de indicatiuis, quā ex his quae memoriae subiiciunt. Gale. in art. med. cap. 81. quaecunq; excernuntur, nonnulla quidē sunt ueluti partes patiētium locorum,



non nulla tanquam excrementa, quæ uero in ipsis continetur singula propriâ faciunt iudicationem, et sic ab exeuntibus sumitur indicatiû. Gal. pri. de loc. aff. cap. 5. locorû notæ, ab actione lesa & excrementis & positu & doloris proprietate & a proprijs accidentibus sumuntur. Affectuum uero ab excrementorû specie, a loci natura & doloris proprietate & proprijs accidentibus, sane actio lesa affectam partem indicare potest & c. similiter. 3. de Symptomatum diff. ca. 3. de his indicia habentur. Gal. meth. 9. cap. 13. hæc itaq; cum uires indicet, maxima harum erit dignitas. Nam uiuere ipsum nobis ex harum custodia constat, ut pote quum uitâ, aut ipsas esse uires, aut earû actiones sit necesse & c. Hippo. aphorif. 2. apho. 33. In quouis morbo mète cõstare et bene si habere ad oblata bonû, cõtra uero se habere, malum, & Gale. in hoc commen. ex his constare mente cognoscet, quæ ad cerebrum & omnes membranas, sicuti ad uentrem attinet hepar & cor ubi adest præptitudo ad ea quæ offeruntur & c. Gal. 1. de art. curat. ad glauc. Virtus uitalis, quam ex corde prodire ostendimus expulsuum debilitate cognoscitur, at quæ ex hepate oritur, naturalis dicta, ex sanguineis egestionibus aquosis & tenuibus, & quæ ex cerebro originem ducit, animalis dicta, ex motuum uoluntariorum imbecillitate deprehenditur & c.

#### De alia signorum diuisione.

Sumuntur etiam indicia a complexione, ab humorum dominio ab ætate, a tempore consuetudine & uictu præterito complexionibus cognoscuntur per decem genera. Primo ex tactu ut si cali. frig. Secundo ex adipe & carne addita nam multa caro caliditatem, Pauca cum multo adipe frigiditatem. Tercio ex cæleri actar do capillorum ortu, nam cæler cali. tardus frig. Quarto ex corporis colore, nã color croceus rubeus liuens ac pallidus caliditatem, albus liuens plumbeus frigiditatem.



46 DE CONSENSV MEDICORVM

Quinto ex membrorum forma, nā ampla lata caliditatem. Angusta uero frig. Sexto ex membrorum sensu, nam cito sentiens cali. tarde frig. Septimo a cogitatione hominum. Octauo ab operationibus, nam celeres operationes caliditatem & econtra frig. Nono ex superfuitatibus corporis, nam siquid egrediens acutum habeat odorem, caliditatem indicat, si minus frigiditatem. Decimo ex accidentibus animi ut ira audacia inquietudo impietas & similia caliditatem, contra uero frigiditatem. De etate, id dictum est pueros & iuuenes esse calidos, senes & decrepitos frigidos, similiter ex tempore & consuetudine & uictu præterito iudicandum est.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. lib. de sectis ad eos qui introducuntur ca. 4. & 5. Hoc igitur modo illi ab ipso affectu eius quod confert indicationem eliciunt, similiter ab egrotantis uiribus ab etate, ab anni tempore & regione &c.

Auic. secunda primi cap. 3. signorum genera quibus complexionum dispositiones cognoscuntur sunt decem & ea enumerat exempla singulorum asserens ut dictum est supra.

De urinæ definitione & diuisione.

Lotium est sanguinis aliorumq; humorum serea quedam redundantia. Id tamen existimandum est optimum lotium in quo residet candidum leue & æquale per omne tempus, uel id optimum est quod urinæ sanorum est simillimum. Tria in lotio considerantur substantia, color & hypostasis. Substantia si tenuis, crassa, nam si tenuis & alba sit uel uirtutis imbecillitatem, uel renum obstructionem significat, si tenuis et pallida, uel tenuis & rufa uirtutis imbecillitatem, & quo ad substantiam cruditatem significat, tenuis uero & flaua incoctionem, et alimenti defectum, uigilias ac animi pathemata significat, tenuis rubra sanguinem incoctum, tenuis & nigra melancho



liam, uel nimiam frigiditatem, aut sanguinis adustionem indicat. Craſſa uero & alba maximam crudorum humorum copiam demonstrat, si craſſa & rubea plenitudinem sanguinis, si craſſa nigra euacuationem atræbilis significat. Color flauus rubeus caliditatem, albus, liuens, ater, frigiditatem denotant. Hypostasis uero diuiditur secundum situm, nam si in fundo, non diuulsa residet, sed pyramidalis, bonam indicat concoctionem, si in supremo loco, diuulsa & inæqualis, imbecillitatem uirtutis, si in medio loco, malum portendit, maxime si diuulsa sit, nam naturam defecisse in concoctione obdistratorem significat. Consideratur etiam urina iuxta suum colorem, nam rubea sanguinis incocti copiam & morbi cruditatem indicat. Idcirco morbum facit diuturnum, nigra cui antecessit liuiditas, frigiditatem, cui uero croceitas, calorem, liuida frigiditatem, & uirtutis interitum, oleosa, totius corporis adipis coliquationem indicat. Rursus si sedimentum cito craſsum fiat, cito morbum solutum iri significat. Si residet craſsum, assistente uirium robore longum fore morbum, si uero imbecillitas adsit agri mortem pronunciat.

#### Loci consentientes ex uera Medicina.

Theoph. de urinis cap. 1. lotium est sanguinis aliorumque humorum aquea quædam colatura. Gal. lib. finit. med. Vrina est superfluitas ex colatu sanguinis in magna uena quæ per renes & ureteras in uesicam delabitur. Hippocra. pronost. 2. tex. 26. τοῦτο οὖρον ἀριστόν ἐστι εἰς λευκίαν, ἢ ὑποστασίς καὶ λεῖψ, καὶ ὁμαλὴ ἐπὶ παντατῶν χρόνων. Gale. 1. de cris. cap. 12. ex his igitur illa optima est quæ urine sanorum est similissima, quæ uero non est talis simpliciter, uel incocta est, uel præter hoc pernitiōsa. Gale. 1. de cris. cap. 12. oportet urinam optimam discedere tantum sua craſsitudine ab aquosa, quantum colore, si bene concoqui debeat ponens differentiā in sub



stantia & colore &c. Gal. loco citato praua autem sufficien-  
ter est, quæ tenuis & alba est, sicuti aqua, nam simplex qui-  
dem dispositio est, sed ultimæ imbecillitatis est indicium, huic  
proxima est altera urina uini tenuis albi colore, quæ in mul-  
tis apparet morbis, post hanc est sub pallida &c. Hippo. 2.  
pronost. tex. 30. Dum urina tenuis fuerit ac rufa crudam esse  
significat ægritudinem. De lotij colore Hippo. 2. prono. tex. 32.  
Exitior urina est si aquosa fetida nigra crassaq; est, uide in  
hoc latius Galeni cōmen. Quod situs hypostasis consideretur  
& eius color lege Hippo. 2. prono. tex. 36. Consideranda in-  
quit in urina nebecula utrum sursum fuerit an deorsum, item  
color quem obtinet &c. De oleaginsa urina Hippoc. 2. pro-  
nost. tex. 35. si pingue de super natet araneorum speciem refe-  
rens, damnandum. Indicat enim consumptionem. Et Gale. de  
cris. cap. 12. Quod si ueluti oleum mingatur colliquationis est  
signum. De colore Hippoc. 2. pronost. tex. 27. Urina subrubra  
cum sedimento subrubro admodum salutaris, sed morbum diu-  
turnum fore indicat, & tex. 33. eiusdem lib. In mulieribus &  
uiris urina nigra, in pueris aquosa, deterrima est: lege fusius  
Galenum. De urinis quæ uel turbide minguntur et paulo post  
resident, uel quæ semper turbide mictæ permanent, aut quæ  
pure minguntur & postea conturbantur habes plura ex Gal.  
1. de cris. cap. 12. & aphorif. 4. commen. 7. & 4. super pri-  
mam epidemiam.

Authores erronei dissentientes circa urinam.

- 1 Adserere renum nutritionis excrementum tantum esse lo-  
tium.
- 2 Adserere, per urinam cognosci posse morbos ex succis or-  
tos qui in uenis non continentur.
- 3 Adserere sedimen in urina esse semper bonum indicium.
- 4 Adserere ex Galeno non posse per urinarum coniecturam

in



in sectionis uenæ cognitionem peruenire.

Confutatio dissentientium ex uera Med.

Confutat primam opinionem Gal. 1. de nat. fac. cap. ult. contra lupum quendam dum inquit, Quod autem soli renes tantilla corpora, quatuor interim totos uel etiam plures habeant excrementi congios, id nec confessum, nec rationi consentiens est.

Ad secundum Gale. 4. de sanit. tuend. circa principium. Quoniam lassitudo uitio acrium excrementorum oritur, ante omnia considerandum, in solidis ne tantum corporibus, at intra uenarum sinus succus contineatur, de his quæ intra uenas sunt, nullum plane, nec manifestum, nec euidentis signum, præter solam urinam conijcere licet, in reliquis, quoniam quæ affligitur, usus sit uictu, existimandum. i. per alia signa quam per urinam coniecturandum, quum urina in hoc casu sit exiguum signum, & quarto de uic. ratione in morb. ac. Non tuto inquit Gale. commen. 83. morbi facilitas ex urinarum concoctione prænoscutur, nam et si febris cruditates per urinas manifeste indicentur, Morborum tamen musculos infestantium, non secuta est per urinas significatio &c.

Ad tertium Gale. aphorif. 4. commen. 69. contigit aliquando uel per initia morbi, uel paulo post urinas factas crassas propter grauitatem habere sedimen, quod bonum signum non est, sicuti in alijs quæ ab initio tenues existentes, ratione coctionis totius morbi sedimen capiunt.

Ad quartum Gal. 2. pronost. commen. 27. Quoties serum sanguinis pariter cum urina excernitur, colore subrubra apparet, indicat enim exuperantiam sanguinis non exquisita ratione confecti & sic sectionem uenæ. Et meth. 9. cap. 4. Mitatus est sanguis etiam si nec in lotio, aut in ipsa caloris qualitate humorum putrescentium signum appuerit, interdum

R. BLANCHARD

PROF. FAC. MÈD. PARIS



igitur signum in urina de mittendo sanguine apparet.

De pulsum definitione diuisione.

**Σ** *φυνκός*. i. pulsus est cordis arteriarumq; dilatatio ac contractio, consideratur pulsus uel ratione uirium, & tunc est triplex, uehemens quando. s. tangentis manus, ualide repellitur, languidus, quum inualide imbecillum ictum edit mediocris mediam seruans proportionem. Vel ratione arteriæ, & est duplex durus & mollis, uel ratione diastoles, & est trinus ut altus longus latus, uel ratione plenitudinis & euacuationis & est duplex plenus & uacuus plenus qui arteriam solidiorem undosamq; in compressione ostendit, uacuus qui inanitatem suo digito representat, uel ratione rhythmi, in quo proportionem temporis metiuntur & sic est duplex deficiens uel intercidens, uel ratione temperaturarum ætatum, anni temporum regionum sexuum de quibus satis loquuti sumus infra ubi Gale. loca citauimus, uel ratione somni & uigiliæ uel aliarum causarum non naturalium, nam in somno languidiores minoresq; sunt. Quum a somno expergiscuntur uehementes & crebriores sunt.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. 4. de diff. puls. Pulsus est distentio & contractio cordis & arteriarum ubi uarias pulsum descriptiones ex antiquis recitat. Quod uero ratione uirium consideretur pulsus habetur ex Gale. 4. de præ sag. expuls. cap. ult. Quum inquit pulsus per se sint languidi, infirma est facultas, ubi earum arteriarum languidus nunc pulsus sit, nunc uehemens, facultas non est per se imbecilla, sed ex copia humorum degrauatur & c. & ibi omnia ad uirtutem spectantia per pulsum declarat. Et. 3. de diff. puls. Pulsus qui cum renisu quodam pulsatur uehemens uocatur, cuius causa est facultatis robur. Quod uero ratione arteriæ pulsus consideretur, habes ex Gal. primo de cau. puls.



Reliqua inquit & tertia gignendorum pulsuum continens causa ipsum est arteriarum corpus & c. & cap. de puls. causis ex diff. instrumentorum, Quum durius aut mollius euaserit corpus arteria, ipsos pulsus duos uel molles reddit, similis sensus est primo de diff. puls. & in lib. finit. med. Gale. pri. de diff. pul. Iam quia arteria tres dimensiones obtinet longitudinem latitudinem & profunditatem non potest in singulis dimensionibus non fieri quantitas aliqua distentionis & contractionis.

Gale. primo de diff. pulsuum cap. de reliquorum diff. generum plenus est pulsus qui plenior arteriam ostendit, uacuuus qui arteria elevationem facit bullosam ut digitorum impressioni gressus per uacua occurrat, & sic plenitudinis & euacuationis pulsus datur. De rhythmo genere pulsuum habes Gal. 1. de diff. puls. ca. de diff. quietis & rhythmici, dum plures species rhythmorum pulsuum enumerat quem fusius leges, omnibus. n. naturis locis anni temporibus omnibusq; aliis suum rhythmum tribuit & inter omnes rhythmos, alios pari proportionem, alios impari constare inquit. De temperie. Gale. 3. praesag. puls. ex intemperie cordis calida fiunt pulsus imbecilles, ex intemperie uero frigida plane efficiuntur contrarii parui tardi & rari de intemperie sicca & humida cordis tractat eodem lib. cap. ult. & lib. de introductione puls. calidiores natura pulsuum habent maiorem celeritatem ac longe frequentior non multo tamen uehementior, Graciliores uero maiorem ac longe rariorem, uerum non multo uehementior, uide de his similiter de usu pulsuum circa finem. De pulsibus aetatum Gal. in introduct. puls. cap. 9. Mutantur per aetates, sic puerulo nuper nato pulsus est frequentissimus, Senum rarissimus, qui uero in media aetate sunt inter hos, ijs pulsus ad proportionem respondent. De pulsu anni



## DE CONSENSU MEDICORVM

temporum Gale. loco nuper citato per anni tempora pulsus mutantur, nam in medio uere maximi ac uehementissimi celeritate uero ac frequentia moderati, similiter medio autumno habentur progrediente uere magnitudo ac uehementia ipsius minuuntur, augentur autem celeritate ac frequentia, Autumno progrediente, omnia minuuntur magnitudo. s. uehementia celeritas ac frequentia, adueniente uero aestate fiunt languidi & parui celeres & frequentes, contra uero in hyeme in paruitatem langorem tarditatem ac raritatem mutantur &c. De regione, Gal. loco citato per regiones mutantur, si quidem in calidis, pulsus sunt quales in aestate media, in frigidis ualde, quales hyeme media, in medijs ad proportionem se habent &c. Quod pulsus uirorum a feminarum pulsu differat, habes Gale. loco citato, uiri. n. inquit mulieribus pulsum habent multo maiorem & uehementiorem, paulo tamen tardiorum ac longe rariorem. De somni pulsibus ac de expergefatto a somno, similiter de mutatione pulsum per exercitium, balnea, cibos & potus aerem ac accidentia animi, nam ab ira pulsus sunt alti magni uehementes celeres ac frequentes, a tristitia parui tardi languidi rari, a metu celeres turbulenti inordinati inaequales &c. habes in hoc loco citato plura ex Galeno.

**Autho. erronei dissentientes circa pulsum doctrinā.**

1. Adserere utilitatem pulsum esse magis necessariam quam respirationis.
2. Adserere certius esse indicium ab urina sumptum quam a pulsu.
3. Adserere cor & arterias moueri tantum ex motu pulsus.
4. Adserere pulsum genera esse quam decem pauciora cum Auerroc.
5. Adserere, ex repletione pulsum dilatari & nō econuerso.



Confutatio dissentientium circa pulsuum doctrinam.

Ad primum Gale. de usu puls. si respirationē cuipiam adīmes, illico mortem afferes, at pulsu, si per multas particulas priues, non magnopere ledes, & sic maior erit respirationis utilitas, quam pulsuum, Præterea ex Hippocra. totum corpus est conspirabile atq; confluxile, Quare si non per arterias saltem certe per alia & potissimum per uenas &c.

Ad secundum Haly Abbas. 7. suæ practices inquit quod pulsus est præco uerus qui multa refert, Præterea id certius est quod ab operatione sumitur, quam quod ab exeuntibus, sed pulsus sumitur ab operatione igitur certior, Probatur etiam ex uulgari quodam carmine sic dicto. Vrinae fraudes aperit discretio pulsus. Gale. primo de diff. respirationis, ca. 18. plus indicat pulsus quam ipsa respiratio & lib. de const. art. med. cap. 18. hoc idem affirmat &c.

Ad tertium Gale. 4. de difficul. puls. probat de mente antiquorum non solum cor & arterias moueri motu pulsus, sed etiam per se sicuti etiam cerebrum, unde. 8. de usu partiū cap. de usu instrumenti odoratus, probat cerebri interiores uentrículos aerē se dilatando attrahere, & se constringendo expellere &c.

Ad quartum Phylar. de puls. ca. 9. habentur genera pulsuum decem, quorum primum &c. & Gal. 1. de differen. puls. decem etiam enumerat, igitur non pauciora quam decem.

Ad quintum Gale. de usu puls. Inquit neq; n. eo q̄ impletur, idcirco dilatatur, uerum ex eo q̄ dilatatur, impletur contra Erasistratum.

De signis repletionem indicantibus.

Plethora est succorum æqualiter se habentium exuperantia, Differtq; a cacochymia quum hæc uitiosorum humorum repletionem non referat, sicuti cacochymia, Plethora igitur



duplex est quo ad vires. s. altera quo ad capacitatem uasorū, cuius signa sunt uasorum distentio, rubor, totiusq; corporis grauitas & in mouendis membris pigritia, cutis extensio, pulsuum plenitudo, uisus debilitas & somnia quæ grauitatem portendunt, Hæc nisi sanguinis missione curetur, calorem natium strangulat.

#### Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. 13. meth. ca. 6. ubi autem equaliter inter se succi adaui sunt, id & plethos & plethoram Græci uocant, nos succorum plenitudinē siue redundantiam dicimus, ubi uero flaua bile uel nigra uel pituita, uel serosis humoribus refertum corpus fuerit cacochymiam .i. succorum uitium dicimus, & lib. de plenit. ad finem, Plenitudo est copia humorum in uniuerso animalis corpore, & paulo post, Quid intersit inter cacochymiam & plethoram apertiori sermone demonstrat.

Gal. lib. de plenit. inter indicia, uenarum tumorem, ac earū tensionem, ruborem corporisq; grauitatem & in mouendis membris pigritiam, memorat, itidem meth. 9. cap. 5. obstructione distentionem tumorem ruborem, in ea quæ ad uasa refertur repletionem recenset. Auice. secunda primi doct. tertia, cap. 6. Repletio secundum duos modos existit, est. n. repletio secundum foramina, & est repletio secundum uirtutem, repletio secundum foramina est ut sint humores & spiritus in qualitate boni, sed in quantitate sui sint superflui, ita ut foramina impleant & extendant, repletio secundum uirtutem, est ut humores sui quantitate non noceant, sed sui qualitate, de duplici hac plenitudine habes ex Gale. lib. de plenit. & meth. 9. cap. 5. & 10. eiusdem lib. cap. ult.

Hippoc. aphor. 1. aphor. 3. Habitus exercitatorum qui ad summum bonitatis attingunt & c. ibi in commen. Gal. Nimia repletio inquit calorem natium extinguit & c.



Gale. meth. 13. cap. 6. Ergo plethora tum sanguinis missio-  
ne curatur tum frequenti balneo, exercitatione frictione &  
digerentibus medicamentis, uide fufius. 3. & .6. de san. tuend.

Aut. erronei dissentientes circa plenit. indicia.

1. Adserere plenitudinem mensurari posse tantummodo ex  
ipsis uiribus.
2. Adserere plenitudinem tantum esse quo ad uasa non quo  
ad uires.

Confutatio dissentium circa plenit. indicia.

Confutat primum Gale. lib. de plenit. circa principiū dum  
inquit, qui ex ipsis tantum uiribus plenitudinem metiuntur  
hi uidentur nunquam utres præter modum repletos uidisse,  
nec se etiam plusquam par est unquam impleuisse cibo ita ut  
uentriculus inde distenderetur & c.

Ad secundum Gale. loco nuper citato, itaque inquit subieci-  
mus duas esse tum notiones tum relationes multitudinis, al-  
teram ad robur uiresq; illius qui defert alteram ad eius quæ  
suscipit capacitatem & c.

De signorum notitia uniuscuiusque humoris.

Sanguinis superabundantiam indicant, repletio grauitas ca-  
pitis circa oculos oscitatio nausea lassitudo absq; labore, dul-  
cedo in ore, rubor, & sanguinis a quocunq; loco facilis flu-  
xus, indicant & temperies, uictus præcedens ætas consuetu-  
do & insomnia circa res rubeas. Pituitæ indicia albedo, mol-  
lities frigiditas, sputi copia, sitis pauca, somnus multus, otia-  
um pigritia pulsus tarditas & quæcunq; de uictu & ætate &  
consuetudine indicare possunt. Bilis indicia sunt color flauus  
sive citrinus oris amaritudo, sitis copiosa narium ac linguæ  
siccitas pulsus crebritas nausea & uomitus biliosus & quæ-  
cunq; dici possunt de ætate temperie uictus ratione. Atræ bilis  
indicia sūt corporis macies, uigiliæ multæ, crassities ac nigra



do sanguinis, multa sollicitudo corpus nigrum fuscum pilosum in somnia terrorem inducentia in tenebris timor, similiter etas consuetudo ars tempus, & uictus ratio praeiterita de atrabile indicant.

### Loci consentientes ex uera Medicina.

Faciunt ad sanguinis signorum probationem quaecumque dicta sunt ex Galeno lib. de plenit. circa principium, ut uasorum distentio rubor, grauitas uniuersi corporis pigritia ad motum membrorum tentio lassitudo, prior uita in otio, uictus ratio transacta & suppressae euacuationes solitae. Auic. secun. pri. cap. 7. sanguinis significationes cum dominantur, significationibus repletionis secundum foramina uicina existunt &c. Nam de singulis humorum signis ibi diffusae per tractat. Dictum est etiam de his fusius de febribus, & ubi de humoribus pertractauimus, & de morbis a capite usque ad pedes, nam ibi non solum de his sed de obstructionum flatuum abscessuumque signis aperte declarauimus.

### De artis curatoriae diuisione.

Ars curatoria trifariam diuisa est, in διατητικὴν .i. in uictus rationem in φαρμακευτικὴν .i. medicamentorum rationem, & in χειρουργικὴν .i. in eam quae manu medetur. Prima, auxiliorum quae digerendi apponendi & concoquendi facultatem habent, est administratio, confertque non solum sanis, sed etiam omnibus aegris & maxime febricitantibus. Secunda est φαρμακία .i. medicatio dicta, quae nudis medicamentis interiores affectus & exteriores, in corporum cognitione, et remediorum naturam, diuisa, sanat. Tertia est quae incisionibus uisionibus et ossium instauratione homines curat.

### Loci consentientes ex uera Medicina.

Cor. Cels. lib. 1. cap. 1. Medicina in tres partes diducta est, ut una esset quae uictu, altera quae medicamentis tertia quae ma-



nu medetur &c. Auice. quarta primi, Res medicationis ex uno trium rerum completur regimine potione & chirurgia. Gale. primo de uic. in morb. ac. comen. 6. de triplici hac diuisione etiam ipse loquitur. s. de dieta chyrurgia quæ per sectiones adustiones perficitur, & de pharmaceutica quæ per medicamenta perficitur, accusans priscos qui nihil de uictus ratione scripserint. Gal lib. finit. med. Medicina uictus institutrix est quæ in sanis atque egrotis rationi uictus instituendi studet. Gale. de art curat. ad glauc. cap. 1. Ars curatiua qualitate & quantitate singulorum medicaminum perficitur. Et lib. de constitu. artis med hæc ars in duo capita redacta est, in corporum nempe cognitionem atque ipsam remediorum naturam. Gal 4. meth. cap. 1. unum esse morborum genus ipsam quoque continuitatis solutionem diximus, hæc in animalis fere omnibus partibus incidit &c. ubi docet quibus curandum sit intentionibus &c. de hac plura quam de chirurgia dicemus.

#### De uictus diuisione in genere.

Victus ratio sumitur uel a ratione morbi tantum, uel a ratione uirium egrotantis & materiæ morbi simul, uel a ratione temporum anni, etatum, uel a ratione suæ quantitatis uel qualitatis, aut in uniuersali, uel in particulari.

#### De uictus ratione in morbis.

Morbus uel per acutus est, uel acutus uel longus, in per acuto qui in quatuor diebus iudicatur, uti oportet tenuissimo uictu, sicuti melicrato, ratio est quia totus hic morbus status est, Idcirco in statu tenuissimo uictu utendum est, præcipue si uires consentiant, in longo pleniori uictu ut ouis alica piscibus, sed non eodem quo insanis modo utendum, in acuto uero tenui, ut ptisanæ succo, Quare duo in uictu duo extrema dantur, Primum quod sit uictus tenuissimus, Secundum quod



sit craſsiſſimus, mediat uero inter hæc tenuis, ratione igitur status morbi ſemper uictus ratio inſtituenda eſt.

Loci conſentientes ex uera Medicina.

Gal. aphoriſ. 1. commen. 12. Nam morbus uel eſt acutus uel per acutus uel longus & quando maxime & c. Hippoc. aphoriſ. 1. aphoriſ. 4. Victus tenuis atq; exquisitus, in morbis quidem longis ſemper, in acutis uero in quibus nõ conuenit, periculofus. Gal. in commen. nunc dixiſſe ſufficit, ut in omnibus morbis, quibus morbi uigor & iudicatio primis quatuor diebus futura ſit, modo natura ſit fortior, integram inedia ſeruare debemus, in quibus uero non ultra primam ſeptimanã protahantur, forti exiſtente natura ſolo utendum eſt melicrato, ſolus autem hic tenuiſſimus uictus eſſet, non tamen in extremo. & c. & poſt hæc uictum tenuem appellat ptiffanæ hordeaceæ ſuccum, & plenum uictum qualis qui ſit per oua & alicam & piſces. Quod uero morbus per acutus totus ſit ſtatus, Probat ex aphoriſ. 7. primi lib. ubi inquit Hippoc. ubi morbus per acutus eſt, ſtatim extremos habet labores, & extreme tenuiſſimo uictu utendum eſt ex quo aphoriſ. probatur etiam q̃ ratione ſtatus morbi inſtituendo ſit uictus ratio. Si uires cõſentiant notanter dictum eſt, nam Gal. aphoriſ. 1. commen. 9. inquit, Quod ſi in ipſo morbi uigore aliquis caſus interuenerit, naturæ robur diſſoluens, nutrire cogimur. Quod uero in longo morbo, pleniori uictu utendum. Gal. loco nuper citato, cum morbus conſiſtit uictu tenuiſſimo oportet uti, in alijs morbis qui ſuum uigorem ſunt poſterius accepturi non licet afferre ſtatim ab initio tenuiſſimum uictum, nam prius homo morietur quam morbus in uigore conſiſtat, & c. Auic. 4. can. de cib. feb. ſi uideris ægritudinem cronicam, aut propinquam cronicæ non ſubtilies regimen & c. Obiectio. Quum morbus non poſſit cognosci, an ſtatum habere de



beat, in quarta, uel in septima. Quomodo instituendus erit uictus?

Responsio.

Vera præcognitione status morbi non cognoscitur, sed iuxta æstimationem, quæ proxima est ueritati præcognoscitur ex qua tunc uictum ordinamus. Nam Gal. de uirium robore primo aphor. commen. 12. idem refert esse coniecturandum.

De ratione uictus a uiribus & a materiæ morbi.

Uictus uel respicit uires tantum, uel materiam morbi tantum, si solum uires tunc uictus plenus conuenit, si solam morbi materiam tunc nullus cibus conuenit, quia cibare prohibet naturam in morbum agere, Hac ratione duo erunt uictus extrema, quorum alterum solam uirtutem conseruat & auget, & talis uictus erit sanorum, alterum solum uirium robur in materiam excitat & talis uictus erit morbi per acutissimi, in quo pene nihil datur, Medium uero inter hæc extrema duplex erit, uel maiorem uirium partem seruabit & minorem partem in morbum excitabit, & talis erit uictus crassus qui in longis morbis conuenit, aut minorem uirium partem seruans, maiorem in morbum reijcit & talis erit uictus tenuis qui in morbis peracutis instituitur, Aut tantum uirtuti quantum morbo tribuit, & talis uictus est mediocris qui in morbo acuto exhibetur, Si igitur uires sint debiles & humores pauci & corrupti, parum & sæpe cibandum, si uires debiles & humores temperati uel abundantes parum & raro, si uires multæ humores pauci non corrupti, multum sæpe, si uires multæ & corpus plethoricum, paucum raro.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gale. aphor. ismorum primo commen. 12. Totius morbi uictus rationem in unoquoque morbo, a duabus intentionibus iussit assumere, ex futuro totius morbi uigore et ex uiribus agro



tantis &c. Hippocra. aphorif. 1. aphorif. 9. coniectari autem oportet an ager cum uictu sufficiat perdurare, ubi de uictu quo ad uires intelligit Hippocra. Gale. in eodem commen. est autem hæc intetio uis ipsa agrotantis, cuius gratia nutrimus, neq; enim morbi causa: igitur ratione morbi nullus cibus cōuenit. Auic. prima quarti, cap. 8. et scias quod si non eſſet illud quod pertinet uirtuti, eſſet magis neceſſarium, ut subtiliaretur cibus ultima subtiliatione, ſed uirtus nō ſuffert &c. Gal. aphoriſmo. 1. commen. 4. In ſanis corporibus ſemper oportet naturæ robur ſeruare, uel augere alimentis non demoliri, eſt autem augere potens alimentum quod plenum uocatur, conſeruans quod modicum exiſtit, quod uero cominuit tenue, igitur dantur duo uictus extrema, alterum augens uires, alterum in quo nihil datur. Et in eodem commen. Magna uero ex parte properamus in longis quidem morbis fouere uires in acutis uero parū debilitatas conſeruare, igitur ſi fouere uires uolumus uictu craſſo utemur, & ſic partem maiorem uiribus condonabimus & minorem in morbum concitabimus, & ſequitur in textu, in acutis ſi uires ſint parum imbecilles conſeruamus, igitur non minus uiribus quam morbo dabimus. Auic. cap. citato, nam ſi ægritudo fuerit ualde acuta & uirtus non deficiat uſque ad ſtatum, tunc eam incitabis ſuper materiam, & non facias eam occupari in cibo ſpiſſo, imo ſubtilia regimen ſtatim cum dimiſſione cibi omnino, igitur minus dandum eſt uirtutis, & talis uictus erit tenuiſſimus. Gale. aphoriſmo. 1. commen. 17. Nam ſi ſæpius aut raro ſue omnino nutrire oporteat ab ægritudine & uiribus primum maxime accipitur, poſt hæc autem ſingula recitat quæ a me prius enarrata ſunt, ut ſi humores corrupti et uires debiles ſint, parum & ſæpius cibandum &c.

De ratione uictus per ætates.



Aetas puerili minus inter alias ætates inediã sustinet, Deinde qui in ætate consistente sunt, post hos decrepiti, Senes uero qui nondum ad extremam senectutem peruenerunt facillime inediã tollerant. Nam pueri ob id quod crescunt, plurimum innati caloris obtinent idcirco plurimo indigent cibo, senibus uero parum caloris inest quam ob rem paucis egent fomitibus, medio modo se habent qui inter has ætates consistunt.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Hippocra. aphorif. primo, aphorismo. 13. Senes facillime ieiunium ferunt. secundo loco qui ætatem consistentem habent, minus adolescentes, omnium minime pueri præsertim qui inter ipsos sunt uiuidiores, & hoc probans inquit, Qui crescunt plurimum habent calidi innati plurimo igitur agēt alimento alioqui corpus absumitur &c. Auice. quarta pri. cap. de cib. febr. omnis cuius calor innatus fortis est ualde, aut plurimus, aut calor innatus est debilis ualde, non potest dimittere cibum &c. Gale. primo aphorif. commen. 14. Omne id eget alimento, cui plurimum ex corpore defluit, sed humidioribus & plus aeris participantibus plurimum defluit, igitur plurimo egent alimento, quare pueri quum humidiores & aerei sint, plurimum cibum expostulent. Senes uero et iuuenes sicci & terrestres non sic resoluuntur idcirco ieiunium facile ferunt.

De ratione uictus ex temporibus anni sumpta.

Conducunt anni tempora mirum in modum ad uictus rationem instituendam, nam in hyeme plus dare expedit quam in æstate, siquidem hyeme calore innato ad interiora se recipiente cibi facilius concoquuntur, cōtra uero in æstate ad exteriora se protendente non fit tam ualida concoctio, Quare



minus dare conueniet, in æstate igitur sæpe & pauca exhibeantur, in hyeme raro & multa, in uere, raro & pauca, in autumno similiter sumpta a roboris uirium indicatione, si uires ualide sæpe & multa, si uero imbecilles, pauca & sæpius offerimus.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Hippoc. pri. aphorif. aphorif. 15. Ventres hyeme & uere, natura calidissimi sunt, & somni longissimi, Quare per ea tempora, alimenta copiosiora sunt exhibenda. Et enim tunc calor innatus plurimus est, unde & pluribus egeat alimentis indicio sunt ætates & Athletæ. Gal. in commẽ. huius aphorif. Non parum inquit conducunt anni tempora ad uictus rationem inueniendam. Nam hyberno tempore plus appetunt homines, & cibum facilius concoquunt, contra in æstate & c. Hippoc. aphorif. 1. aphorif. 18. Aestate & Autumno cibos difficillime ferunt, hyeme facillime secundum locum uer habet & c. Hippocra. aphorif. 1. aphorif. 17. Et quibus semel & bis, & quibus plura ne cur pauciora particulatim oporteat afferre considerandum, condonandũ est aliquid tempori ætati & consuetudini. Gal. in commen. huius aphorismi, a tempore & ætate & alijs quæ sunt proportionalia uictus accipitur hoc modo æstiuo tempore, quantum ad temporis rationem attinet sæpius & pauca danda sunt. Hyberno tempore ob uirium robur multa sed raro & c.

De uictus ratione a ciborum qualitate sumpta.

Quæcunq; præter naturam sunt, contrarias in uictus ratione indicationes expostulant. Quæ uero secundum naturam sunt, similes. nam morbus calidus & siccus, cibum frigidum & humidum expostulat, calidus & humidus frigidum siccum frigidus & siccus calidum & humidum & sic de reliquis, similiter similia similibus conseruantur seruata tamen quanti-



tate & qualitate eadem inter se.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Hippo. apho. 1. aph. 16. Victus humidus omnibus febricitantibus confert, maxime uero pueris & alijs qui tali uictu uti consueuerunt. Gal. in commen. primum qualis sit adhibendus uictus febricitantibus monstrat, Deinde quod uictuū *υγιαστικόν* indicationem ijs quæ præter naturam sunt contrarias, in ijs uero quæ sunt secundum naturam similes facere oporteat & c.

Gal. 8. meth. cap. 9. Dictum sæpe numero est, id quod secundum naturam est similis semper postulare, quod præter naturam est, contraria, siquidem quod naturaliter se habet, custodire, quod præter naturam est tollere oportet, Porro febris præter naturam est, ideoque uictus rationem frigidam & humidam exigit & c.

De uniuersali ac particulari uictus ratione.

Vniuersalis totius uictus ratio est quæ ad duos medendi scopos ad morbi. s. uigorem & ad ægrotantis uires respicit, sed particularis est quæ morborum accessiones in cibando cauere studet, ita ut nec quando accessiones adsunt, nec futurae sunt, quicquid exhibeatur, cauendo tamen ea interim quæ in eandem ferre non possunt, corpora, nam et in ipso febris principio cibanda sunt.

Loci consentientes ex uera medicina.

Gal. aphor. 1. aphor. 11. Totius uictus rationem a duabus intentionibus ex totius morbi uigore & ex uiribus ægrotantis assumere iussit, Quod autem quispiam particulatim cibum afferat conuenienter, in hoc docet sermone, cauere iubens morborum accessiones. Et commen. 12. Totius uictus figuram ad duas respiciens intentiones faciebat, quarum altera uis ægrotantis, altera constitutio morbi, particulares autem oblationes ex accessionibus coniecturabatur & c.



64 DE CONSEN. MEDIC. LIB. I.

Hippocra. aphorif. 1. aphorif. 11. In acceſſionibus abſtinere oportet, nam cibum dare, nocuum & quibus per circuitus ſunt acceſſiones, in ipſo acceſſione abſtinere oportet.

Avic. quarta primi, cap. de cib. feb. Et de corporibus ſunt corpora cholerica, quæ requirunt regimen diuerſum ab illo quod diximus. Ipſi. n. quum non cibantur in ipſo febris principio, aut in hora ſtatus quæ eſt prauior, tunc non uacua ſunt diſpoſitiones eorum a duabus rebus, nam ſi ſunt debiliū uirium, ſuperuenit ſyncopis, & moriuntur in paroxyſmo, ſi uero fortium uirium cadunt in extenuationē igitur hæc corpora cauenda ſunt, quæ ferre in ediam non poſſunt. Gale. meth. 10. cap. 5. Al quos uero eorum cibabis et quum inuaſura adhuc eſt febris & quum incipit ſunt porro hi ſicco ac calido temperamento &c.

Autores erronei diſſentientes circa rationē uictus.

- 1 Adſerere, plenum uictum in omnibus morbis conuenire.
- 2 Adſerere, tenuem uictum in omnibus morbis eſſe pleno præferendum.
- 3 Adſerere, uictum plenum ut craſſum in diuturnis morbis non eſſe neceſſarium.
- 4 Adſerere, uictum tenuiſſimum in nullis morbis eſſe exhibendum.
- 5 Adſerere, uictus ſcopum, ſummi tantum debere a uiribus non a morbo.
- 6 Adſerere, eſſe incipiendum a tenuiori uictu in principio morbi & procedere ad pleniorē.
- 7 Adſerere, qualitatem & non quantitatem eſſe tantum modo conſiderandam, & e conuerſo.
- 8 Adſerere, in febribus, carnem præfertim delicatis non eſſe præbendam.

Confutatio diſſentientium circa rationem uictus.

Ad



Ad primum, Hippoc. aphor. 1. aphor. 7. Vbi morbus per acutus est, statim extremos, habet labores, & extreme tenuis simo uictu utendum, igitur plenus uictus in omnibus morbis non conuenit, Gal. præterea hoc ipsum attestatur in comen.

Ad secundum Hippo. aphor. 1. aphor. 4. Victus tenuis atq; exquisitus in morbis quidem longis semper, in acutis uero in quibus nõ conuenit periculosus, igitur in omnibus morbis pleno non est præferendum. Præterea Gal. in hoc comẽ. In sanis seruandum robur uel augendum monet, in agris raro augendum, in longis morbis conseruandum, in acutis mediocriter debile seruandum, Quare sicuti in acutis tenues, ita in longis plenus erit præferendus.

Ad tertium Hippoc. aphor. 1. aphor. 7. tantum cibi indulgendum est quanto morbus extremis mollior est, Gale, in comen. præcipit tantum a uictus tenuitate declinare, quantum morbus ab extremis recedit, igitur quanto tardiorẽ fere morbi statum iudicabimus tanto magis crassiori uictu utemur.

Ad quartum Hippoc. aphor. 1. aphor. 6. extremis morbis extrema exquisite remedia optima sunt, ubi Gale. inquit Hippocra. præcipere exquisitissimam curationem & uictum pariter adhiberi tenuissimum, igitur uictus tenuis in his morbis erit exhibendus.

Ad quintum Gal. 1. aphor. comen. 12. Cum igitur tres essent intentiones ad perfectam & indeficientem uictus rationem. Prima quidem sumpta ex uiribus agrotantis. Secunda ex morbi constitutione. Tertia ex particularibus acceßionibus assumi debet, & c. igitur non tantum a uiribus quantum a morbi constitutione, scopus rationis uictus assumi debet.

Ad sextum Gale. aphor. 1. comen. 7. In morbis qui sunt suum uigorem posterius accepturi, non licet ab initio asferre tenuissimum uictum. Nam prius homo euita migraret, quam

E



morbis in suo uigore consistat.

Ad septimum Hippoc. aphor. 1. aphor. 9. Coniectari oportet an ager cum uictu sufficiat perdurare &c. & aphorif. 13. Senes facillime ieiuniunt tollerant &c. & aphorif. 15. Ventus hyeme & uere natura calidissimi &c. In omnibus his locis loquitur de quantitate uictus instituendi, quæ a uirtute ab ætate a tempore sumenda est, igitur quantitas est consideranda. Et particulariter Gale. 1. de art. cur. cap. 9. quantitas cibi tanta sit, ut bene concoqui ualeat, de qualitate iam dictum est superius.

Ad octauum Gal. 1. de art. cur. ad glau. cap. de feb. tertiana concedit ex piscibus saxatiles ex uolatilibus quæ molli carne consistunt, ita & gallorum testiculos & suum pedes & cerebra præsertim delitiosis.

#### De parte Pharmaceutica.

Medicatio bifariam diuisa est in euacuationem & in alterationem euacuatio fit multifariam uel per sectionem uenæ per clysteres per urinas per secessum per sudores per diuersionem & deriuationem per menstrua per hæmorrhoidas per nares per palatum. Alteratio uero erit duplex uel secundum qualitatem uel secundum locum, alteratio secundum qualitatem nihil aliud est quam mutatio eius quæ prius fuit qualitatis, mutatio uero secundum locum non alteratio dicitur, sed potius latio, quæ est prioris loci mutatio, alterationis uero species concoctio existit.

#### Loci consentientes ex uera Medicina.

Indicatio huiusmodi est euacuatio & alteratio inquit Gale. in art. med. cap. 89. Euacuationes uero fiunt & per sanguinis missionem & clysteris usum & per urinae uias atque eam quæ fit percutem transpirationem, ac per eam quæ fit ad partes oppositas attractionem & ad alias propinquas deri-



uationem &c. Gale. primo de naturalibus fac. cap. 1. Nec ea modo quæ in colore & sapore motantur alterari dicimus, sed si quid ex calidiore sit frigidius & e contra, nam commune nomen alteratio est, at genus aliud est in corporibus quæ si tum mutant cui latio nomē est, hi duo motus sunt simplices. scilicet alteratio & latio sed compositi, ex quibus alteratur substantia, sunt diminutio auctio generatio & corruptio &c. Vide etiam de his secundo meth. & primo de loc. aff. Quod uero alterationis species sit concoctio uide Galenum in arte. med. cap. 89. & fusius secundo, & tertio de nat. fac.

Quomodo alteratio concoctio & humorum præparatio ac digestio inter se differant.

Quid sit alteratio iam dictum est, Concoctio uero duplex est, altera quæ penes alimēta perficitur, & est mutatio in propriam eius quod mutatur qualitatem, altera, quæ improprie maturatio dicitur, est quedam in concoquentis substantiam eius, quod concoquitur deductio, unde concocta etiam dicuntur, quæcunq; a natura euicta sunt, cruda uero quæ nondū euicta. Digestio uero est ueluti quædam alimenti distributio. Nam Græci αὐτὸσπύριον .i. cibi distributionem per totum corpus a natiuo calore facti dicunt, interdum sumitur digestio pro discussione excrementorum seu pro segregatione, quæ a facultate expulsoaria & attractoria perficitur, unde a concoctione differt in particula. Differt etiam quia concoctio ad digestionem præire solet, uel quia a diuersis facultatibus utraq; fit. Alteratio autem quum sit humorum in qualitate mutatio quomodo ab his differat, iam notum est. Solum enim in ijs morbis alteratio conuenit, qui non amplius ab aliqua causa fouentur, sed tantum contrarijs remedijs indigent ut hæctica et diaria febris, & hæc perficiuntur absq; concoctione digestionem



68 DE CONSENSV MEDICORVM

et preparatione, quid autem sit preparatio uide de obstructione superius.

Loci consentientes ex uera Medicina.

Gal. 2. de fac. nat. ca. 4. Concoctio est alteratio quædā ac nutritis in propriam qualitatem eius quod nutritur mutatio. Similiter. 1. de nat. fac. cap. 4. et 7. et 8. eiusdem libri asserit. Quod uero concoctio significet maturationem uideri potest aphor. 1. commen. 12. unde Gale. si aliqua fuerit inflammatio cum tanta meatuum angustatione, ut nihil extra effundatur, necesse est illam esse et concoctum difficilem et longo tempore perdurare, ubi terminos concoctionis paulo inferius docet. Nam crudissimus inquit morbus est in quo nihil expuitur, Secundus in quo sanies tenuis est, Tertius in quo crassior, Quartus in quo perfectam habet concoctionem. i. maturationem. Vide tamen etiam Gal. de hac maturatione, Secundo de uictu in morb. ac. commen. 45. fusius loquentem. De digestionem Gale. 6. de sympt. cau. cap. 2. Igitur alimenti per corpus digestio Græci anadosin uocant, inter naturalia opera numeratur quum ex uentriculo in iecur, atq; ex hoc in uniuersum corpus, alimentum digeritur et sic digestio sumitur pro distributione. Gal. 3. pronost. commē. 13. in fine commen. humores tenuiores, ac calidiores ad excretionem parati sunt, crassi uero et crudi ad abscessum uel ad digestionem, porro idipsum ut per concoctionem medeatur, excretio quædam est, quæ ex urina plerumq; raroq; per aluum efficiatur. Quod concoctio præcedat digestionem siue segregationem hoc habes ex primo aphor. commen. 22. siquidem inquit Gale. ante concoctionem non medicari oportet, nam post concoctionem, natura euacuationi adminiculans humores discernit et superfluitates expellit, quare concoctio ad digestionem præcedit præterea Gale. aphor. 4. commen. 22. Quando aliquis morbus inci-



pit si quid excernitur, nihil excernitur tunc natura ratione, quia tunc a causis morbum facientibus grauatur, & cruditas humorum adest, tunc aliquid bene euacuari est impossibile, si quidem oportet concoctionem præire subsequi uero discretionem deinde euacuationem &c. Gale. meth. ii. cap. 9. Quum dictum sit contrariorum contraria esse remedia, Quid uetat omnibus febricitantibus, frigidam uno ordine exhibere, nam ostensum est ipsius febris prout febris est aquam frigidam semper esse remedium, quod uero ad alia spectat, non semper. i. febris prout calor est frigidus indiget. i. alterari ad frigidum, sed ubi alia fuerit causa quam calor, non alteratione, sed & præparatione indigebit &c.

Obiectio.

Quum quis dixerit excrementum crudum uel concoctum de qua concoctione intelliget, præsertim si tale excrementum mutatum, nutrire non ualeat?

Responsio.

De uniuersaliori significato intelliget, nam Gale. 2. de uic. in morb. ac. commẽ. 45. Generali inquit concoctionis significato utimur, quum uel catarrhum uel coryzam, uel fluentes ex his humiditates, uel eas quæ ex oculis manant aut crudas aut coctas esse dicimus, quæ concoctio est, quum natura humores euincit.

Aut. erronei dissentientes circa digest. concoc. & humorum præparationem.

- 1 Adserere digestionem esse humorum alterationem.
- 2 Adserere concoctionem a frigidis fieri.
- 3 Adserere præparationem a digestionem & a concoctione nõ esse alienam.
- 4 Adserere humores calidos ac tenues nõ præparatione prius indigere quam euacuentur.
- 5 Adserere humores crassos cum extenuantibus ac incidentibus esse maturandos & concoquendos.



70 DE CONSENSV MEDICORVM

Confutatio dissentientium circa concoct. & digest.

Gale. lib. finit. med. Digestio est concocti ac confecti & in sanguinem conuersi alimenti in corporis particulas omnes attractio quam natiuus calor molitur, igitur non humorum est alteratio.

Obiectio.

Quum duplex sit digestio, altera alimentorum, altera humorum siue excrementorum, cur exemplum tantum affers de digestionem alimentorum.

Responsio.

Exemplum tantum adduxi de alimentis, quoniam digestio etiam excrementorum est ueluti segregatio, quæ non minus quam prima a calore innato perficitur, nec per alterationem, ut nonnulli putarunt conficitur, sed per ea quæ calorem innatum roborant.

Ad secundū Gale. 3. de ratione uic. in morb. ac. commē. 29. concoctioni perpetuo calidum opitulatur confertq; frigidum uero renititur & aduersatur.

Obiectio.

Ergo biliosi humoris concoctio non fiet a frigidis.

Responsio.

Circa nomen deciperis, nam biliosi humoris non dicitur concoctio, sed potius alteratio quæ nullo pacto uel concoctio uel digestio dicitur, nam flaua bilis nec atra in sanguinis substantiam redire possunt teste Gale. 2. de uictu. in morb. ac. commen. 31. sed in contrarium alterari, nisi forte pro digestionem uel concoctionem intellexeris a natura euinci, quæ euinctio dici potest maturatio siue imperfecta concoctio.

Ad tertium, Quæcunq; fiunt a diuersis causis inter se sunt aliena, sed preparatio concoctio & digestio fiunt a diuersis causis, ergo sunt inter se aliena, quod uero fiant a diuersis causis probatur, nam concoctio & digestio fiunt a natura, Preparatio autem tantum ab arte.

Ad quartum Gale. 1. de sanit. tuend. circa finem, Quod si



uel crassitudinis uel abundantie, uel lentoris excrementorū uitio meatus obstructi sūt tenuatoria uictus ratio his cōpetit.

### Obiectio.

Non possum capere quo pacto in humore tenui præparatio fieri debeat, quum huic humori nec incisio nec alia præparatio competat, sed ratione sui possit euacuari?

### Responsio.

Præparatio quatuor in partes diuisa, est Quarum prima est crassorum humorum præuisio siue extenuatio, Secunda est meatuum obstructorum reseratio, Tertia est quæ humectatibus ac laxantibus, ut puta quiete & alimentis & balneis perficitur de qua loquitur Hippocra. aphor. 4. aphor. 13. ubi iubet ante epotum ueratrum corpus præhumectandum esse cibis balneis & quiete, Quarta est humorum multitudinis obstructantis ac omnia uasa replentis apertio. Quare dicimus si non ratione humoris crassi, uel ratione meatuum obstructorum siue a crassitie siue a copia, saltem ob eam quam nobis monstrauit Hippocra. ut mollius corpus reddamus, præparationem molimur.

Ad quintum, Quæcunq; maturantur coguntur ac incrassantur, teste Gale. 4. de ratione uict. in mor. ac ubi inquit, Necesse est, quæcunque concoquuntur ac euincuntur, cogi ac incrassari, igitur non extenuari nec incidi debent. Præterea Gale. lib. de totius morbi temporibus adserit, urinam, sputum, lippitudines & omnes humores qui a cerebro per palatum et nervos defluunt esse ab initio aqueos tenuasque quum uero temporis processu concoctionem adsumunt, crassiores euadere & pauciores & sic quæcunque maturantur crassiora euadunt, similis sententia habetur ab ipso Hippoc. pronost. 2.

De euacuatione per lectionem uenæ.

Vena sectio, est uniuersalis euacuatio, quæ auctionem hu



morum super æqualitatem uenis exuberantium euacuat, uerū est q̄ plenitudo non semper de sectione uene indicat, nam hæc ipsa ab humoribus crudis fieri potest, qui sectionem uenæ haudquaquam exposcunt. Indicatio sectionis uenæ sumitur a magnitudine morbi, a uirium robore, considerata tamen ætate puerili uel senili, & aere nos ambiente calido uel frigido. Sumiturque indicatio ab ipsa patientis temperie, ab habitu totius corporis, a loco habitationis ab anni temporibus. Fit sectio uenæ, ob duas causas, aut quia sanguis inutilis est & suam qualitatem non seruans nutrire non ualet, aut quia uires præmit aut uenas & arterias distendit findit & obstruit. Tempus incisionis erit, si fieri potest, a principio morbi, si minus, dummodo morbus sectionem requirat, nullus dierum numerus erit considerandus, sed usque ad quatuor dies erit facienda sectio. Quantitas extrahendi sanguinis erit quousq; color mutabitur, aut uirium robur sustinebit, & in uirium imbecillitate aut dimittenda est, aut partiri expediet. Venæ secandæ sunt in capitis passionibus exteriores, a collo infra interiores, a renibus infra quæ per malleolos ac poplites decurrunt.

#### Loci consentientes ex uera Medicina.

Auice. quarta primi, cap. de phlebot. Phlebotomia est euacuatio uniuersalis quæ multitudinem euacuat, multitudo est augmentum humorum super æqualitatem ipsorum in uenis. Gale. de cur. rationem per sang. missionem si infesta sit degrauians plenitudo, haud semper sanguinis mollienda detractio est, cuius rationem paulo inferius reddit. Auic. loco allegato itidem asserit, inquiens & debes scire q̄ quotienscunque fuerit plethora non debes phlebotamare, quoniam repletio quâdoque ex humoribus crudis fieri potest, quod si minueris non maturabis eos & timebitur ne eger perdatur & c.



Gale. de cur. ratione per sang. miss. cap. 20. Scopi in mittendo sanguine sunt morbus ingens roburque uirium excepta etate puerili, & aere nos ambiente ualde calido. Et cap. 13. eiusdem lib. Morbi itaque magnitudo cum uirium robore primi erant mittendi sanguinis scopi. Idemq; asserit meth. 4. cap. 6. & meth. 9. cap. 5. Itidem quarto de ratione uict. in mor. ac. commen. 24. similiter Hippoc. eodem lib. cap. 19. attestatur. Gale. de cur. ratione per sang. miss. cap. 13. Deinde considerandum quæ sit naturalis hominis temperies, nam quibus ample sunt uenæ, quiq; modice graciles sunt nec candidi nec tenera carne præditi copiosius euacuabis &c. & meth. 9. cap. 17. enumerat consuetudinem etatem locum habitationis anni tempus & laborantis uires. De tempore sectionis habetur Galeni textus de opt. secta ad Thrasyb. cap. 37. Plerumque inquit remedia, ut purgationem & sanguinis missionem adhibemus quum morbus quidem non adest, sed futurus timeatur, & paulo inferius, age enim inquit in decremento inunctio cataplasma & cibus adhibetur, & istorum cuiusque est proprium tempus, sed in initio ac morbi incremento sanguis mittitur. Et de cur. ratione per sang. miss. non numero tantum animaduertes, quod quidam faciunt, sed & corporis habitui, nam sunt qui septuaginta annos nati sunt & sectionem perferant. Gale. 9. meth. cap. 11. Sanguis inquit naturæ inutilis fieri potest bifariam uel sui qualitatem non seruans ut amplius nutrire non possit, aut uires premat aut uenas & arterias distendat findat & obstruat. Gale. de cur. ratione per sang. miss. cap. 20. Igitur uniuersim hoc sciendum in sanguinis missione dierum numero haud attendendum & cetera. & paulo inferius, Quocunque die mittendi sanguinis scopos in laborante inueneris, in eo auxilium illud adhibeto etiam si is uel uigesimus ab initio extiterit.



# 74 DE CONSENSV MEDICORVM

Et Auice. quarta primi cap. de phleboto. non attendas quod quidam dicunt q. non est bonum post quartum diem, ut fiat phlebotomia, quoniam bonum est, ut fiat etiam si fuerit post quadraginta dies. Hippocra. 2. de ratione uict. in morb. ac ca. 10. eo usque auferendus est sanguis donec rubidior multo, uel pro puro rubidoq. liuidus fluxerit. Similiter Auice. quarta primi, cap. de phleb. a coloris mutatione & a leuitate & laxitate pulsuum signum ponit, Almanzor lib. 7 cap. de phleb. & Haly Abbas lib. 9. cap. de phleb. dicunt quod non debemus cōsiderare mutationem sanguinis nisi in calidis apostematibus ut in pleuresi, quod uerum est. Nam Gale. lib. de curandi ratione per sang. miss. cap. 14. inquit, In quibus iuxta sectam uenam phlegmone est ingens, optimum est sanguinis & in colore & consistentia mutationem expectare & cat. Et paulo inferius non semper hæc expectanda est, sed antequam mutatio fiat, cessare conuenit tum ob infirmas uires tum ob phlegmones paruitatem. Gal. de curandi ratione per sang. miss. ca. 12. ubi multa euacuatione est opus, & uires sunt imbecilliores, in his euacuationem partiri expedit. Et Auicen. cap. de phleb. cum phlebotomia fuerit necessaria cum debilitate uirtutis, partire phlebotomiam sicuti diximus. Gale loco allegato cap. 16. Igitur interior utilis est in his quibus inferiores collo partes patiuntur. Exterior uero in ijs quibus, quæ his superiores sunt ut facies & caput &c.

Aut. dissentientes circa sectionem uenæ.

- 1 Adserere sectionem uenæ, non nisi mane esse committendam.
- 2 Adserere obstructionem & putredinem esse causam mittendi sanguinem.
- 3 Adserere sectionem uenæ non competere, morbo non assistente.



- 4 Adserere, in die iudicatoria sectionem uenæ fieri debere.
- 5 Adserere sanguinis detractionem uisum hebetare.
- 6 Adserere in plenitudinem sectionem uenæ semper esse perpetrandam.
- 7 Adserere fluente aluo esse mittendum sanguinem.
- 8 Adserere, nullum esse temporum anni discrimen in secanda uena.

Confutatio dissentientium circa sectionem uenæ.

Ad primum Gale. de cura. ratione per sang. miss. cap. 12. Quamobrem nec per noctem sanguinem mittere uerearis, siquidem ridiculum est quod quidam facti tanta secunda diei hora ad quintam aut sextam solum modo sanguinem mittentes, haud alio quouis tempore &c.

Ad secundum Gale. 2. meth. cap. 14. Nec obstructio nec putredo causa est mittendi sanguinem, sed succorum redundantia, nam nec obstructio nec putredo per sanguinis missionem curari possunt, ut quæ alia remedia desiderent.

Ad tertium Gale. de opt. sect. ad Thrasyb. cap. 37. plerunq; inquit remedia ut purgationem et sanguinis missionem adhibemus quum morbus quidem nō adest, sed futurus timeatur.

Ad quartum Auic. quarta primi, cap. de phleb. Neque phlebotomia, neq; uentris solutio fieri debet in die motus aegritudinis, nec quum aegritudo est crissim habitura, sed si possibile fuerit quies est habenda, habes etiam in hoc aphorismum uigesimali pri. lib. ibi quæ iudicantur uel iudicata sunt &c.

Ad quintum Gale. de cur. ratione per sang. miss. ca. 7. sunt quidam imbecillioribus oculis aut scotomacis in quibus sanguis abundare dicitur, hos omnes euacuabis, uel medicamento purgante, si alij a sanguine humores sint, aut diminutione sanguinis & sic sanguinis detractio conuenit, nec hebetat, sed uiuidiores reddit.



Ad sextum Gale. 4. de uict. in morb. ac. commen. 19. Plethoria non semper sanguis missione curanda, sed & frictione balneis multis abstinencia, faciunt etiam quaecunq; recitata sunt superius ex Galeno & Auic. ad hoc probandum.

Ad septimum Hippocra 4. de uict. in morb. ac. cap. 18. si cuiuspiam sanguinem aufere confert, Ventrem confirmare oportet, & ita aufere &c. Et Gale. hoc in loco fluente aluo inquit sanguinem ne detrahes, ne perseverando fluore uirtus prosternatur.

Ad octauum Gal. ad Glau. cap. 14. Qui omnino de temporum statu nihil cogitantes sanguinem abstulerunt medici, hos omnes interierunt, & quarto de uict. in mor. ac. commen. 19. si abunde aer calidus & siccus fuerit tunc a sanguinis missione abstinemus, etiam si morbus magnus fuerit & aetas florens.

### De purgatione per medicamenta soluentia.

Purgatio est humorum qui sua qualitate molestant, euacuatio, ob id; purgans dicitur quia sanguinem ab excrementis purgat. Hec purgatio ab ipso Hippoc. uocatur uasorum inanitio, ab euentu, nam omnia uasa inaniri euenit in omni euacuatione. Intentio euacuationis non solum humorem superabundantem respicit, sed & uires & naturam illius qui debet euacuari. Ad euacuationem quatuor requiruntur, Primum robur uirium, Secundum q; materia non sit crassa nec uiscosa, Tertium q; meatus non sint obstructi, sed aperti, Quartum q; nullum adsit apostema intrinsecum, nec illa sint extensa, nec materia sit in aliqua parte firmata, sed a natura sit euicta. Quantitatem purgantis medicamenti, quae praebere debeat, ignoramus. Verum tantum medicamenti erit propinandum, quantum in plurimis mediocriter euacuari noueris,



non fiat igitur euacuatio nimia quoniam periculosa est. Qualitas uero medicamenti ea sit eligenda prout natura redundantis succi exposcit, nam si flaua bilis uel pituita abundet, quæ flauam bilem uel pituitam educat. Tempus purgandi erit ab initio morbi si humores turgeant, si uero in aliqua parte firmentur uel crudi sint, eo usq; morandum in purgando donec a natura euincantur siue concoquantur, uel eo tempore euacuandum quo superfluitates natura expellere conatur, nam tunc ad id in quo natura deficit, supplere debet medicus. Tempus uero particulare erit ut purgationes in accessionibus morbi fiant per superiora & in remissionibus per inferiora. Si multa simul purgantia pharmaca miscueris fac sint congenera ut simul eodem tempore soluant, Vitandaq; est medicamenti in suauitas et eius uehementia moderanda, quæquæ decem sint quæ in purgatione sunt considerata, ut repletio uirtus complexio accidentia figura ætas tempus dispositio aeris & regionis consuetudo euacuandi & cæt.

#### Loci consentientes ex uera Medicina.

Gale. aphorif. 1. commen. 2. Euacuatio est humorum quæ sua qualitate molestant purgatio. Et in lib. de purg. med. fac. purgans pharmacum ob id dicitur, quia a recrementis purum sanguinem reddat. Gale. aphorif. 1. commen. 3. Intentio quantitatis euacuationis non solum humorem respicit superabundantem, sed & uires hominis qui debet euacuari. Nam alij minus alij magis perferunt euacuationes. Idem etiam asserit aphorif. 4. commen. 2. Gale. aphorif. 1. commen. 24. considerare oportet, nunquid æger idonee se habeat ad purgationem. Nam quicunque multa cruditate laborant, uel qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt, & quibus, *ὑποχολή* extensa atque inflata sunt, aut aliqua uiscerum adest inflammatio, omnes ij non sunt apti ad purgationem.



nem. Et aphorif. 1. commē. 3. in omni euacuatione uires agroti oportet attendere, & donec laborans tollerat humorē exuberantem educere, quum uero dissoluuntur, etiam si remaneant superfluitates cauere oportet eorum euacuationem. Itidē Auice. quarta pri. cap. 5. asserit, Adiungit etiam q̄ fastidium habentibus molestā sint purgationes. Gale. de cur. ratione per sang. miss. cap. 12. Quod laboranti prēbendum sit medicamē, aut bilem tum flauam tum atram, aut pituitam aut serosum excrementum euacuans exacte nouimus. Ceterum quantum prēberi debeat nescimus, similiter in lib. de sect. ad eos qui introducuntur, cap. 5. asserit. Et aphorif. 1. commē. 23. quantitas euacuationis nullum habemus indicium nisi ex tollerantiæ facilitate. Gale. aphorif. 2. commen. 22. Euacuatio nimia morbum parit. Et Hippocra. aphor. 1. aphor. 3. sic & euacuationes quæ ad extremum deducunt periculose. Et Auice. quarta primi, cap. 3. & scito inquit quod residuum materiæ dimittere, quod necesse erat euacuare, est minus nocuum quam exquissite euacuare, ibi etiam omnis euacuatio superflua secundum plurimum febres generat. De qualitate euacuationis Hippoc. aphorif. 1. aphor. 2. si italia purgentur, qualia purgari oportet confert & leuiter ferunt. Gal. in commē. sermo est de eorum qualitate quæ euacuantur, si igitur pituita superabundet, hanc omnino oportet euacuari, flaua autem bile uel atra infestante, demissa pituita, bilem euacuandum & c. Hippoc. aphor. 1. aphor. 22. concocta medicari atq; mouere non cruda, modo non turgeant, plurima uero non turgent. Et Gale. in commē. tales humores euacuare conuenit qui agitantur & de loco ad locum mouentur ac transfluunt, qui uero in aliqua parte firmati sunt, neque alio auxilio mouere oportet neq; medicari ante concoctionem, & paulo post, si natura mediocrius atq; imbecillius agat, id quod deficit oportet supplere, nam natura



expellente & medicamento attrahente humoris noxi euacuatio fiet. Et Auic. quarta primi, cap. 3. In acutis ægritudinibus maturationem expectare melius est quam euacuare præcipue si quietæ fuerint, Quod si moueantur ad euacuandum festina, nam impedimentum eius motus est maius quam suæ euacuationis. Gal. in lib. quos purg. oportet, Purgandi occasio a temporibus morbi sumuntur, ut puta purgationes in accessionibus per superiores partes, in remissionibus per inferiores conueniunt. Gal. in lib. quos purg. oportet. Purgantia medicamenta si simul misceantur congenera esse debent. i. eiusdē naturæ ut eodem tempore soluant. Gal. lib. de comp. med. per genera purgantis medicamenti in suauitas ac eius uehementia moderanda est. Auic. quarta primi, cap. 3. Decem sunt in euacuando considerata & enumerat omnia quæ dicta sunt. Primum est repletio nam nisi repletio supponatur nulla opus esset euacuatione robur uirtutis, nam ubi uirtus deficeret inanis esset euacuatio, cōplexio, nam ubi nimis calida uel frigida foret non competeret euacuatio. Similiter accidentia uehementia prohibent euacuationem, sic figura si sit raræ texture, ne spiritus resoluantur, sic ætas nondum parata, sic hora regio; nimis calida uel frigida, ut septentrionalis & meridionalis, sic ars laboriosa euacuationem non admittunt. Et Gal. lib. de sect. ad eos qui introducuntur, cap. 5. Euacuatio est plenitudini contraria & contraria contrariorum sunt remedia, uerum uires ætatem tempus anni & regionem, & alia ante enumerata prius considerare oportet & c. & de feb. ad glau. cap. 14. ubi fuerint uigiliæ uehementes aut dolor intensus ægro tū infestans, cauendæ sunt subitæ ac malæ euacuationes & c.

Aut. erronei dissentientes circa purgationem.

- 1 Adserere pharmaca non proprios humores attrahere.
- 2 Adserere purgantia medicamēta a nutrimento nō differre.



- 3 Adferere nullo modo purgantia pharmaca in principio morbi esse exhibenda nisi materia turgat.
- 4 Adferere purgantium pharmacorum usum etiam non ualde indigentibus esse proficuum.
- 5 Adferere in die critica nullo modo pharmacum esse præbendum.
- 6 Adferere, pharmacum nulla habita de temporis anni ratione posse exhiberi.
- 7 Adferere ob igneam caliditatem inferium principio esse uerenda pharmaca etiam si materiae copia adsit.
- 8 Adferere pharmaca purgantia æque omnes indifferenter humores purgare.
- 9 Adferere, euacuationem optimam esse, si copia humorum peccantium extracta sit.

Confutatio dissentientium circa purgationem.

Ad primum Gal. de elemen. 2. circa finem, Exeuntia ostendunt quam proprium humorem quodlibet pharmacum attrahat, Quotiescunq; n. quis medicamentum hauserit quod uim habeat bilem euacuandi, uomitu huiusmodi humorem eijci et, & paulo infra, Ex quibus licet manifeste inferre q. unum quodq; medicamentum, cui uis purgatoria inest proprium attrahere humorem, hoc idem etiam asserit primo de fac. nat. cap. 14. & de atrabile cap. 6. & 9.

Ad secundum Gal. 3. de nat. fac. cap. 7. Porro in hoc desidet medicamentum a nutrimento, nam medicamentum uim corporis uincit, nutrimentum uero ab hac uincitur. Et. 3. de temper. cap. 2. At quæ quidem assimulantur omnia nutrimenta uocantur, reliqua omnia medicamenta unde quatuor species medicamentorum enumerat. Prima quæ non mutatur a corpore, sed corpus mutat ac uincit. Secunda quæ initium mutationis habet a corpore deinceps putrescit & putrescendo corpus



pus corrumpit ac putrefacit, & hæc duæ species medicamentorum uenenosorum sunt. Tertia est quæ corpus alterari facit, sed mali nihil infert. Quarta species eorum est quæ agunt & patiuntur aliquid, sed per spatium temporis uincuntur & assimilantur & hæc sunt tam medicamenta quàm nutrimenta & c.

Ad tertium Hippoc. aphor. 2. aphor. 29. Cum morbi incitant si quid uidetur mouendum moue, cum uero consistunt ac uigent melius est quiescere. Vnde Gal. incommē. ut mēlius hoc eueniat melius est circa principium euacuare, quo minorem factam materiam, natura possit facilius concoquere, unde hic de multitudine loquitur Gale. quæ euacuari in principio exposulat, Verum est q. etiam euacuatur in principio si humorum mala qualitas adsit, ut in pestilenti morbo uidetur. Nam Gal. 9. meth. præcipit in corruptela humorum cum uiribus imbecillis paulatim quod uitiosum est euacuare. Similiter quarto de sanit. tuend. sin inquit uires imbecilliores dehortantur sanguis haud mittendus est, sed deiectio mediocris adhibenda. Euacuatur quoq; in principio morbi si locus læsus urgeat, ut pleuritis aut si in aliquo alio principe loco materia decumbat. Nam Hippocra. 2. & 4. de uict. in morb. ac. tex. 76. si dolor sub thorace fuerit, & ualde infestauerit, pleuritico uentrem subpurgabis. Similiter Gale. in commen. si uehemens febris non sit hominisq; naturam noueris ad medicamenti purgantis potum te conferes & c. Euacuatur etiam maxime si uehemens dolor alicubi fuerit. Nam Gal. aphor. 1. commē. 23. In maximis doloribus nullum maius inueni remedium, quàm usq; ad animi defectum euacuare & c.

Ad quartum Gal. aphor. 3. commē. 15. Euacuatio per purgātia pharmaca ualde indigentibus & ex longo interuallo uix utilis est. Nam si quis uti uoluerit bis uel semel in mense, ueri



tus ne superfluitatum multitudo aggregetur, præter id quod nocebit, corpora etiam in malam trahet consuetudinem.

Quāquam Gale. de pharmaco ualde purgatorio intelligat, sed uti solutiuis quæ sunt ueluti syliquæ ægyptiæ Manna Natili indi quos tamarindos uocant, succus rosarum uiolarum, Myroalani Rheubarbarum & similia, non esset tam grande peccatum, Maxime si morbus fieret factus uel faciendus hoc Exposceret.

Ad quintum Hippoc. 4. de uict. in morb. ac. tex. 76. phar= macum exhiberi in quarta iubet, unde inquit si dolor ualde in festauerit, pleuritico uentrem subpurgabis, ueruntamen purgans medicamentum quarta die ministrabis & tribus primis diebus clysteres exhibebis. Et Gale. in commen. non tantum in prima, sed in tertia, & quarta se præbuisse phar= macum ait, uerum id nota quod ipse inquit, si minus dies iudicatorius expectetur quocunq; die hæc tuto præbebuntur &c.

Ad sextum Hippoc. aphor. 4. aphor. 5. sub cane & ante canem difficiles sunt medicationes. Vnde Gale. reddens rationem inquit, nam purgatio praua fiet quum calor aeris ambientis in partem trahat extrinsecam, contrariam ei ad quam medicina ducit humores, ex quibus dictis Galeni collige duos motus contrarios esse in medicina uerendos.

Ad septimum Gale. 9. met. cap. 5. In quo morbo adest humorum abundantia & calor uehemens ibi est inter ipsa sanandi remedia discrimen, ut si abundantiam euacuare uelis febrem augeas, si febrem refrigerare abundantiam moreris & in hac consilij inopia deueniunt qui statim ab initio non euacuarunt &c.

Ad octauum Gale. de atrabile cap. 6. At si uerum esset omnes humores qui in uasis continentur, alteratos quidem a medicamento pro illius facultate æque euacuari, simile utique



fuerit auxilium ab aliquo horum medicamentorum purgari  
& secta uena exinaniri, Cur igitur υδρᾱγωγᾱ, hydericis ex  
hibemus, quum liceat uena secta sanguinem eua cuare, similis  
quoq; sententia habetur eodem in lib. cap. 9.

Ad nonum Hippocra. aphor. 1. aphor. 23. Deiectiones nō  
multitudine sunt exstimandæ, sed si talia deiciantur qualia cō  
ueniunt, & ægri facile tollerant. Vnde Gale. in cōmen. Qua  
re non promptam eorum quæ euacuantur quantitatem opor  
tet attendere, sed duas quæ dictæ sunt significationes si qua  
lia oportet euacuentur, & si facile tollerant.

#### Obiectio.

Antequam pharmacum soluat erit ne dormiendum? Aut  
si solutionem tardauerit, erit ne aliquid ultra exhibendum?

#### Responsio.

Auic. quarta primi, cap. 5. respondet tuæ obiectioni inqui  
ens, si medicina sit fortis super eam dormiat, alioquin natu  
ra medicinam digeret nec illico se mouere debet, sed cum se  
data fuerit anima ambulet & moueatur.

Ad secundam Auic. si solutionem prolongauerit bibat hy  
dromel uel supponatur clystere, cauendo tamen ne duas me  
dicinas uentrem soluentes in una die coniungas quoniam ti  
morosum æst & extra rectitudinem iudicij & cætera.

**De Reuulsione Deriuatione & euacuatione & quæ  
earum præcedat in curatione.**

Tria sunt eductionis genera ac immodicæ uacuationis co  
munia remedia reuulsio scilicet deriuatio ac euacuatio, re  
uulsio quam Græci αὔτις dicunt, est in ijs præsertim,  
quæ adhuc influunt semper in contrariam partem auersio,  
cuius differentie locales sunt octo. prout in capite de cepha  
lea & hemicrania demonstrabimus, at deriuatio siue ἀποχ  
εῖσις est in his præcipue fluxionibus quæ sibi aliquam se



# 34 DE CONSENSV MEDICORVM

dem occuparunt, in partem uicinam deductio, Vacuatio uero quam *κένωσις* dicunt, est humorum qui in aliqua sede, seu in toto corpore molestant, inanitio, in materia igitur fluente primum est molienda reuulsio, in iam fluxa & in certa sede contenta, deriuatio, sed ubi in aliquo membro iam dudum firma est, corpore primum plene expurgato, ipsa uacuatio perpetranda est, reuulsio igitur fiet *κἀτίξιν* ex loco remoto. Deriuatio ex proximo, uacuatio ab ipsa patiente particula, at ubi cum materia fluente, dolor magnus contingerit, tunc primum factitanda est deriuatio, mox stante plenitudine, reuulsio, demum ipsa uacuatio &c.

Loci consentien. de reuulsione deriuat, & uacuatione.

Quod tria sint eductionis genera satis expresse ad sensum patet, Quod autē sint remedia immodice uacuationis comunia, hoc habes ex Gal. 5. meth. cap. 3. ibi Nam hæc quoq; Hippocratis inuenta sunt, omnis scilicet immodice uacuationis comunia remedia &c. Ex hoc loco etiam reuulsionis & deriuationis definitiones eliciuntur, nec non & differentie earum locales, uide etiam in lib. de reuulsione & 4. meth. cap. 6. ubi nos docuit ad contraria reuellere, & deriuare ad latera Aui ce. 4. pri. cap. 3. Et scias inquit q; materiei euacuatio, & ipsius de suo loco eradicatio est secundum unum duorum modorum unus eorum est propter attractionem, quæ fit ad longinquam diuersitatem, & alter propter eam quæ ad propinquā, & docet utriusq; modum si fusius eum legeris, Hoc idem attestatur Gale. 2. ad Glau. cap. 2. ibi, Fluentium igitur adhuc humorum reuulsio, eorum autem qui iam membrum obsederunt deriuatio medella est &c. ibiq; docet quonā modo utraq; molienda sit, Quod autem fluente materia primum molienda sit reuulsio, moxq; deriuatio, satis apte docuit Gale. 4. meth. cap. 6. ibi quare si fluxio ualenter irruat, reuellere ad



contraria studebimus, at si iam fluxio restitit atq; membro inhaesit, deriuare per uicina, magis expedit, ex eo rationem reddens, quod in propinquiora translatio sit, et purganti medicamento promptior tum accessus tum attractus, e, uicino datur &c. Quod reuulsio fieri debeat κατὰ τὸν ἰδὲσθιν idest in rectum, non solum in his omnibus locis testatum relinquit Gale. sed etiam in libro de curandi ratione per sanguinis missionem cap. 15. & 16. ubi inquit sed reuulsio quibus in directum adhibetur, euidentem utilitatem celeriter ostendit, quibus contra, haud etiam &c. Quod autem existente dolore primum incohandum sit, à, deriuatione & non, à, reuulsione testatur Hippo. in 6. epidimiorum. 2. part. dicens deriuationem debere tanquã absolutissimum remedium ad reuulsionem precedere, cuius ratio esse potest, quia dolor attrahendo materiam, fit ualidior, & inflammatio ipsa augetur, quod si deriuatione utaris materiam una cum dolore minues, unde Auice. 4. pri. cap. cit. Cũq; materiam ad longinquum attrahere uolueris, loci dolorem prius sedabis, ac si dicat dolorem loci prius deriuatione minues, antequã reuulsionem moliaris &c.

## Obiectio.

Quomodo post ponere uacuationem reuulsioni ac deriuationi iubes, si Auicenas dicat quod suarum quidem horarum dignior est, quã in corpore nullo modo est alicuius materiei repletio, idest, cum corpus fuerit plene euacuatum?

## Responsio.

Hic locus Auicena ita intelligendus est, ac si diceret, Dura reuulsionem uel deriuationem moliri paramus satius esset, si nec repletio, nec aliqua materia in corpore, idest in membro ad quod fit attractio, incubuerit, quoniam talis repletio forte impediret, ne reuulsionem, uel deriuationem integre, faceremus, adisti pulaturque meae huic opinioni correctio



Andreae bellunensis quam post hac uidere poteris, Quod autem euacuatio materie iam fluxæ & firmatæ postremo sit adhibenda, omnes norunt qui obcessus aliquos uel tumores iam diu curarunt &c.

### De Clysteribus.

Clyster est instrumentum ad euacuanda intestina præcipue crassiora inuētum, crassiora inquā cum certum sit, clysterem non eo usque posse ascendere, ut ad ieiunum intestinum tandem perueniat, Hic ex uaria ac multiplici materia, prout uariis corporis affectus requirit, componi potest, Nam horum aliqui acres, aliqui molles & frigidi parari possunt, quorum usus adeo frequens est apud practicantes medicos ut suis clysteribus quandoq; opus naturæ ex abrupto interrumpant, Faciunt tamen clysteres ad expellenda intestinorum excrementa, ad renum & uesicæ dolores, ad colicam iliacamq; passionem extrahunt etiam quæcunq; a pharmaco exolvente relicta sunt, & ex accidenti intemperiem calidam sanant, uerum requiritur indicatio posituræ ac figuræ loci dum per anum uel supra curare cupimus, itidem & patientis situs, ut supine cruribus demissis potius iaceat, quam aliter quoquo uersus &c.

### Loci consentientes de Clysteribus.

Gale. 5. meth. cap. 5. siquidem instrumentis aliquando utimur pro partis ipsius proprietate, alijs ad uterum, alijs ad uesicam, alijs ad intestina crassa per clysterem &c. Itidem ait cap. 7. eiusdem libri, ubi inquit clysterem ea præcipue desyderant quæ in recto intestino sunt ulcera &c. & sic clyster est instrumentum crassis intestinis dicatum. Quod uero clyster non ascendat ad ieiunum intestinum satis aperte demonstrauit Gale. 13. meth. cap. 17. ibi quandoquidem quæ eduntur ac bibuntur, eorum uis antequā ad inferiores partes perueniat,



resoluitur, quæ uero infusa sunt, ea omnino ad ieiunum usq;  
ascendere non possunt, imo etiam si admodum nitaris, fortas  
se tantum tenue intestinum contingent &c.

## Obiectio.

Quomodo fieri potest, quod Gale. sibi ipsi nõ repugnet?  
siquidem. 6. de sympt. cau. cap. 2. inquit, quippe nonnullis cly  
steres adeo ascenderunt, ut uomitione reijcerentur,

## Responsio.

Si uerba Gal. recte perpenderis facile intelliges nec eum si  
bi ipsi repugnare nec ueram esse, quam captiose facis obie  
ctionem, loquens. n. Gale. de uentriculo inquit, quando secun  
dum naturam se habuerit, tunc, e, supernis partibus attrahit  
atq; per inferiores deijcit, quum uero præter naturam affe  
ctus est, tunc ab infernis partibus aliquid assumit, & per uo  
mitum illud expellit, et exemplum affert de clysteribus etiam  
ab ipso attractis & reiectis, non quod clysteris facultas eo  
ascendat, quo per uomitum possit reijci. sed id facit uentricu  
lus quum male affectus est, Hic tamen aduerte q. quicquid fie  
ri per se non potest, id certo per accidens aliquando efficitur,  
onde clysteri imposito uacuatur quandoq; uentriculus, non  
quod ad ipsum clyster perueniat, sed reiecto inferiori excre  
mento, nec locus detur uacuuus, natura ex se quod super, est,  
deijcit, & sic à uentriculo euacuat &c. Quod autem clyste  
res ex uaria ac multiplici materia componantur, quodq; di  
uersi generis sint, lege Aetium ser. 3. cap. 159. ubi de infusioni  
bus sedis loquitur, ibiq; habet, quod ex infusionibus, quæ inij  
ciuntur, aliæ simplices sunt & teneræ, aliæ acres, aliæ uero  
aliuū usum ac uim habent, hoc totum caput si legeris plura  
ac diuersa enemata intelliges ut puta ad febres ad inflamma  
tionem, dolores, ad uteri morsus & cætera ex diuersis rebus  
composita, Quod uero ex frequenti usu clysteris natura opus



interrumpatur, uide Gale. prim. de diebus decretorijs cap. 2. ubi probat crisim ex eo non posse fieri in septimo die, quod medici cum impositione clysteris tum ex incisione uenarum ex appositione cucurbitularum frictione & ceteris intempestiue patratīs, totiens peccantes quotiens ad agrotantem accedunt, non sinunt iudicium in septimo die ad quod paratū erat fieri, Auic. 4. pri. cap. 19. enema est medicamen nobile in expellendo superfluitates intestinorum in sedando dolores renum & uesicæ et apostemata ipsorum & aegritudines colicæ & c. deinde subdit ex enematribus fit iuuamen in expellendo reliquias, quas inanientia relinquunt & c. Gal. 10. meth. cap. 10. sicut missio sanguis non primum, sed ex accidēti, calidam aliquando intemperiem sanat, ad eundem modum & clyster & purgatio & c. Gal. 4. meth. cap. 7. sicut ne deligare agram particulā possis, nisi prius uel ex figura uel positura uel utrisq; indicationem sumpseris, sic nec immittere in sedem clysteris fistulam comode queas absque eius generis indicatione & c. uide latius. 13. meth. cap. 17. ibi, illud ex positura partium didicimus nempe inferioribus intestinorum aliquid esse per clysterem infundendum, superioribus uero atq; etiam ipsi uentriculo lieni & stomacho superne aliquid exhibendum & c. Auic. loco. cit. Situs clysterizati melior est, ut supinus iaceat, deinde uoluat se ad latus dolens & c.

Aut. dissentientes circa Clysteris dicta.

- 1 Adferere nō multum refere si horam in imponendis clysteribus non serues.
  - 2 Adferere clysteres in uētris suppressione frequētari posse.
  - 3 Adferere, balneū ualde præstare ante clysteris impositionē.
  - 4 Adferere ex clysteri nullā penitus lesionē prouenire posse.
- Confutatio dissentientium circa clysteris dicta.
- Ad primū Auic. 4. pri. cap. 17. & hora clysterizandi me



lior est, cum aeris est frigiditas, & rationem reddit dicens, quod inde fit ne grauitas dolor aestuatio & nausea augeatur, Bac. Gentilis in hoc loco notat clysteres non esse imponendos statim à cibo ne indigesta extrahāt, Nec in hora magni aestus ne fiat magna comotio, sed tempore frigidiori, et ita multum refert si horam non seruaueris &c. de clysteribus loquens Hippocra. 4. de morb. ac. tex. 43. & 44. palam docuit quando & quomodo & quibus congruant, quem si legeris plurima etiam ex Gale. comento adisces. Ad secundum Paul. æg. lib. pri. cap. 44. dixit et si enema abunde proficiat, non tamē continue id faciendum est, ne natura his irritata spontaneæ excretionis obliuiscatur &c. Ad tertium Auic. loc. cit. & secundum plurimum non est bonum ut balneum enemati præmittas &c. Bac. Ratio est, quia duo motus contrarij, si possibile est in patiente debili semper uitandi sunt, sed balneum cum à centro ad circumferentiam trahat, fieri non potest quin clysteri, qui à circumferentia ad centrum humores euocat, aduersetur uide tamen rationes Auicennæ si lubeat. Ad quartum respondet ipse Aetius ser. 3. cap. 159. dicens plures esse clysteres quibus caput & stomachus male afficiuntur enarrans de coctiones quibus hæc fiant, Auic. loc. cit. Quæ uero ex eis sunt acuta debilitant hepar & perducunt ægrum ad febrem, & sic ex clysteribus noxa quandoq; non parua contingit, ut illos nunc sileam qui dolores sūt quā immaniſsimos generant &c.

De cucurbitularum, usu & differentia.

Cucurbitularū aliquæ sunt uitreæ, aliquæ æneæ, aliquæ uero ex cornibus paratæ, utimur quidē uitreis, ut sanguis quem attrahunt, an in mensura satis sit pellucescat, Aeneis uero quia cum maiorem flamam retineant, multo sunt in attrahendo uitreis efficaciores, Corneis, eo, quod non ita inaniunt nec siccant, ac illæ quæ cum maiori flamma adhibentur,



Sunt et nonnullae aliae cucurbitularum differentiae à paruitate magnitudine earum decerptae, quemadmodum et aliquae aliae sunt ore latiores et angustiores aliae uero collo breuiores ac prolixiores quae plus minus ue attrahunt, pro ut effectus rei postea indicat, est igitur cucurbitula instrumentum quod uiolenter attrahit à medicis excogitatum, cuius usus maxime praestat in reuulsionibus ac deriuationibus, nam sanguine ex naribus fluente, si in praecordiis cucurbitula defigantur, sumopere iuuant, dummodo à dextra nare ipso fluente super iocinore, et à sinistra super liene, uel ab utraque super utroque uiscere imponantur, si uero sanguis ab utero defluerit, sub mammis etiam cucurbitula defixae, ab imo sursum reuellunt, ac sanguinem retinet, et fluxiones oculorum in occipite fixae efficaciter remorantur, sub mento etiam applicitae dentibus faciei et gutturi posunt, similiter abscessibus coxarum, podagrae, haemorrhoidibus, elephantiae, et inflationibus uesicae et uteri, modo renibus admoventur, unice succurrunt, et quemadmodum in anteriori parte coxarum positae, testiculorum apostemati crurium ac coxarum exituris conferunt, ita etiam super nates à toto corpore praesertimque à capite extrahunt, intestinis etiam male affectis obsequium praestant, et menstruum curant corruptionem, sunt igitur ad summum haec cucurbitularum utilitates, membrum in primis cui adnectuntur, euacuant, spiritum ne una cum sanguine inaniatur, prohibent, iuuantque, quum nihil ex principali oribus membris euacuari desyderamus, calorem etiam membri excitant, humores à centro ad circumferentiam attrahunt ac euacuant, uacuatio tamen non usque adeo memorabilis est, ac ipsa attractio, siquidem plus satis attrahitur, quam foras eiiciatur spiritum insuper flatuosum in doloribus ita discutiunt, ut incantamenti quid simile uideatur Faciunt etiam ad euocanda menstrua, si in pube et



in inguinē defigantur, & ad alia multa, quæ longum esset recensere, Maioris tamen efficacitæ sunt si cum scarificatione admoueantur, quā non scarificatæ, Nec te prætereat, quod scarificationes, quæ profunde penetrant, sanguinem crassiorem, quæ sumatantum attingunt, tenuiorem euacuant, afferūt & plures secum noxas cucurbitulæ si intempestiue quis uti illis uoluerit, nam in febribus cōtinuis, & ubi præsertim mēs egri turbata sit, uel sensus sit obtusus, præcordijs admotæ, statim ægrum strangulant, uel mortem eadem die inducunt, simili modo si intempestiue capiti applicentur, lethargos ac mentis stuporem pariunt, à quibus si quis forte euaserit, effugere non potest, quin in longum capitis affectum incidat & c.

Loci consentientes de cucurbitulis.

De differentijs tum à materia cucurbitularum tum ab earum paruitate & magnitudine sumptis, satis lucide tractauit Paul. lib. 6. cap. 41. ibi alij cucurbitulis usi sunt uitreis, ut sanguinis qui euacuatur mensura in extractione pellucescat & c. uide illum latius & omnes differentias, quas super adduximus, inuenies, Gal. 4. meth. cap. ult. exponens quid sit cucurbitula, est inquit, instrumentum ad uiolentum attractum à medicis excogitatum, & in lib. 5. eiusdem methodi cap. 3. loquens de deriuatione et reuulsione laudat cucurbitulā sub māmis defixam, si uel mentes confertim eruperint, uel sanguis ab utero quoquomodo profluxerit, eamq; ob causam, cum, e, naribus sanguis defluat, id retinent inquit maxime in præcordijs defixæ cucurbitæ, infigendæ autem sunt, si à dextra nare profluit super iocinere, sin ex sinistra super liene, si ab utraq; nare super utroq; sunt imponendæ uiscere & c. Hipp. aph. 5. apho. 50. Mulieri si uis menstrua cohibere, cucurbitulam quā maximam ad mammas appone Bac. Non intelligit cucurbitulam ad mammas proprie sed ad partes quæ sub mammis,



ubi maximæ uenæ desubter ueniunt, esse apponendam, alioz qui illabentes in cucurbitulam mammae & tumescentes, non sinent eam amplius tolli, hæc met sententia repetitur ab ipso Gale. 13. meth. cap. 19. ibi cucurbita imponi debet auellendi in contrarium causa, sic nanq; ad mamillas cucurbitam imponimus & c. ibiq; habet quod cucurbita in occipite defixa, efficax est remedium ad oculorum fluxiones & c. uide in hoc Auicennam. 4. pri. cap. 21. ibi, uentosa sub mento posita pro sunt dentibus faciei & guturi, & mundant caput & mandibulas, & renibus superposita conferunt apostematibus coarum & earū scabiei & bothor & podagræ & hæmorrhoidibus & c. quibus etiam subiungit quod in uentosis cum scarificatione tria existunt iuuamenta, primum eorum est euacuationis ex ipso membro, secundum est remanentis substantiæ spiritus ne euacuationem humoris qui educitur, sequendo euacuetur, Tertium est quum non curatur, ut ex principalibus membris fiat euacuatio & c. uide in hoc latius Gal. in lib. de reuulsione, Nam satis plures cucurbitularum usus comemorat, quā Auicennas, Aet. ser. 3. ca. 20. cucurbita tum impetu affixionibus uiolenter naturam attrahens, tum multum locum occupans, attrahit quidem memorabilem materiam, non euacuat autem pro ratione attractæ & c. Quod autem spiritum flatuosum cucurbita discutiat, lege Gal. 12. meth. cap. ult. ubi ad flatuosum inquit spiritum cucurbita cum maxima flamma subinde admota facit, uidebiturq; tibi presidium hoc in huiusmodi affectibus incantamenti cuiusdam simile quid efficere, siue hi intestinis siue in quauis corporis particula sunt excitati & c. & 13. meth. cap. 19. siquidem cum menses euocare in animo est in pube & in inguine cucurbitam figimus & c. & sic etiam in deriuatione prodest. itidem habet Paul. lib. 6. cap. 41. ibi leuis cucurbita inflationes discutit destillatio



nes in stomachum suspendit &c. mox subdit. at quæ cū scarificatu adhibetur, efficacius ipsos per halitū digerit. Auic. loc. cit. scarificatio uero est profundanda, ut ex profundo trahatur. Paul. loc. cit. si tenuiorem qui continetur sanguinē acceperimus, summa scarificari, si crassiorē alta debent &c. denoxis cucurbitularū intempestiue admotarū lege Aeti. loc. cit. ibi cucurbita præcordijs intempestiue affixa &c. & plura cucurbitularū incōmoda, si eius uerba recte perpēderis, inuenies &c.

#### Observatio in admouendis cucurbitulis.

Auic. 4. pri. cap. 21. oportet quidē ut à uentosis sibi quilibet caueat post balneū, nisi cuius sanguis fuerit crassus, quoniam ipse se prius balneari debet & una hora morari ante earum applicationem &c.

#### Authores dissentientes circa cucurbitulas.

- 1 Adserere cucurbitulas in omnibus ferē morborum principijs posse admoueri.
- 2 Adserere in corporibus etiā repletis nulla facta uacuatione cucurbitas conuenire. (plicādas.
- 3 Adserere cucurbitulas utiliter puerulis unius anni esse ap=
- 4 Adserere ī cucurbitularū incisione statutū nō esse terminū.
- 5 Adserre post cucurbitularum appositionem non esse deter= minatum cibandi horam.

#### Confutatio dissentium circa cucurbitulas.

Ad primū respondet Gale. 11. meth. cap. 18 ubi inquit, quod nec in cerebri & eius membranarum phlegmonis in morbi initio cucurbitulis utimur, uerum ubi nec influit adhuc quicquā & totū corpus est euacuātū, qđ itidē, sed uniuersalius cōfirmat ipse Paul lib. 6. cap. 4. ibi cucurbitulis neq; p affectuū initia neq; cū corpora sunt pletorica, utemur, & sic in nullo morborū principio regulariter possunt admoueri cōtra illos qui quacunq; leui de causa cucurbitas affigi iubent.



Ad secundum Aet. ser. 3. cap. 20. Neq; in corporibus repletis cucurbitis utimur, sed cum euacuatum fuerit totum & c. Gale. in lib. de reuuls. cucurbitulæ ijs qui ante uacuatī sunt, conueniunt, nam in plethoricis illis haud utimur & c.

## Obiectio.

Si daretur occasio, quod incidere uenam, uel aliter purgare uires non paterentur, esset ne periculosum in ipso febris impetu & ubi maximæ cruditas adsit, cucurbitulas adhibere?

## Responsio.

Huic tuæ obiectiōi satisfacit Celsus lib. 2. cap. 11. dicens hoc auxilium neq; unquā periculosum esse etiam si in medio febris impetu, etiam si in cruditate adhibeatur, ideoq; ubi sanguinem mitti opus est, si incisa uena præceptum periculum sit, aut si in parte corporis etiam uitium est, huc potius confugiendum est, rationem reddens quia ut nullum periculum, ita leuius præsidium esse, uerum nec posse uehementi modo succurrere, nisi æque uehemens fuerit auxilium & c.

## Obiectio.

Videtur Celsus quasi in primis uerbis à Gal. dissentire, si quidem concedit cucurbitulas in repleto corpore, quæ ab Aetio & Gal. sum opere damnantur?

## Responsio.

Tantum abest, quod Celsus à Gal. sententia differat, ut prope modum idem unum uelle uideatur, sed rem adhuc non percipis. Quum dicat cucurbitulas in medio febris impetu posse adhiberi, id ita sane intelligitur, quod si uires non patiantur sectionem uenæ, & imbecilles fuerint, satius esse aliquod adhibere auxilium per cucurbitulas quam nullum, & ubi præsertim in aliqua parte corporis uitium aliquod firmatū fuerit, quod autem idem sentiat cum Gale. lege in eodem capite eum dicentem, quod usus cucurbitulæ precipuus est, ubi non



in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est &c. id est ubi non fuerit totius repletio sed alicuius partis &c.

Ad tertium respondet Auic. 4. pri. cap. 21. quod infans in tertio anno debet ventosari & post, transactis scilicet duobus annis, quoniam non prorsus debet ventosari cum est unus anni &c. Bac. Nota quod hic in additionibus Andreae Belunensis legitur etiam cucurbitulas post sexaginta annos non esse omnino admouendas, sed cum rationem huiusce rei non reddat, suspicor haud illi esse credendum quum Gale. in lib. de curatione per sanguinis missionem cap. 13. etiam septuagenarijs modo vires valeant boniq; habitus sint, uenarum sectione morbo urgente imperat, quod plus satis est, quam cucurbitulas applicare &c.

Ad quartam Paul. loc. cit. respondet dicēs ὁρος δ' ἐ τοῦ σπινθίου τοῦτο δ' ἰατρὲς ἔωλεσσι βαθεύς τὸ πᾶχος μόνον τοῦ δ' ἔργματος id est terminus moderatæ altitudinis diuisionum est sola cutis crassitudo, & sic non multum infra cutem, quæ cutis ipsa sit terminus, fieri debet incisio, si uero pro termino horam incidendi & apponendi intelligant, respondet Aui. cen. loc. cit. quod ex suis horis in die melior est hora secunda & tertia & sic omnino terminus est incidendi statuatur &c.

Ad quintum Auic. loco cit. dixit & oportet quidem ut uentosatus post unam horam cibetur uerum si fuerit cholericus statim post uentosas comedere debet grana mali granati, aut lactucas cum aceto aut bibere aquam endiuie cum saccharo &c.

#### Obiectio.

Cōueniūt ne in frigida & arida dispositione cucurbitulæ.

#### Responsio.

Non conueniunt nisi caloris excitandi gratia, alioqui sicuti sectio uenæ ualde nocua est, ita & cucurbitulæ, hocq; testatum reliquit Gal. 3. de loc. aff. cap. 4. quum dicat, si forte for-



tuna ut nonnunquā euenire solet, frigida aridaq; fuerit dispositio, sanguinis quidem detractio ad extremum ducit periculum, sola uero cucurbitula non alio nomine, quā caloris excitandi gratia utiles esse censentur &c.

#### De hirudinibus.

Hirudines quas Græci βδέλλα nuncupant, non feræ, sed cum pauculo sanguine cicurate, partibus corporis admodum ueri debent, uerum illæ partes, quibus hirudines applicandas censueris, si nitro perfricetur, aut unguibus scalpantur, facilius inherebunt, facit & ad hoc sum opus lutus & sanguis circa locum illitus, Desinesq; eas tātisper pasci, donec dimidiam sanguinis partem, quam desideras, extractam conijeceris, eas uero prohibebis decidere, si quod satis sit, non plene exhausterint, quod si parum depascantur, tunc caudam forfice præcidito, nam sanguine semper affluente non eum exhaustire desinent, quo ad uel salem uel cinerem ori ipsarum inspergas nā iuxta illud Horatii, non missura cutem nisi plena cruoris hirudo at ubi sponte deciderint, statim cucurbitulam ad euellendum si quod remanserit uenenum, applicabis, uel sponsia locum fouebis, quod si sanguis erumpat, nec ullo modo cohiberi possit, tunc lintea ex aceto, aut gallam ustā iniicito, conferūt ualde hirudines cutis impetigini, ac eius pustulis, siquidem non alium sanguinem quam cutaneum, uel quo imbuta est caro, exugunt, eum omnino demittentes qui in profundo residet &c.

#### Loci consentientes de hirudinibus.

Aet. ser. 3. cap. 22. Sanguisugas captas una die seruare oportet, easq; paucio sanguine alere, usus autem tempore pars cui admouende sunt, nitro præparetur, & aqua dulcissima exacte abluatur &c. Itidem ait Auic. 4. pri. cap. 22. ibi, & ipsæ antequā ponantur, quasi per unam diem colligenda sunt, & constri-



constrictione faciendum est, ut euomant, & tunc ipsis parum sanguinis agni projiciatur & c. Gal. in lib. de reuuls. Detrahimus inquit eas, ubi dimidiam partem sanguinis extractam conijcimus prohibemus uero decidere, donec quod satis sit excretum fuerit & c. lege hoc caput totum Gale. & quædāq; à me dicta sunt, quasi ad unguem inuenies, quod itidem habet Auicennas & Aetius locis supra citatis, Auic. tamen eodem in loco habet, quod sanguisugæ conferunt ægritudinibus subcutaneis sicut sahaf & alcuabe & eis similibus & c. Bac. Alcuabe nomen arabicum, idem significat ac si diceret ulcera maligna & ad sanandū difficilia, sahaf uero quid situix adhuc potui ab Arabibus intelligere, nisi forte pro sahaf nō inapte legatur sahafati, qđ exponitur bothor humida quæ emit tit uirus, & ne tibi ignotum per quid ignotius interpretari uidear Bothor idē est, ac si dicatur pustula parua in cute emi nens & c. Quod autem hirudines non alium sanguinem quā cutaneum exugant, hoc attestatus est Gal. in lib. de Reuuls. ubi inquit sciendum est sanguisugas haud eum qui in profundo est, sanguinem extrahere sed tātum quo caro imbuta est exu gere & c.

#### Obiectio.

Quæ nam extractio magis profunda est, sanguisugarum an cucurbitularum.

#### Responsio.

Si Auicennæ textum legeris, hæc tuam soluit obiectionem, dicens & extractio sanguinis à sanguisugis facta profundior est extractione, quæ fit cum uentosis & c.

#### De cauterijs.

Cauterium ex quo fit combustio, quæ a Græcis καὶ ὕλη καὶ ὕλη καὶ ὕλη uocatur, duplex est, alterum quod actu inurit, alterum quod energia, non id tantum per se operando sed ui naturæ opitulante, hoc dicunt potentiale, illud uero actuale, cauterium igitur po tentiale est id, quod ex medicinis urentibus siue causticis in



quarto gradu calidis & siccis componi solet, Ex eoq; dicitur potentiale, quum materia ex qua ipsum constat, à naturali calore alterata, de potentia ad actum deducitur, & fit ex arsenico calce sublimato nitro sapone, tapsia oleo uitrioli & c. cauterium uero actuale illud est in quod ignis calor actu imprimitur, & fit ex auro & ferro, raro ex aere & argento, cuius usus est prohibere ne corruptio de uno in alium locum diffundatur, membra roborare, id quod iam corruptum est, resolvere & sanguinem cohibere, quod itidem non agit potentiale, dummodo tempore debito, congruenti temperaturam & morbo adhibeatur, caueat tamen chirurgus dum inurit ne nervos tendones & ligamenta cauterio tangat, fiatq; potentior inustio sanguine fluente quam in putri carne remouenda, siquidem sanguinis fluor maiorem ac firmiorem requirit crustam, quam aliud, ad quoduis, parata inustio, & supra cranium si qua demum inustio molienda sit, tenuiter te operari consulo, ne membranae uel cerebrum tuo opere maculentur, Fit etiam ustio in purulentis & in iecore ubi in eius tunica pus collectum fuerit, sic in liene & in longis destillatio nibus stomachi & in ceteris pluribus quae nunc recensere nostri instituti non est & c.

#### Loci consentientes de cauterijs.

De duplici cauterio potentiāli & actuāli loquutus est al-bucasis lib. pri. cap. pri. & conciliator diff. 208. quos uidere poteris, nam utriusq; cauterij rationes adducunt, quod autem potentiale componatur ex causticis medicamentis lege Gal. s. de facult. simp. cap. 14. ubi multa habet de causticis medicinis, quas ipse σπινδα vocat, ibiq; enumerat ἀσπεννου idest auripigmentum, sandaracam chrysocollam dryopterim aconitum & c. ex quibus potentiale cauterium componitur Aui-ce. 4. pri. cap. 29. inquit quod cauterizatio est medicamen ual



de utile, iuuans ad prohibendum ne corruptio spargatur, & ad confortandum membrum, cuius complexionem retificare uolumus & ad resoluendum materias corruptas in membro retentas & ad stringendum sanguinis fluxum & c. albucasis loc. cit. & scitote filij q. ex secreto curationis per cauterium cum igne & bonitate eius super cauteriũ cum medicina comburente est, quoniam ignis simplex est cuius actio non peruenit nisi ad membrum quod cauterizatur, & non nocet membro alijs coniuncto cum eo nisi nocumento paruo & c. Et loquens de tempore & complexione, dixit, omittendo calidam & siccam temperiem, conuenire in omni fere complexione & tempore.

### Obiectio.

Si cauterium in omni tempore fieri potest, sicuti albucasis inquit sequetur hoc quasi inconueniens, quod absq. alia purgatione precedente & in diebus canicularibus, quum natura à calore exhausta est, possit admoueri, quod reuera longe à medicorum dogmate alienum est e,

### Responsio.

Duo tempora in unum cōfundis alterum in quo fiunt cauteria, alterum in quo morbus decernitur, primum tempus duplex est electum & necessarium, tempus electum adhuc potest esse uniuersale & particulare, tempus igitur uniuersale & electum est, uer, mox ipse autumnus, particulare sunt dies & hora quibus hoc agitur, dico igitur quod si fieri possit, ut tempus electum expectetur, multo fore satius quam si æstiuo uel urente canicula fiat, uerum si necessitate compulsi, uel ob fluxum sanguinis uirtutem prosternentem uel ob festinum et inopinatum dolorem id facere conemur, non est ut putes cōtra rationis dogma, quod necessitati succurre studet, id factum iri, in secūdo tempore morbi albucasis etiā particulares præ-



supponit et uniuersales iam factas purgationes ita ut alijs nõ  
 iuuantibus cauteria sint tanquã extrema medicinæ subsidia et  
 sic tua obiectio nulla est, Auic. loc. cit. cauterizator cauere de  
 bet ne fortitudo cauterizationis ipsius pueniat ad neruos neq;  
 ad chordas, neq; ad ligamenta &c. Bao. intellige tu si putrefa-  
 ctio fuerit tantum in carne, nam si in osse uel neruis consistat  
 penitus penetrandum est, donec quod computruit, remouea-  
 tur, Gal. 5. meth. cap. 4. maximam autem necessitatem uel cru-  
 stificis medicamentis uel ignitis ferramentis utendi animad-  
 uerti, ubi ex erosione putrescentis alicuius profluum sangui-  
 nis concitatur, quin etiam in talli affectu ubi cotum quod  
 computruit est sublatum, tutius est uel ipsius ueluti radicem  
 adurere uel certe crustificis medicamentis, uti & cæt. Et sic  
 in fluxione sanguinis eo utimur eum non alia nobis crustifi-  
 ca medicamenta suppetant, Quod autem in fluente sangui-  
 nẽ maior crusta fieri debeat, habes Auicennæ textum quum  
 dicat, quod si propter sanguinem qui fluit, quispiam cauteri-  
 zauerit, oportebit ut cauterizatio sit fortis adeo ut crustæ  
 grossitiem habeant et spissitudinem, ne cito cadat, uide in hoc  
 latius Auicennam & plura ex his intelliges quæ à me dudum  
 exarata sunt in cæteris consule Paulum lib. 6. ubi περι καυ-  
 τος ἐμπύου, & de uestione hepatis & lienis agit &c.

#### Aut. dissentientes circa cauteria.

- 1 Adserere satius esse uti potenciali cauterio quã actuali,
- 2 Adserere cauterium ferri esse illi præponendum, quod ex  
auro conficitur,
- 3 Adserere cauterium actuale circa caput ob mollitiem cere-  
bri non esse applicandum,
- 4 Adserere incorruptione remouenda non dari signum quo-  
usq; liceat comburere,



5 Adferere cauterium ex aere conflatum non esse ad ipsam  
ustionem efficax.

### Confutatio dissentientium circa cauteria.

Confutat primum conciliator diff. 208. uarijs rationibus,  
pri. quia actuale cauterium omni ferè complexioni conuenit  
sed frigide tantum & humide potentiale. 2. quia hoc plus, il-  
lud minus lædit, itemq; dolorem plus satis longum efficit po-  
tentiale quàm actuale quum citissime quiescat, facitq; ebullitio-  
nem in spiritibus & humoribus potentiale quod actuale ne-  
quaquã, sed uide tu rationes ipsius, quibus certo concludere  
posthac poteris multo melius ac præstantius fore uti actuali  
cauterio, quàm potentiāli &c.

Ad secundum Auice. 4. pri. cap. 29. Res uero inquit quæ  
cauterium fit, melius est aurū itidem concludit Albucasis loc.  
cit. ibi antiqui dixerunt, quod cauterium cum auro est melius  
&c. ratio est quia plus præstat in temperie hominis aurum  
quàm ferrum idcirco est illi præponendum &c.

Ad tertium respondet Aet. ser. 6. cap. 50. quod ad inuetera-  
tam & egre solubilem cephealeam adhiberi debent cauteria  
nucleo formia ubi magis dolor hæret, & licet inquit usq; ad  
os urere, quo squamæ discedant, hocq; ex Archigene & Gal.  
recitat præterea Auicennas laudat cauterium supra crācum,  
adeo tum tenuiter factum ne cerebrum ebulliat, Demum ra-  
tio ipsa ad hoc suadet, quum maxime cauterium intemperie  
frigida et humida, qualis est cerebri conueniat, & sic capiti  
erit applicandum &c.

Ad quartum inquit Auicennas loc. cita. Cumq; cauteri-  
zaueris propterea ut carnem corruptam projicias, & ter-  
minum sani scire uolueris, erit ubi dolet, idest terminus erit,  
ne amplius comburas, ubi cauterium protinus dolorem,



intulerit, & sic dolor est signum ne ultra limites urendo progrediari &c.

Ad quintum Aristo. in problem. prim. problemate. 35. querens cur si quis ære incisus sit, facilius, quam si ferro, sanescat. Respondet quia æs uim medicamenti obtinet, Nam facit ut uulnus celerius coeat, quod si sic est, uidere nescio quur non tam efficax sit ex ære cauterium quàm ex ferro paratum, præsertim cum non minus ignis impressionem suscipiat at retineat ue ac ipsum aurum & cat.

**Finis Libri Primi.**



## IOANNIS BACCANELLI

MEDICI REGIENSIS,

De consensu Medicorum,

in curandis morbis.

## LIBER SECVNDVS

## De Cephaleæ descriptione.

**C**ephalea est dolor diuturnus difficulterq; solubilis, qui per quosdam circuitus intollerabilem capitis passionem affert.

## Loci consentientes de cephalæ descriptione.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 9. est. n. affectus hic, dolor diuturnus difficulterq; solubilis, qui a parua occasione uehemētes habet accessiones, ut neq; strepitū neque uocem neque luminis splendorem, neque motum tollerare possit infirmus, sed tranquillitatem obscurumq; cubiculum querat &c. Similis sententia est in Gale. 2. de comp. med. per loc. ca. 2. Hanc passionem uocat Auice. prima tertij, cap. 35. Ouum & cauthati siue alchude quod interpretatur galea ut in correctione ex Andrea belunensi uel potius ex suis Auice. commentatoribus apparet. Nā huic illa omnia tribuit, quæ a Galeno de cephalæa recitantur. Aet. ser. 6. cap. 48. ita belle immittari Gale. uidetur, ut nil aliud quam mæra Galeni uerba exprimat, quod identidem sed breuiuscule agit Paulus Aeg. lib. 3. cap. 5. Cornelius Cels. lib. 4. Cap. 2. In capite interdum acutus ac pestifer morbus est, quæ κεφαλαία Græci uocant, Dolorq; est intollerabilis, circa tempora uel occipitium &c.

## De loco affecto.

Cerebrū afficitur aut eius mēbrane quas Græci μὲν γυὰς uocant, interdum dolor intra caluariam se continet, interdū



extra.

Loci consentientes de loco affecto.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 9. quæ cephalea a medicis nominatur nemo dubitat quin cerebri sit morbus. Alex. lib. 1. cap. 17. fit ab inflammatione in caluariae membranæ ac cerebri pelliculis orta. Paulus lib. 3. cap. 5. Quibus intra caluariam morbus consistit, his dolor ad oculorum radices porrigitur, quibus extra est, circa caluariam dolent, idem Gale. 2. de comp. med. per loc. cap. 2. asserit. Auic. prima tertij, cap. 35. fit ab ipso phlegmone in cerebro, aut eius uelaminibus existente &c.

## De causis cephalæ.

Causæ sunt uel per se uel per consensum, si per se, uel erit primitiua a Græcis  $\pi\rho\chi\alpha\tau\alpha\rho\tau\iota\chi\eta$  dicta, uelut est ardor frigiditas ebrietas plaga &c. Antecedens a Græcis  $\pi\rho\rho\gamma\omicron\upsilon\mu\epsilon\upsilon\eta$  dicta erit sextuplex, Prima humorum multitudo, Secunda partium capitis imbecillitas, Tertia obstructio meatuum, Quarta humorum mala qualitas, Quinta intemperies simplex, Sexta sensus exuberantia, uel causa erit coniuncta a Græcis  $\sigma\upsilon\gamma\kappa\alpha\tau\iota\alpha$ . i. concausa cephalæam actu efficiens, & erit triplex mala complexio soluta continuitas uel utraq; simul. Rursum mala complexio uel erit calida uel frig. sic. uel hum. causæ malæ complexionis calidæ sunt sanguis bilis pituita salsa, Causæ malæ complex. frig. sunt humores & uapores frigidi, Causæ malæ complex. siccæ sunt dies caniculares, motus corpori & animales, De causis humidis nulla fit mentio ex eo quod dolorem non pariunt, nisi cum aliqua acrimonia, uel alia mala qualitate coniuncta sint &c. Solutæ continuitatis causæ sunt omnia quæ cōtinuitatē dissoluant &c. Si uero causa sit per consensum tunc uel erit ab aliquo membro mittente sicut a uentriculo uteroue aut ab hepate & reliquis aut a præcedentibus morbis.

## Loci consentientes de causis cephalæ.

Gal. 2. de compos. med. per loc. ca. 1. Causæ producētes sunt



quinq; prima est iuxta intemperiem simplicem citra humorū complexum, alia iuxta humorum qualitatem, alia iuxta multitudinem tantum ipsorū humorum contingit. Quarta quum multitudo hæc trāsitus humorum ac uaporū obturat, Quinta quū in quibusdā capitis partibus ob imbecillitatē spiritus flatuosus innascitur, Sexta quā adiūximus habetur ex Gale. 3. de loc. aff. ca. 9. ibi neq; absurdū est īquit ut quosdā ob sensus exuperatiā dolor infestet, quemadmodū in ore stomachi accidit & c. Auic. similiter prima tertij. ca. 35. huius ægritudinis causam ponit cerebri ībecillitatē & fortitudinē sensus eius & c.

De causa procatarctica loquitur Gale. 2. de cōpos. med. per loc. ca. 1. ibi quandoq; etiā ob causam aliquā externā procatarctice laceffentē, uelut est ardor frigiditas ebrietas plaga capitis dolor contingit. Auic. prima tertij, de uniuers. ser. soda, cause primitiue calefacientes sunt sicut sol ignis uinum potus et crapula & c. De causa coniuncta ibi etiam loquitur Auic. loc. citato dicens qđ causa doloris immediata, aut est mala cōplexio, aut solutio cōtinui, aut utraq; sicut in apostemate & c. De mala cōplexione loquitur Gal. 2. de cōpo. med p loc. ca. 1. ibi uehementissimi dolores fiunt iuxta caliditatē et frigiditatē, moderati iuxta siccitatē, ad humiditatē nullus cōsequitr dolor & c. Gal. aphor. 4. cōm. 70. fiunt. n. dolores capitis et ex calore solo, nōnunquā ex flaua bile q̄ uel in capite uel in uentriculo cōtinetur ut ex abundātia humorū caput opprimente, uel propter aliquā loci obstructionē, uel a spiritu flatuoso habente in parte ipsa generationem. De causa per consensum loquitur Auic. pri. tertij, cap. 35. ibi & multotiens contingit a morbis antecedentibus qui substantiam cerebri et eius uelamina tam intrinseca quam extrinseca debilitarunt fit etiam ex uaporibus stomachi ad caput elatis & c. Alex. lib. 1. de dol. cap. Dolor inquit capitis nō semper primario affectu efficitur, sed p



consensum nonnunquā alterius membri, unde si ad nimium iocinoris calorem dolores capitis oriantur multo uehementiori crutiatu laborantem adfligunt ob fumos eiusdem uisceris caput petentes &c.

### De signis cephalæ.

Primum si dolor fuerit a causa procatartica cognoscitur ex affectu derelicto, Si dolor fuerit per essentiam in capite, dolor continuo ægrum lædet, lesionemq; in aliqua cerebri parte comprehendemus, & cum reliquis cerebri operationibus manifesta lesio apparebit, sicuti in sensu uisus uel alijs sensibus, Quod si dolor capitis per consensum fieri contingerit, tunc per consentiendi membri lesionem magis uel minus intensam, dolor magis ac minus crescet minuetq;e. Cognoscitur etiam a primordio ipsius lesionis, nam quod primum læditur, alteri lesionem infert, At si ab intemperie fiat dolor citra humorum complexum, tunc manifestus calor uel frigus absq; ulla in capite grauitate sentietur, quod si ab intemperie humoralis, tunc uniuscuiusq; humoris aderunt particularia signa, nam sanguinis sunt septem, rubedo, tensio, grauitas, tactus calidus, pulsus magnus, somnus ob uaporum copiam, urina crassa rubea, Bilis signa sunt sex dolor acutus mordicans punctorius in anteriori & dextra capitis parte, uigilia, coloris flauities, parua grauitas, tactus acris calidus, pulsus uelox, & sitis. Pituitæ signa sunt quatuor color albus, dolor obtusus & p̄seuerans in occipite somnus profundus et pigritia. Melancholice signa sunt liuor in facie nigrities, sensus corruptio dolor obtusus p̄seuerans in parte occipitis sinistra. Flatus signa sunt, loci extensio, nulla adest grauitas interdum fit cum sonitu & tinnitu permutatur dolor de loco ad locum, & multiplicato uapore maior fit in capite pulsus, imaginatio interdum corrumpitur & sequitur uertigo. Do-



lorem qui fit a soluta continuitate, ipsa solutio indicat, quæ nisi extrinsecus appareat per puris ac sanguinis excretionē cognoscitur. Si fiat dolor ab aliquo abscessu aderunt signa lethargi uel phrenitidis, si fiat a febre tunc ipsa crescente dolor augebitur, & declinante minuetur.

#### Loci consentientes de signis cephalæ.

Gale. 2. de comp. med. per loc. cap. 2. habet hæc affectio interdum continuos dolores, interdum exacerbationes & interualla siue ordinata siue inordinata, intermittunt exacerbationes ueluti in commitiali morbo correptis. Dolores igitur cum grauitate humorum multitudinem significant, cum mordacitate aut humorum uel uaporum acredinem, cum pulsu inflammationem, cum tensione citra grauitatem ac pulsum tenuis ac uentosi flatus multitudinem demonstrant, si uero cum pulsu membranosi corporis inflammationem, si uero cum grauitate distentio fiat humorum multitudinem intra membranas contentā. Et eodem in lib. cap. 1. Qui ex ardore caput dolent cutis tactui aridior oculosq; rubros habent, frigidisq; tum perfusionibus, tum illinitionibus gaudent, quod si ob biliosum humorem caput doleat, accedit maior mortus et faciei pallor & aliquando oris amaritudo contingere solet. Porro signa dolentium caput ob frigiditatem contraria sunt eis quæ ex ardore oriuntur & c. lege de his Paulū lib. 3. ca. 5.

#### Obiectio.

Ob quam rationem hæc affectio dolores per interualla habet uelut morbus commitialis?

#### Responsio.

Hæc ratione quia hoc contingere potest ex specifica proprietate in humoribus inuenta, nam ex bile extra uasa mota fit dolor tertianarius, & in uenis contenta mota & alterata prouenit dolor continuus & hoc contingit ex specifica bilis proprietate, uel hoc euenit ob quantitatem auctam aut



diminutam humorū, uel pp eorum crassitiē tenuitatē fluxibilitatē & uiscositatē & hoc habetur ex Gal. 2. de diff. feb. de febre sextana & ab Auic. pri. quarti, tra 4. ca. de feb. apostematū & c. Auic. pri. quar. de feb. ephimeris causa primitiua cognoscitur p eius præsentiā & ablationē & ab effectu derelicto & c. Et pri. 3. ca. de signis ostēdentibus species sode habet omnia q̄ ante recitata sunt & c. lege etiam Aet. ser. 6. cap. 48.

De cura cephalæ ob humore calido.

Eliciuntur ex Gal. quinque ad curandum intentiones, Prima est uniuersalis euacuatio quā a multitudine dolor fiat, Secūda est reuulsio, Tertia malæ qualitatis repulsio, Quarta capitis particularis purgatio, Quinta capitis roboratio & si quid derelictū est resolutio & c. Vniuersalis euacuatio fit p sectionē uenæ, primo p sapheanā si in causa sint hemorrhoides uel mēstrua retēta, uel p uenā basilicam uel cōmunē, si adhuc sanguis abūdare uideatur, deinde p cephalicā, postremo p uenas frōtis, aut eius loco applicētur naribus sanguisuga. Reuulsio fit pluribus modis sicut p enemata p extremarū partium frictiones ligaturas, p sanguinis detractionē per cucurbitulas per hirundines ad hemorrhoidas et ad nares applicitas p suppositoria. Nam interdū sub reuulsione etiā derivatio cōuenit quæ ad uicina loca tantū fieri solet, unde per ἑρπύλα. i. p nares euacuantia ut sternutatoria gargarismata masticatoria aurifusoria & similia fiunt. Repulsio malæ qualitatis fit dupliciter p exteriora & p interiora. Exteriora fiunt per repellentia epithemata, inunctiones, cerata, cataplasmata, odoramenta, suffumigia, instillationes, lotiones, et similia ita tamē ut repellentia sint adstringentia & frigefaciencia primū, deinde repulsoria, quibus addendū est aliquid ex mitigatorijs ac cōcōtorijs medicamētis, deinceps ad discussoria paulatim accedēdū detractis omnino repellētibus. Interiora malā qualitatem



remouentia sunt Syrupi, Zulapia siue Iuleb, ecclegmata Apo-  
 zemata siue decocta pulueres &c. Syrupi sunt Acetosus sim-  
 plex Violaceus de Endiuia, Rosaceus de succo acetosæ, de  
 agresta de granatis de limonibus de acetositate citri &c. Zu-  
 lapia uaria sunt, ut uiolacea Nenupharina, fiunt etiam cum  
 ptisana & uino granatorum cydoniorum malorum uel cum  
 Iuleb rosaceo aqua hordei & aqua coriandrorum præparato-  
 rum &c. Electuaria sunt diarhodon abb. Triasandali, Con-  
 serua uiolacea Rosacea cōfectio de prunis mes. Manuschristi  
 diacoralis &c. Decocta fiunt ex rebus frigidis ad caput spectā-  
 tibus ut sunt uiola Nenuphar Rosa salix cucurbita, Mala gra-  
 nata lactuca sandali, Mirtus plantago semperuina portulaca  
 & similia. Capitis purgatio multifariam fieri pōt. sicut p sim-  
 plicia medicamina, uel per composita. Simplicia sunt Rheu-  
 barbarum Aloes Agaricus, succus rosarum Diagridiū Myro-  
 balani citrini Casia siliqua, succus uiolarum, Manna, succus  
 Iridis, Tamarindi, succus fumi terre et similia. Cōposita sunt  
 uaria sicuti electuaria cōfectiones pillulæ Trochisci potiones  
 boli pulueres. Electuaria sunt electuarium de suc. ros. nic. elm  
 ros. mes. Diaprunis sol. nic. Diaphinicon mes. elm de psyllo  
 sol. mes. Casia et māna cum rheubarbaro, cū agarico, cū sca-  
 monio præparato. Cōfectiones sunt cydoniata solutiua, nebu-  
 le solutiue & mille cōfectiones quæ parari possunt, sicuti pas-  
 sula cū diagridio &c. Pillulæ sunt aureæ nic. de hiera simpt.  
 Gal. pillulæ lucis mes. de hiera cōposita nic. De Rheubarba-  
 ro mes. Aggregatiuæ mes aleophangina mes. Trochisci sunt  
 Tro. de diarhodon de Rheub. de camphora addendo aliquid  
 rheub. uel diagridij. Potiones fiunt ex electuarijs ac decoctis  
 superscriptis similiter boli cum electuarijs et sacharo. Pulue-  
 res sunt ex rheubar. Aloe agarico cucumere syluestri & cæ.  
 Capitis roboratio perficitur cum stypticis infrigidantibus



ac constringentibus ut oleo rosaceo myrtino &c. Residui resolutio fiet cum resoluētibus modice calefaciētibus sicut sunt semina Altheæ, fœnugræci, lini, Melliloti camomilla anetho, aut cum oleis camomille Anethi &c. uel cum pulmone agni uel arietis catulorum & pullorum columbarum &c.

Loci consentientes de cura cephalæ.

Auic. prima tertij, tra. 4. ca. 36. Si causa est sanguis phlebotoma & si tu in principio administraſti id quod repellit, deum utere embrocis ex aquis in quibus resoluentia sint modice calefacientia cum repercussione modica & stipticitate ut flos squinanti camomilla &c. De inde euacua cum eis quæ eueniunt & scias quod quum purgaſti superest ut confortes cerebrum & eius uelamina &c. ex quibus uerbis omnes intentiones a me iam dictæ eliciuntur. Præterea Paulus æg. lib. 3. cap. 5. & Aet. ser. 6. cap. 50. & mes. cap. de soda, & Arcul. de cura cephalæ similiter Michael Sauonarola de cura soda cal. Gerardus de solo Gordonius ac ipse Marcus Catinari omnes in has intentiones curandi concurrunt. De reuulsione loquitur Gal. 2. de compos. med. per loc. ca. 2. inquit reuulsio itaq; fit per clysteres per extremitatum ligaturas, & per plures infernarum partium frictions, interdum per sanguinis ex cubito detractioe & ex naribus aperta uena & apophlegmatismis & medicamentis quæ naribus induntur &c. Similiter Hippo. 3. de morbis circa principium si dolor capitis permanet ut sternutet curato, lenibusq; ac odoratis caput & uentrem purgato, ptisanæ succum sorbeto uinum ne potato &c. De repulsione malæ qualitatis loquitur etiam Gale. loco cit. ibi repellit oleum rosaceum omphacinum per se & cum aceto ex capitibus papaueris &c. Et. 2. de compos. med. per loc. cap. 1. Quod si in capite ipsa affectio calida existat in primis repellendum cum refrigerantibus, deinde ex



mittigatorijs ac concoctorijs aliquid admiscere ad repulsoria oportet, deinde discussoria adhibenda ita ut paulatim repulsoria pharmaca detrahantur. De interioribus exhibendis cōsule Neotericos authores. De purgatione capitis tetigit Gale. 2. de compos. med. per loc. cap. 2. ibi dabimus hieram exacutā &c. quomodo uero hiera exacuatur docuit Gale. eodem in lib. cap. de Alopetia dicens se ueratrum nigrum addere si atrabilis sit expurganda aut scamonium, si amarabilis sit euacuanda, unde Græce habetur  $\tau\upsilon\nu\ \iota\epsilon\rho\alpha\chi\acute{o}\xi\epsilon\upsilon\upsilon\alpha\gamma\tau\alpha\varsigma\ \delta\circ\tau\epsilon\omicron\upsilon$ . Et. 2. de compos. med. per loc. cap. 1. euacuandus est biliosus humor per absinthij cremorem aut per Aloen & per ipsam picram antidotum aut modica addita scamonia, aut per catapotia ex Aloe confecta &c. De capitis roboratione, & residui resolutione satis habes ex Auic. Mes. & Almanf. capite de soda calida. Gale. cap. cit. Discutit oleum dulcissimum calidum & magis inueteratum, itemq; sycionium. Nota non dici sycionium  $\alpha\pi\omicron\sigma\upsilon\chi\upsilon\omicron\nu$ . i. a cucumere ut nonnulli putant. sed potius a sycionia patria ubi parabatur, nam Diosco. 1. lib. de oleo sycionio loquens nullam de cucumere mentionem facit, & hoc prius annotauit Cornarius in suis annotationibus. Discutiunt etiam inquit Arcul. pulmo arietis agni, item catuli lactentes ac pulli columbarum &c.

#### Observationes de uenæ sectione.

Auic. prima tertij, de cura sode calide absq; materia, in sectione uenæ primum caue ne uenter sit stypticus ibi tu ad curandas aegritudines capitis lenificatione multum naturæ indiges &c. Similiter Razes, lib. diuis. cap. 3. asserit. Secundo caue ne adeo uehemens sit dolor ut curandi ordinem permutet & hoc uoluit Mes. & Auic. quarta primi cap. 3. ibi quunq; ad diuersum trahere uolueris dolorem illius membri prius sedā. Gal. meth. 12. ca. 1. Qui dolori neglecta curatione tātum est



intentus, non id ex topicis artis ratione, sed in agri gratiam facit, at si ex dolore vires resoluatur atque ex eo periculum impendet & mitigari prius dolor & vires roborari debent, similis sensus est eodem in lib. cap. 7.

### Observationes de repulsione.

Gal. 2. de compos. med. per loc. ca. 1. Aptissimus locus est ad applicanda remedia iuxta capitis sinciput siquidem ob laxitatem coarticulationis iuxta coronalem sutturam & ob osium tenuitatem & raritatem facile tum caliditatem cum frigiditatem omniumque adhibeatur, intro distribuit.

Auic. de uniuers. cur. sod. Alienanda sunt hæc frigida a posteriori cerebro quod est origo neruorum. Gale. loco citato a papaueris succo & mandragoræ est abstinendum, non enim citra damnum refrigerant. Vitandaque quæ cum refrigeratione manifesta adstringunt ut solani succus mali punici cotonei & Mespili & si quando necessitas expostulat parum ex eis admiscere oportet.

Mesues cap. de cur. sod. cal. quum topicis usus fueris fac ne priuentur his tribus uirtutibus, Prima quod in gradu alterationis competant, Secunda quod membri uirtutem coadunent ne superfluitates caput recipiat, Tertia quod sua proprietate caput robovent & c. uersus idem Mesues adhibenda sunt alterantia frigida exceptis in quatuor casibus. Primo quum soda calida fit in febribus materialibus, nã sodam multiplicat usus epithematum uapores exire non permittentium, ut testatur Auic. prima tertij, cap. 11. Secundo quum soda fit propter uapores acutos qui ex totius corporis consensu uel partis ad caput perueniunt etiam caput eos recipit, nam diuersio ad oppositum ex una parte competit & ex alia receptorum resolutio, non autem alteratio. Tertio quum soda fit a multitudine materie & tunc euacuatio sedat. Quarto quum fit



fit a multitudine uaporum existentium in capite per consensum totius uel partis tunc resolutio & particularis euacuatio conuenit & non alteratio.

Gal. 2. de compos. med per loc. cap. 1. notat q. ubi frigidior & crudior fuerit humorum multitudo tepida applicentur ubi calidior & biliosior, frigida Arcul. præsente rheumate fomentationes sternutatoria & gargarismata & lotiones pedum & capitis non sunt omnino nisi post perfectam euacuationem admittenda. Auic. prima tertij, cap. de can. uniuers. cur. Cauendum est in cerebri inflammationibus ne maturantia adhibeamus & c.

#### Observationes de purgatione capitis.

Auic. prima tertij, de euacu. cur. a facilioribus est incohandum similiter Mes. cap. de sod. cal. Auic. prima quarti, cap. de cura putridarum in genere, Ad euacuationem præcedat digestio & Hippoc. aphor. 1. aphor. 22. concocta medicari atq; mouere nō cruda modo nō turgeāt & c. de his uide de purg. sup.

#### De cura cephalæ ex humore frigido.

Curationis scopi erūt quinque, Primus modus regiminis, Secundus materie præparatio, Tertius humoris præparati euacuatio, Quartus diuersio, Quintus cerebri roboratio ac residui resolutio.

Modus regiminis si materia sit pituitosa frigi. s. & humida, erit circa sex res non naturales calefaciens & exiccans. Materie præparatio fiet si pituita fuerit crassa ac uiscosa, p incidentia ac attenuantia capiti cōferentia, ut est Rhodomel oxymel simplex compositum & scilliti cum Sy. de duabus radicibus, Sy. de quinque rad. Sy. de stechade, de betonica, cum decoctis incidentibus ut ex hyssopo origano pulegio salvia maiorana betonica ruta peonia saturegia stechade sileri mōtano ex chamedrio chamepithi castorio cinnamomo ligno Aloes

H



laudano melliloto calamo aromatico uerbena feniculo fo-  
 lijs lauri cum mosco ambra nuce myristica rosmarino, quæ  
 omnia summopere capiti oportuna esse uidentur. Si uero ma-  
 teria fuerit tenuis & fluens calidis stypticis quæ crassiorem  
 materiam reddant utemur, sicuti est mastiche nux mosch. li-  
 gnum aloes &c. Posset etiam fieri materiæ preparatio cum  
 cataplasmate ex rebus prædictis, minus calido & frigido  
 prout expedire uidebitur. Euacuatio fiet ut supra dictum est  
 per simplicia ac composita pharmaca. Simplicia sunt colocyn-  
 this agaricus aloes uebuli sarcacola turbit chartamus esula  
 polypodium hermodactilus scilla radices ireos ciclamē &c.  
 Composita sunt confectioes electuaria pillulæ & pulueres.  
 Confectioes sunt diarob diaturbit & mille aliæ quæ per te  
 cum melle & saccharo poteris componere. Electuaria sunt  
 diaphi nicon mes. el'm indum mes. Diacartami magist. egetea  
 mes el'm elefscoph mes. Diarob cum turbit & rehubarbaro  
 & similia. Pillulæ sunt chochie Almans. pillulæ fetide mes.  
 de serapino mes. de rheub. mes. de sarcacola mes. Hieralogo-  
 dion nic. pillulæ aggregatiuæ mes. sine quibus nic. Pillulæ de  
 hiera magna Gale. de hiera cum agarico magist. pillulæ aleo-  
 phangine mes. pillulæ de agarico & de hermodactilis mes.  
 &c. Pulueres componi posunt ad libitum sicut puluis turbit  
 preparati rheub. Agarici cartami &c. Diuersio & deriu-  
 tio quæ est alteræ euacuatio fit per extremarum partium li-  
 gaturas per, suppositoria enemata cucurbitulas lotiones fri-  
 ctiones, Deriuatio fit per gargarismata sternutatoria & ma-  
 sticatoria caput purgantia. Ligationes fient ualidiores quam  
 in calida cephalæa. Suppositoria parantur exempli gratiarū  
 ex specierum hieræ compositæ. 3. ij, salis gemei. 3. i. cum melle  
 fiant supposita quibus addi potest colocynthis agaricus fel  
 tauri stercus muris euphorbium esula diagridium &c. Ene-



mata parari possunt ex decocto saluæ stachados mercurialis maluæ furfuris lib. prim. cassiæ hieræ logodionis añ. ʒ. ʒ. Rhodomellis olei communis añ. ʒ. iij. salis ʒ. ʒ. Validiora fiunt cum colocynthide agarico centauryo cartamo & c. Cucurbitulæ applicantur cum scarificatione prout tibi uidebitur. Frictiones fiunt manibus oleis mandili aspero uel leni uino albo & decocto asparagorum & herbarum calidarum & c. Gargarismata fiunt cum oxymelle simp & compos. & scillitico cum decocto origani hyssopi, cui addi potest ut sit ualidius synapis piretrum cortices thuris ac piper & c. Sternutatoria cum pipere conditi eleboro albo fiunt. Caput purgia cum nigella per. 24. horas infusa in aceto & exiccata & in puluerem redacta fiunt, aut ex felle taurino aut caprimo cum modico castorei & parte una croci, cum aqua maioranæ fiat collyrium, Masticatoria fiunt simpliciter cum mastice addito pipere uel piretro uel radice capparorum & c. Capitis roboratio fiet cum calidis stypticis residui resolutio fieri potest per linimenta epithemata attractiones sacculos instillationes confectiones & suffumigia & cerata. Linimenta fiunt ex oleo camomillino rutaceo laurino de spica liliorum alborum de cheiri nardino sansucino de amygdalis amaris de croco quibus addi possunt oleum ros. uiol. & similia uel si calidiora desiderantur cum oleo de castorio de euphorbio de piperibus. Epithemata fiunt ex aquis maioranæ uel oleis aut ex decocto stachados foliorum lauri camomillæ rosarum cum oleis ad caput spectantibus. Attractio per nares fiet cum aqua maioranæ muscho addito uel ambra, quauis odorifera in mulieribus sint uitanda ob conuersionem uteri ad superiora, uel cum alijs aquis capitalibus addendo calamum aromaticum & nucem myristicam. Sacculi fiunt ex camomilla maiorana stachade folijs lauri, pulegio origano corticibus cedri cinna



mo spica mace gallia muschata &c. Instillationes fiunt ex laudano storace cal. cum oleo camomillino rutaceo &c. Confectiones fiunt ex diambra diamargaritone diamuscho dul. confectiones de gemis aromatico ros. moschato electuario regii mytridato theriaca diacoro &c. Suffumigia fiunt ex thure sandaraca ligno aloes laudano muscho storace calamita garyophyllis &c. Cerata fiunt ex camomilla maiorana stecha des rotarum ana. p. i. corticum citri garyophyllorum cinnamomi nucis muscha. ana. p. 5. gallie muschate ladauni parū cum oleo de spica & resina pini ad libitum fiat ceratum &c.

Loci consentientes de cura cephalæ ab humore frigido.

Gale. 2. de comp. med. per loc. cap. 1. si uiscosus aut crassus humor aut flatus uaporosus in angustis meatuum infarcitur, ita ut multo tempore opus sit ad curationem tunc quæ sic infarcta sunt, attenuare oportet, meatusq; dilatare per quos excernantur habita prouidentia, ne quid humoris uel flatus amplius infarciatur. Et ad hæc corroborandum est affectum membrum, ex quibus uerbis curandi intentiones elici possunt, consule tamen in ijs omnes neotericos practitantes. De sex rebus non naturalibus loquitur Paulus lib. 3. ca. 4. ibi uinum inquit subtilius propinandum corporis motio adhibenda, item balneum prodest &c. Quod materie preparatio fiat per incidentia ac extenuantia habes in. 9. aphor. 2. libri nam in fine commē. Gal. erit fluidum corpus omnibus referatis meatibus humoribus uero incisis abstersis atq; extenuatis, si quis fuerit humor in corpore crassus ac glutinosus. Quod uero tales syrupe iam enarrati sint ad propositum lege ex Mesue, uel ex Gale. 2. de comp. med. per loc. ca. 1. ubi acetum mulsum in potu aut simplex aut Iulianicum appellatum ex origano hyssopo commendat Auicē. prima tertij, de cura sode frigide & ad



ministrentur subtiliatiua uel maturatiua & euacuatiua de-  
terminata & c.

De diuersione loquitur Auic. loc. cit. ubi eam fieri in prin-  
cipio imperat si humor in eo fuerit communicans, quod ue-  
ro hæc tot modis quot iam diximus fiat expresse habetur ab  
Arcul. Marco Catinario & ab omnibus practicantibus, de  
roborando capite lege Gale. loco nuper citato. Item Auic. pri-  
ma tertij, ubi modos epithematum caput purgiorum oleorū  
ac herbarum docet. Inde enim omnia ex me dicta intelliges.  
Auicen. de cur. soda frigida, omnes qui habent sodam ex fri-  
gore post purgationem, si ea in digent, iuuāt unctiones caput  
purgia suctiones narium odora menta embrocæ & empla ca-  
lefacientia & c. Habes similia ex Gal. 2. de compos. med. ca. 2.  
de cura cephalæ ex Archigene & Asclepiade & plurimis  
alijs ut apophlegmatismos sternutatoria & amuleta quæ ca-  
piti circumponuntur, similiter irrigationes masticatoria pa-  
stillos & c.

#### Observationes de regimine in cephalæa.

Auicen. prima tertij, de uniuers. regimine in soda, Tu scis  
q. soda est exemplum reliquis ægitudinibus in necessitate ab-  
scissionis suæ causæ & oppositione ei cum contrario, et post  
hæc scis q. ex rebus in rememoratione soda iuuantibus est  
paucitas comestionis, & potus proprie uini & multitudo  
somni, uerum nimia paucitas comestionis in soda calida no-  
cumentum affert, augmentum in ipsa faciens, & in uniuers  
fali can. & scias q. qui conqueritur de ægitudine frigida in  
capite nocetur a uino, & qui habet ægitudinem in uelami-  
nibus nocetur ab aqua frigida. Arcul. fercula sint facilis con-  
coctionis & paucarum superfluitatum, item comedantur ali-  
qua styptica post cibum uapores reprimentia, sicut cydonia-  
ta cum speciebus uel pira uel fructus styptici, somnus sit



minor quā in alijs sode speciebus, dormiat leuato capite, loco exercitij fricationes uicem suppleant: animi accidentia uidentur excessiua &c.

#### Observationes de materiæ præparatione.

Marcus Catinarius de cura sode phlegmaticæ ab imbecillioribus inquit incohandum ad ualidiora procedendo, Ratio est quia ualde extenuantia in principio exhibita magis naturam dilatant quam in digerendo adiuuent &c.

#### Observationes de euacuatione.

Mesues de sod. frig. ab humore melancholico. Tria consideranda sunt in euacuatione, Primum q, non semel & multā & subitam faciamus euacuationem, sed per interualla habentem temperiem, ut natura euacuationem, non autem euacuatione naturam regulet, nam ex subita ac uiolenta euacuatione uix natura regulariter operatur, sicut impetus flammæ quæ subito agit in subtile & prætergreditur crassum, Secundum est q, euacuatio sit commensurata non excedens mediocritatem, sed sit extensio eius eleuationis non recedens a gradu medicinarum incolumnium, Tertium est, q, non expolientur solutina a rebus lenificatiuis & humectantibus, nam hæc operationem beatificant. Itidem asserit Auice. prima tertij, de can. uniuers. curat. Adde tamen his tu quartum quoniā quum phlegmagoga indifferenter ab omnibus partibus euacuant, idcirco aliquid quod membrum euacuandum respiciat his semper addere cōuenit, ut uirtus pharmaci ad id tendat quod euacuare intendis, ut si caput capitalia, si pectus pectoralia &c.

#### Observationes de topicis applicandis.

Gale. 2. de compos. med per loc. cap. 1. In inueteratis capitis Affectionibus ac doloribus ualidis ac frigidis necessario capillos radimus aut ualde usq; ad cutem ressecamus. Paulus lib. 3. cap. 4. Topica mutantur singula continue, nam uetustate fiunt



inefficatia. Gale. 2. de compos. med per loc. cap. 2. inquit q, in principio morbi a debilioribus est auspiciandum, quum statim efficacissima adhiberi nō conueniat, ut supra dictum est.

### De Hemicrania.

Ημικρανία siue ἑτεροκρανία est ubi uel in parte sinistra uel dextra dolor capitis accidit qui interdum intensiōē quādoq; remissionem infert, locus doloris interdum extra caluariam percipitur, aliquibus ad capitis usq; profunditatem penetrat, quibusdam uero temporum musculos uehementer infestat &c.

### Loci consentientes de hemicrania.

Gal. 2. de compos. med per loc. cap. 3 Hemicrania est affectio dolorosa circa dimidiam capitis partem aliquando dextram aliquando sinistram, quae iuxta suturem secundum eius longitudinem terminatur & ut plurimum exacerbatur.

Auic. prima tertij, hemicrania est dolor in una medietate capitis excitatus &c.

Razes quem multi sequuntur nullum agit de hemicrania caput, uolens fortasse pharmaca quae inueterato capitis dolori medentur, hemicranicis etiam affectionibus auxiliari, sed non mirum, quum nec Apollonius Archigenes & Asclepiades una cum Critone ut refert Gale. scripserint. De loco affecto loquitur Gale. loc. cit. ibi quidam circa temporum musculos dolitant & pleraq; sane ipsorum pars hoc modo affligitur, quidam uero dolorem longe ulterius progredientem habent & quidam adeo uehementer dolent ut neq; manus contactum facile ferant.

Aet. ser. 6. cap. 49. & aliquibus contingit ut extra caluariam doloris sensum perceptent, quibusdam in capitis profunditatem penetrant &c. Similiter Paulus lib. 3. cap. 5. Quamquam unum idem caput de cephalaea & hemicrania ipse faciat.



## De causa hemicraniae.

Causa est plenitudo uel humorum aut uaporum influxus. Fieri nonnunquam etiam potest hemicrania ab intemperie nuda absq; humorum complexu, sepius tamen sit ex aliarum corporis partium consensu & deniq; ab his omnibus quæ dicta sunt superius de cephalæa.

## Loci consentientes de causis hemicraniae.

Gale. 2. de compos. med. per loc. cap. 3. hemicrania fit ex influxu humorum siue multorum siue calidorum siue frigidiorum causam doloris suggerente. Hoc idē asserit Aet. ser. 6. cap. 49. itidem Paulus. Alex. lib. 1. cap. 18. nonnunquam fieri inquit ex solo temperamento sepius ex consensu aliarum corporis partium & c. negat tamen Auicē. posse fieri hemicraniam a malitia complexionis singularis. i. ab intemperie nuda, sed quum nullam adducat euidentem de hac re rationem, plus tribuendum esse Alex. authoritati assererē in hac re quā Auicē. nē.

## De hemicraniae indicijis.

Quauis uberius de indicijis supra dictum sit quum de Cephalæa uerba fecimus nihilominus ut in summa referā, Grauitas molesta plenitudinem indicat, dolores cum erosione humorum uel uaporum acrimoniam, dolores cum pulsibus inflammationem, dolores uero ad radices oculorum se extendētes, intra caluariam morbum denotant, si uero circa caluariā doleat, dolores extra sunt, de humorum qualitate summi potest indicium, a iuuantibus & nocentibus applicitis & c.

## Loci consentientes de hemicraniae indicijis.

Aet. ser. 6. cap. 48. Dolores cum grauitate humorum multitudinem indicant, cum mordacitate, humorum uel uaporum acredinem, cum pulsu inflammationem & c. & paulo inferius, Dolores quidem in superficie herentes membraneos



caluæ ambientis affectionē significat, quibus uero affectio inter caluariam est, dolores usq; ad radices oculorum procedunt &c. Hoc idem asserit Gal. 2. de compo. med. per loc. cap. 2. & Paulus ægi. lib. 3. cap. 5. Auic. prima tertij, cap. 37. quum fiat hemicrania modo a frigidis modo a calidis, frigidos esse dices si cum calefactione quietem inueneris, calidos si quietē cum infrigidantibus &c. Vide etiam de his latius Gale. 3. de loc. aff. cap. 9.

### De cura hemicranie.

Tres sunt in cura hemicranie intentiones medendi, Prima est euacuatio, Secunda est reuulsio ac deriuatio, Tertia male qualitatis permutatio. Euacuatio fiet uel pharmaco uel uenæ sectione, prout ager magis opus habuerit & de his superius uberrime dictum est in capite cephalæ. Reuulsio ac deriuatio per eadem & perficientur ut supra dictum est, Verū ante accessionis tempus hæc perpetranda sunt, iuuat in hoc fricare partem, quæ circa temporum musculum est, tam diu, ut excalefiat, præsertim si a frigida causa dolor proueniat.

Mala intemperies siue humorum qualitas per sui contrarium permutabitur ut calida cum frigidis frigida cum calefacientibus, utrūq; tamen semper ea addenda sunt quæ adstringentem facultatem habent, eo tamen seruato, q̄ in uehementi caliditate modice refrigeres in frigida multum excalefacias, dolor uero sine humorum complexu per alterantia tantum extrinsecus adhibita, curabitur.

### Loci consentientes de cura hemicranie.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 3. ubi quis hemicraniam curare aggreditur prius quali purgatione, aut uenæ sectione ager opus habeat, consideret, atque ita ad capitis auxilia progrediendo tum per digitos suæ manus tum per linteum



dimidiam frontis partem & eam maxime quæ circa temporum musculum est confricando ex calefaciat, atq; id ante accessionis tempus faciendum est, post exacerbationem uero pharmacis hemicranicis utendum. Quod si multa caliditas in doloribus percipiatur, ijs quæ modice refrigerant, citra uero hanc, ijs quæ multum excalefaciāt, uerum utrisq; ex his quæ firmitatem ac robur addunt, misceantur quæ adstringentem habeant facultatem &c.

Auic. prima tertij, cap. 38. Eius cura est phlebotomia & proprie uenæ frontis & temporis, & solutio, & clysteria et attractio, & totum cum eo quod conuenit ipsi ut dictum est, quum periodus adest oportet ut purgetur corpus ante ipsum, & permutetur complexio post purgationem, quod si materia fuerit calida pones narcotica super tempora &c. & paulo infra ægritudo cuius tempus est prolongatum est frigida secundum dispositionem & indiget resolutionem & quod calefaciat cum fortitudine &c.

Alex. lib. 1. cap. 8. Si hemicrania citra materiam ab intemperie fiat, solis extrinsecis utendum est præsijs. Si uero cum materia cōsiderandum est quis nam humorum adauctus rediit, quod si sanguis modum excesserit, sectione uenæ utendum si alius humor sortito medicamine statim euacuandus est &c.

#### De cura cephalæ & hemicranie per consensum.

Si ab uniuerso corpore caput afficiatur, quatuor erunt curandi intentiones. Prima euacuatio aut purgatio, Secunda reuulsio & malæ qualitatis impræsse repulsio, Tertia erit eius si quid adsit in capite, concoctio, Quarta erit partis affectæ roboratio ac discussio, si uero uni alicui parti condoleat, binæ tantum erunt intentiones, altera, scilicet ad membrum ex quo humores uel uapores mittuntur, altera ad membrum in quo recipiuntur. Euacuatio fiet si multitudo humorum in uenis fuerit



per sectionem uenæ, si uero qualitate tantum humores inualeant, purgante pharmaco utemur &c. Reuulsio fiet in partem contrariam reuelendo, repulsio malæ qualitatis impressæ fiet per sorbitiones aut irrigationes moderate refrigerantes. Coctio eius quod capiti impactum est, fiet per attenuantia & incidentia ut dictum est supra. Roboratio fiet etiâ per eadem et ut supra dictum est, Quod uero attenuatum est, & incisum tunc discutiendum erit. Si uero una pars mandet & altera suscipiat, quod altera non transmittat stypticis refrigerantibus procurandum, & quod caput, ne recipiat, ijs quæ firmitatem ac robur indunt, utendum erit. Quot modis autem aliquid per consensum fiat lege fusius ex Auic. secunda primi, cap. de complendis dispositionibus &c.

Loci consentientes decura cephalæ & hemicranie.

Gale. 2. de compos. med. per loc. cap. 1. Si ab uniuerso corpore caput afficiatur prospiciendum intemperiei & materie prædominanti instando easq; urgendo & si multitudo humorum circa uenas fuerit uenam seccabimus, si qualitas magis inualuerit purgante pharmaco utemur, quod si uni alicui parti cõdoleat existente calida intemperie, panem ex diluto uino dabimus exhibendo etiam sorbitiones ex alica & foris irrigationes moderate refrigerantes & firmitatem addentes ut dictum est &c. Et paulo superius dixerat si aliunde humor uel uapor deriuat influentem imprimis repellere necessarium est, Impactumq; concoquere & attenuare, idq; ipsum discutere, & circa partem affectam firmitatem inducere ut ne quid influens amplius suscipiat. De Reuulsione loquitur Hippocra. aphor. 5. aphor. 68. ibi dolenti partem capitis posteriorem in fronte uena incisa prodest. De Coctione Gale. 2. de compos. med. per loc. cap. 1. ubi inquit, si uero ob crassos & uiscosos humores in stomacho contentos caput doleat, hos extirpabi-



mus acetum mulsum exhibendo aut simplex aut Iulianicum appellatum ex hyssopo & origano potionibus &c. Quod uero membrum ne transmittat iubet Razes bucellas panis in succo granati aut uine acerbæ aut horum similitum exhiberi, Quæ de refrigeridis stypticis opus est in his uti &c.

De his quæ lædunt caput.

Gale. 2. de compos. med. per loc. cap. 1. iuxta finem uiticis semen Absinthij succus, lac in potu, Glandes quercinæ, oliuæ nigre, Eruum hoc enim articulos dissoluit, Offendunt etiam caput Myrrha, Thus, Hederæ cacumina, Perturbât etiam mentem lêtisci fructus, crocus, peucedanum cyclaminus sicca cum uino potata, styrax, Medicus potus tristitiam discutit, Multus autem turbulentos somnos efficit &c.

Diosco. lædunt præter hæc, palma, arbutus, ferula, meu, Mandragora uinum gipsatum &c. Auic. præter hæc damnat lac, Allium, Cepas et omnia acrumina. Et prima tertij, de ser. uniuers. sod. omnia aromata siue calida siue frigida, Item damnat carnem uacinam & reliquas carnes crassas fabas auellanas &c.

De pronost. cephalæ & hemicranie.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 10. caput dolenti & circundolenti pus uel aqua uel sanguis effluens per nares aut os aut aures morbum soluit. B. Intellige si dolor ab inflammatione aut ab humorum multitudine fiat, alioqui si a flatuoso spiritu aut ab intemperie contigerit, non per hos modos sanaretur ut Gale. in commen. Et aphor. 3. aphor. 13. Si æstas sicca fuerit & aquilonia autumnus uero pluuiosus & australis dolores capitis ad hyemem fiunt. Hoc idem etiam adserit Auice. prima tertij, cap. de uniuers. sermone sodæ. Et aphor. 4. aphor. 70. Quibus urine perturbatæ quales sunt iumentorum, ijs dolor capitis uel adest uel aderit Ba. Nota ex Gale.



commen. quod quædam urinæ longo tempore manent perturbatæ, quædam cito sedimen crassum habent & cito morbum finiri denotant, quæ uero non resident, si uires adsint longum fore morbum prænunciant si imbecilles ægri mortem prædicunt. Auic. similiter de his pertractat de signis nunciatiuis so de cap. 8. ibi urina similis asinorum urinis sig. quod soda fuit aut fit aut erit, & similiter rubedo urinæ et subtilitas eius in febribus & hora crisis significant pmutationē ad caput &c.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 51. Quicumq; sani dolore capitis repente capiuntur & statim muti fiunt & stertunt in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit &c. Et. 3. pronost. cap. 7 capitis dolor uehemens & continuus cum febre, siquid ex indicijis extiterit exitiosis, lethalis admodum est &c. Hoc idem etiam habet de coactis prænotionibus & plura multa. Et. 3. pronost. cap. 12. Si quis per febrem non exitiosam dixerit caput dolere, aut etiam tenebricosum quid ob oculos obuersari, si uentriculi dolor in eo extiterit biliosa uomitio aderit &c. et post hæc tres capitis dolorū diff. assignat, ibi si quibus horum capit dolor &c. lege fusius & plura inuenies ad hanc rem utilia. Arcul. Dolor capitis continuus prolongatus frequenter ad cerebri abscessum aut cecitatem ægrum perducit, Item cephalalgia in febribus continuis quæ non inclinante febre remittitur phrenitidem pronunciat Hippoc. 3. de morbis circa principium, quum grauis capitis dolor repente per exordia mutum facit præsertim cum temulentia hic in septem diebus perit. Habes etiam plurima pronostica ex prædictione secunda ipsius Hippocratis quanquam esse Hippocratis librum falso ascribant nonnulli &c.

Authores erronei dissentientes circa  
dolorem capitis.

1. Adserere cepheam a cephalalgia non differre.



- 2 Adserere alterationem esse solam tantummodo causam doloris cum Auerroë.
  - 3 Adserere humidum quatenus humidum nullo modo efficere dolorem.
  - 4 Adserere solutionem continui esse solam tantummodo causam doloris.
  - 5 Adserere q̄ tenues urinæ dolores capitis significant.
  - 6 Adserere sectionem uenæ non in omni capitis dolore conuenire.
  - 7 Adserere reuulsionum modos esse sex tantū & non plures.
- Confutatio dissentientium circa dolorem capitis.

Ad primum Gale. 3. de loc. aff. cap. 9. constat q̄ sicut in cephalalgia, ita et in cephalea caput facillime afficitur, atq; hoc est ipsis commune, uerum per cephaleam affecte partes multo debiliores quam in cephalalgia redduntur igitur intense differunt.

Ad secundum Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 1. dictum est ob dissolutionem continuitatis similariū partium dolorem oboriri, Dissoluunt enim erodentia diffecantia distendentia & uehementer calefacientia & refrigerantia & c. Si igitur dissolutio continui causa est doloris non ergo sola tantummodo alteratio & c.

Ad tertium Gal. in arte med. cap. 80. Alteratur substantia a caliditate frigidityte humiditate siccitate, itidem adserit, secūdo de uic. in morbis ac. com. 1. igitur humiditas alterando efficiet dolorem, quod intelligēdum est si non per se saltem. hoc efficere per accidens.

Ad quartum Auic. prima tertij, de uli ser. sod. Causa doloris aut est mala complexio aut solutio continui aut utraq; sicut in apostemate. itidem ait Gale. 12. meth. cap. 7. necesse est ut affectus qui dolorem extitit uel diuisio sit uel alteratio & c.



itidem in art. med. cap. 80. igitur non sola solutio continui est causa tantummodo doloris sed etiam alteratio.

Ad quintum respondet Gal. aphor. 4. com. 70. esse falsum quod urinae tenues sint κεφαλιγίνα. i. dolorem capitis significantes &c.

Ad sextum Hippoc. aphor. 5. aphor. 68. Dolenti partem capitis posteriorem in fronte recta uena incisa prodest, Qua de re si non ratione euacuationis, ratione tamen auersionis ne aliquis abscessus fiat semper conueniet.

Ad septimum Gal. 5. meth. cap. 3. Reuulsio in his que supra sunt omnibus, deorsum semper agitur, sursum in ijs que sunt infra. Præterea a dextris ad sinistra, sicuti ab ijs rursus ad illa, similiter ex ijs quæ intus sunt ad ea quæ foris habentur & sic sunt sex modi, sed hic Gale. reticet modum de ante & retro, quem aphor. 5. commē. 68. recitauerat & sic sunt octo.

#### De phrenitidis descriptione.

Phrenitis duplex est uera & notha, uera est inflammatio membranarum cerebri cum febre acuta delirium & mentis percussione inducens mendosa quæ paraphrenitis dicitur, est non inflammatio cerebri uera a consensum totius uel aliquius partis dependens, Phrenitidis tres sunt differentie, Altera qua læditur cogitatio & seruatur ratio & memoria, Secunda in qua solum læditur ratio, seruata imaginatione & memoria, Altera in qua læditur memoria, ratione & imaginatione seruata, Quarta etiam addi potest, in qua nihil horum seruatur. Si igitur imaginatio læditur tunc pars sincipitis læsa est, si memoria pars occipitis, si ratio medius uentriculus &c.

#### Loci consentientes de phrenitide & eius diff.

Gal. lib. finit. med. Phrenitis est mentis delirium cum febre acuta ac floccorum collectu & mentis emotione, Paulus lib. 3.



cap. 6. ἡ ΦΡΕΝΙΤΙΣ ΦΛΕΥΜΟΝΗ ΤΩΝ ΜΗΥΓΩΝ ΕΣΤΙΝ. Auice. præ. tertij, tra. 3. ca. 1. charabitus. i. phrenitis est apostema calidum in uelamine cerebri subtili ac crasso absq; corpore cerebri, licet quandoq; cerebro accidat, uocatur etiam, ab ipso sirsen calidum. Quod uero fiat cum acuta febre lege Hippoc. lib. 3. in epidemicis morbis ibi ΦΡΕΝΕΤΙΣΤΕΙΝ Græci dicunt qui cum febre acuta desipiunt, ΜΑΝΕΘΑΙ uero qui citra febrem insaniunt. Hoc idem sentit Gale. 5. de sympt. cau. ubi inquit delirium esse motum principis facultatis deprauatum a prauis succis, siue a cerebri intemperie ortum habens cui si febris accesserit phrenitis uocatur, si citra febrem mania &c. Quod uero tres sint uel quatuor phrenitidis differentie. Inuit Gale. 4. de loc. aff. cap. 2. ubi inquit tres sunt differentie duæ quidem simplices ex quibus tertia componitur. Prima quæcumq; oculis offeruntur, quantum ad sensitiuam notitiam pertinet, recte iudicat, cogitando uero a naturali iudicio aberrat, Secunda recte cogitat, sed a sensibus difformiter mouetur, Tertia quæ simul & sensus & cogitationis uitio laborat. De memoria amissa in hoc causa habes ex Galeno exemplum de quodam qui cum matellam petiuisset, in eiere tamē neglexerit, aut quū lotiū emisisset matellam prodere non meminerit &c. Quod uero quarta species siue differentia addi possit habes ex Auicenna capite de signis charabiti. De his etiam mentionem facit Aet. ser. 6. cap. 2. ibi proinde anteriore cerebri parte læsa imaginatio solum peruertitur &c.

#### De causis phrenitidis.

Causarum aliquæ antecedentes, aliquæ coniunctæ, antecedentes sunt succi calidi ueluti sanguis & utraq; bilis in cerebri membranas penetrantes. Coniunctæ sunt iidemet succi inflammationem ad actum deducentes. Paraphrenitis uero fit a uaporibus calidis & mordacibus, a toto uelut in febre acuta ad



ta ad caput elatis, interdum fit etiam a simplici & nuda alteratione, interdum affecto diaphragmate uel alia quapiam corporis parte. Verum ea quæ a septo transuerso, prouenit, adeo similis ueræ phrenitidi existit, ut quis facile in hoc decipi possit &c.

#### Loci consentientes de causis phrenitidis.

Gal. 5. de sympt. cau. cap. ult. Phrenitis non solum ob calidos succos uel calidiorem cerebri temperaturam accidit, sed quum phlegmonem in cerebro uel in ipsius membranis, ij succi pariunt &c. Paulus lib. 3. cap. 6. Causa morbi est sanguis exuperans uel biliosus humor, interdum flaua bilis adeo perusta ut in nigram degenerauerit quæ etiam grauissimâ phrenitidem contrahit &c. Gale. 5. de loc. aff. cap. 4. Atq; delirare etiam solent nonnulli ob uitium quod in ore uentriculi consistit & febribus ardentibus & pleuritide & peripneumonia, sed quæ ob septi transuersi accidunt deliria non multum distant a phrenitide.

#### De phrenitidis indicijs.

Quum tria sint phrenitidis indicia, Præcedentia. s. demonstratiua ac rememoratiua, de præcedentibus ac demonstratiuis hic tantum mentionem facimus. Signa præcedentia sunt, uigilie prolixæ, somnus turbulentus, bliuius agreslis, dolor capitis promptitudo ad iram & odium, aluius adstringitur, urinae sunt tenues, biliosum humorem ad superiora petentem demonstrantes. Signa demonstratiua sunt sex, ut febris continua conclusa, magna capitis & oculorum grauitas, uehemens in facie & oculis rubor, dolor capitis, horror luminis, & pulsus frequentia cum durtie. Signa inter ueram & spuriam interstinguentia sunt, ut siquid ex dictis sex defecerit, non amplius sit uera, sed spuria, Præterea si ab altera corporis parte uel a toto ut in febribus fieret,



tunc mendosa est, nam febre curata etiam ipsa curatur, Præterea mendosa statim fieri solet, uera autem paulatim accedit. Signa causarum sunt, nam sanguine peccante, oculorum aderit rubor, uenæ sanguine tume factæ, risus, motus morbi uniformis (uniformiter moueri inquam quum nec de tertio in tertium, nec de quarto in quartum accessionem habet) sanguis destillat e naribus, somnus lōgus, imaginationes rubæ. Signa bilis sunt audacia, temeritas, oculorum uultusq; flauities, uigiliæ multæ, linguae ariditas, qui uero tam inaniter se uiunt ut coerceri nequeāt, ijs ab atrabili phrenitis procedit, De signis quæ affectam particulam demonstrant superius dictum est. Signa inflammationis in cerebro aut in eius membranis sumuntur ex dolorum ac oculorum affectionibus, nam maior est dolor quum in membranis inflammatio existit, quam in cerebro &c.

#### Loci consentientes de signis phrenitidis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 4. de omnibus his signis mentionem facit ibi interdum uigiliæ præcedunt, & somnus manifestis imaginibus turbatus ita ut clament, & exilient, interdum adeo agrestis obliuio ut ne meiere sed nec matellam prodere meminerint &c. lege fusius & inuenies multa a me pridem recitata leges etiam in hoc capite differentiam inter ueram & mendosam phrenitidem.

De signis sex demonstratiuis loquitur Razes. 9. almans. ibi quum aliquem febris conclusa continua inuaserit cum forti capitis & oculorum grauedine, & in facie atque in oculis uehemens fuerit rubedo & capitis dolor, & horror luminis fuerit, & in pulsu uelocitas, & frequentie superfluitas, sunt certissima phrenitidis indicia, Quod si lingua fuerit nigra uel citrina & permisceatur intellectus et multum fuerit alieatus & multū uigiliauerit, iam phrenitis perfecta est &c.



Sed Gal. 1. prorrhēt. commen. 4. a principio usque ad finem methodum inueniēdi phrenitidis indicia docet, ubi quæ propria quæ ue inseparabilia esse signa dicantur facile intelliges. De paraphrenitide loquitur Paulus lib. 3. cap. 6. ibi, Quæ consensu stomachi gignitur, non est phrenitis, sed hoc solumputa delirium, facit etiam mentionem de signis causarum, ibi quibus sanguineus humor morbum facit, ij cum risu insaniunt, quibus flaua bilis, ferociter, quibus atra tam imaniter sæuiunt ut coerceri nequeant &c.

De uera ac mendosa phrenitide loquitur etiam Cornel. cels. lib. 3. cap. 18. ibi phrenitis tum demum est quum continua dementia esse incipit, sed perfecta est, ubi mens imaginibus addicta est &c. Itidem Gal. aphor. 7. commē. 14. Desipientia agnoscitur loquentibus agentibus ue nihil consentaneum rationi &c. lege etiam de his Hippocra. 3. de morbis circa principium &c.

#### De cura ipsius phrenitidis.

Considerandum in primis num facta uel fienda sit inflammatio, quod si non facta prohibendum ne fiat, his uidelicet quinq; modis, Primo cum uictu tenui ac alijs sex rebus non naturalibus in contrarium ordinatis, Secundo reuulsione & deriuatione, uel si adsit plethoria euacuatione, Tertio repulsione, Quarto sanguinis & aliorum humorum alteratione, Quinto euacuatione, Regimē sex rerum non naturalium tale sit, primum quiescat in aere puro ac temperato, nec in thalamo sint picturæ, uictus sit in primis tenuis ad frigidū decliuis, abstineat a potu aque frigide præserti si morbus in septo trāsuerso fuerit, sed potus sit aqua hordeacea cum oxymelle. Reuulsio fiet per sectionem uenæ cephalicæ. Deriuatio per hyruidines naribus applicitas, uel per sectionem uenæ in fronte uel per caustica quedam uesicatoria nuncupata. Euacuatio



nimia existente plethoria fiet incipiendo a saphenis deinde a communi & a basilica. Repulsio fiet per epithemata instillationes & cetera topica prout supra relatum est in cura cephalæ calidæ. Epithemata fient cum oxyrhodino, Quod uacuo modo parari solet, Nam aliqui aquæ rosacæ ad alia ingredientia portionem duplam immittunt sicut R<sup>x</sup> aquæ ros. 3. viij. olei. ros. & aceti ana. 3. ij. Alij uero uolunt ut ex his tribus aliud sit subduplum ad reliquum ut uerbi gratia R<sup>x</sup> aquæ ros. 3. viij. olei ros. 3. iij. aceti. 3. ij. Alex. uero quintā aceti partem oleo ros. adiungit. Alteratio sanguinis uel bilis fiet per infrigidantia styptica et hæc perficitur per cibum aut potum per iuleb aut Sy. uocatos aut confectiones, Cibi sint frigidi styptici, Potus sit uinum granatorum malorum uel cydonia= tus succus omphacium, limones & arantia mala. Iuleb sit rosaceum uel cum aliquibus Sys. concinnatum miscendo una aquas uel decocta plantaginis solatri portulacæ cicorij, uel sic paretur, Accipe sy. de acet. citri. 3. iij. Sy. de papauere. 3. ij. aquæ ros. florum nenupharis cicorij ana. 3. v. uini granatoru. 3. i. uini cotoneorum malorum. 3. 5. fiat iuleb cum sandalis rubeis aromatizatum. Syrupi sunt sy. de ribes de limonibus de succo acetosæ sy. rosaceus uiolaceus de papauere de citro de agresta oxysachara sy. de granatis. Confectiones sunt conserua ros. uiol. boraginacea, diacoralis diarhodon abb. & c. Eua= tuatio fiet si morbus sit sanguineus per sectionem uenæ ut supra retulimus si uero biliosus per pharmacum cholagogum, quod fiet per electuaria uel pillulas uel potus prout opus fuerit, de quibus supra in capite cephalæ fusius pertractauimus, Peculiaris tamen est aqua fructuum mes. distin. 7. Antidotarij & infusio rheubarbari & c.

At si inflammatio facta sit tunc duo erunt medendi scopi, alter ab materie fluxu resolutionem, alter ad tollenda sym=



ptomata. Resolutio materiae ita fiet, primo euacuando materiam exuperantem cum rhebarbaro Myrobalanis uel pillulis iam dictis, Secundo resoluendo cum topicis temperatae caliditatis sicut cum columbis, pulmone arietis & catulis scissis ac euisceratis cum natua eorum caliditate, aut aduentitia praesertim parata cum rebus anodinis modice calidis ueluti sunt uiolae maluae melliloti folijs lauri corticibus papaueris camomilla anetho folijs senae & stechade &c. Remotio symptomatum fiet si uigiliae adsint cum somnum prouocantibus ueluti cum sy. de papauere cum lotionibus extrinsecis soporiferis, ut cum corticibus capitum papaueris albi, cichyosiamo floribus nenupharis uiolis anetho, & cum folijs uitium salicis lactucae mandragorae rosam populi &c. uel cum seminibus papaueris albi, aut semiscrupulo pillularum de cynaglossa &c. Quod si retineatur urina, eam prouocabimus cum oleo scorpionum inungendo circa uesicae regionem uel cum cataplasmate ex paritaria &c.

Loci consentientes de cura & primo  
de regimine.

Auice. prima tertij, cap. de charabito loquens de regimine sex rerum naturalium inquit & fac eum quiescere in domo temporata & in aere puro.

Obiectio.

Aer esse debet frigidus quum sit morbo contrarius & cordis intemperiem magis euentet. Quomodo igitur erit temperatus ut Auicenna.

Responsio.

Aer ratione morbi potestate debet esse frigidus, sed non actu quia per os ac meatus cutis nimium constiparet, Calidus uero nimium caput repleret & resoluendo uires debilitaret, Quare magis temperatus esse debet quam frigidus. Hoc etiam



habes ex Gale. 10. meth. & ex Alex. & Raze. 1. cōtinētis. Mesues cap. de phrenit. & Auic. loco citato, Domus in qua locatur patiens sit exuta a formis & luciditate, nam phreniticus intueri eorum imagines diligit & ex earum intuitu lēditur cerebrum.

## Obiectio.

Quomodo hic luciditas prohibentur quum Alex cap. de phrenit. dicat q̄ magis lucidus debeat esse aer quā obscurus.

## Responsio.

Si patiens ex tenebris timorem concipit, aut amoto lumine in imaginationes incurrat aer esse debet lucidus si uero eōtra in obscuro quiescat, Vide in hoc casu Corn. cels. lib. 3. cap. 18. De uictu loquitur Paul. lib. 3. cap. 6. inquit, Cibus primum esto aqua mulsa, deinde ptisane cremor & sorbitiones excondro cum quadam dulci potione ut rhodomellite, panis quoque aqua lotus recte exhibetur, similiter intubum lactuca elixa, ab aqua frigida potu arcendi sunt præsertim si septum trāsuersum consortij lege malo dedisse originem cognoueris. Razes similiter. 9. almā. Nutrimentum eius sit aqua hordei semel aut bis in die sumpta secundum consuetudinem quam in tempore sanitatis habuerit Arcul. iubet ptissanam quater in die esse sumendam. Auice. incipe nutrire ipsum subtili nutrimento ita ut sis contentus oxymellite deinde permuta ipsum ad aquam hordei subtilem cum oxymellite, deinde permuta ad crassum & considera egritudinem & uirtutē, & loquens de potu aliena inquit eos ab aqua uehementis frigoris.

## Obiectio.

Dogma Auic. de cibandis aegris omnino contrarium uideatur Hippocra. 1. aphoris. Nam iubet q̄ a principio morbi uisus sit crassior & uersus statum sit tenuior hic uero econtra iubet primum q̄ sit tenuior & uersus statum crassior.

## Responsio.



Modus cibādi in morbis acutis cum apostemate est diuer-  
sus ab eo qui tantum in morbis acutis sine apostemate fieri  
solet. Nam morbus acutus cum apostemate requirit in prin-  
cipio uictum tenuiorem ut membra magis conficiant & re-  
tineant & motus humorum ex hac retentione supprimatur,  
hocq; habetur ex ipso Auic. fen. 16. cap. de cura fluxus cum ex-  
coriatione & cap. de tinesmo: sed in alijs morbis acutis ser-  
uatur dictū Hipp. De diuersione ac sectione uenæ loquitur Ga-  
le. 13. meth. cap. 21. ibi, itaq; incidenda est in talibus affectibus  
uena statim ab initio, si modo tam ualens fuerit uirtus ut sine  
noxa missione sanguinis tolleretur & paulo post, & hoc utri-  
q; uitio commune est & ei quod cum sopore & ei quod cum  
uigilijs incidit & c. Similiter Mes. cap. de phren. In primis  
si nihil prohibeat phlebotometur cephalica deinde phleboto-  
ma uenas frontis, uel sanguisugas naribus applicato & c. Rø-  
zes. 9. alman. Aegro igitur antequā prædicta compleantur  
accidentia est subueniendum ex sanguinis detractione & uen-  
tris solutione cum succo fructuum & c. Aduerte q; Azarai-  
us non uult fieri sectionem uenæ in biliosa phrenitide sed ta-  
tum hemorrhoidarum prouocationem. Auic. prima tertij,  
cap. de cura charab. fiat phlebotomia ex cephalica & egres-  
sio sanguinis aliquantula imo multa ualde, Deinde phleboto-  
ma uenas frontis & c. & cum phlebotomaueris tum oportet  
ut ipsum clysterizes clysteri ualde leni cum oleo. s. rosaceo et  
aqua hordei deinde trahe materiam ad interiora cum frica-  
tione pedum & c.

## Obiectio.

In principio morbi conueniunt ne frictions?

## Responsio.

Dico q; repletionem imminente ne materia plus agitetur  
quam auertatur non conducere, sed remota hac causa si fue-  
rint debiles frictions & a longinquis partibus incepte forte



conducent &c. De hac sectione omnes fere practici loquuntur similiter Cor. Cel. lib. 3. cap. 18. ipi, Quod si uires patiantur egri sanguis quoq; mittendus, Itidem ait Aet. ser. 6. cap. 2. &c. De repulsione loquitur Gal. 13. meth. cap. 21. ibi, Comune præterea utriusq; est ut oxyrhodinum in principio admoveas &c. Similiter Auic. prima tertij. cap. cita. ibi & pone super caput eius in principio oleum rosaceum cum aceto in frigidatum niue &c. & oportet ut in principio administres repercussiva pura, nisi sit de genere magno ex quo apostemantur uenæ quæ sunt extra caput, &c. Nam in morbi augmento pura non conueniunt, sed cum resoluentibus mixta &c. Itidem fatetur Cor. Cels. loco citato ibi conuenit caput adcutem tondere &c. De alteratione per syropos & confectiones habes plura ex Mes. Arcul. Marc. Cat. Sauonarola &c. Similiter de euacuatione, nam Arcul. si cholera fuerit in causa euacuabis eam cum medicina leniente, quæ etiam digesta materia erit, reiteranda &c. De remotione accidētium loquitur Cor. Cel. lib. 3. cap. 18. ibi si nihilominus uigilent hi, Quidam somnum moliuntur potui dando aquam in qua papauer aut hyosciamus decocta sit, & paulo post, seruanda est alius quam tenerrima, remouendi terrores & potius bona spes asserenda, querenda delectatio ex fabulis ludisq; quibus capi maxime sanus assueuerat. Paul. lib. 3. cap. 6. Quod si urina ipsis delirij uitio cohibeatur, calentis hydrelei imbre pubem & uesticam fouebimus, Itidem ait Auic. loco citato inungens oleo pubem tepido.

#### Observationes de uenæ sectione.

Auic. prima tertij, cap. de charab. inquit q, phlebotomia fieri debet ex cephalica seruatis quatuor conditionibus. Prima q, nihil sit q, prohibeat sicut tempus anni, ætas, robur uirtutis &c. Secunda q, copiosa fiat si a sanguine phrenitis de-



penderet, pauca si ab alio humore, ibi cholericum indiget in  
sui cura educatione cholerae plurima & phlebotomia minore  
& cum cautella &c. Tertia q̄ cauenda est syncopis ita ut ne  
actu accidat. Quarta q̄ sit cautella in ligando ne ex ma-  
gna commotione fieret hyppospasma. i. uenae ruptio. Halyab  
bas unum tantum aduertit ut ne post tertium diem sui euen-  
tus fiat uenae sectio, hoc idem uidetur attestari Hippoc. in eo  
aphorismo Medicari in ualde acutis si materia turget eadem  
die, tardare. n. malum est. Auic. loc. cit. uidetur etiam inuere q̄  
uniuersalis uenae sectio particularem precedere debeat, ob-  
seruatis tamen tribus conditionibus, Prima q̄ uirtus sit ualida,  
Secunda q̄ dispositio capitis hanc requirat, Tertia q̄ seua ac-  
cidentia non adsint &c.

### Observationes de repulsione.

Auic. de cura charab. conuenit oxyrhodinum niue infrigi  
datum & non calidum.

### Obiectio.

Quomodo frigidum si Aet. ser. 6. cap. 2. dicat caput rosa-  
ceo tepido irrigetur, nam in cerebri membrana inflammata  
frigiditas rosacei non est tuta.

### Responsio.

In phrenitide duplex esse potest medendi scopus quatenus  
ad topica, alter. s. ad inflammationē, alter ad reliqua indican-  
tia, si igitur ad inflammationem tantum sit tua intentio tunc  
oxyrhodinum conuenit actu frigidum, si ad reliqua indican-  
tia tepidum &c.

### Observationes de euacuatione.

Mes. in cholerica phrenitide statim fiat euacuatio cum  
aqua fructuum, nec in mora sit medicus, nam induciae nō dan-  
tur in preparanda materia unde uersus: Sinocha cum colica



phrenesis squinantis & antrax,

Materias crudas euacuare iubent.

Et de topidis loquens inquit scito quod sanguinea indiget resolutione plus & extinctione minus, Colerica uero econtra, hoc idem ait Auic.

### De pronosticis phrenitidis.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 53. Desipientie quæ cum risu fiunt securiores, quæ uero cum studio periculosiores. B. securior. i. minus periculosa & hæc fit a sanguine, sed quæ fit a flauabile timor est ne exusta insaniam satis furiosam generet & c. Et aphor. 2. apho. 2. ubi somnus delirium sedat: bonum, B. hoc delirium non fit patiente cerebro, sed tantum a caliditate nuda, unde mirum non est si id somnus de medio tollat. Et aphor. 7. aphor. 12. A pulmonis inflammatione phrenitis, malum, B. etiam econtra malum est si ex phrenitide inflammatio pulmonis sequatur, Verum quod tunc phrenitis mala est quæ ad cerebrum permutatur, uel si adeo excrescat ut meningæ cerebri patiantur. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. Phrenitis mitior est quum a pallida bile ortum contraxit, uehementior quum a flaua, ferina uero quum a flaua bile perassata. Hippo. pronost. 1. cap. 9. Qui in febre acuta aut delirio aut pulmonia, aut capitis dolore, manus subinde ad os, fert, aut frustra uenatur muscas aut colligit festucas aut euellit pillos id exitiale est. B. lege fusius Gal. commẽ. de delirio. Et Hippoc. aphor. 4. aphor. 72. Quibus urinae albæ & perspicuæ, malæ præsertim si in phreneticis appareant. Et Auicẽ. prima tertij, cap. de charab. nullus uisus est habere apostema in partibus cerebri cuius urina fuerit aquosa qui euaserit. Nam tunc aquosa esse dicitur urina, quum teste Gale, perspicua simul sit & alba. Hec enim magnam cruditatem ac flauam bilem ad caput solummodo rapi ostendit & c. Mesu. cap. de phrenit. cura huius agritus



dinis si iam impreſit caſſa eſt, ſi uero adhuc perfecta non eſt curatur, ſed non apud negligentes & ſtultos medicos &c.

Authores erronei diſſentientes circa phrenitidem.

- 1 Adſerere, cerebri ſubſtantiam nullo modo poſſe inflammari ut Serapio.
- 2 Adſerere, phrenitidem abſq; febre fieri poſſe.
- 3 Adſerre, paraphrenitidē a nuda caliditate non poſſe effici.
- 4 Adſerere, phrenitidem a ſanguine exorta non eſſe ſignum periculoſum.
- 5 Adſerere, aquam frigidam in phrenitide poſſe exhiberi ut Razes.
- 6 Adſerere, in omni phrenitide ſeclionem uenæ non conuenire.

Confutatio diſſentientium circa phrenitidem.

Confutat primum Auice. cap. de charab. dicens, Quidam medicorum exiſtimant q. ipſum cerebrum non apoſtematur, quia quod lene eſt ut cerebrum uel durum ut oſſa non extenditur & ſic non apoſtematur, ſed hic ſermo eſt erroneus quoniam lene uiſcoſum extenditur & oſſa etiam apoſtemantur &c. quod intelligendum eſt per uiam congeſtionis, non autē per uiam rheumatis, & hoc idem ſentit Auer. 4. collig. & Gale. 6. aphor. com. ſi. ibi, ſiunt omnes patēte cerebro &c.

Ad ſecundum Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. Igitur quemadmodū phreniticis febris unum quoddam accidens diſpoſitionem cerebri cenſetur, ſic econuerſo in ardentium februm demencia, multis elatis ad ipſum uaporibus. Idem ſentit Hippoc. in epid. mor. & Gale. 5. de ſympt. cau. &c.

Ad tertium Gal. 6. aphor. comm. ſi. loquens de paraphrenitide inquit, Quæcunq; n. ex ſola caliditate ſine humore uitioſo ſiunt, ſimiles quodammodo ſunt eis quæ ex ebrietate contingunt igitur quedam ſiunt a nuda caliditate.



Ad quartum Gal. aphor. 2. commen. 2. sed satis fuit ei periculofissimum morbum phrenitidem nominare, & aphor. 6. commen. 53. nulla inquit desipientia secura est, igitur nec a sanguine exorta.

Ad quintum Auice. prima tertij, cap. de charab. & Alex. cap. de phrenit. Gelida autem aqua quoniam parum frugi omnino uitanda, nam interna phlegmoni nocet deliriūq; auget & omnia in deterius conuertit, materiaeq; resolutionem prohibet & nervis nocet & sic nullo modo conuenit.

Ad sextum conueniunt Alexan. Razes & deniq; omnes q; fieri debeat si non euacuandi saltem reuellendi gratia & hoc in principio morbi, cauendo ut supra.

#### De lethargi descriptione & loco affecto.

Lethargus est dormiendi inexpugnabilis quædā cupiditas, eoq; ληαργος dictus est, quod ab accidente. i. ab obliuione frigidum cerebri apostema sequente fiat, unde & alias ueteranus morbus uocatur, eo quod qui tali egritudine laborant, æterno ueluti sopore afficiantur, fitq; hic morbus uel in meatibus substantiæ cerebri, & hoc ut plurimum, uel fit in paniculis uel in eius substantia, et hoc raro admodum contingit, in uentriculis uero cerebri nequaquam, Qui si fieri contingat, non amplius lethargi nomen, sed potius apoplexiæ uel epilepsiæ obtinet, fitq; ut plurimum in occipitio, interdum in sincipiti uel in medio, sed raro admodum.

#### Loci consentientes de lethargo.

Gale. lib. finit. med. Lethargus est delatio in somnum non facile excitabilem, quæ cum coloris uitio & flatuoso edemate, nec sine ipsarum quoq; solidarum partium, repulsifici spiritus languore prouenit fere indebili febre ac maligna. Auic. prima tertij, cap. 16. lethargia dicitur apostema phlegmaticū intra craneum factum & est firsen pituitosum &c. Et hæc



quidem ægritudo nominatur nomine sui accidentis, idest ab obliuione apostema cerebri sequente & c. Cel. lib. 3. cap. 20. In lethargo marcor est ac inexpugnabilis pene dormiendi necessitas & c. De loco leso loquitur Paul. lib. 3. cap. de leth. ibi, τοπου μέν ἐχει τὸν αὐτὸν τῇ φρενιτίδι, φημι τὸν ἐγκεφαλον & c. Auice. prima tertij, cap. 16. Et plurimum quidem fit in meatibus substantiæ cerebri, & raro in uelaminibus & substantia cerebri quia phlegma raro penetrat paniculos cerebri propter eorum duritiem, & propter eius uiscositatem & c. Gale. 3. de loc. aff. cap. 5. In lethargo & in omnibus soporosis affectionibus ratio & memoria pereunt. Quare quum memoria in occipitio & ratio in medio uentriculo reponatur, hoc sequi necesse est lethargum .s. plerunq; in his duobus locis contingere & c.

### De lethargi causis.

Quum cerebrum primario affectu laborat binas tantum causas antecedentes & coniunctas habere dicitur ex quibus procatactica intelliguntur, antecedentes sunt uehementia frigora cum multa humiditate complexa, sicut in pituita & in nimia repletionem cernitur, uel antecedentes dicuntur quæcūq; pituitosum humorem generare possunt, sicut comestio fructuum & ceparum aut nimia potio. Causæ uero coniunctæ sunt humores lethargum ad actum producentes, si uero cerebrum per consensum afficiatur, tunc uel fit exmutatione aliquius acuti morbi uelut a phrenitide & a febre continente uel ab stupefacientibus pharmacis nimis refrigerantibus cerebro adhibitis, aut fit a diaphragmate, uel ab aliquo alio uiscere affecto. Verus igitur lethargus a pituita tantum fit, notus uero a pituita cum bile admixta, in capite putrescente, oboritur, unde symptomata habet etiam admixta.



## Loci consentientes de causis lethargi.

Gale. 3. de loc. aff. cap. de morb. comit. lethargus ortum trahit a uehementi frigore. Et. 2. aphor. commē. 3. somnus inquit fit refrigerato primo sensitiuo. i. cerebro, quæ refrigeratio si mixta fuerit humiditati facit lethargicas passionēs, si cum siccitate *καταλυσίς*. Et. 4. de sympt. cau. cap. 8. fit lethargus a frigida multaq; humiditate grauāte. Vide etiam Gal. 2. de loc. aff. cap. ult. Nam ibi quotquot inquit affectus sunt soporosi ac somnolenti tot omnes a frigida causa oriri. Itidē. 3. de loc. aff. cap. 5. Paulus lib. 3. cap. de leth. ex pituita quæ frigore nimio et humiditate cerebrum imbuerit, contrahitur. Auic. prima *tertij*, cap. 16. Et hæc egritudo generatur ab omni quo generatur humor phlegmaticus & in quo sunt euaporatio & putrefactio & c. Et plurimum inquit generatur ex comestione ceparum & ex nimia repletionē stomachi & multitudine potus & comestione fructuum intellige frigidorum humidorum.

## Obiectio.

Quæ damnat cepas Auic. quum ex sua caliditate potius proficere, quam nocere deberent. Responsio.

Considerat incepis duas esse partes, quasdam. s. crassas ex quibus pituita generatur, & quasdam acres quæ euaporationem ad caput mittunt, Quæ simul unitæ potius capiti nocent quam profint. De causis per consensum loquitur Aet. ser. 6. cap. 3. fit lethargos ex mutatione alicuius acuti morbi ut ex phrenitide & a continente febre & ex alijs plurimis morbis in quibus præsertim euacuationes sequuntur sunt & c. Gale. lib. finit. med. lethargus euenit partim affecto principio. i. cerebro, partim ab scellu. Alex. lib. 2. cap. 20. si pituita sola delinquerit lethargiam ueram introducit, Notham uero pituita cum bile mixta in capite putrescente, & sunt in ea symptomata permixta.



## De lethargi indicijs.

Indicia lethargi sunt. 13. ut dolor levis quasi extendens, febris lenta, somnus grauis, obliuio uehemens, respiratio imbecillis & rara, crebra oscitatio, singultus ob stomachi consensum, albedo linguæ, pigritia in motu palpebrarum, pulsus rari & tremuli, alius interdum humida, interdum sed raro arefcit, urinæ quales iumentorum, interdum tremores & sudores apparent &c.

## Discrimen phrenitidis &amp; lethargi ex Auicenna.

Vterq; affectus similis in hoc esse uidetur q. patientes aliena ac uaria loquuntur. Differunt uero quadrifariam Primo quia in lethargo somnus est grauis, in phrenitide paucus uel nullus, Secundo lethargici in suis lectis præcipitati iacent, phrenetici resurgunt, Tertio in lethargo pars posterior, in phrenitide anterior læditur, Quarto in lethargo est febris lenta levisq; dolor capitis, in phrenitide uero uehementia sunt omnia &c.

## Discrimen lethargi &amp; apoplexiæ, sincopis &amp; uteri strangulatus.

Differt lethargus ab apoplexia ex eo q. lethargus paulatine ac pedetentim fiat apoplexia uero statim, differt ab uteri strangulatu, quum excitatus respondeat, strangulata minime, differt a sincopi quum in lethargo facies sit uiuida in sincopi ueluti mortua, differt a subet & congelatione per febrem quæ nec in subetia uel congelatione accidit, intellige præsertim si ægitudines & non accidentia per se sint.

## Loci consentientes de signis lethargi.

Paulus lib. 3. cap. 9. In lethargo adest febris lenta non admodum acris, cum animi in somnū profunda delatione, pulsus magni turbulenti, respiratio rara & imbecillis, & cetera omnia a me exposita. Auic. similiter prima tertij, de signis



leth. tibi sorda levis febris lenta, necessaria enim est febris in omni apostemate facto ab humore putrefacto et propter hoc seperatur a subet & c. Vide in super Gal 5. de loc. aff. cap. de septi. transuersi affectibus & 3. de loc. aff. ca. 5. Itidem Aet. ser. 6. cap. 3. ibi proinde considerare oportet speciem delationis in somnum & c. De signis discriminum lethargi cum phrenitide apoplexia, & ceteris similibus lege ex Auice. Arcul. Sano narola, & ab ipso Gordonio.

#### De lethargi cura.

Scopi in curando lethargum quinque enumerantur, Primus euacuatio, Secundus reuulsio, Tertius materiae repulsio, Quartus symptomatum emendatio, Quintus uictus ratio instituen da. Euacuatio si adsit repletio, aut pituita cum sanguine abundauerit fiet per sectionem uenae cephalicae, Quod si minus sanguis redundet, per phlegmagogum per secessum uel per uomitum aducens moliri potest, Educunt pituitam hiera simplex hiera composita, Pillula chochia, electuarium indum et quaecumque in cephalica ab humore frigido exarata sunt, Vomitus fiet ex decocto raphani cum sesquiuntia oxymellitis scillitiae. Reuulsio fiet per cucurbitulas lotiones clysteria, quae multum in hoc casu laudantur, per frictiones ligationes & c. Clysteria parantur ex rebus ad caput spectantibus, sicut ex decocto, salviae, maioranae, rutae, betonicae, stechados, cui mellis rosacei tres onciae & totidem olei communis adiectae sint, uel si acria uolueris, adde praedicto decocto radicem cyclaminis, colocynthidos, cartami, centaurij quantum lubet, addito etiam sale gemeo, aut hiera composita electuario indo & c. Lotiones fiant ex praedictis rebus a cubito ad extremam manum et a genu usque ad plantas pedum & c. Repulsio materiae perficitur per exteriora & interiora, Per exteriora in principio repellentia, Per interiora materiam preparantia. Exteriora in prin



in principio repellentia sunt oxyrhodi num, in augmento repellētibus adde resoluentia, ut est aliquid castorei, et a medio statu usq; ad lethargi declinationem resoluentibus puris utendum. sicuti est emplastrum Mesues, quod recipit piretri sinapis scille castorei euphorbij &c. Interiora materiam praeparanda sunt sy. de stechade oxymel scilliticum rhodomel &c. quae dicta sunt in capite cephalae ab humore frigido cū aquis uel decoctis saluae stechados maioranae hyssopi betonicae etc. Emendatio symptomatum fiet per ea quae a somno profundo agrum reuocāt, ut est fumus humanorum capillorum, itē frictio pedum cum aceto sale uel farina synapis, uel cum succo rutae aceto et sale, reuocat etiam a somno pilorum euulsio partium inferiorum, clamor & tumultus, obliuio uero loquendi mingendi, ac egerendi, incitando, uescicam comprimendo, oleisq; aspergendo membraq; inferiora uehementer comprimendo, reuertitur. Victus sit tenuis incisorius ac rescans cum condimentis quibusdam paratus, ut panis contritus in aqua cum salua pauco pipere uel cinnamomo, uel ptisana sale uel pulegio uel oxymellite parata, uel aqua cicerum uel lupinorum, Potus sit hydromel, in declinatione morbi uictus sit qui uires recolligat ac recreet, unde dandum est uinū aquosum tenue album subadstringens, carnes sint gallinarum coluborum montanarumq; auicularum, pisces petrosi, olera sint porri asparagus petroselinum &c. Aer, sit lucidus splendidus, domus tepida, somnus non permittatur nisi per mediam horam deinde excitetur, ita ut de media in mediam horam dormiat & excitetur, Frictiones uicē suppleāt exercitij &c.

Loci consentientes de cura lethargi.

De omnibus his fere intētionibus loquitur Gal. 13. meth. ca. 12. & primū de euacuatione, ibi, incidēda est in talibus affectibus uena statim ab initio si uirtus ualeat &c. de humorib.

K



preparatione, ibi, excitare eos oportet & crassitiem humoris incidere & excalefacere incoquentes in aceto thymum & pulegium & origanum & c. de derivatione, ibi, Mox palatum ualentibus & acribus medicamentis ungemus, deinde sternutamentis utemur. De repulsione, ibi, tum capiti similes praesidiorum facultates imponemus ad aucta semper eorum usque ad ipsum sinapi uehementia. De Reuulsione, ibi, Quin etiam cucurbitulis utemur & c. De euacuatione loquitur Auic. etiam prima tertij, cap. de cu. lith. ibi si non fuerit quod prohibeat phlebotometur prius et si alia fuerint tibi necessaria, da ei ad potandum hiera prica. 3. i. et quartam unius drachmae de pulpa colocynthidos & tres drachmas myrrobalanorum & dauic unum masticeis, Aet. ser. 6. cap. 3. si sanguis fuerit redundans secetur uena & pro uiribus euacuetur. De reuulsione loquitur Paul. lib. 3. cap. 9. ibi, si minus sectio uenae competit eius loco clysterijs acribus alium ducemus. Acria. n. huc spectant quia tum febris mitis est & lenis, tum quia materia crassa non apta fluere in uentriculo continetur, a quo clystere acutum diuertit & euacuat, similiter Auic. loc. cit. administra eis clysteria acuta & trahatur materia ad inferiora, & fac eum uomere cum penna melle & sinapi illita & frica extremitates eius donec rubescant & doleant & c. De repulsione & materiae preparatione loquitur Auic. cap. citato et in principio repellere materiam cum oleo rosaceo & aceto & post duos dies a principio sui misceatur eis castorium & c. Alex. lib. 1. cap. 20. uniuersam curationem capiti applicare oportet quo uapores qui eo deferuntur promptius supprimantur, danda est in super opera ut humores ibi coacti conquoquantur incidantur & dissipentur & c. De sympt. emendatione facit mentionem Cel. lib. 3. cap. 20. ibi hos quidam excitare nituntur ad motus his per quae sternutamenta euocantur & his quae odore foet



do mouent, qualis est pix cruda lana succida piper ueratrum  
 & c. Auic. loco cit. Quum in subet profundi fiunt euellere capit  
 los eorum & pone apud nocram uentosas multas cum igne  
 & absq; incisione, & quū eis acciderit obliuio urinæ & ster  
 coris, embroca utraque emundatoria & uentrem cum decocto  
 camomillæ melliloti, uiolarum & comprime uesicam & c.  
 De uictus ratione instituenda lege Aet. ser. 6. cap. 3. ibi, Ci  
 bi porro sint tenues & incisori ac resecantes & cum condi  
 mentis parati aniso cumino apio pipere, sunt tamen qui ane  
 sum damnent quum sit somniferum. Paul. lib. 3. ca. 9. etiam de  
 his loquitur, ibi, alimentum sit cremor ptisanæ cum oxymel  
 lite uel pulegio. & hoc in principio. Nam in declinatione u  
 tius sit qui uires recolligat & c. Auice. loc. cit. Et quum nutris  
 nutri eos cum aliquibus quæ sint sicut aqua lupinorum cice  
 ris cum hordeo fracto, deinde quum finitur aegritudo admi  
 nistra restaurantia lege fusius hos authores, et plura, quæ hic  
 recitari non possunt, inuenies & c.

#### Lethargum generantia.

Cepe, oximum, semina nigri & albi papaueris, Poma  
 mandragoræ.

#### De Pronosticis lethargi.

Hippoc. aphor. 2. apho. 1. In quo morbo somnus laborem  
 facit, mortale, si uero iuuat non mortale. B. intellige somnū  
 quatenus somnum non esse mortalem, sed quatenus accidens  
 alicuius morbi. Et aphor. 2. aphor. 3. somnus atque uigilia si  
 modum excefferint, malum. B. Excedit modum tripliciter,  
 Primo ex parte quantitatis, unde multus uel deficiens, ma  
 lus, Secundo ex parte qualitatis qualis est somnus inexpugna  
 bilis & superfluous cerebrum infrigidans & humectans, Ter  
 tio ex parte temporis qualis meridianus & nocturnus. Au  
 ce. prima tertij, cap. de signis leth. Quumq; fortia fuerint ac



cidentia lethargie & multiplicatur sudor ualde, est, tunc perimens propter quod sudor deiecit uirtutem, & quoniam spiritus dilatatur & fit bonus & declinant accidentia, tunc tendit ad salutem & proprie si apparent apostemata post aures & c. Cel. lib. 3. ca. 20. lethargus est de genere acutorum & nisi succuratur celeriter iugulat & c.

Authores dissentientes circa Lethar. & Vertig.

quare infra, pag. 156.

De Vertigine.

Τὸ σκοτοματικὸν πάθος. i. affectus scotomaticus, qui et uertiginosus dicitur, quid sit ex ipsa appellatione manifestatur. Est. n. scotomaticus is dicendus cui obtenebrationes contingunt, ac ei uidetur caput circumferri, ita ut firmari non possit, sed parua occasione cadat. Differt uero uertigo a scotomatico affectu, eo quod omne scotoma uertigo sit, sed non econuerso, σκοτομα dictum latine turbo a σκοτομα. i. uertiginos siue a uerbo σκοτομα. i. obtenebro, siue a σκοτίς. i. obscuro, obscurantur enim precaligine oculi, ut nihil uideant, sed in uertigine simpliciter dicta res uidentur tantum circumuolui absque casu & tenebris, differunt etiam in causis ut infra uidebitur.

Loci consentientes de Vertigine.

Gal. aphor. 4. commē. 17. Vertigo est quando simul uidentur circumuolui quæcūque conspiciamus & sensus uisus de repente destruitur, quum uideantur tenebræ circumfusæ. Auice. prima tertij, tra. 3. uertigo est, ut habens ipsam imaginetur quod res super ipsum uoluantur & quod eius cerebrum & corpus ipsius reuoluantur, quare non regit se ita ut firmetur imo cadit & c. Ba. Intellige scotomaticum affectum (& si nula de tenebris fiat mentio) hic ab Auice. de finiri, sub quo uertigo tanquam minor dispositio continetur. Definatur uero uertigo a Raze hoc



modo, Razes. 1. com. ca. 2. uertigo est dispositio in qua apparet res reuolui & tamen homo nō cadit, sed regit se & c. Ba. adde, sed perseverante morbo diutius ex facili occasione concidit, maxime ubi in circulum circumuertatur. Vnde Gal. 3. de loc. aff. a parua occasione hebetantur, ita ut interdum cadant, si circumrotentur, hoc idem adserit Paul. cap. proprio & c. & Aet. ser. 6. cap. de uertig.

### De uertiginis causis.

Causæ uertiginis primitiue sunt omnes sex res præter naturales ex quibus uapores crassi egredientes, ut cepæ uinum, cerebrum male afficiunt. Similiter mora in sole, Mala intemperies, capitis percussio, aut cranei fractura, solitæ excretionēs retentæ, cruditates, ebrietates et consideratio rerum quæ circumaguntur. Antecedentes sunt omnes humores, a quibus uapores eleuantur, qualis est utraq; bilis pituita & sanguis. Coniuncte sunt uapores spiritibus admixti existentes actu in regione uisus. Hec affectio etiam per consensum alicuius partis uel totius fieri potest, ex uaporibus ad caput elatis, aut ex ore uentriculi a malis humoribus morso, ab hysdemet causis deniq; prodeunt uertigines, a quibus morbus comitialis & easdemet sedes occupant & c.

### Loci consentientes de causis uertiginis.

De causis primitiuis loquitur Gale. 3. de locis aff. ca. 8. ibi, id maxime accidit quum uel sub sole æstuauerint, uel aliam ob causam calefactio fuerint capite, aut ex calido uaporosoq; spiritu caput opplente & c. Aet. ser. 6. cap. 7. facile capiuntur ab hac affectione quibus consueta excretionēs sunt oppressæ, sed & cruditas & ardores asidui & ebrietates affectionem hanc efficiunt. Auic. prima tertij, ca. de cau. uertig. fit propter considerationem ad res que uoluuntur ita ut figatur forma illa sensata in anima, & paulo post inquit interdum fit a ma

R. BLANCHARD

K 3

PROF. FAC. MF

115



litia complexionis, et fit ex motore spiritus exterius sicut ex percussione capitis & fractione cranei &c. De antecedentibus causis lege Gal. aphor. 3. commē. 27. ibi, Quotidianæ constitutiones &c. ubi inquit fit uertigo ab humore cum spiritus crassie in capite moto, ideoq; proxima est comitialibus morbis & apoplexijs &c. Paul. lib. 3. cap. 12. Nascitur uertigo quum frigidus, & glutinosus humor cerebrum occupat &c. Auice. prima tertij, tra. 5. uaporis materia quandoq; est cholera quandoq; phlegma, & uertigo phlegmatica similis est epilepsie &c. De atrabile & sanguine non meminit nisi ubi designis uertiginis loquitur. De causis coniunctis loquitur Gale. aphor. 3. commē. 31. ibi uertigines accidunt propter spiritum uaporosum, qui in partibus cerebri inordinato motu cietur &c. Auice. prima tertij, cap. cit. ex causis fit corporeis presentibus in uacuitatibus cerebri, contentis in ipso ex uaporibus prouenientibus in uenis, quæ sunt in ipso & neruis &c. De causis per consensum plura habes ex Gale. aphor. 4. commen. 17. ibi fit ab ore uentriculi a malis humoribus morso &c. Item aphor. 2. commē. 31. ibi, aut in uentriculo uitiosis superfluitatibus acruatis ad cerebrum fertur exhalatio uaporosa. Item. 3. de loc. aff. ca. 8. Oribasius aphor. 3. commē. 20. de hac re mentionem & ipse facit ibi sicut uentus sese eleuans et puluerem in sublime rapiens &c. Auicen. prima tertij, tra. 5. Et quandoq; fit ex uaporibus ascendētib; ad cerebrum &c. lege eum fusius nam ibi enumerat omnes partes a quibus se extollere potest. Gal. in lib. qui introductio siue medicus nuncupatur, caligines inquit oculis offusæ & uertigines cognata sunt uitia morbo caduco ab iisdemet causis prodeunt atq; easdem sedes occupant &c.

## De signis uertiginis.

Indicia quæ distinguunt utrum primario affectu an per con



sensum efficiatur uertigo hæc tria sint, Primū nō præcessit alterius mēbri nocumenū, Secundū est uertigo assiduaque non excitatur ex repletionē alterius mēbri nec remouetur ad alterius mēbri euacuationē, Tertiū quia omnes fere sensuum actiones lesse sunt, si igitur alterius mēbri læsio præcesserit, ad cuius in crementū uertigo augeatur, & ad eius decrementū decrescat, & ad eius ablationē, auferatur, tunc p̄ consensum est, ubi igitur per cōsensum uentriculi fieret uertigo, tūc præcedet praua concoctio, appetitus deiectio grauitas, nausea, uomitū et anxietas quædā stomachica, dolorq; erit in anteriori parte cerebri usq; ad medium p̄p neruorū reuersuorū cōsensum &c. Si uero primario affectu, tunc præcedunt hebitudines in oculis, aurium sonitus auditus, grauitas, dolor capitis, & sic uniuscuiusq; sensus ob læsio aderit, Indicia humorū morum præcipue sanguinis sunt, uenarum inflatio, oculi rubi, capitis grauitas, somnus & pulsatio. Bilis sunt uigilie inflammatio sine grauitate multa, imaginationes citrinæ &c. Pituite, sunt grauitas tumor & multitudo somni & sic de reliquis humoribus etiam intelliges &c.

#### Loci consentientes de signis Vertiginis.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 8. loquens de signis primarij affectus & per consensum inquit, Vertigo quum per se fiat, aut per uentriculi consensum sicut & Archigenes fatetur, sic signa, distinguere oportet, Nam si uertigo ex primaria cerebri affectione fiat, tunc aurium soni, & capitis dolor & grauitas, & sic olfactus & cuiuscunq; sensus a capite prodeūtis ob læsio aderit. Vbi uero per consensum oris uentriculi, præsentietur cordis morsio quam Græci dicunt *καρδιαγωγία* & Nausea &c. hæc eadem recitat Paul. lib. 3. ca. 12. Auice. prima tertij, tra. 5. uertigo facta ex reuolutione hominis, aut consideratione ad res reuolutas, nota est per se, et similiter, quæ fit a per-



cusione & casu. In ea quæ fit a retentione materierum in cerebro, signa sunt q̄ ægritudo est assidua non sequens ægritudinem aliorum membrorum, nec est excitata cum repletionē, ne sedata cum euacuatione & antecedit ipsam dolor capitis, sonitus & tinnitus & grauitas est in capite & inuenit tenebrositatem in uisu & in sensibus abreuiationem & c. lege eū fusius, nam si omnia uellem in unum congerere essem longitūdine longe longior, lege etiam ipsum de signis cuiusq̄ humoris ibi & si fuerit humor & c.

#### De cura Vertiginis.

Primum id in cura notato, an per se, an per compatiendi rationem morbus fiat. Si per se, an actu uertiginosus sit an facultate, Primo expedit curatio, alteri præseruatio, Præterea etiam id intueri, num in ipsa uertiginis accessione sit patiens, an extra. Si in accessione tunc frictionibus cucurbitulis ligationibus & medicamentis odore mouentibus æger excitandus est, si uero extra accessionem, tunc primum causa diligenter considerata, curandus erit, unde si fuerit causa primitiua, qualis est uisus rerum circunuoluentium, aut auditus uocum in gentium, aut percussio & crapula, tunc ita remouenda erit causa, ut ne res mobiles uideat, nec sonos ingentes audiat, & tunc motus spirituum & eorum disiunctio moderetur cum quiete animi & corporis in loco obscuro, interim remouendo si qua mala fuerit intemperies in cerebro derelicta, cum contrarijs intra & extra applicatis. Si uero aliquis humorū causa fuerit, tunc quintuplici scopo indiget, Primus euacuatione, Secundus reuulsione simul & deriuatione, Tertius alteratione siue humorum præparatione, Quartus accidentium remotione, Quintus uictus ratione. Euacuatio fiet per sectionem uenæ si sanguis superabundauerit per remotas uenas incipiendo a japhena deinde a basilica postremo ab ipsa cepha-



lica & a uenis, quæ post aures locantur præsertim si purgationes menstruorum uel hæmorrhoidarum oppressæ sint, si uero sanguis cum alijs humoribus in qualitate redundet, pro ut natura humoris requirit, euacuabitur cum rheub. Myrobalanis casia &c. Reuulsio fiet cum omni reuulsionum genere ut supra dictum est in cap. cephalæa procedendo usq; ad cauteria. Alteratio siue humorum præparatio perficitur per exteriora & interiora. Exteriora parantur in principio cum his quæ repellunt ac infrigidant, quale est oleum rosaceum et acetum. In medio tempore cum repellentibus ac resoluentibus mixtis & in fine cum puris resoluentibus pro ut habuisti in capite cephalæa. Interiora per ea quæ immobiles reddunt spiritus, sicuti sunt frigida styptica, qualis est syrupus rosa. de granatis de ribes de citonijs & quæcunq; apozemata, ex his parata, ubi materia sit calida & spiritus in motu fuerint, ualent etiam in hoc casu eclegmata ex saccharo rosaceo miua cydoniorum, Item cotoneata a prandio statim uel ab ipsa cena comesta. Remotio accidentium, erit si nec apud ignem, nec in scalis nec prope flumina patientes sint, ne interdum ex uertigine oborta præcipitentur, si uero aliqua etiam tenebræ adhuc remaneant, cum his quæ clarificant statim curabuntur &c. Victus ratio, si ab humore calido fieret uertigo, erit, quæ bilis aut sanguinis feruorem extinguat, sicut sunt acetosa styptica, qualis est succus cotoneorum malorum & granatorum, in quo bucella panis immergi potest, sitq; uictus non flatuosus non cacostomaticus sed facile concoctilis, Aer sit magis obscurus quam lucidus ne spiritus agitentur, Potus sit modicum uini albi tenuissimi præsertim si uertigo per compatiendi rationem fieret, somnus sit notabilis, quies non solum corpori, sed etiam animo confert, uitanda insuper sunt accidentia animi sicut ira tristitia nimia cogitatio &c. Venereis quantum potest se



abstineat &c. Si causa fuerit per consensum tunc triplici scopo curabitur, Primo cum cause remotione, Secundo cum membri mittentis & recipientis roboratione, Tertio cum reuulsione uaporum adhibito tamen regimine congruo ut supra, Quae omnia longe uberius habita sunt in cap. cephalae per consensum &c. Quare non est ut hic denuo recitentur &c.

Loci contentientes de cura uertiginis.

Paulus lib. 3. cap. 12. Vertiginosos in accessione excitabimus cum medicamentis quae odore mouent, item frictionibus & id genus alijs &c. lege etiam in hoc Marc. Cat. Auic. prima tertij, tra. 5. Vertigo facta a reuolutione hominis super ipsum & consideratione eius ad reuolutiones & considerationes a loco alto, cum quiete & tranquillitate curatur & somno si non cito sedaturum.

De cura a causa humoralis & primo de ipsa euacuatione loquitur Auic. loco nuper cit. ibi. Quae uero facta est ex sanguine, aut ab humore contento in corpore curat phlebotomia ex cephalica deinde ex uena quiete, quae est post aurem. Et Paul. loc. cit. ubi morbus conquieuerit sanguis discutiendi gratia extrahatur & purgatio ex hiera praestanda. Et Razes. 9. alma. Quod si non appareant & facies sit rubra, sanguis ex cephalica uel basilica erit minuendus. De reuulsione etiam loquitur Paul. ibi, Interpositis diebus acri clistere et cucurbitulis ad occipitium cum scarificatione, moxq; apophlegmatismis et sternutamentis uti debemus &c. Auic. loc. cit. & cauterizatur arteria & proprie ea cuius causa est ascensio uaporum & uentose conferunt nocrati &c. Si uero fuerint humores diuersi a sanguine incipe ad curandum cum pillulis de hiera & infusione aloes, uel in humoribus calidis cum decoctione myrobalanorum epithimi pillulis stomaticis &c. De alteratione plura habes ab Aet. ser. 6. ca. 7. ibi. His uero qui calidum caput ha



bent etiam rosaceum cum aceto adhibeas &c. Et Auice. cap. cit. & cō fortabis caput cum oleo rosaceo & aceto & oleo camomillino & post confirmationem cum oleo camomillino singulari, &c. loquens etiam de interiori inquit & malitia complexionis curatur per contrarium ut temperetur complexio naturalis, ubi Vgo Senensis utitur syrupo destechade de epithimo oxymelle composito et scillitico cum decocto hase origani hyssopi stechades &c. De accidentium remotione loquens etiam Auice. inquit, & habens uertiginem alienet a se considerationem ad omnem rem cito reuolubilem, & ab aspectu profunditatum fouearum & uerticum montium, lege etiam de his omnibus Arcul. Marc. Cati. Michaellem Sauo. et Gordonium. De uictus ratione fit mentio ab Aet. ser. 6. ca. ibi, cibi sint boni succi facile concoctiles, flatus exortes omnino stomacho ac uentri commodi urinam cientes, uinum modicum sit album & tenuissimum & non ualde uetus. De cura per cōsensum, Mes. cap. de uert. inquit, In primis materiam absconde, deinde membrum mandans rectifica et regimen ad equalitatem administra, cerebrum & caput conforta ne recipiat deinde diuerte uapores & fumos cum constrictione dolorosa uentofatione clysterijs &c.

#### Observationes de sectione uenæ.

Aet. ser. 6. cap. 7. monet ne acervatim euacues nam ex facili occasione concidunt &c.

#### Verriginem generantia ex Diosco.

Cardamomum hyosciamus Mandragora Falernum, Aconitum, Cicuta.

#### Remedia ad uertiginem ex eodem.

Valent peucedanum, Galbanum, Ampelos leuce, acetum scilliticum, uinum scilliticum.

Auic. prima tertij, tra. s. quandoq; fit uertigo & scotomia



secundum semitam crisis, & uertigo frequens & proprie in decrepitis nunciat apoplexiam, & similiter uertigo eueniens successione stuporis communicantis membrum, & quandoq; soluit uertiginem sorda accidens, ille cui frequenter accidit scotomia de se ipso sollicitus sit & humorem euacuet crassum, ne ad epilepsiam aut apoplexiam perueniat, quum uertigo prolongatur signum est qd fiat a causa frigida & c.

Aut. dissentientes circa Leth. & Vertiginem.

- 1 Adserere, lethargum non principaliter in cerebro, sed in corde fieri ut Aristo. Qui prima uim sentiendi in corde esse dicebat & non in capite. (res.)
- 2 Adserere, lethargum a melancholia generari posse ut Ra
- 3 Adserere in lethargo a frigidityte, & humiditate proueniente, sectionem uenae non competere.
- 4 Adserere in lethargo occipiti esse adhibenda repellentia.
- 5 Adserere scotomaticum affectum non differre a suffusionibus oculorum quum utrobq; imagines uideantur.
- 6 Adserere, uertiginem quae fit per consensum, non esse attribuendam capiti.
- 7 Adserere, omnem uertiginem per arteriarum sectionem esse curandam.

Confutatio dissentium circa Leth. & Vertiginem.

Impugnat primum Gal. 4. de sympt. cau. ca. 8. ibi, Ceterum quod capitis repletio somnum conciliet, iam Aristo. satis monstrauit, sed quamobrem oppleto capite prima sentiendi uis quiescat, quum ipsa (ut ille putat) in corde resideat, nullam probabilem inuenire potuit rationem, igitur & c.

Ad secundum respondet Auicen. prima tertij, cap. 16. ibi, sunt quidam Medici qui nominant lithargiam omne apestema frigidum in cerebro, siue sit melancholicum & c. quem uidere poteris, Praeterea Gale. loco citato lethargus inquit fit



a frigidityte & humiditate, sed melancholia frigida est & sicca igitur &c.

Ad tertium Alexan. lib. 1. cap. 20. Si nec vires agrotantis atas regio & tempus obistere uideatur sanguinem detrahere in principio statim expedit &c. Auicen. si non fuerit q̄ prohibeat phlebotometur, intellige saltem reuulsuam sectionem competere si non euacuatiuam.

Ad quartum Gale. 13. meth. ca. 22. Sed quoniam suttura & praesertim coronaria, non solum impositi medicamenti qualitates, sed etiam substantiam, (si tenuis est) introtrasmittit, nam praeter reliqua tenuissimum est hoc loco cranium & rarissimum, ergo quotiens medicamenti cuiusq; uim uehementer descendere uoles hoc maxime loco impones &c. igitur non occipiti &c.

Ad quintum Gal. in lib. qui introductio siue Med. nuncupatur respondet dicens q̄ caligines oculis offuse, & uertigines cognata sunt uitia morbo caduco sed inter se differunt, quod experientia demonstratur, nam in scotomatico affectu leui occasione hebetantur & concidunt, sed non in suffusionibus oculorum &c.

Ad sextum Gale. 3. de loc. aff. cap. 8. Verum ut iam antea saepe numero monuimus, licet caput per alterius partis consensum afficiatur affectio tamen ipsi ascribenda est &c.

Ad septimum Gale. 3. de loc. aff. cap. cit. Quamobrem non nulli horum, ab arteriarum sectione praesidium petierunt, arterias pone aures secantes, sed constat non omnes huius auxilij beneficio fuisse curatos &c. Nam fieri potest q̄ inequalis cerebri intemperies huiusmodi spiritum producat &c.

#### De Morbo comitiali.

Morbus comitialis graece ἐπιληψία dictus, est totius corporis non omnimoda conuulsio, ex qua operationes motus



Et sensus in membris prohibetur, per temporum intervalla accidens, fitq; cum repentino casu ac exitu spumæ oris, talis uero conuulsio sequi solet, uel a multitudine grauante, uel ab acrimateria cerebrum mordicante, quod quum tale molestum reijcere conatur tali motu conuulsuo concutitur &c.

Loci consentientes de morbo comitiali.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. Morbus comitialis est omnium corporis partium conuulsio non perpetua sicut in Emprosthotono opisthotono & tetano, sed quæ ex temporū accidit intervallis, & lib. finit. med. Comitialis morbus, est oppressio mentis sensoriorumq; cum repentino casu, ac spumæ oris exitu. Auic. prima tertij. tra. 5. epilepsia est aegritudo, prohibens membra animata ab operationibus sensus & motus in erectione, non integre & illud est propter opilationem contingentem &c.

Obiectio.

Quum Gal. de sympt. diff. cap. 3. dicat si non totum corpus conuellitur, sed principes functiones detinentur, hoc symptoma morbus comitialis appellatur si igitur symptoma est quomodo ab Auic. aegritudo dicitur. Præterea conuulsio est symptoma, sed morbus comitialis est conuulsio igitur symptoma & non morbus ut Auic.

Responsio.

Morbus comitialis summi potest primo pro obstructione cerebri uentriculos opplente uel pro mala intemperie, uel pro mala compositione & sic his tribus modis est aegritudo, at sumptus pro motu conuulsuo, est symptoma si uel accidens &c. Quir motus conuulsuus fiat in cerebro reddit rationē Gal. 3. de loc. aff. ca. de mor. comit. ibi. proinde existimaui similem motum cerebro euenire qualis stomacho interdum a re quapiam molestato accidere solet &c. Vide etiam de hac re Act. ser. 6. cap. 13. De generatione spumæ uide Gale. aphor. 2. commē. 43. ibi strangulati &c. & Auic. ibi spuma uero acci



dens in epilepsia est propter agitationem motus &c.

De causis morbi comitialis.

Causæ primitivæ sunt victus depravatus ac potus multitudo, mora in solenimia, coitus plurimus, exercitium super repletionem, accidentia animi ut tristitia ira timor euentus tumulti, auditus uocum terribilium, odor hepatis cerui usti & gagates lapis bitumē & cornu ceruinum, Causæ antecedentes sunt intemperies mala totius corporis, complexio cerebri frigida & humida ex qua flatuosus spiritus generatur, uel masculus humor ut pituita atrabilis sanguis uel materia uenenosa. Causæ coniunctæ sunt, uapor uel flatus crassus, uel talis humor actu obstruens. Causæ uero per consensum omnia membra a quibus uapores ad cerebrum mittuntur, sicut totum corpus stomachus lien &c. mēbra a quibus uapores eleuari possunt.

Loci consentientes de causis morbi comitialis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 6. Iam alios uidimus (loquens de causa primitiua) conuulsione comitali ab oris stomachi uitium correptos, quum aut probe concoxissent, aut uini meracioris plurimum potassent, aut ueneri immodice operam dedissent. Auic. prima tertij, tra. 5. & causas mouentes epilepsiam plerumq; adiuuant causæ extrinsecæ sicuti immoderantia cibi et potus & satietas nauseatiua, & mora plurima in sole et coitus plurimus & exercitium super repletionem & id quod debilitat cor ex timore &c. Aet. ser. 6. cap. 14. epilepticos collabi faciunt suffita, bitumen, lapis gagates cornu ceruinū odor hepatis caprini assati & ipsum hepar dum editur, hoc idem habet Paul. lib. 3. cap. 13. Gale. aphor. 2. commen. 45. magna ex parte victus depravatus hanc passionem generat, Mattheus de grado historiam de suo filio recitat qui ex magno tubarū sonitu in epilepsiam ceciderit. De causis antecedentibus & coniunctis loquitur Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, non ab



ariditate uacuationeq; sed a crasso semper humore hanc affectionem induci, argumento est, qd & subito fit & soluitur cōfestim, nam subitariam meatuum obstructionem a crasso uiscosq; humore fieri constat. Paulus lib. 3. cap. 13. Morbus comitialis habet causam partim in ipso cerebro, partim in uersis uentriculis subsistentem, modo humorem pituitosum, modo melancholicum. Itidem ait Gal. 3. de loc. aff. ca. de Mania. Auic. prima tertij, tra. 5. Tunc restat ut eius causa sit aut contractio cerebri ad expellendam rem impediētem quæ est, aut uapor aut qualitas mordicatiua aut humectatiua malæ substantiæ aut humor faciens opilationem & spasmus non integrum in uentriculis cerebri, & principijs originis neruorum & c. B. Nota qd hæ tres causæ. s. Vapor humor & qualitas uel mordicans uel substantiæ uenenosæ, mutuam adeo beneuolentiam in se agunt, ut una sine altera effici non possit & sic intelligitur Auice. ipse uero loquens de causa materiali inquit fieri a sanguine plurimo dominante aut a phlegmate, aut a melācholia, aut a cholera & est parua ualde & c. Hippocra. de sacro morb. pituitosis fit natura non biliosis Gale. 4. de loc. aff. loquens de sopore apoplexia & morbo comitiali inquit horum trium morborum frigiditas ac crassus aut omnino uiscidus humor causa est. Similiter. 2. aphor. commē. 45. dixit. De causis per consensum, habes plura ex Gale. 5. de loc. aff. cap. de affectu oris uentriculi ubi exemplum de grammatico affert, qui quotiens doceret cogitaret irasceretur, morbo comitiali corripiebatur. Item differentias huius habes ex Gal. 3. de loc. aff. cap. de morb. comit. Similiter habes exemplum de puero, qui principium affectionis sentiebat in crure, præterea quomodo ille humor ad caput ascendat, habes etiam exemplum de istu scorpionis quanuis hæc tertia species raro contingere soleat, prout notauit Aet. ser. 6. cap. 13. Paulus



lus lib. 3. cap. 13. ore uentriculi inquit affecto cōsortij lege oboritur quemadmodum in colicis, Item & ab alijs inquit partibus nascitur, quum ueluti aura quædam frigidior ad cerebrū ascendat, alias a crure, alias a manus digitis, alias ab utero mulieris grauidæ & c. Auic. prima tertij, tra. 5. Membra ex quibus uapores eleuantur ad cerebrum epilepsiam facientes sunt aut totum corpus, aut splen aut, stomachus, aut myrach & contingit etiam illud in reliquis membris & c.

#### De signis morbi comitalis.

Signa communiter præcedentia, sunt mutatio corporis a complexione sua grauitas capitis, tristitia, et eorum quæ iuxta sunt obliuio, imagines insomniorum turbulentiæ, pallor faciei, inordinatus linguæ motus & ira. Signa morbum demonstrantia sunt spuma oris, repentinus casus, oris ac faciei distractio, ceruicis ac totius tremor, dentium constrictio, sterco ris ac urinae ac etiam spermatis inuoluntaria emissio. In uehementi morbo si spuma ab ore abstergetur, denuo resurgit, in debili uero non amplius reuertitur, uel in debili cito resoluitur, in uehementi nequaquam. Signa pituitæ sunt, si spuma sit crassa ac multa, si urina uitro liquefacto sit similis, Cognoscitur etiā ex uomitu, ab ætate, a regione, a regimine præterito, a colore faciei & ab alijs ut dictum est, in primo lib. Signa demonstrantia morbum esse in capite uel in alijs membris sunt, quia si in capite præcesserunt sensus, & motus læsiones aut obliuio, aut amētia & c. Si in stomacho cognoscitur ex nausea uomitu erosionem & sic de reliquis morbis & c.

#### Loci de signis morbi comitalis.

De signis præcedentibus Auic. ibi loquitur, & plurimum antecedit mutatio corporis a complexione sua & c. Paulus lib. 3. cap. 11. præcedunt quædam animi tristitia, eorum quæ iuxta sunt obliuio turbulentiæ in somniorum imagines, dolor

L



capitis eiusq; repletio continuo & ob iracundiam faciei pal-  
lor inordinatus lingue motus &c. De signis morbum demo-  
strantibus loquitur Razes. 9. alman. cap. de epilep. Quum ali-  
quis cadit in terram et torquetur & commouetur & intelle-  
ctum amittit dicimus esse epilepticum, quod si spuma exit per  
os, aut secum mingit, aut sperma egreditur, aut egestio, passio  
tunc est grauior ac uehementior &c. Paul. cap. cit. Quam pri-  
mum morbus inuadit concidunt ægri, uoxq; interrumpitur,  
peculiaris morbi nota est oris spuma, non desunt quibus uri-  
na & stercus præter uoluntatem excernitur &c. B. Hæc si-  
gna de uehementi epilepsia intelliguntur, nam in debili non  
omnia adsunt, uide de ijs tamen fusius Arcul. Sauonarolam,  
Gordonium & ceteros practicantes.

De signis humorum lege Auic. prima tertij, tra. 5. ibi, & si-  
gna eius cuius causa est phlegma &c. uide eum fusius nā om-  
nia annotasse, longum ac præter rem foret.

De signis per consensum loquitur, ibi, Qui nō ex propria  
cerebri affectione sed per consensum comitali morbo labo-  
rant, eos citra perpetuam conuulsionem, ueluti, saliendo per  
interualla concuti uidentur. Manardus in episto. 6. lib. tertij,  
Quando per consensum patitur, non accidunt uehementes  
& assidue conuulsiones, sed per interualla breuibus quibus-  
dam saltuosis motibus patiens concutitur. Gal. 5. de loc aff. ca.  
de oris uentriculi affectione, & Paul. lib. 3. cap. 13. Similiter  
Alex. cap. de sacro morbo. Si per consensum stomachi eueni-  
at, cognoscitur ex nimia uentriculi repletione, aut ex ine-  
diā, aut syncopi ex nausea uomitu erosione &c.

#### De cura morbi comitalis.

Id in primis præuidendum est, an in ipsa morbi ex acer-  
batione æger actu sit an extra. Si in exacerbatione, tunc uni-  
ca tantum curandi intentio erit. s. ab exacerbatione liberatio,



quæ fieri potest cum reuulsione uaporum ad alia loca per cu-  
 curbitulas frictiones clysteres suppositoria, aut per odores  
 sensum irritantes, cum castoreo succo cirenaico. i. assa fetida  
 succo rutæ &c. Si uero patiens fuerit extra exacerbationē,  
 tunc considera, nū inceperit, uel incipiēda sit ægritudo, quæ  
 si non inceperit, sed incipiēda timeatur tunc una tantū erit  
 curandi intentio præseruare. s. ne patiens dispositus in hanc  
 ægitudinem incurat, quod fiet si superuacaneas humiditates  
 abstulerimus cum electuario ex saccharo et amygdalino oleo  
 aut sisamino parato, aut si ea quæ a proprietate comitalem  
 morbum expellunt, dederimus sicut peoniam &c. aut infan-  
 tes ab omni strepitu & timore custodierimus, aut si nutrix a  
 coitu a crapula & ab his quæ lac malum generare possunt se  
 se abstinerit &c. Si uero morbus iam dudum inceperit, cau-  
 sam tunc primum inquirito, Quæ si fuerit pituita tanquam  
 maiori ex parte contingens, uide num primariam affectio-  
 nem, aut per consensum efficiat. si affectio primaria sit in ce-  
 rebro uel in uentriculis eius, tunc quinque erunt medendi in-  
 tentiones, Prima uictus ratio, Secunda humoris præparatio,  
 Tertia euacuatio, Quarta reuulsio, Quinta cerebri robora-  
 tio ac residui resolutio, quāquam si ad Galeni dogma acces-  
 serimus, unicus tantum erit curandi scopus qui est obstructio-  
 nis remotio. Victus ratio sit incidens ac extenuans qualis est  
 capparis usus. sit quæ laudabilis chymi, non superflue hume-  
 ctans, cauenda est insuper repletio & mala digestio, semel in  
 die reficiatur ager si tolerat, Caue etiam ne uentriculo pleno  
 superueniat exacerbatio, caueant etiā a crassis carnibus mul-  
 ta supersuitatis, & a leguminibus uinoq; copiosiori, nam  
 paucitas uini dilatat animam, inquit Auic. & excusat a mul-  
 titudine. Itē a uenereis liberalioribus a balneis ante purgatio-  
 nem, a sinapi eo q̄ cerebrum sua acrimonia percutit, caueant



insuper a calore & frigore superfluo a uentis, si possibile sit regionem permutantes, Quies & tranquillitas laudatur & exercitium post euacuationem, Somnus super repletionem uitandus & uigilia superflua nam spiritum resoluunt ac debilitant Preparatio humoris perficitur per ea quae incidendi ac extenuandi uires habent, quale est oximel simplex & compositum scilliticum sy. de absinthio, apozima ex hissopo & origano sy. de stechade, de hissopo rhodomel & c. cum decoctis saluie, hissopi, rutae, maioranae, radicum iridis, scillae, uisci quercini, peoniae, florum rosmarini, stechados, glycyrrizae, acori, passularum, nucis moschatae cinnamomi, betonicae, & c.

Euacuatio erit, si repletio uniuersalis existat cum pituita & nihil aliud prohibeat, per sanguinis a cubito missionem, si minus fiet cum turbito agarico cum hiera ruffi, cum pillulis chochijs fetidis polypodio, Si uero fuerit affectio atrabilaris, cum eleboro, pillulis indis, de lapide lazuli cum myrobalanis & similibus & c. Vel euacuatio fiet cum electuarijs dissolutis in aliquo decocto, sicut cum diaphinicone electuario indo & c. ut supra relatum est in capite cephalae, Reuulsio. i. ad inferiora materiae diductio, perficitur cum cucurbitulis dorso & praecordijs etiam cute incisa affixis, aut enemate ex centaurio colocynthide, additis quibusdam electuarijs ad hoc propositum facientibus ut hiera diacolocynthidos, hiera simplici & oleis & rhodomele, deinde frictionibus lotionibus circa crura, quibus anecte deriuationes quae fiunt per sternutatoria masticatoria gargarismata & c.

Roboratio ac residui resolutio fieri possunt, per exteriora & interiora, remouendo malam intemperiem derelictam, ne ipsa remanente, noua materia denuo agregetur. Interiora sunt diacorus diamus schus dul. confectio pliris arcoticon nic. Theriaca, Mitridatum, Acorus conditus & quaecumque a pra-



prietate occulta conferre dicuntur de quibus plura nobis dicta sunt in fine capituli et sunt peonia ruta corium frontis asini &c. Exteriora sunt sacculi commissuræ coronali & sagittali appliciti ex maiorana stechade ruta peonia nuce moschata, uel fiat eodem in loco sinapismus, aut cauterium aliquod potentiale uel aduale usq; ad ossis superficiem & ulcus per aliquot dies apertum conseruetur. At si per alicuius partis consensum morbus comitialis acciderit, procurandum, ut membri, a quo malus uapor ad caput reptat, mala dispositio removeatur, uel ascensus prohibeatur cum ligatione arcta uel cucurbitulis, uel loci apertione prout magis expediet, deinceps cerebrum ne uapores suscipiat roborandum, & quid susceptum est, resoluendum &c.

Loci consentientes de cura morbi comitialis.

Aet. ser. 6. cap. 13. Cura tempore exacerbationis, erit partes obtortas deligare inungere & dirigere odoribus sensum irritare & perseverante exacerbatione castorium aut succū cyrenaicum ori cum aceto mulso infundere, &c. B. Intellige de his qui post annos pueriles in morbum concidunt. Arcul. de cura epilepsie, Quedam administranda in tempore paroxysmi diuertendo cum fricationibus ligaturis, & suffumigium ex assa cito remouet paroxysmum &c. Vide in hoc ceteros practicanes sicut Gord. Marc. Cat. Sauona. itidem habet Auice. ibi, & finis actionis causæ eius est allenatio a prauitate paroxysmi &c.

De præseruatione lege Mesuen, ibi, præseruant quæcunq; a proprietate retardant paroxysmum, aut prohibent aduentum eius omnino aut occultant sicuti dicemus &c. Auic. prima tertij, tra. 5. Epilepsia in infantibus curetur ita, ut nutrimentum lactantis retificetur, unde lactans alienet a se, omne quod generat lac aquosum aut corruptum aut grossum & prohibe

L 3



at sibi coitum & prægnationem, et alienetur infans ab omni re, in qua est timor et uoces magni sensus ut uox tonitruui fulguris &c.

Razes primo commen. cap. de epilep. Scribit plures medicinas morbum prohibentes, calefacientes. s. & exiccantes, quas etiam habet Auice. loc. cit. & sunt peonia, quæ à Gale. 6. de fac. simp. tantopere laudatur, suspensa uel in potu data, & quæcunq; infra ex mente Dioscori. recitabuntur &c. Quod primum in omni morbo inquirenda sit causa, habes ultra Auicen. & Galeni textum etiam duos Ausonij uersus in quibus omnes fere intentiones curandi habentur & sunt,

Quis morbus, quæ causa facit, qui casus ab illo  
Nascantur, quæ cura modo, quis deniq; finis.

Mesu. in cura epilep. sunt quinq; intentiones, Prima regimen in uita ponit, Secunda equat & coaptat materiam, Tertia abscindit eam &c. in hoc consule non solum Græcos omnes, sed etiam ceteros arabes, nam fusius de his pertractant. De uictus ratione loquitur Paulus lib. 3. cap. 13. ibi, uictus ratio utilis est, quæ incidit & extenuat, idcirco capparitis esus & salsamentum prodest. Auice. prima tertij, tra. 5. Commune est omnibus epilepticis ut utantur cibis laudabilibus quibus inest humectatio laudabilis non superflua, caueant a repletionem et custodiant se a malitia digestionis, Qui uero non tolerant ut semel reficiantur, diuidant cibum suum in tres partes & sumant duas tertias in prandio & tertiam in cena &c. B. Hic Auice. locus effecit ut discrimen illud inter neotericos nasceretur, utrum cena maior prandio esse debeat, sed quum utrinq; robustæ ac ualidæ rationes afferantur, tu tamen aduerte, ne adueniente exacerbatione siue uesperis siue mane quod uenter sit ualde plenus, unde Auice. & oportet ut occurrat paroxysmus cum mundatione stomachi &c.



Paul. lib. & cap. cit. fugere inquit oportet, carnes, legumi-  
na, uinum copiosius uenerem liberaliorem balnea siriapim  
& c. Auic. loc. cit. oportet ut alienent omnes fructus humidos  
& grossos, nisi stypticos super cibum quia roborant stoma-  
chum & repletio uini multū nocet, sed parum ex ipso sum-  
ptum dilatat animam & confortat spiritum & c. Mes. Hy-  
dromel est potus elegantior quam uinum. Auice. & oportet  
ut alienent a se omne acre & uaporosum et uitent cibos gra-  
ues ut sunt raphanus caules baucia. i. pastinacæ & c. lege hūc  
locum fusius & plurima a me dicta inuenies. Cels. lib. 3. cap.  
25. Cauende sunt cruditates lociq; præcipitis conspectus, om-  
nia terrentia, uomitus lassitudo, sollicitudines & negotia om-  
nia & c. De humorum præparatione loquitur Auice. loc. cit.  
ibi & ex syrupis est oxymel squilliticum & similiter sy. de  
absinthio & apozima hissopi cum origano & c. Itidē Mes.  
ibi, adaptant materiā ut eius facilis fiat expulsio qualia sunt  
squilla & acetū eius & oximel & c. Et Paul. auxiliatur his  
oxymel scilliticum quotidie potum & c. De euacuatione loqui-  
tur Aet. ser. 6. cap. 14. Si nihil dicens prohibeat uenam sec-  
care oportet, & intermissis quatuor aut quinq; diebus cor-  
pus reficere, ac sic infra euacuare, maxime per ueratrum ni-  
grum aut colocynthidem & c. Itidem adserit Paul. & Auic.  
ibi, melius quo purgetur illa cuius causa est phlegma est hie-  
ra & pulpa coloquinthidos & hiera hermetis, Quod si cū  
phlegmate est repletio uniuersali tunc phlebotomia secundū  
quod narrauimus est ei iuuatiua & c. De reuulsione & deri-  
uatione uerba facit Mes. cap. de epilep. ibi competunt garga-  
rismata & sternutatoria & proprie uomitus & masticato-  
ria & fricationes & ligaturæ in extremitatibus & uentosa-  
tiones in eis & empla rubificantia super membrum man-  
dans & c. Itidem Auic. & Paul. ibi, synapismus capiti indu-



catur &c. Et Auic. ibi, ex eis uero quæ materiã ad inferiora trahunt &c.

De roboratione cerebri ac residui resolutione habes plura ex Auic. prima tertij, tra. s. ibi, & post illud permuta complexionem cerebri cum confortatiuis calefacientibus ex emplastris & synapi &c. Paul. lib. 3. cap. 13. iubet ad hoc caput esse tondendum & ex peucedani liquore cui spondylium sit incotum cum aceto diluto perungendum &c. Mes. & in omnibus his retificatio cerebri debet esse intentio prima &c. Arcul. unum est ut fiat attractio materierum de profundo capitis ad cutim, ad quod ualet hoc emplastrum & ammoniaci dissoluti cum pinguedine anatis uel milui untias duas fermenti untiam unam sinapis untiam semis cantaridarum. 3. s. peoniæ 3. ij. fiat emplastrum, quo remoto inungatur cum pinguedine milui & iterum apponatur & auferatur, donec crustæ apparuerint &c.

Quæ excitare possunt morbum comitiale.

Excitant epilepsiam Apium & in hoc consentiunt Plinius lib. 20. Auic. Serapio & Mes. Item Alleum Asphaltum, nidor coru capræ uel hirci uel cerui, Item ostracorum & sulphuris suffumigium, lac; omne nocet secundum Serapionem.

Morbum comitiale curantia.

Cardamomum, balsamum populus nigra ficus, iūcus odoratus lepus terrestris mustella, iecur et unguis asini lichē equi, iecur, hirci, hirūdines, lac humanum, coagulum, fel, sanguis, finum, plantago, eryngion, ruta, seseli, libanotis, spondylium, peucedanum, lajserpitium galbanum segapenum, ammoniacum, trifolium, coniza, anthyllis, symphyton, cestron, pentaphylon, uiola purpurea, helleborum nigrum, ampelos leuce, oxymel, acetum scilite, lapis selenites, lapis aetites &c. Confectiones ad hunc morbum idoneæ sunt aromaticum mo



schatum, confectio nic. confectio de moscho, diacastoreū nic. potio sancti Pauli, Pliris arcoticon nic. pillulae inde pillulae Alex. de sex rebus, pillulae ex artemisia &c. Si quis scire uoluerit, quo pacto applicari debeant simplicia legat de singulis Diosco.

Quæ curant a proprietate.

Vgo curantia a tota specie sunt, hepar lupi, hepar milui, pellis frontis asini portata super carne nuda, cingulum ex pelle caudæ lupi, aut frontis eius, uesica apri cum urina puluerizata, omnia coagula & propria leporis, pyretrum conditū, peonia, uiscus quercinus, caput cuculi, oua corui, far smaragdus portatus lapis spongiæ phylipendula in cibis, os hominis &c. De pronosticis morbi comitialis.

Hippoc. aphor. 2. aphor. 48. Quicumq; iuuenes morbo comitali laborant, mutatione ætatis temporum & locorum et uictuum quoq; liberantur. B. i. Quæcunq; possunt patientis temperaturam permutare, ea a morbo ipsum liberant. Et apho. 5. aphor. 7. Quibuscunq; morbi comitiales fiunt, ante pubertatem mutationem accipiunt quibus autem uigesimoquinto commoriuntur. B. Nota q; pubertas durat a. 4. usq; ad. 25. annum. Gale. 3. de loc. aff. cap. de mor. comit. Porro in his omnibus affectibus in quorum numero est epilepsia periculi magnitudinem ex anhelitus nocumento conijcere oportet. Paul. lib. 3. c. 1. 13. Si acutissimus fuerit affectus, tum ob crebras accessiones, tum ob symptomatum uehementiam, statim iugulat. Itidem Aet. & Auice. ibi, & quando continuantur paroxysmi epilepsie interficit &c. Paul. lib. de dinamidijs, Si quis lunaticus spumat & oculos conuertit & fremit & mugit & cadit & membra contraxerit & colorem similem croco habuerit moriturus est Razes. 1. commē. autoritate Hippoc. Multi pueri moriuntur ex eo quia eorum uenæ arctæ sunt &



phlegma plurimum recipere non possunt. Auic. prima tertij, tra. 5. Et quando apostemata apparent in ea fortasse resoluunt eam & minuunt materiam eius, & multotiens mutatur epilepsia ad melancholiam, & multotiens resoluitur propter febres, quæ sunt longæ, & epilepsia melancholica est deterior quam phlegmatica & c.

Michael Sauonarolus inquit q. si infans est genitus tempore menstruorum uel presente epileptico, q. incurrit in epilepsiam incurabilem, sed quur ita sit diuinare non possum, et forte pace sua dixerim, hoc somniauit. Hippoc. de mor. sac. quum inueterauerit, amplius medicabilis non est, quoniam cerebrum pituita consumitur & liquefit, quo liquefacto crebrius corripuntur & c.

Authores dissentientes circa morbum comitalem.

- 1 Adserere, in epilepsia sensum & motum omnino integre auferri.
- 2 Adserere, cum Auerroe causam immediatam epilepsie esse uaporem absq; materia fouente.
- 3 Adserere, epilepsie causam & locum affectum non idem esse cum apoplexia.
- 4 Adserere, epilepsiam per consensum post pubertatem non posse curari.
- 5 Adserere, omnem mutationem ad calidam complexionem & siccam, curare epilepsiam.

Confutatio dissentientium circa morbum comitalem.

Ad primum respondet Gentilis & Auer. 3. collig. cap. ulti. q. in epilepsia in relationem ad apoplexiam, non aufertur sensus & motus omnino integre quia cuiuslibet epilepsie obstructio non est integra. seu omnimoda uti in apoplexia, itidem Gale. & Auic. ut supra.

Ad secundum Auice. prima tertij, tra. 5. impugnat ipsum



Auerroim, probans q̄ pura qualitas sine materia fouente hoc per se efficere non possit, uide tu eius rationes. Hoc idem ait Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Plane constat hanc in cerebro affectionem, consistere, impediēte humore animale spiritum, quo minus possit exire &c. ex quibus uerbis non puram qualitatem, sed potius humorem causam esse conijcere possumus &c.

Ad tertium Gal. aphor. 2. commē. 45. Morbus comitialis inquit est proximus quodammodo apoplexiæ quum idem locus in utroq; patiatur, & idem humor in causa sit &c.

Ad quartum Gal. 5. de loc. aff. cap. 6. Exemplum affert de quodam grammatico qui ex affectu oris uentriculi, morbo comitiali corripiebatur, cui pro bam concoctionem procurans & robustum uentericulum efficiens, simulq; purgans cum hie ra, uiginti annis quibus postea superstes fuit, integra ualitudine, uitam exegit, quæ si uera sunt, sequitur q̄ ea quæ per cōsensum fit saltem si non quæ per essentiam curari possit.

Ad quintum Gal. 2. aphor. comm. 45. respōdet q̄ non quælibet mutatio morbum soluit comitiale, sed ea tantum, quæ calidiorem & sicciorem corporis habitum efficit &c. igitur non quælibet mutatio, sed quæ corpus tantum ad has qualitates peruertit &c.

#### De apoplexiæ descriptione.

Apoplexia est quedam uentriculorum cerebri obstructio, per quam membra motu & sensu priuatur, uel ἀποπλεξία quæ latine dici potest syderatio est priuatio motus & sensus totius corporis una cum lesione principalium actionem de repente incidens, in qua non tantum motus & sensus, sed etiam interdum ipsa spiratio uehementer impeditur, & hæc acutissima est apoplexia.

Loci consentientes de descriptione apoplexiæ.



Auic. prima tertij, tra. 5. Apoplexia est otiositas membrorum a sensu & motu propter opilaticnem contingentem in uentriculis cerebri & in cursibus spiritus sensibilis & motui & c. Gal. lib. finit. med. Apoplexia est detentio mentis cum priuatione sensuum & corporis resolutione & c. Cels. lib. 3. cap. 27. mentionem facit de apoplexia simul & paralesi. Paul. lib. 3. cap. 18 et Aet. ser. 6. ca. 27. describunt etiam apoplexiam ibi est affectio cerebri priuatio motus & sensus totius corporis & c. Similiter Gal. aphorif. 2. comm. 42. ibi, ubi in apoplexia totum corpus sensu & motu priuatur. solus restat anhelitus, Qui si etiam ipse prohibeatur, maxima est & acutissima hæc apoplexia & c. Auer. 3. colliget cap. ult. Apoplexia est quum homo cadit in terram & cessat eius uox & priuantur omnes operationes motus totius corporis & c.

#### De causis apoplexiæ.

Quum apoplexiæ causa sit obstructio ut dictum est, duplex erit obstructionis causa, uel clausio, uel repletio, clauditur cerebrum, uel ex causa uirtutem stimulante unde fugit & contrahit, uel ex causa dolorem inferente, uel ex mala qualitate frigida styptica uentriculos cerebri opprimente, Repletur cerebrum uel ab apostemate calido uel frigido, uel ex materia pituitosa uel melancholica uel sanguinea, raro fit a pallidabile, fit etiam a percussione aut casu, aut per consensum & c.

#### Loci consentientes de causis apoplexiæ.

Auic. prima tertij, tra. 5. Hæc quidem opilatio fit aut propter clausionem, aut propter repletionem, clausio fit quum id ad cerebrum perueniat quod dolorem facit, aut impediat et moueatur motu contractionis, aut qualitas perueniens ad ipsum stypticum faciens & c. Repletio aut est apostemans, aut non & c. lege fusius & cætera habebis. Gal. aphorif. 2. cōm. 42. Omnes autem apoplexiæ, sunt ui animalinon potente



ad partes infra caput existentes defluere, aut propter aliquā dispositionem inflammationi similem, quæ sit in ipso cerebro constituta, aut uentriculis ipsis humore pituitoso oppletis &c.

Paul. lib. 3. cap. 18. origo uitij est ex frigidiore pituita, quæ cerebri principalissimos cerebri uentriculos una uice et cumulatim replet &c. Gal. aphor. 6. commē. 56. Apoplexiæ & conuulsiones fiunt propter humorem pituitosum, aut melancholicum, quoniam communis utriusque est crassitudo, B. hac ratione motus Hippoc. in aphor. 57. eiusdem dixit apoplexiæ fieri a quadragesimo usq; ad sexagesimum, quoniā in his maxime temporibus abundat uterq; humor &c. In reliquis lege Aet. ser. 6. cap. 27. in principio, item Gale. 4. de uic. in morb. ac. commē. 27. & 3. de loc. aff. cap. 7. Item Alex. & Arcul. & Gord. &c.

### De signis apoplexiæ.

Signa præcedentia sunt, dolor capitis, uertigines & scotomie, uenarum circa guttur inflatio, totius corporis tremor & stridor dentium in somno, grauitas ac pigritia, frigus extremarum partium, motus difficilis, urina æruginosa atra & modica. Signa actualis apoplexiæ, sunt quia subito infirmus cadit, & ueluti attonitus iacet uox amittitur cum totius corporis sensu & motu citra febrem, in somno stertit, uocatus non respōdet, nec diuulsis pillis uel stimulo punctus nō sentit.

Signa apostematis sunt febris superueniens dolor &c. Signa loci affecti sunt, quia si fuerit in uentriculis prioribus, aut in meatibus qui *μετωχτες* dicuntur, tunc resolutæ erunt faciei partes, aut odoratus uitatur, si in uentriculis posterioribus, tunc resolutio erit in spinæ principio, Signa humorum non est ut totiens repetantur, quum a nobis alias satis superque relata sint.

Signa quibus apoplexia a subet syncopi epilepsia uteri



strangulatu & a defuncto corpore differat, intelligens ex locis allegandis infra signa eius quæ sit a percussione, aut causa cognosces ex narratione infirmi & c.

Loci consentientes de signis apoplexiæ.

Paul. lib. 3. ca. 18 loquens de signis præcedentibus inquit, Præcedunt capitis turbatio, acutus dolor et iugularium uenarum suspensio, tenebræ oculis offusæ, extremarum partium sineratione algores, totius corporis palpitatio, motus difficilis & dentium in dormiendo stridor, urina eruginosa, atra, modica & c. Et Auic prima tertij, tra. 5. ibi, antecedunt soda & inflatio guidex & c. quæ habet Paulus sed rudioribus uerbis expressa. De signis præsentibus habes locum in Razes. 9. alma. ibi, Quum aliquis quasi dormiens iacet & sine somno stertit & quum pungitur nõ sentit, tunc iam patitur apoplexiam, quantitas ægritudinis est secundum q̄ fortiter, aut debiliter stertit. Oribasius. 2. aphor. comm. 47. Cognoscimus esse apoplexiam dum spumam edit & extensionem molitur & oppressionem & c. Itidem Paul. ibi, Procumbunt. i. attoniti iacent uox incipitur & c. Gal. 1. meth. ca. 9. ibi, si quis tribus horis siue quatuor siue horæ dimidio, toto corpore sit uehementer arreptus, ut neq; sentiat, nec moueatur, hunc apoplecton siue attonitum esse dicimus. Signa apostematis habes etiam ex Auice. prima tertij, tra. 5. ibi, Quæ autem est ex apostemate, non euacuatur a febre & c. B. idcirco febris fit, quia dum pus conficitur, dolores & febres accidunt teste Ippocr. aphor. 2. aphor. 47. Signa humorum peccantium sibi ab eodem et Auic. recitantur ibidem, et illa quæ sit ex sanguine significant signa sanguinis prædicta multis uicibus & est facies rubea & c. Illa uero quæ sit ex phlegmate, significat color & forma oculi & c. lege de his Alexa. Arcul. & Cord. De signis quibus apoplexiam differt a subet & c. loquitur primum Auic. ibi diff. inter apople



xiam et subet est, q̄ apoplecticus clamat & c. Arcul. differt a sincopi, quia facies ueluti mortui & pulsus debilis ualde & sumersus, in apoplexia uero facies et pulsus cōsuetus. Differt ab epilepsia, quia hæc cum periodis, & cum motu conuulsio uo cito soluitur & ad paralesim non terminatur ut apoplexia, differt a uulua strangulatu, quia præfocata sentit audit & habet omnes interiorum sensuum operationes, non autem apoplexia, differt a mortuo per quatuor signa ab ipso recitata sicuti percotum subtilissime carminatum ori ad motum aut per speculum lucidum ac tersum naribus appositum & c. Vide Marc. Catin. Auic. loc. cit. & tardetur sepultura ambigui ex mortuis donec perpendatur eius dispositio & nec sit minus. 72. horis & c. Quur in sepultus tanto tempore remanere debeat, in hoc consule conciliatorem, mihi uidetur potissima ratio, quia in hoc potissimum tempore fætor apparet qui mortuum hominem proclamat & c.

#### De cura apoplexiæ sanguineæ.

In apoplexia primum coniectari oportet, an patiens mortuus sit, an adhuc supersit cum hisdem signis nuper a me recitatis. Deinde si in causa fuerit sanguis, tunc triplex erit curæ di scopus, Primus reuulsio. Secundus euacuatio, Tertius malæ complexionis derelictæ remotio. Reuulsio statim fiet per sectionem uenæ saphenæ aut basilicæ præsertim si corpus fuerit plethoricum, aut solitæ purgationes oppressæ sint, si minus fiet sectio uenæ cephalicæ aut uenæ frontis & sufficiet etiam pro euacuatione. Remotio malæ complexionis derelictæ fiet cum epithemate ex aceto & oleo rosaceo, & hoc in fine, ne in principio morbi facta magis obstruat.

#### De cura apoplexiæ pituitosæ.

Cura pituitosæ apoplexiæ requirit quatuor intentiones, scilicet euacuationem, reuulsionem & derivationem, resis-



dui resolutionem, & sex rerum nō naturalium regimē. Eua-  
 cuatio fit per sectionē uenae si cum pituita signa sanguinis ad-  
 fuerint, si minus statim per pharmacum absq; ulla humorum  
 preparatione, Nam tardare in acutis malum est, aut fiat per  
 enemata, suppositoria uomitoria aut per pillulas chochias fe-  
 tidas de euphorbio cum syro, de stechade aut aquis capiti di-  
 cati dissolutas. Clysteres parari possunt cum decoctis saluiae  
 maioranae, roris marini origani calamenti, centaurij abroto-  
 ni peoniae pulpae colocynthidos additis hieralogodionis cas-  
 siae extrac. Sacchari partibus oportunis & cum oleo camo-  
 millino rutaceo laurino addito sale conficiantur & c. Suppo-  
 sitoria parentur cum u. ratri uel colocynthidos puluere uel  
 cum speciebus hierae picrae sale gemeo & c. Vomitoria fiant  
 cum penna in oleo liliaceo intincta ac gutturi immissa & c.  
 Reuulsio & deriuatio fiet cum cucurbitulis occipitio cū sca-  
 rificatione affixis, modo uires permittant. Item cum ligatu-  
 ris saepe reiteratis & cum apophlegmatismis cum aceto ex  
 origano & thymo decoctis, item cum sternutatorijs cum elle-  
 boro & pipere, aut cum fricationibus pedum com oleo quo-  
 piam calido, aut cum suffumigijs ex castorio oppopanace gal-  
 bano & c. aut cum synapismo aut uesicatorio capiti admo-  
 to & c. Resolutio residui perfici poterit, tum per exteriora  
 tum per interiora. Exteriora fiant cum epithematibus cali-  
 dis quae parantur ex rebus capitalibus, item cum linimentis  
 inungendo cum oleo de costo de euphorbio de castoreo, cum  
 emplastris in quorum numero laudatur emplastrum de sina-  
 pi mes. aut cum cādenti ferro capiti admoto. Interiora per-  
 ficiuntur per confectiōes electuaria pulueres masticatoria  
 gargarismata, nam ad resolutionē simul ac diuersionem haec  
 faciunt. Confectiōes sunt diacori, confectio ana cardina,  
 item quaecunq; calida sunt & sicca febrem euocantia & c.

Victus



Victus ratio sit calida & abstergoria, in principio tenuis atque exquisita, capiatur tantum hydromel uel aqua hordeacea modo sanguinea sit apoplexia, procedatur deinde a tenuissima ad crassiusculam dietam ita ut solo pane patiens uescatur, quousque morbus iam se remittere inceperit, deinde cibus mollis & succulentus concoctu facilis dandus similiter uinum aqua dilutum & carnes exhibeantur. Exercitium ante cibum commendatur uel loco eius fricationes. Somnus modo conceditur, modo damnatur, si fuerit multus, aut si assumpto statim cibo quis dormiat, conceditur uero ex eo quod concoctionem adiuuat & cerebrum roboret et uaporum resolutionem perficit &c. Conferunt etiam quandoque animi accidentia sicuti est irasci &c.

Loci consentientes de cura apoplexie sang.

Auice. aliquando accidit ut homo in epilepsiam incurrat & non sit differentia inter ipsum & mortuum, idcirco in primis considerandum num aeger uiuat uel mortuus sit. Mesu. cap. de apople. Conaberis a princio materiam subtrahere in quantum possibilitas exigit & si sanguineam uideris, utriusque partis illico phlebotoma cephalicam, simul cum emissione multi sanguinis & consequenter crura & pedes uentosari facias &c. Paul. itidem habet lib. 3. cap. 18. ibi, Qui curationem admittunt ijs statim sanguis ex uena detrahendus est eadem die. Itidem adserit Gal. in introduc. ibi, Sanguis statim mittendus &c. Auice. similiter prima tertij, tra. 5. ibi, Regimen illius quæ sit ex sanguine est phlebotomia in hora illa, & missio sanguinis multi, sanat. n. in dispositione. i. cito, & post phlebotomiam clysteriza cum eo quod sciisti de clysteribus, ut deponatur materia a capite &c. De remouenda mala complexionem loquitur Paul. loc. cita. ibi, caput inungatur oleo camomillino uel anethino in quo spondilium decoctum.

M



fit Auic. loc. cit. Et fac ipsum olfacere quod confortet cerebrum & non calefacit, cum eo quod docui te. i. in cap. sode & c. similiter omnes practici in hanc concurrunt opinionē.

Loci consentientes de cura apop. pituitosæ.

Auice. prima tertij tra. 5. Si uero cum ea quæ facta est ex hplegmate inueniuntur signa sanguinis, phlebotometur, deinde clysterizetur cum clysteribus fortibus & supponantur colyria fortia in quibus ponuntur gumæ & fel bouinum, postea bibat quod soluit & c. Cels. lib. 3. cap. 27. proderit malo corporis uel sanguis missus uel aluus ducta & c. Aet. ser. 6. cap. 27. Qui uero ad uenæ sectionem inepti sunt, primum ad uomitum comoueantur & sedes ipsorum illinatur ijs quæ flatu educunt & c. Paul. lib. 3. cap. 18. oportet & ori per uim aperto digitum uel pennam oleo modè factam inserere, ut ea quæ in sunt eijciantur. Auice. loc. cit. Et si possibile est fac eum uomere cum penna immissa gutturi illinita cum oleo liliaceo & proprie quum existimatur q̄ in stomaco aut in eius ore sit repletio & c.

Obiectio.

Cels. uidetur esse huic opinioni contrarius, cū dicat nō oportet in hoc casu uomere, neq; urinam medicamentis mouere.

Responsio.

Intellexit Cels. si neruorum dolor aut tremor, qui quando accidere solet in præsentiarū adesset, quia tremor neruorum ex uomitu magis intenderetur, alioqui uomitum & ipse a cena utilem non proposuisset & c. De reuulsione et deriuatione loquitur Aet. ser. 6. cap. 27. ibi post purgationē cucurbitæ præ cordijs aut capiti affigatur cum scarificatione. Similiter Auic. prima tertij tra. 5. ibi, & non est malum post euacuationem ipsius cum clysteribus & similibus, ut naribus aliquid aproxi metur & proprie condisi & caputpurgia fortia & c. Itidē Paul. loc. cit. ibi, si uires permittant cucurbitulæ occipitio cū



scarificatione defigantur & si fieri potest etiam præcordijs,  
 ualeitudini etiam faciunt quæ sternutamenta excitant & apo  
 phlegmatifini ex thymi & origani decoctis parati & c. De  
 resolutione residui habes plura ex Auic. loc. cit. ibi, & fiant  
 post, super caput eius uaporationes calefacientes sicut ex ane  
 tho amaraco folijs citri calamento origano & c. uel fiant in  
 unctiones ex oleis calefacientibus & confortatiuis, et ignitū  
 ferrū apponatur capiti uel aliquod emplastrū ex resolutiuis  
 q̄ sciisti & c. et hæc de exterioribus, nam de interioribus po  
 stea medicamentis loquens dixit & cum uideris alleuiationē  
 fac gargarismata sternutationes & pone uentosas super col  
 lum & c. De regimine uictus Aet. ser. 6. ca. 27. inquit curandū  
 est ut accipiant cibos quotidie quidem uerum paucos leues et  
 calidos & extersoria ui preditos plerunq; cum melle edulca  
 tos, intellige in pituitosa apoplexia. Auic. prima. tertij, tra. 5. et  
 subtilia regimen ipsius & sis contentus in eo iuleb & aqua  
 hordei. subtili & aqua casei. Intellige in prima die & in san  
 guinea apoplexia, nam de pituitosa postea loquens dixit &  
 potus eorum sit aqua mellis et panis cum ficibus siccis est bo  
 nus eis, quidam uero dicunt ex eis esse bonum origanum cum  
 lentibus & uux passæ & amygdalæ & ficus sunt ex fructibus  
 conuenientibus eis & c. Paul. lib. 3. ca. 18. ubi morbus se remis  
 serit cibus mollis distribui facilis succulentus assumetur &  
 paulo infra uinum tenerum, calente aqua temperatum potui  
 exhibebitur & c. Auenzoar sint carnes syluestres non in do  
 mibus pingues factæ, unde passeret & omnia minutarum au  
 um genera in declinatione morbi conueniunt. Auic. loquens  
 de uino inquit non nouum sit ob eius superfluitatem non anti  
 quum ob uelocem eius penetrationem, sed inter utrunq; eo  
 rum magis erit conueniens intellige inclinato morbo, nam in  
 principio nusquā cōuenit. Cels. lib. 3. ca. 27. potus sit sine uino.



aquæ calidæ. i. in principio Auenzoar, nec potent aquam frigidam, nec aqua per se, sed aquam tepidam cum sy. corticum citoniorum cum melle, si uero dederis uinum da solum untiâ unam in fine pro confortatione membrorum & c.

De motu loquitur Auic. ibi, Quñ aut uoluntas adest, ut cænet, nō est malū, si ante, præmittatur exercitiū leue et moueant mēbra laxata motu aliquo & c. Paul. gestentur ægri curru aut lectica aut lecto pensili & c. De somno & uigilia Auic. dixit, Quum aliquid assumūt, non dormiant super ipsum uelociter, sed expectent aliquantulum donec descendat & digeratur digestionē aliqua, Nec etiam plurimum uigilent, illud. n. iuuat cerebrum & resoluit ex cibis uaporem non digestum prohibentem digestionem & c. B. Hinc pende quorundam errores qui nullo pacto apoplecticum dormire permittunt, caueat tamen etiam medicus ne ex hac Auice. licentia ægrum in somno postea perdat, unde aprehenso manibus pulsu si nimis sentiat calorem profundari, statim infirmum excitet, ne amplius dormiat & c.

#### Observationes de sectione uenæ.

Aet. ser. 6. cap. 27. Copia sanguinis qui detrahatur, diuidatur, commouere. n. tantum oportet, non uires exoluere & calorem extinguere & c. Marcus Catinarius ne secus uenas guidet. i. iugulares sicuti præcipit Razes, nam difficillime consolidantur, & recitat historiam de quodam scholari in his uenis uulnerato qui mortuus est. Paul. 4. de uic. in morb. ac. cōmen. 27. primum ante sectionē uult per omnes corporis particulas, frictiones fieri ut sanguis extenuatus facilius exeat & c.

#### Observationes de topicis.

Auic. prima tertij, cap. de apople. & oportet ut incipias a debiliori unctione, si confert & si non, adde & permuta ad id quod est fortius.

Obiectio.



Auic. primo can. fen. quarta, cap. 1. In forti morbo debemus, inquit, a fortiori medicamento incipere, quomodo hic adserit contrarium. Responsio.

Tue obiectioni respondet Concil. differentia. 154. inquiēs esse hanc curam Auic. tentatiuam & c. Vide eum fusius si libeat.

#### Observationes de potu.

Auic. loc. cit. & potus super cibum est ex rebus magis nocitiuis, ac si diceret a prandio uel a cena nullo modo bibant & c.

#### Apoplexiam excitantia.

Excitant apoplexiam fungi mandragora & pomorum nimius usus & odoramentum.

#### Apoplexiam curantia.

Conferunt apoplexie absinthium, anacardus, acorus, betonica, colocynthis, gallie odoramentum, euphorbium, pistrum, confectio anacardina, theriaca diatefferon, theriaca magna, hieralogodion, & quaecumque dicta sunt in capite epilepsie huc referantur, Vide insuper aggregatorem cap. de apop. Item Guilielmum, & Varignanam, capite proprio, Item consilia Bertholamei Montagnani, praesertim ubi de epilepsia loquitur & c.

#### De pronost. apoplexiae.

Hippoc. aphor. 2. aphor. 42. Soluere morbum quem apoplexiam uocant fortem, impossibile, debilem uero non facile. B. Fortis apoplexia magna ex parte curationem non admittit, ob respirationis lesionem, aut uirium imbecillitatem, debilis uero non facile, quia terminatur in paralesim. Vnde Auic. Paul. Aet. Razes, ut plurimum in paralitidem terminatur & c. Et aphor. 6. aphor. 51. Quicumque sani a dolore capitis de repente capiuntur et incurrunt apoplexiam, ij in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. B. Intellige si dolor fiat a spiritu flatuoso, & apoplexia a materia pituitosa



sa, quia tunc febris superueniens dispositionem soluit calefaciendo extenuando ac resoluendo spiritum flatuosum et humorem pituitosum. Pereunt in. 7. inquit Gal. quia pars principalis non diu tollerat for̃es simul & diuturnas passionēs. Auic. prima tertij, tra. 5. Et quum acciderit febris tunc spes sit, ut cum ea resoluiatur superfluitas &c. Aet. ser. 6. ca. 27. exhibet spem salutis ipsa calamitas febris. Paul. lib. 3. cap. 18. Apoplexie morbus nequaquam aut raro curatur, ut qui minetur mortem in propinquo. Si uero etiam remedia admittat plurimum cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit &c. Razes. 9. alman. Si spuma ab ore exeat, non est ei medicamen, adijcit his Arcul. q̃ si admotis ualenter sternutationē mouentibus & nō stertat neq; impressionem sentiat, quod est mortale &c. Cels. lib. 3. cap. 27. post sanguinis missionem, si non reddit motus & mens, nihil spei superest. Gal. lib. de dynamidijs Apoplecticus quum ex multis rebus desiderat sibi cibum afferri & potum, & statim hæc abominatur, mortem sibi imminere significat. B. In hoc tamen tu considera rorbur uirium & æquum iudica &c. Auic. loc. cit. Et scias q̃ plurimum accidit apoplexia habentibus ætates & corpora & regimina humida & proprie quum adest cum humiditate frigus, si autem accidit cum caliditate complexionis et siccitate, tunc est res praua, ægritudo enim contraria complexionis nō accidit nisi propter magnam causam &c. Cum senī etiam accidit uertigo comitans, iterata, tunc illud nunciat apoplexiā &c. Mesu. cap. de apople. inquit illico ad ministretur omnis cura, nam dilatio ducit ad mortem festinam, quum morbus per se parum curam recipiat. Idcirco cum protestatione mortis medicus se ad curam intromittat.

Autho. dissentientes circa apoplexiā.

8 Adserere, apoplexiæ species esse tamen tres ut Auic.



- 2 Adserere, apoplexiam a frigido tantum humore fieri & non a calido.
- 3 Adserere, in apoplexia musculos pectoris ob necessitatem respirationis moueri.
- 4 Adserere, apoplexiam a nudo et simplici frigore posse fieri cum Auic.
- 5 Adserere, in acutissima apoplexia omnino deficere spirationem.
- 6 Adserere, apoplexiam fortem nunquam posse curari.

Confutatio dissentientium circa apoplexiam.

Ad primum quacunque sunt quatuor non sunt tres tantum, sed species apoplexiæ sunt quatuor per Gal. aphor. 2. cōm. 42. igitur non tres tantum q̄ sint quatuor, ibi enarrat Gal. dicens q̄ prima est quum anhelitus prohibetur, Secunda est quum respiratio fit cum magna ui, Tertia est quæ nec intentum nec uiolentum, sed inæqualem ac exordinatum ac præterea intermittentem habet anhelitum, Quarta est in qua anhelitus aliquem seruat ordinem & est debilior & cito curatur.

Ad secundum respondet Auic. 3. can. q̄ causa apoplexiæ potest esse sanguis et pituita, Quare non solum a frigido, sed etiam a calido humore fiet. Item Gal. lib. de sang. miss. cap. 6. apoplexiæ proueniunt multo nimirum sanguine in principium animantis confertim incumbente, itidem ait. 4. de uic. in mor. ac comm. 27. & in lib. introd. siue medico appellato & sic etiam a calido fiet.

Ad tertium Gal. aphor. 2. comm. 42. Verum in apoplexijs nō ob id quod sit adaucta necessitas respirationis, sed quia uis est imbecillis, idcirco muscoli pectoris coguntur operari & c.

Ad quartum respōdet Gale 2. de loc. aff. cap. 7. ibi, apoplexia q̄ subito eueniat, aut frigidum aut crassum aut uiscidum quidpiam quod principes cerebri uentriculos affatim implet,



non autem totius substantiæ intemperiem, causam esse manifestum est. Idem confirmat Aet. ser. 6. cap. 27.

Ad quintum Gal. 6. de loc. aff. cap. 4. quippe in confesso est & spirationem a uita & uitam a spiratione, seperari non posse, adeo ut uiuentem non spirare & spirantē non uiuere, sit impossibile, igitur spiratio omnino non deficit, nisi uellemus apoplexiam mortem appellare, uerum ut ipse inquit Gal. adeo potest esse exigua ista respiratio ut sensum omnino effugiat, itidem ait. 4. de loc. aff. cap. 7. & c.

Ad sextum Gal. 2. aphor. comm. 4. 2. Videtur inuere q̄ interdum possit curari, per id quod dixit magna ex parte curationem non admittit, Præterea regulæ medicorum non semper sed ut in pluribus intelliguntur, igitur interdū curabitur. Præterea Hippoc. 6. aphor. 51. apho. inquit apoplexiam forte in septem diebus ægrum perdere, nisi febris apprehenderit, igitur febre superueniente curatur. Quod uero de forti apoplexia intelligat lege Gal. in comm. ibi, mutos solet Hippoc. nominare & c. Item Auic. prima tertij, tra. 5. cap. de apople. accidit inquit ut homo epilepsiam incurrat & non sit differentia inter ipsum & mortuum & non apparet anhelitus, deinde reuiuiscit & sanatur, & tamen intelligit de forti apoplexia, igitur & c.

#### De paralytidis descriptione.

Quum Paralysis binas habeat descriptiones propriā. scilicet communem. Ista erit propria paralysis est mollificatio totius medietatis corporis cum priuatione sensus et motus, communis est ista paralysis est ablatio uel diminutio in sensu & motu uoluntario, aut mixto in aliqua corporis parte, non in toto, motus ubi deperditur & si sensus integer remaneat semper paralytidem efficit. Quir autem interdum remanente sensu solus amittatur motus et econtra triplices assignantur



causæ, Prima quia ex paucitate spiritus, motus potius quam sensus deperditur, Secunda quia aliqua materia est in nervis motus & non sensus, Tertia quia temperies pro uno magis quam pro alio corrumpitur, nam si corrumpatur ab humido motus deperditur, si uero a sicco sensus &c. In hoc morbo interdum cerebrum, interdum nervi musculi ad motionem deputati afficiuntur, quod si materia obstruens in ambobus cerebri uentriculis foret, tunc apoplexia diceretur, si uero in uno tantum latere, hemiplexia, si in parte nuچه omnes corporis partes præter faciem resoluuntur, si in parte spinæ siue dextra siue sinistra fiat obstructio, tunc in ea parte erit resolutio &c.

Loci consentientes de descriptione paralytidis.

Quod binæ sint paralytis descriptiones, lege Auic. secunda tertij, cap. de paraly. ibi, Paralytis quanquæ dicitur sermone absoluto, quanquæ sermone proprio &c. Gale. lib. finit. med. Paralytis est affectio uoluntarium motum offendens in partibus uel parte quadam contingēs. Item Prorrh. 3. comm. 26. paraplegia talis est affectio unius partis corporis qualis paraplexia totius &c. Et quarto de sympt. cau. cap. 5. si nervi a principio fiant stupidi, deinde omnino sensum & motum amittant, paralytis. i. nervorum resolutio dicitur. B. Pende ex hoc loco q̄ paralytis a stupore non differt nisi in magnitudine. Auic. secunda tertij, cap. cit. & multotiens remanet cum ea sensus, quoniam materia est in nervis motus & sensus, & una est causa, quare motus deperditur &c. Vide de his latius Auic. loc. cita & Arcul. De loco affecto loquitur Gale. 3. de loc. aff. cap. ult. Igitur quemadmodum ubi uniuersa corporis partes quæ sub facie constitutæ sunt, resoluuntur, faciei partibus illesis, affectionem in spinæ initio esse certum est, quod si hæ quoq; afficiantur, cerebro noxam iam illatam esse osten-



ditur. Aet. ser. 6. cap. 27. plura habet de his, ibi, si omnes nervi sensum & motum amittant &c. Itidem Paul. lib. 3. cap. 18. adserit lege etiam Gale. 4. de sympt. cau. cap. 5. fusius, item 4. de loc. aff. cap. de linguæ aff. ibi, Quum utraq; cerebri pars &c. Item Auic. loc. cit. ibi, si materia aut læsio fuerit &c.

#### De causis paralytidis.

Causæ sunt tres, Primitivæ antecedentes & coniunctæ, Primitivæ sunt regimen frigidum & humidum in sex rebus non naturalibus, Incisio nervorum, dislocatio spondilium, ligaturæ comprimentes, percussio in partibus nervosis, & accidentia animi ut timor ira, Item ægritudines præcedentes sicut apoplexia epilepsia colica uteri strangulatus &c. Causæ antecedentes sunt quatuor humores, inter quos plerunq; in causa est pituita interdum sanguis, raro melancholia, rarissime omnium bilis, nisi alijs humoribus admisceatur. Causæ coniunctæ sunt repletio, vel inanitio, vel apostema in principio nuchæ, vel in una parte actu contenta obstruens, item immoderata temperies frigida & humida cū materia et sine materia, licet etiam immoderata temperies calida & sicca sensum & motum ex sua immoderantia debilitet &c.

#### Loci consentientes de causis paralytidis pri.

Auic. secunda tertij, tra. 1. cap. de cau. paraly. de causis primitivis loquitur, ibi, porrorum contractio quandoq; accidit propter ligaturam, aut quandoq; fit ex compressione vehementi sicut accidit apud percussione[m] aut casum, aut accidit quū declinant spondiles & rumpuntur &c. Item incisio quæ est in latitudine prohibet sensum & motum in membris & cui accidit percussio & ictus, aut motus subito ex timore pauore ira delitijs angustia amittitur &c. Gale. itidem ait. 4. de sympt. cau. cap. 5. ibi, idq; vel ob luxatam quandam uertebra[m], vel alio quouis modo, si quidem ingens fuerit affectus partes.



inferiores subito & sentiendi & mouendi facultate priuantur &c. De casu & percussione habes ex Gale. 3. de loc. aff. cap. ult. exemplum de pausania syro, qui ex casu in initio dor si laesus duos sinistrae manus digitos amisserat &c. Similiter habes ex hoc capite Gale. plura de incisione spinæ. Gale. 5. de sympt. cau. cap. 2. Corripiuntur qui uehementer fuerunt refrigerati, & qui se meraco uino ingurgitarunt, & qui diu in otio uixerunt, & qui intempestiue multam aquam frigidam biberunt &c. De causis antecedentibus habes Aet. ser. 6. cap. 28. ibi, conflatur hæc affectio humoribus multis uiscosis ac crassis, neruos obturantibus per quos motus uoluntarij perficiuntur. Auic. loc. cit. & scitum est quod destructio motus & sensus fit quoniam spiritus sensibilis aut motuius retinetur a penetratione ad membra &c. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ubi uero deperdito sensu quis conciderit, non accidente motu, quo uel conuelli uel salire uideatur, id a uehementi frigore ortum trahere sentio &c. Et aphor. 5. comm. 17. Immodicum frigidum hæc facit, conuulsiones distentiones ob neruorum refrigerationem &c. De causis coniunctis loquitur Auic. secunda tertij, cap. cit. ibi, & paralysis faciens abscissionem spiritus a membris, aut est repletio aut apostema, aut solutio singularitatis &c. Gal. aphor. 2. comm. 20. loquens de immodica intemperie inquit, quoniam omnis immodica intemperies, imbecilem reddit aut exoluit operationem propriae uirtutis. Et in lib. introd. siue med. Hemiplexia fit ex humorum crassorum copia, qui capitis uasa, unde corpori sentiendi mouendiq; facultas aduenit, obstruunt. Itidem adserit. 3. apho. comm. 23. in fine commenti loquens de apoplexia. Paul. lib. 3. cap. 18. si partes resolutæ conuellantur, uel relaxentur, id ab inanitione uel repletionem proueniet &c. Huc etiam spectant quæcunq; de causis apoplexie nuper recitata sunt &c.



## De signis paralytidis.

Quum quis sensum et motum in una parte, uel in pluribus corporis partibus amisserit, tunc paralitidem pati dicimus. Signa si fiat a primitiuis causis habentur partim ex relatione infirmi, partim ex quadam coniectura. Signa ex causis antecedentibus, si sint humores cognoscuntur, quia si sanguis, adest inflatio uenarum, totius repletio, oculorum rubedo &c. Si pituita, adest albedo mollities, urina alba, pulsus debilis tardus &c. Signa ex causis coniunctis, si adsit apostema, cognoscitur, ex febre, dolore, tumore & duritie in loco percepta, si immodica intemperies cum materia replens cognoscitur ex tactu, uel ex his quæ inuadunt & nocent, item ex habitudine, uictu præcedente & similibus &c.

## Loci consentientes de signis paralytidis.

Razes. 9. alman. Quum aliquis se mouere non ualet, aut unum, aut plura membra ex suis & sensum illius membri siue membrorum amisserit incurrisse paralytim pronunciamus. Auice. secunda tertij, tra. 1. cap. de sig. paraly. illa quæ est a tortuositate, aut a casu & percussione, aut sectione cognoscitur ex præcedenti causa. Et primo lib. fen. secunda cap. de signis dominiij humorum & loco citato habet omnia signa humorum præsertim ibi, & si materia est cum sanguine significat eam guidere & uenæ et oculus & repletio &c. lege fusius in hoc loco et intelliges cætera a me dicta, lege etiam Arcul. et Gord. & Sauona. & Auic. ibi, si fieret ab apostemate calido tunc extensio & febris &c.

## De cura paralytidis.

Ad curationem quinque expediunt, uidelicet uictus ratio, humoris præparatio, euacuatio, reuulsio & deriuatio, residui resolutio & membrorum roboratio. Victus ratio sit attenuatoria sicca non uiscosa, non uirosa, sed uentri accommoda,



urinam ciens, in quantitate modica, utatur his, quæ roboran-  
di nervos facultatem habent, tolleranda est fames & sitis, in  
potu exhibeatur hydromel potius quam uinum, nam materi-  
as ad nervos uinum penetrare facit & procul sit acetum, nã  
ualde nocet, in morbi recessu, uinum antiquum paucum ex-  
hiberi debet eo q̃ calefaciens & exiccans ægritudinibus ner-  
uorũ confert. Similiter & frictio & gestatio in lectica, aut  
uehiculo & balnea commendantur. Humorū præparatio  
fiet cum calefacientibus & exiccantibus ut puta cum hydro-  
melle syrupo de stechade rhodomelle cum aquis saluie beto-  
nice rosmarini, huc etiam spectat oxymel simplex sed ratio-  
ne aceti cum syrupo mellino rectificandum est. Euacuatio fiet  
per ea quæ redundantẽ humorem euacuãt, ut cum hiera simp.  
& composita, hiera hermetis hiera logodione, nec ab re exi-  
stimare, si a uenæ sectione inciperemus, moderatamq; detra-  
ctionem moliremur, ut ne agri nimis perfrigerentur, fiatq;  
detractio per antithesim, a sanioribus partibus, nisi quid ali-  
ud impediât. Reuulsio & deriuatio, si ea quæ a cerebro ad  
nucham confluunt ad alias regiones trahamus cum cucurbi-  
tulis affectis partibus affixis, enematibus masticatorijs, erinis  
sive sternutatorijs frictionibus & his similibus. Resolutio resi-  
dui paratur per exteriora & interiora. Exteriora fiunt lini-  
mentis ceratis emplastris & balneis. Linimenta parẽtur cū  
oleo camomillino de spica, de costo de terebinto, uulpino, de  
castoreo & c. Cerata similiter fiunt cum puluere lumbricorũ  
galanga piretro castoreo additis oleis cera & pice empla-  
stra prosunt quale est emplastrum de sinapi Mes. uel fiant cū  
herbis capitalibus additis oleis & aliquali farina. Balnea cõ-  
ferunt tam naturalia sicut sulphurea quã etiam arte parata.  
Interiora sunt electuaria, confectiões pulueres & similia.  
Electuaria sunt diamuscus dulcis, Theriaca & omnia deniq;



quæ calefaciunt siccant & resoluunt. Confectiones sunt deco-  
rus conditus, Pulueres camapitheos stechados & c.

Loci consentientes de cura paralytidis.

Aet. ser. 6. ca. 28. loquens de dicta inquit, sit attenuatoria ue-  
tri comoda nihil uiscosi aut uirosi habes & c. Paul. lib. 3. cap.  
28. cibi conueniunt ad concoctionem expediti, nec recremen-  
titi, & paulo infra uictus siccior utilis est potio modica &  
frictio & c. Mesu. ca. de paralyti, utantur cibis qui proprietate  
habeant confortandi neruos qualia sunt grana pini, leporis  
cerebrum origanum hissopus piper gingiber sansuccus salvia  
& c. hoc intellige in causa frigida et in processu morbi. Auic.  
secunda tertij, stude ut facias pati famem, & ciba cum cibis  
siccis & fac tollerare sitim & in secunda mensa, iuuat uti  
medula nucleorum pini & scias q. aqua melior est eis quam  
uinum, nam materiam in neruis penetrare facit & ut pluri-  
mum atescit, acetum uero est ex rebus quæ sunt neruis nocibi-  
liores & c. Conciliator diff. 144. Non competit uinum si ma-  
teria cruda & in fluxu sit, si uero digesta & facte sint euacua-  
tiones. paucum uinum antiquum confert, nam materias resol-  
uit & exiccat. B. Nota paucum dixisse ex eo q. Mes. dicebat  
scito uinum esse neruis inimicum et oculis p. se, Ipsius. n. abusus  
causa est morbi per se, Itidem. Auic. loc. cit. Paul. uomitus a  
cena conuenit, item gestationes curru lectica aut uehiculo  
& c. De preparatione humorum meminit Auic. secunda ter-  
tij, quando dixit, & in hac hora sis contentus rebus subtili-  
bus ex his quæ leuiter digerunt & soluant, unde dixerat q.  
quandoq. exhibetur oxymel cum sua dispositione & oppopa-  
nacum cum syropo de melle & c. Aet. ser. 6. cap. 28. utendum  
est etiam potionibus relatis ad morbum comitalem, q. uero  
per potiones intelligat syrupos & ea quæ incidendi uim ha-  
bet, manifestum est ex his quæ ab ipso supra relata sunt & c.



Mesu. Adequatio fit materiei, cum administratione rerum morbi materiam carminantium maturantium &c. Vide de hac preparatione humorum plura iuxta neotericos practi-  
cantes &c. De euacuatione facit mentionem Aet. ser. 6. cap. 28. ibi, Manifestum igitur est, quod redundantem humorem euacuare oportet, nec aptius principium in his reperire da-  
tur quam uenæ sectione, si permisserit ætas habitus tempus prægressus uictus &c. oportet autem moderatam detractio-  
nem facere ut ne perfrigerentur, Quapropter minuenda est materia paululum, detractio uero fiat a sanioribus partibus &c. Auic. In illa autē in qua est spes oportet incipere a phle-  
botomia &c. Paul. loc. cit. Quoniam partes resolutæ uel con-  
uelluntur uel relaxantur, idq; a repletionē uel inanitionē, atten-  
dēdum rursus est partim sanguinem detrahi debere partim non &c. Mesu. cap. proprio euacuatio fiet cum administra-  
tione priorum euacuantium, sicut cum hiera diacolocyn-  
thidos pillulis fetidis hiera hermetis &c. Similiter Aet. loc. cit. Interpositis diebus alius subducatur, primum clysteribus,  
deinde per aloes & polypodij & colocynthidis cremorem,  
conuenit etiam hiera archigenis &c. De reuulsione loquitur  
Auic. ibi, oportet ut clysterizentur enematibus fortibus &  
colyria fortia supponantur ut inclinentur eorum materia ad  
inferiora, confert etiam positio uentosarum super capita  
lacertorum absq; incisione, sed post euacuationem &c. Simi-  
liter Aet. ser. 6. ca. cit. post purgationem cucurbitula affectis  
partibus adhibeantur, si uero hæ ineptæ sint uicinis affigan-  
tur &c. & paulo post detracta materia etiam sternutatorijs  
& pituitam per os ducentibus utendum est &c. Itidem Paul.  
lib. 3. cap. 18. asserit, Mesu. cap. de par. Diuersio completur cum  
gargarijs masticationibus caputpurgijs et sternutato-  
rijs &c. Quomodo autem hæ fiant habes supra de cepha-



lea a causa frigida &c. De resolutione residui Auic. secunda tertij, cap. cit. Cumq; membrum reddit ad se, oportet, ut ipsum excites post id & constringas ipsum, ut ad integram redeat sanitatem &c. & paulo infra portet ut resolutio fiat, cum aliquibus quæ sint ut anisum sigia .i. storax liquida & castoreum, & supra dixerat q; emplastrum de sinapi est ex eis quæ ipsis cōferunt, & fricatio cum oleo et nitro & aqua sulphurea & administratio acori, & q; nihil est ita conferens ut theriaca & mitridatū, & assa fetida est uehementis iuuamenti bibita uel linita &c. Mesu. Vltimam rem complent, unctiones emplastra fricationes & balneum &c. Aet. loc. cit. laudat ad resolutionem residui unctiones quatuor fieri, unam circa cavitatem occipitis, tres in uertice, ex quibus inquit non despero perfectam restitutionem &c. Paul. lib. 3. cap. 18. Cucurbitulæ resolutis partibus, agglutinentur, si paucae fuerint distinctim, post cucurbitulas delinantur medicamenta ex pice resina &c. Vide etiam Auic. ibi, quandoq; iuantur a febre & a balneo sicco &c.

#### Observationes de humorum præparatione.

Marcus Catinarius cap. de par. Cauendum est inquit ne nimis præparemus cum fortibus digestiuis, nimium calefacientibus, usq; ad quartam diem, sed gradatim procedendum a debilioribus ad fortiora eo q; magis materiam dilatant quam præparent.

#### Observationes de euacuatione.

Auic. secunda tertij, & non properes in usu medicinarum fortium in principio rei, imo tarda usque ad quartum & septimum, Quod si fuerit egritudo fortis usq; ad. 14.

#### Obiectio.

Quur Auic. & Mes. incipiunt a debilioribus, Quum Razes dicat cuius curam incipiemus cum pillulis fetidis, quæ inter



ter uehementia pharmaca reputantur.

### Responsio.

Intellige ad utriusq; concordiam, q; hic coacte, illi magis regulariter procedunt, Paul. incipit a semi dracma hieræ & interpositis diebus exhibet integram drachmam, dehinc unā & semis postea duas atque tres. B. Notandum est etiam ex Pauli & Aetij textu q; in hoc morbo interpolatim medicinas exhibeamus, ne natura medicinis assuescat & laxetur. Idcirco diebus interpositis, modo uno, modo altero medicamento uti præcipiunt, & Interim uires resumendas iubet & c.

### Obseruationes de resolutione.

Auic. ca. de cur. par. Et ubi necesse est, resolvere oportet, et non sint resoluētia cum lenificatione pura, sed cum aliquantula stipticitate, quia laxantia substantiam membri debilitāt, & resoluētia spiritum resoluunt, idcirco cum stipticitate fienda & c.

### Obseruationes de topicis.

Galenī est placitum. 3. de loc. aff. ca. ult. Vt consideretur locus originis neruorum, unde exemplum refert de pausania Syro Auic. loc. cit. Positio medicinarum super locum paralyticatum est ex eis quæ non afferunt iuuamentum, de quo sit curandum sed oportet cognoscere originem neruorum & c. & oportet cum resoluētib; procedere a debilib; ad fortiora, & cum medicatur cum calidis augmentatur ægritudo quoniam materia subtilis dilatatur per ea plurimum, idcirco oportet miscere cum in frigidantibus aut tēperatis ut est succus liquiritiæ, et de emplastris loquens dixit, Quūq; sensus est debilis fortasse emplastrum forte nocet, & non sentit id & ducit ad lesionem et ulcerationem fortem, oportet igitur ut omni custodia ab illo caueatur, & ut consideretur dispositio impræssionis emplastri & c. Paul. lib. 3. ca. 18. In relaxat



tis quidem mebris adstringentia, ijs quæ laxant miscere & frictionem intensam moliri couenit, inconuulsis uero laxantibus duntaxat, utendum est, & frictione molli &c.

Paralytidem generantia.

Generant paralytidem uapor argenti uini, carnes porci ne, & tubera.

Paralytidem curantia.

Faciunt ad paralytidem & a proprietate tam occulta quàm manifesta ualent, abrotanum, chamepitij, uetonica, salvia aristologia, artemisia, costus, maiorana, matersylua, colocynthis, laurus, rosmarinum, acorus calamentum, origanum, hisopos, mellissophilon, rutha, sauina, mel cinnamomum, anacardus, assa, helleborus, pyretrum peucedanum, diptamus, cyclamen, ceratum alexandrinum, aqua sulphurea, aluminosa, unguetum de bdello mes. unguentum basilicon mes. unguentum marciaton nic. oleum de piperibus, de cinnamomo, de citro, oleum laterinũ, uulpinum de costo, de terebintina, de sinapi, de piretro nic. pinguedo gliris, blãcha nic. confectio piretri mes. cap. de epileps, confectio anacardina mes. cap. de agri tud. neruorum diambra Auic. in. 5. tra. diacalamentum, diacastoreum nic. sy. de stechade, theriaca, hiera ruffi, hiera hermetis, hiera logodion, hiera picra, confectio de musco, diapliris arcot. nic. Pillula fetide, de euphorbio &c. roborant neruos nuclei pinearum conditi, castoreum, nux indica, pœonia &c. Vide Varignanam in lib. de secretis ca. de paral. Itẽ Barth. Montagnanam conf. 48. Item Arcul. & Sauon. cap. de cur. paral. Vide etiam Gord. & alios practiçantes.

De Pronosticis paralytidis.

Paul. loc. supra cit. Quæ a nerui diuisione oritur particularum resolutio, insanabilis est, quæ uero a temperie uel ab humore, commune ex facultatibus prædictis præsidium recie



pit. Auic. secunda tertij, cap. cita. Vrina infantis si sit uiridis nunciat paralytim siue spasmm, & paralytis eueniens a remotione spondilium mortifera est secundum plurimum. B. Ratio est quia spondiles eos nervos, qui a se exeunt, facile comprimunt, qui nisi ad suum locum reducantur, insperata est salus. Cels. lib. 3. cap. 27. Morbus qui fit in partibus, nunquam acutus, sepe longus & fere sanabilis est. Razes cap. de paral. Quod si paralytis ex percussione aut casu euenierit, & accidit subito, ita q. nerui aliquantulum contundantur, taliter permanebit, nec unquam sanabitur. B. intellige nisi sit in etate in qua membra spermatica restaurari possint. Hippoc. 3. prorrh. Paraplecticis parotides uitiosae. B. Parotides sunt abscessus post aures, uitiosiq. sunt quia ad inferas partes non deuoluuntur sicuti ceteri abscessus boni. Auic. loc. cita. Et quodcunq. membrum molliciatorum & paraleticorum secundum colorem reliqui corporis existens, non minoratur nec extenuatur, est, de quo maior habenda est fiducia, quam illud quod est diuersum ab hoc, nam quum minoratur, aut extenuatur, signum est quod non nutritur & c. At si nihil horum acciderit bene sperandum. Item febris superueniens soluit paralytim. B. intellige si ab humiditate & frigidity fiat. Arcul. Tremor & dolor in paralyti superueniens bonum, si uero paralytis annum pertransit, ut plurimum non recipit curam. B. intellige tremorem & dolorem idcirco esse bonum indicium, quia ubi tremor & dolor, ibi, est sensus & motus & c.

Authores dissentientes circa paralytidem.

- 1 Adserere, tunc resolutionem uocari, quum sensus deperditur, & non motus.
- 2 Adserere, impressionem sensus in membris, a calore impediri.
- 3 Adserere, frequentem usum calidorum mirum in modum prodesse neruis.



4 Adserere, uehementia pharmaca in principio curæ paralytidis conuenire.

5 Adserere, tunc paralytim uocari, quom uis sentiendi et mouendi omnium neruorum amittatur.

Confutatio dissentientium circa paralytidem.

Ad primum respondet Gal. 3. de loc. aff. cap. penult. dicens q. neruorum tunc uera exit resolutio, ubi motus deperditur, ubi uero aliquarum partium sensus perit, eam partem sensus expertem uel stupidam potius dicimus quam resolutam.

Ad secundum dicit Auic. secunda tertij, tra. 1. q. membra sensus non recipiunt impressionem propter complexionis corruptionem, complexio uero corrumpitur a calido, aut frigido, aut humido aut sicco, sed calidum inquit non prohibet impressionem sensus &c.

Ad tertium Hippoc. aphor. 5. aphor. 16. Calidū inquit ubi eo sæpius utatur, hæc mala affert, carniū effeminationem neruorum incontinentiam &c. Vbi Gal. in comm. intelligit neruorum imbecillitatem fieri, eorum substantia a calore dissoluta & sic calidi frequens usus neruis nocet substantiam neruorum dissoluens.

Ad quartum communis est opinio, ut regulariter procedendo non euacuemus cum uehementi pharmaco, maxime quum paralysis de materia pituitosa non sit morbus acutus, sed ubi subitanæ mortem minetur, coactæ cum uehementi pharmaco purgabimus.

Ad quintum Gale. 3. de loc. aff. ca. 10. Quum omnes igitur nerui tum sentiendi cum mouendi uim amiserint, apoplexia huiusmodi affectio appellatur, igitur non paralysis &c.

De conuulsionis descriptione.

Conuulsio est neruorum ac musculorū affectio per quam interdum totum corpus interdum pars, citra uoluntatem ad suā



originē cōtrahuntur, Huius spec. s sunt tres. ΤΕΤΑΝΟΣ. i. tentio equalis, ΕΜΠΡΟΘΟΤΟΥΟΣ. i. tentio ad anteriora καὶ ὀπίσθου. i. tentio ad posteriora, locus uero affectus cognoscitur, quia uniuerso corpore conuulso infra faciem, tunc prima spinalis medulla pars affecta est, si uero cum uniuerso corpore etiam facies conuellatur tunc cerebrum affectum esse dicimus, si autem quapiam corporis pars conuellatur tunc eorum neruorum originem esse affectam iudicamus &c.

Loci consentientes circa conuulsionis descriptionem.

Gal. lib. finit. med. Conuulsio est affectus quid neruis ac musculis accidit, quum modo corpus totum, modo pars eius, citra uoluntatem trahitur. Oribas. aphor. 2. comm. 30. Spasmus est inquit motus inuoluntarius uoluntaria obtinens loca. Auic. secunda tertij, ca. de spas. Spasmus est aegritudo neruosa, qua mouentur lacerti ad principia sua & inobedientes sunt in dilatatione, nam alij remanent secundum suam dispositionem & non dilatantur, alij facile redeunt ad dilatationem suam sicut in oscitatione & singultu &c.

Obiectio:

Quomodo est aegritudo, si Gal. 5. desympt. cau. referat esse accidens.

Responsio.

Tria considerantur in conuulsione, malus motus & sic est accidens, uel mala membri figura et sic est morbus officialis, uel causa cuius fiat hoc accidens & sic est intemperies sicca, idcirco aegritudo dicitur &c. Gal. apho. 6. comm. 39. Conuulsio est passio inuoluntaria ad similem uenientibus neruosis partibus dispositionem, quam etiam in motibus factis secundum appetitum assumebant Itidem ait in lib. de trem. & palpit. in fine. Et apho. 4. comm. 57. tres sunt numero conuulsionēs opisthotonos emprosthotonos & tetanos, itidem ait in lib. de trem. & palp. Similiter Auice. ibi, sic mollificatio



diuersificatur in membris & , ibi , quum corpus declinat ad anteriora . De loco affesto loquitur Gale. 3. de loc. aff. cap. 6. ibi , conuulso enim uniuerso corpore infra faciem , omnium infra faciem neruorum originem affectam esse putandū est , quæ sunt primæ spinalis medullæ partes , si uero cum uniuerso corpore facies etiam conuulsa sit , non solum eam partem quæ ex spina procedit , uerum etiam ipsum cerebrum curamus & c. Itidem . 4. de sympt. cau. ca. ult. adserit.

#### De causis conuulsionum.

Quum duplex sit spasmus , alter ad materiã proportionatus , alter non proportionatus , causa non proportionati duplex intrinseca & extrinseca , Intrinseca sunt accidentia animi sicut timor mæstitia dolor , uel mala qualitas a materia uermium uel mala qualitas per consensum aliorum membrorum ad neruos ut uentriculi uteri & c. Extrinseca est mala qualitas frigida styptica membrum comprimens ut frigiditas aeris , uel frigus nerui uulnerati , similiter punctura cæca casus percussio incisio , uel mala qualitas uenenosa qualis est morsus uenenosorum animalium uel præcipitatio & quicquid cerebrum imbecille redit , mordicat ac dolorem infert ex quo nerui fugiant ac contrahantur & c. Proportionatus uero ad materiam duplex alter de repletionem , alter de inanitione . Cause primitiue de repletionem sunt crapula ebrietas consuetæ euacuationes retentæ , balneum & exercitium in corpore replethorico & c. Cause antecedentes sunt ut plurimum pituita & sanguis , raro melancholia , rarissime omnium bilis cause coniuncte sunt ipsi humores in neruis existentes neruos iuxta longitudinem dilatantes , interdum abscessus , uel flatuosus spiritus crassus , qui ubi fuerit particularis uulgo dicitur granfo . Cause conuulsionis de inanitione sunt quæcunq; strenue exsiccant , quales sunt febres ardentissimæ ieiunia ui-



gilia, alui profluvium, nimius concubitus, euacuationes per-  
soluentia pharmaca nimius labor, & quaecunq; possunt hu-  
miditates in nervis naturaliter existentes dissipare ac exte-  
nuare & omnino exiccare &c.

Locis consentientes de causis convulsionum.

Auic. secunda tertij, cap. de spas. Et quandoq; fit spasmus qui  
ad materiam non proportionatur eueniens causa rei impe-  
dientis, a qua nervi fugiunt & congregantur ad expellen-  
dum ipsum, & causa illa, aut est dolor & multotiens ex uas-  
pore calido mordicatio aut a qualitate uenenosa perueniente  
ad cerebrum, aut propter qualitatem non uenenosam, sicut  
quum spasmus accidit ab infrigidatione uehementi congre-  
gante neruum et lacertum et contrahitur ad caput suum &c.  
Paul. lib. 3. ca. 20. porro facit affectum, quanuis raro lassitudo,  
humidormitio, ponderis eleuatio casus, uulnus, ardor, ictus  
& alia quae eandem nervis offensam inferre possunt &c.  
Vide de his latius Auicem. loc. cit. Quod uero spasmus pro-  
portionatus sit duplex lege Gal. aphor. 4. comm. 57. Omnes  
convulsionem fiunt aut a repletionem aut ab euacuationem partiū  
uidelicet neruorum. Itidem adserit aphor. 6. comm. 39. et.  
5. de sympt. cau. cap. 2. ibi. atq; omnes Hippoc. authore in duo  
capita reducuntur plenitudinem & inanitionem. Et Hippo.  
aphor. 6. aphor. 39. Convulsio inquit fit uel ex repletionem &  
inanitionem &c. De causis huius convulsionis proportionate  
primitiuis loquitur. 3. de loc. aff. cap. 6. si temulento cuipiam  
ac omnino pleno homini qui in otio degit id euenire conspe-  
xeris ex repletionem iudicabis. Et aphor. 5. comm. 5. solet etiā  
uinum neruos replere quibus repletis fit convulsio &c. lege  
fusus de hac re Arcul. cap. de spas. Gord. Ant. guaine. De causis  
antecedentibus et coniunctis loquitur Auic. secunda tertij, cap.  
de spas. ibi, causa spasmi aut est cum materia aut sine materia



sicut caliditas & siccitas, et materia spasmi secundū plurimū est phlegmatica aut melancholica aut sanguinea & c. Et paulo post, causa essentialis spasmi ex repletionem est, aut humiditas & frigiditas addiuuans secundum congelationem et grossitiem, aut caliditas et siccitas & c. Hippoc. aphor. 5. apho. 17. frigidum conuulsiones distentiones liuores rigores febriles facit & c. B. quia omne nimium siue calidum, siue frigidum nervis nocere solet, nam ex immodico calore, eorum substantia dissoluitur, & ex immodico frigore cogitur ac cohibetur. Gal. 2. de sympt. cau. cap. 2. causam huius rei quippe demonstrauimus dum neruum aut stupore aut resolutione infestari dicebamus si frigus illum constringat, aut crassi lentiq; humores obstruant, aut aliqua causa externa ipsum suo pondere comprimat & c. Itidem ait in lib. de tre. & palpitatione cap. ult. ibi, Itaq; nervos tendinesque in animalium corporibus ex humore superfluo tensos & c. Quod fiat etiam a flatuoso spiritu habes ex Auic. loc. cit. ibi, & nō est longum quin sit spasmus eueniens a uentositate inflatiua spissa. Ipse enim est ex eis quæ plurimum accidit, & remouetur in hora intelligens de eo quod dicitur granfo. Itidem ait Paul. lib. 3. cap. 20. ubi tribuit originem musculis repletis spiritu & aere crasso nebulosoq; & c. De causis conuulsionum ex inanitione plurima refert Auic. secunda tertij, cap. cit. ibi, spasmus autem siccus, alius quidem qui fit successione febrium adurentium & proprie in febribus sirsen, & successione motuum laboriosorum corporalium & animalium, sicut angustie uigilie timor, & ille est, ex eis a quibus fit euasio.

## Obiectio.

Quomodo fit euasio si ab Hippoc. & Gale. lib. de tre. & palp. in fine existimatur incurabilis.

## Responsio.

Duplex est spasmus, alter quidem confirmatus in quo om



nes substantiales membrorum humiditates consumptæ sunt, & hic dicitur incurabilis quia humiditates ille deperditæ haudquaquam restaurari possunt. Alter non confirmatus in quo primæ tantum humiditates consumptæ sunt, sed spei aliquid superest, ut restaurentur & sic interdum ab his fit euasio. Gal. 3. de loc. aff. ca. 6. quippe cū conuulsio fit uel a labore, uel uigilijs, uel fame, uel solitudine, uel arida æstuanteq; febre, qualem in phreneticis uidere est, causam eius esse ariditatem uacuationemq; recte putaueris. Et. 5. de sympt. causis phlegmone plenitudinem pariunt, ardentissime ac aridissime febres inanitionem! & c. lege etiam aphorismum, ex superflua purgatione conuulsio & c. lege etiam Gal. 5. de sympt. cau. cap. 2. & in lib. de tre. & palp. & aphor. 6. comm. 39. ubi affert exemplum modo de chordis quæ ob nimiam humiditatem rumpuntur aut de loris quæ ad ignem longius calefacta contrahuntur. Itidem Auic. sic dispositiones chordarum quæ elongantur in hyeme propter humiditatem & abbreuiantur in æstate propter exiccationem.

#### De signis conuulsionum.

Signa præcedentia sunt angusta ac luctuosa respiratio, Pulsus rarus durus exiguus, risus sardonicus, tremor manus ægri occultus alius sic cecidit, urina aquæ similis uel cruenta esse uidetur, tument oculi, & facies rubescit, præcedunt tremores et singultus, dolor capitis lumborum ac clauiculorum accidit, dentes strident, oculi peruertuntur. Signa præsentia sunt membrorum contractio ad suam originem, diuersitas in pulsu, ita ut in principio sui motus sit humilis, in medio sui motus ascendat & in fine cadit, arteria alijs membris est calidior & c. Signa conuulsionis erunt, si in sanis repentina conuulsio adueniat ac permaneat. Signa conuulsionis de inanitione sunt conuulsiones post multos sudores, uomitus, alui



profluua, sanguinis fluxum, uigilias, fames, aut febres ardentissima accidentes &c. Signa conuulsionis non proportionate ad materiam sunt cause eius antedictæ. Signa humorum cognoscuntur ex coloribus & reliquis sapius antedictis. Signa apostematum sunt dolor, febris pulsatio &c. Signa conuulsionis per consensum alicuius membri sunt quia præcedit lesio illius membri &c.

Loci consentientes de signis conuulsionum.

Paul. lib. 3. cap. 20. de signis præcedentibus uerba facit, ibi, Notæ horum sunt angusta respiratio, Pulsus rarus & exiguus nonnunquam & risus sardonius oboritur, rubet facies, oculi intumescunt, & id reliquum quod a me nuper relatum est. Auic. quasi de uerbo ad uerbum eadem recitat. Gale. pronost. 3. commē. 34. potissimum conuulsionem futura cognoscuntur, si partes in uultu peruertantur, aut dentes strident, aut oculi cerebro mouentur ac peruertuntur sed in pueris sufficit, si tantum modo uigilent, si admodum metuant, si mente lugeant ac alius non deiciat &c. Memento etiam aphor. 54. lib. 6. uidelicet in acutis passionibus quæ cum febre sunt lucida suspiria malum. uide de pulsu duro & de alijs huc spectantibus Gal. in commē. De signis præsentibus lege Razē. 9. alman. cap. de spas. ibi, Quum aliquod membrum alicuius contrahitur & ad suam redit originem, aut plura membra sic disponuntur, spasmata esse pronunciamus. Auic. secunda tertij, cap. de sig. spas. Pulsus spasmatorum est extensus & diuersus insitu ascendens & dimittens sicut sagittæ euadentes de arcu sagitarij &c. De signis spasmi de inanitione & repletionem Gal. prorret. 3. commē. 69. inquit conuulsionem ex euacuatione post sudores multos uel uomitus uel deiectiones uel sanguinis eruptiones, uel inedia uel uigilias uel motiones tum multas tum uehementes sunt &c. Itidem Paul. lib. 3. cap. 19.



Aet. ser. 6. cap. 38. si statim ab initio morbi conuulsiones fiant & permanserint, tunc a plenitudine ortum habent, si uero a multis sudoribus uomitibus &c. tunc ex inanitione oriuntur. Itidem Auic. loc. cita. ibi si spasmus a repletione fiat signa sunt q. subito prouenit & non discedit uelociter, si a siccitate fit paulatim & successione aegritudinum euacuantium &c. Idem sentit Gal. aphor. 2. commē. 26. Signa humorum tangit Gal. pronost. 3. commē. 34. ibi, colores præter naturam habentur indicantes humorum prauitatem, ex quibus conuelli assolent. Pallidus enim aut liuidus prauum qualitate significat humorem, rubidus uero sanguinis copiam &c. De signis spasmi ex apostemate loquitur Auicē. secunda tertij, cap. de sig. spas. ibi, & quandoq; cum spasmo sunt pulsatio & saltus & est signum malum, pulsatio unam duarum rerum significat, aut apostema in uisceribus &c. Similiter loquens de signis per consensum alicuius partis inquit cum nocumentum est ex stomacho communicat ei cerebrum, deinde nerui & fit spasmus successione uomitus qui est sicut succus porri aut ærugo æris &c.

#### De cura conuulsionum.

Ad curam spectant quatuor intentiones, Prima est uictus ratio Secunda euacuatio sub qua reuulsio comprehenditur, Tertia resolutio ac membrorum roboratio, Quarta est symptomatum remotio. Vicius in conuulsione de repletione existente materia pituitosa, sit, calidus tenuis & siccus in principio & in uirium robore, si uero imbecillitas uirium adsit etiam in statu cogimur ei succurrere, cum carnibus qualitate siccis, uinum nō bibatur usq; ad morbi remissionem, nam tunc ad resolutionē antiquum facit. In conuulsione de inanitione, uictus sit frigidus humectans pinguis tenuis quum male transglutiant & uia sint stricte, magis tamen humectet quam infrā



gidet, qualis est aqua carnis cum quatuor seminibus frigidis alterata lac recenter multum, sorbitiones ex chondro & alica cremor ptisanæ, Potus sit aqua hordei aqua cucurbitæ et mellonis indi cū Iuleb si ad fuerit febris, si minus his addatur parum uini tenuis & aquosi, facit enim ad penetrationē & c. Euacuatio fiet primum per uenæ sectionem, si sanguis uel humorum copia in causa fuerit, si minus iuxta humorum exigentiam euacuato, de quibus in capite de paralyti satis dictum est. Sed ubi morbus inducias dederit, tunc primum materia erit præparanda cum rhodomelle, syropo de stecha de, cum aquis ac decoctis capiti spectantibus, conueniunt insuper clysteria cum rebus capiti dicatis, frictiones ad partes subiectas, item masticatoria sternutatoria, cucurbitule affectis partibus cum scarificatione, multa existente materia, uel sine scarificatione pauca existente. Resolutio ac membrorum roboratio perficitur cum emollientibus ac resoluentibus quum materia sit crassior quam in paralytice & hæc per exteriora & interiora. Exteriora sunt linimenta ex oleo liliorum alborum, lumbricorum oleo uulpino costino & c. unguenta ex bdellio, Balnea tã naturalia quam artificialia, Naturalia sulphurea salsa aluminosa, Artificialia sicut in oleo comuni, uel in balneo in quo decoctæ sint uulpes catuli cum herbis capitalibus .s. camomilla anetho maiorana salvia rosmarino stechade et simil. Interiora sunt electuaria resoluentia ut diamuscus, diacorus, mitridatum, confectio anacardina & quæcunq; febrem prouocare possunt. Remotio symptomatum fiet, si dolor qui interdum uehementissime molestare solet, auferatur & hoc perficitur cum anodinis cum balneo. 53. ex oleo, .s. cōmuni in quo decocta sit lumbricorum quedam quantitas, uel cum oleo camomillino de .s. lini, uel balneo arte parato, & membra contracta ad suum locum reducantur &



inordinato motui resistatur. Cura conuulsionis de inanitione tantummodo consistit in humectando & restaurando, modo cum balneis ex lacte, modo artificialibus cum folijs salicis hordeo uiolis & seminibus frigidis &c. Post balneum statim membra ex oleo rosaceo liniantur, ne humiditas impressa exalet, sed sua stypticitate cohibeatur, Clysteria fiant ex rebus similibus additis quibusdam impinguantibus, Somnus insuper accersendus est euacuatio nulla fiat nisi naturalis & nutriatur ut dictum est. Cura conuulsionis non proportionata ad materiam sic fiet, Primum si fuerit a percussione cum laxantibus balneis ex hordeo camomilla et malua fenu graeco &c. Si fuerit ex uulnere, in primis dolorem remoue, & sanies inducatur, cum emplastro altheae uel cum uitello oui et terebentina & tota spina liniatur cum humectantibus temperatis, sicut oleo amygdalino dulci &c. Si fuerit a uentositate resoluator cum fricatione & oleis calidis. Si fuerit a punctura uenenosa extrahatur illa humiditas uenenosa, uel cum cucurbitula apposita uel cum emplastro ex scabiosa & uitello oui. Si fuerit punctura ex ferro tunc aperiatur locus ita, ut uirus quoquo modo transpiret cum unguento exiccante & corrodente, quale est unguentum apostolorum aegyptiacum, sed prius sedetur dolor cum terebinthina & oleo rosaceo, aut cum balneo ex oleo lumbricorum aut cum pane in lacte infuso, aut cum aliquo quod locum stupidum reddat qualia sunt opiata &c. Si fuerit ab apostemate, curetur eodem tramite, quo solent tales abscessus curari. Si fuerit per consensum uetriculi, curetur uomitu, uel euacuatione per secessum, roborando cerebrum & spinam ne amplius quidpiam suscipiant, & sic intelligito de alijs particulis &c.

Loci consentientes de cura conuulsionum.

Habes de uictu primum Auic. secunda tertij, ibi, & si ha



bens spasmus humidum, debilis sit uirtutis, non abscondantur ab eo carnes siccae sicuti carnes minutarum auium & cubegi & cheruberi. i. perdicis & laude, & si uirtus non fuerit debilis sint cibi eius panis cum melle et aqua ciceris cū anetho & sinapi & c. & sic calidum ac tenuem uictum imperat. Paul. lib. 3. cap. 20. Porro uictus erit tenuis, qui expedite distribuatur & recrementis omnino uacet & c. Et loquens de uictu conuulsionis de inanitione, dixit, Qui ex inanitione conuelluntur nutriendi sunt ex chondro et alica, uinoq; tenui & aquoso, quod facile per omnia corporis membra distribuitur, nisi febris adfuerit, tunc ptisana cremor utilis est. Et Auic. loc. cit. & infirmo detur in potu lac recenter multum secundum mensuram conuenientem, si non fuerit febris & aqua hordei & aqua cucurbitae & aqua melonis indi cum Iuleb, et si commisceatur cum aliquo horum parum uini albi, ut penetrare faciat, erit conueniens, & paulo post, cibus habentium spasmus siccum, sit totum quod humectat & lenit et omnes sorbitiones pingues lenes factae ex aqua hordei, assumpta ex carnibus agnorum & hedorum, & quandoq; ponitur ex oleribus humectatiuis frangentibus nocumentum carnis, si illie fuerit caliditas & c. De euacuatione lege Paul. loc. cit. ibi, Quibus ceruix recta intenditur, ab inito sanguis detrahendus est, & partes lanis oleo sycionio imbutis & castoreo contegantur & cucurbitulae sic admouendae ut cutis exasperetur, lenes enim noxam inferunt & c. Auice. secunda tertij, cap. de cur. spasmu. Si spasmus est humidus oportet ut curetur cum euacuantibus & purgantibus & c. & cum uideris sanguinis signa dominantia tunc phlebotoma & c. Aet. ser. 6. cap. 2. post uenae sectionem utendum unguentis lancinantibus & cucurbitula cum scarificatione locis omnibus affectis affigantur, in potu conueniunt apomelli & radicis sylphij deco-



Elum & ipsa trita & hyssopi decoctum & c. B. Intellige non  
 tantum ratione potus quantum preparationis materiae, Itidē  
 Paul. & Auic. loc. cit. asserunt. De resolutione postea loquens  
 Aet. loc. cit. inquit, deinde cataplasmata locis affectis adhibe-  
 antur, quæ laxare ac discutere possunt simulq; lenire, Horum  
 autem materia sit fenugrecum, semen lini farina hordeacea  
 ac loliacea & c. Paul. lib. 3. cap. 20. Quod si tetanus aduetu-  
 statem inciderit in oleum bis quotidie descēdere oportet nec  
 diutius immorari quum maxime vires conuellat. B. Nota q̄ te-  
 tanus non differt a conuulsione nisi ut genus & species, uel si  
 cut compositum a simplici, sunt enim in tetano binæ conuul-  
 siones diuersorum musculorum & neruorum ad oppositas  
 partes sese trahentium. Auic. secunda tertij, cap. de cur. spasf.  
 Et sessio in pelli uulpium & luporum iuuat & inunctio cū  
 adipibus luporum & oleo de lilio, si non fuerit febris & de-  
 coctum catulorum aut sessio in aquis, in quibus decoctæ sint  
 medicinae subtiles sicut abrotanum aut folia radices iunci &  
 calamus aromaticus & folia lauri & c. lege eum fusius &  
 plura ad balnea & iunctiones spectantia ab ipso intelliges  
 & c. De remotione accidentium, habes fere omnes practicā-  
 tes, sed præcipue Paul lib. 3. cap. 19. ibi, Primum partes quæ  
 contrahuntur ualenter continendæ sunt & inordinatis resi-  
 stendum motibus, oleo perfricare oportet rutaceo aut sycio-  
 nio & c. Itidem Auic. ibi, & applanetur quod spasmatum est  
 leniter & c. & antea dixerat, & si fuerit dolor seda dolorē  
 postquam consideraueris quid sit. Et abscinde causam eius,  
 lege de his Arculanum. De cura spasmi ex inanitione loquu-  
 tus est etiam Auic. ibi, dicens conuenientior cura est tina, &  
 inunctio in oleo humido post ipsam, & eius iteratio multo-  
 tiens, si autem possibile est tina fiat ex lacte, si non ex aquis  
 in quibus cocta sint folia salicis hordeum uiola nymphaea cū



curbita & citruli, aut sit totum illud ex aqua ros. in qua decocta sint aliqua horum & si feceris clysteria fiant ex istis expressionibus & oleis aliquibus dissolutis humectantibus & impinguantibus & c. Itidem Paul. loc. cit. adserit, ibi, eos qui ex inanitione conuelluntur, oleo uel hydreleo calido fouere competit & c. De cura per consensum habes plura apud neotericos omnes quos recensere esset præter longitudinem, satis graue. Vide tu Arcul. Marc. Catin. Gord. & c. Lege insuper Auic. ibi, In eo qui factus est a percussione oportet ut administrentur embrocæ quæ laxant factæ ex hordeo camomilla & c. Si fuerit a dolore seda dolorem & c. Et si est propter puncturam curetur & c. Et si fuerit a nocumento propter alicuius rei uenenosæ potum, curetur cum eo quod cognoscitur in cap. de uenenis & c.

#### Observationes de sectione uenæ.

Aet. ser. 6. cap. 39. primum si a repletionem fiat, seccanda est uena. Auic. de cur. spas. loquens de sectione uenæ inquit, non extrahas totum, quod necessariū est ex sanguine, imo retine ex eo aliquid ut resistat spasmo & resoluator resolutione motuum spasmi, & hæc observatio etiam habetur a Raze. l. contin. ca. de spas. & c.

#### Observationes de balneis.

Auice. loc. cit. Et scias q. longitudo spatij moræ in tinna est ex eis quæ nocent propter mollicationem uirtutis, tu autem pone multitudinem numeri in loco longitudinis spatij & fac sedere ipsum bis in die & c. hoc idem annotauit etiam Paul. lib. 3. cap. 20.

#### Observationes in ponendis cucurbitulis.

Auic. Et ille qui utitur uentosis oportet ut utatur sine scarificatione, si res est leuis, et si non ita est, scarificatio fiat, & loca uentosarum, custodiantur et conseruentur, ne corpus infri-



infrigidetur &c. Vide in hoc latius Paul. æginet.

### Observationes de aqua frigida.

Paul. lib. 3. cap. 20 frigida superfusionem quum sit (quem admodum ait Hippoc.) periculosissima, eoq; posteris credo uituperata & nos damnamus deuitamusq;. B. Hæc dicta sint in Marcū Catinariam, qui per immersionem aque frigide curam fieri iubet. Similiter de febre prouocanda, nam non solum Auic. ut supra sed etiam Paul. in hoc loco optimum esse inquit præsidium febrem, quæ per initia non fuerit superuenientem: & hoc contra Michaelē Sauona. qui nullo modo prouocandam ait esse, quum postea nostri non sit arbitrij eam expellere.

### Conuulsionem excitantia.

Excitant, eiq; nocent coturnix, helleborus albus tribulus marinus, Prohibent a proprietate spasmus iuxta Auice. & Plinium, Fel adeps cinis mustellæ, spoliū serpentis, storax bibita &c.

### Conuulsionem curantia.

Curant spasmus ex repletionē, acorus, assa, aristologia bdellium, calamentum camedrys, castoreum, centum capita colocynthis, epithimum, euphorbium, galbanū, peucedanum pyretrū, satirion, scenoanthos, absinthium, oleū amygdalarū dul. de been, de piperibus, de costo, de croco, de alchechēgi, de s. lini, syrupus de stechade, de betonica, rhodomel, pillulæ fetide, de serapino, de sex rebus Alex. chociæ, unguētum aragō, balsamum, confectio anacardina, diamuscus, diambra, lege etiam remedia inunctiones &c. iuxta Varig. ca. 10. de dispos. capitis. Itidem Bartho. Montagnanam cons 244. in fine, uide etiam Aggregatorem, Arcul Sauona Gord Aet &c.

### De pronosticis conuulsionum.

Hippoc. aphor. 2 aphor. 26, Febrem conuulsioni superue-



nire, melius est quam febris conuulsionem. B. Nam si febris superueniat humorem calefaciens extenuat & dissoluit, si uero post febrem conuulsio accidat, statim ob sui acutiē uires dissoluens, exitium affert, nisi ab initio quis huic oportunis remedijs resistat. Et aphor. 4. aphor. 5. ex purgatione superflua, conuulsio aut singultus superueniens, malum. Et apho. 4. aphor. 49. In febre non intermittente silabrum, uel oculus, uel nasus, uel supercilium peruertatur, uel non uideat aut iam debili existente corpore, quodcunq; horum fiat, iam prope est mors. Et aphor. 4. aphor. 57. Quia conuulsione, uel distentione neruorum tenetur, febre superueniente liberatur. Et aphor. 4. aphor. 66. In acutis febribus conuulsionem et circa uiscera dolores fortes, malum. Et apho. 4. apho. 67. In febribus ex somnis timores uel conuulsionem, malū. Et apho. 4. aph. 68. In febribus spiritus offendens malum, conuulsionem enim significat. Et aphor. 5. apho. 1. Conuulsio ex helleboro lethalis. B. Non eam intelligit Hippoc. quæ per consensum oris stomachi, neq; eam quæ per nimiam euacuationem, accidit, sed forte eam quæ ab impulsu hellebori uirtute, uiolenti-  
us neruorum substantiam exiccat, alioqui frustra legeretur aliter aphor. ex superflua purgatione &c. Et aph. 5. apho. 2. Conuulsio ex uulnere lethalis. B. Quia ad uulnera sequi solet inflammatio, quæ ubi neruos attigerit conuulsionem accidunt quādoq; uniuersales ex quibus mors. Etiam aphor. 5. aphor. 3. ubi sanguis plurimus fluxerit singultus aut conuulsio superueniens malum. Et aphor. 5. aphor. 5. si ebrius quispiam repente obmutuerit conuulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ad horam peruenerit qua soluantur crapulæ, uocem recuperet. Et aphor. 5. aphor. 6. Quicunq; a distentione corripiuntur, in quatuor diebus pereunt, si uero hos effugerint sani fiunt. E. Morbus hic in primo dierum iudiciorum circuitu fi-



nitur non tollerante diu natura laborem. Et aphor. 5. aphor. 18. frigidum inimicum ossibus dentibus, nervis, cerebro, spinali medulle, calidum uero utile. Et aphor. 5. aphor. 57. In fluxu muliebri, si conuulsio & animi defectus aduenerit, malum. Et aphor. 5. aphor. 70. a quartanis capti, non admodum a conuulsione capiuntur, si uero prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur. Et aphor. 7. aphor. 9. a profluuio sanguinis disipientia & conuulsio, malum. B. Dictum est conuulsionem ex euacuatione esse, malam, sed quanto magis si ambarum fuerit conuentus. Et aphor. 7. aphor. 10. Ab ileo uomitus singultus desipientia, uel conuulsio, malum. Et aphor. 7. aphor. 13. Ab aestibus fortibus conuulsio aut distentio, malum. B. Intellige pro aestibus siue febrem, siue aerem ambientem, uel feruorem, uel cauteria, uel escaram, nam ob nervorum siccitatem, hæc proueniunt conuulsiones quæ difficillime curantur. Et aphor. 7. aphor. 18. In uigilia conuulsio uel desipientia malum & c. Et aphor. 7. aphor. 25. Ex medicamento conuulsio. Et aphor. 7. aphor. 27. Mulieri utero gerenti, si tentio superuenerit, facit abortum. Razes. 9. alman. spasmus qui non repente, sed suauiter accidit post febrē, aut post multam uentris solutionem, aut multum uomitum, aut sanguinis fluxum, malus est et uix curabilis. Itidem habet Paul. loc. cit. Et Aet. & Auic. Mes. Quis sit hic deterior, quā distentio est, quia iuxta omnes dimensiones contrahit. Gal. lib. de tre. & palp. in fine. Conuulsiones quarum siccitas causa est, minime medicaberis, nam sic affecti citissime intereunt, nec medicamenta sibi ipsis utilia excogitare permittunt, atque ex humorum copia, aut ab inflammatione eueniunt, humorum euacuando repletionem, & inflammationem proprijs remedijs medendo ipsas curare poteris & c. Similiter aphor. 5. conuulsio. 7. Conuulsio quæ fit ab euacuatione acutissima est & per-



nitiosissima, quæ uero a repletionē neruorum partium, ne  
q; acutissima, neq; similiter periculosa.

Aut. dissentientes circa conuulsionem.

1. Adserere, cum aristotele neruos oriri a corde.
2. Adserere conuulsionum species esse plures quam tres, quum corpus etiam ad dextram et sinistram curuari possit.
3. Adserere conuulsionem de inanitione, non esse semper mortalem, Nam pueri inquit Auic. liberantur a spasmodico uelociter.
4. Adserere, omnem conuulsionem de repletionē posse semper a febre curari.
5. Adserere, conuulsionis motum a naturali motu non differre.

Confutatio dissentientium circa conuulsionem.

Confutat primum Gal. 3. de loc. aff. cap. 6. probans duobus medijs non oriri a corde, Primum per exercitatisimos medicos, qui non cordi in hoc morbo sed cerebro, uel circa spinam remedia adaptant, Alterum ex arte anatomica, in qua euidentissime cernitur neruos oriri a cerebro & non a corde.

Ad secundum respondet Gal. lib. de tre. et palp. cap. ult. enumerans tantum tres species inquit huiusce passionis modos hunc quidem Emprosthotonum, illum uero Opisthotonum, Tertium autem tetanum (ut omnes fatentur) appellari cognoscas, reliquos modos laterales tanquam impossibiles propter situm neruorum & corporis imbecillitatem, tacens, quos si cognouisset utlies, non utiq; sicco pede pertransiisset.

Ad tertium inquit Gal. aphor. 2. comm. 26. Si uero ex ardentibus febribus totum corpus exiccetur, & neruis deinde exsiccitate conuulsio accidat, hoc maximum est malum & pene insanabile, cuius ratio ab ipso redditur &c. Quod uero dicit Auic. ita intelligendum est q; pueri liberantur a spasmodico uelociter. i. pueri immunes sunt, ne de facili in conuulsio



nem de inanitione incidant ob eorum edacitatem &c.

Obiectio.

Gal. 3. pronost. inquit q̄ conuulsio accidens pueris cum acuta febre facile curatur & tamen sequitur febris, igitur non omnes moriuntur.

Responsio.

Duplex est febris, altera totum corpus & nervosam compaginem desiccans & hæc est incurabilis & lethalis. Altera est dissoluens humores pituitosos frigidos, qua facile curatur pueri & sic intelligit Gale ibi.

Ad quartum respondet Gal. in lib. de tre. & palp. non curari conuulsiones ex repletionem, tantum ex febre. sed quæcunq; tantummodo ex frigidorum humorum copia proueniunt repletionem tamen euacuando, sed quæ ab inflammatione eueniunt minime per febres curantur, sed inflammationem proprijs auxilijs igitur conuulsio de repletionem non semper a febre curabitur.

Ad quintum inquit Gale 3. de loc. aff. cap. 6. Conuulsionem in conuulsis partibus faciam, hac sola ratione a motu naturali differre, q̄ præter uoluntatem fit. Naturalis uero motus uoluntarius est, et sic differt a motu conuulsionis qui in uoluntarie semper fit.

De Melancholiæ descriptione.

Melancholia est quædam sine febre, mentis alienatio ex humore melancholico depedens. Hæc duplici specie insigni constat, altera quæ Græci μελαγχολία. i. atram bilem, altera μανία. i. insaniam uocant. Melancholia ratione locorum affectuum duplex est, Prima quum cerebrum primario affectus afficitur, Altera quum per consensum uel totius uel partium precordijs. s. affectus molestatur. unde præcordialis siue hypochondriaca melancholia uocatur, Complures uero & harum existunt differentie, quas enarrare longum foret. Nam quidā



semper, rident nonnulli plorant, alij mortem expetunt, alij mori timent alij futura uaticinātur, quos *εὐθεστίχοι* Græci uocant &c.

**Loci consentientes de Melancholiæ descriptione.**

Gal. lib. finit. med. Melancholia est quidam sine febre affectus mentem ledens, non sine graui molestia animi, atque auersione a rebus charissimis. Ibi etiam describitur insania, dum inquit est alineatio mentis, mutatioq; a communi hominum ritu ac sanorum moribus sine febre.

Auic. Melancholia est mutatio existimationum et cogitationum, a cursu naturali ad corruptionem & ad timorem & ad malitiam propter complexionem melancholicam facientem spiritum cerebri syluestrem interius & facientem ipsum timidum propter tenebras &c.

Oribasius aphor. 7. comm. 10. Atrabilis est affectio cerebri & ex melācholica sit materia &c. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ubi atra bilis in corpore abundat, eam insaniæ speciem quam Græci *μελαγχολία* uocāt, efficit. Quemadmodū alter atrabilis succus qui præassata flauabile nascitur, ferina deliramentā inducit modo cum febre modo sine febre. Alexan. tracta. cap. 22. Sed ex loco etiam affecto aliam atque aliam sortitur speciei nomenclaturam, afficitur. n. interdum cerebrum primario affectu, nonnunquā p consensum singularum corporis partium, interdum uentre & præcordijs adflētis, quam speciem hypocondriacam nominant. Gal. 5. de sympt. cau. in fine melancholicæ dementiæ uariæ sunt species prout in ipsis particulatim dolosæ suspectæq; apparent. In omnibus commune unum habetur, quod omnes præter rationem mæsti sunt, nequam ob rem tristētur rationē possunt reddere ac non pauci eorum mortem et alia non timenda timere uidentur &c. Vide fusius infra de signis melancholiæ &c.



## De causis Melancholiæ.

Causæ uel sunt in cerebro, uel extra cerebrum, si per se in cerebro sunt et nõ ab alijs dependant partibus corporis, tunc uel sunt initiatrices siue primitiue, uel antecedentes, uel coniunctæ. Causæ primitiue sunt aer frigidus et siccus turbulentus, aut calidus siccus adurens sicut aer æstatis & autumnii, cibi potusq; atrabilarij qualis est caro bubula caprina, lentes, uinum crassum, exercitium exiccans ac balneum immoderata uigilia timores trisitiæq; uehemens studiũ, longi carceres menstrua ac hemorrhoides oppresse &c. Causæ antecedentes sunt mala intemperies frigida et sicca sine materia, quæ tum cerebri, tum spiritus animalis complexionem ac substantiam tenebrosam efficit. Itidem facit mala intemperies calida & sicca, nam adurendo eorum substantiam obtenebrat. Item mala temperatura frigida & sicca cum materia melancholica naturali uel non naturali ut ex adustione sanguinis. Mania similiter ex bile præassata generatur. Causæ coniunctæ sunt, uel ipsa intemperies cerebri frigida & sicca naturalis & non naturalis melancholiam ad actum produciens, uel ipsa melancholia in cerebro contenta. Causæ uero per consensum a toto corpore sunt uel febres quartanæ præcedentes, uel aliæ ægritudines in melancholiam desinentes. Causæ per consensum a partibus erunt plures, nam si proueniat malum a splene, tunc causa erit uel eius imbecillitas segregare ac expurgare atrabilem non ualens, aut obstructio, aut apostema, aut mala intemperies. Et similiter intelligito de hepate stomacho præcordijs ex quibus humor aut uapor tenebrosus tandem ad cerebrum eleuatur.

## Loci consentientes de causis Melancholiæ.

Auice. loc. cit. & melancholiæ causa aut est in ipso cerebro, aut extra cerebrum. Aet. ser. 6. & Paul. lib. 3. ca. 14. &c.



Gal. 3. de loc. aff. cap. 5. Interdum sine febre uitium est ut in mania & melancholia id quod modo per consensum modo primaria affectione, cerebro laborante accidit. Itidem ait. cap. 7. B. Ex hoc Gale. loco cognoscitur quotienscunq; aliquid per se & per consensum afficiatur, & hoc exacte discernitur per propria accidentia perpetuo permanentia. De causis primitiuis melancholice loquitur Gal. aphr. 3. comm. 20. ibi furores. n. & atrabiles & morbi comitiales & anginae sunt morbi autumnales similiter & comm. 22. eiusdem est sententiae & c. Auic. prima tertij, tra. 5. & quandoq; causa generationis eius est aer exterior, & quandoq; fiunt in generatione eius cibi generati cholerae nigrae, & ex causis fortibus in generatione melancholice est superfluitas tristitiae et timoris. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. facile intemperiem melancholicam incidunt. Qui & uigilijs & multis laboribus & solitudine & tenui uictu fuerint educati, ad haec accedunt, si haemorrhoids aliqua restricta sit, aut alia quaedam consueta sanguinis euacuatio, aut mulierum menstrua insuper si quis usus sit cibi qui suapte natura sanguinem melancholicum efficiunt, ut caprina bubulaq; caro, magisq; hircinae et taurinae asinorum ac camelorum carnes. Item uulpinae caninae atq; magnam uim in huiusce modi generatione ex lepore cibus est, sed multo magis, ac limaces frequenter comeste omnesq; terrenorum animalium carnes sale condite. Ex aquatilibus thummi balenae, uituli marini, delphini canis atq; ceta ceorum omnium, ex oleribus brassica sola fereq; inter legumina lentes, mox panis furfuraceus et qui ex uitiatissimis seminibus conficitur. Praeterea uina crassa nigraq; aptissima sunt ut ex ipsis melancolicus humor efficiatur, uetus deniq; caseus & c. Vide de his etiam Gale. de atrabile ca. 4. & 6. & c. De causis antecedentibus loquitur Gale. 1. q. fiat sine materia aphr. 6. comm. 53. Et Auic. prima



tertij, tra 5. causa est malitia complexionis frigidae & siccae sine materia permutante substantiam cerebri & complexionem spiritus luminosi ad tenebras, aut est cum materia & illa materia, aut est in uenis ueniens ad eas ex loco alio & conuertitur ad cholera nigram per adustionē, aut est materia imbibita in corpore cerebri & c. & Paulo infra inquit & oportet ut scias q. cholera nigra faciens melancholiam, quandoq; est cholera nigra naturalis, aut phlegma quando conuertitur in cholera nigram ob spissitudinem, aut ob aliquam adustionem, quanuis hoc sit rarum & parum & c. B. Nota ex Manardo in secunda epistola noni libri pituitam adeo assari non posse in corpore humano, ut nigra in totū euadat. Be Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. Igitur ea quam atrabilis constituit, in melancholiam transit, quæ uero a pituita parta est, in aliā affectionem permutatur melancholiam haudquaquam efficiens & c. Gal. 5. de sympt. cau. in fine sola autem melancholica dementia a frigidiori succo, ut causa euenire solet & c. Et. 3. de loc. aff. cap. 7. prouenit huiusmodi humor in quibusdam plurimus, uel a temperie ab initio comparata, uel a cibis in hunc humorem conuersis & paulo ante melancholici sunt in quibus siccitas & frigiditas dominatur & c. Vide etiam caput sextum de atrabile. Aet. ser. 6. cap. 9. Generatur autem caliditate multa indigena, aut flauam bilem, aut crassiorem sanguinem adassante & c. Vide etiam Gal. 3. de loc. aff. & 2. artis curatiue & c. Cause coniunctæ recitantur ab Auic. loc. cit. ibi & una quæq; specierum cholerae nigrae quum in cerebro est modo prædicto facit melancholiam. Gale. 5. de symp. cau. in fine lib. Porro omne delirium deprauatus est principis facultatis motus, a prauis succis aut cerebri intemperie ortum habens & in fine cap. Quod nobis extrinsecus accidit, quum ambiens nos aer uastissimis tenebris fuerit obscuratus id



melancholicis ab intimo corpore erumpere uidetur, occupante cerebrum, uel ipsamet atrabile, uel uapore quopiam melancholico &c. De causis etiam per consensum loquitur Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Interdum cerebro accidit, ut nonnunquam uniuerso in uenis sanguine melancholico effecto ob commune uitium ipsum quoque ledatur, nonnunquam uero reliqui corporis sanguine prorsus inocuo, solus qui in cerebro continetur, uel aliunde in ipsum deriuans aut in ipsomet humor melancholicus genitus est, &c. Et paulo post sunt etiam nonnulli qui per febriles morbos melancholicum humorem contraxerunt &c. Auice. prima tertij, tra. 5. ca. de Melancho. Cui causa est extra cerebrum communicat res aliqua ex qua humor, aut uapor tenebrosus eleuatur ad cerebrum & res illa aut est in toto corpore, quum ei dominatur complexio melancholica, aut praecesserunt egritudines quibus succedit melancholia ut febres temporales & permixtae aut quum fit permutatio ex epilepsia, aut est in splene, quum in ipso retinetur melancholia & non potest ipsam purgare, uel trahere nigram ex sanguine, aut quia in ipso peruenit apostema uel opilatio &c. Lege fusius eum & inuenies etiam caliditatem hepatis esse causam &c. Aet. ser. 6. cap. 9. perducit etiam ad consensum cor ipsum ob uicinitatem et ibi, plerumque partes circa praecordia primario affectae caput ad consensum perducunt & delirium efficiunt &c. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. Videtur quidem in ipso uentriculo inflammatio esse, Sanguis. n. in parte inflammata contentus crassior et atrabili magis conformis et sicut ex uentriculo halitus fumosus ad oculos eleuatus suffusorum accidentia efficit pari ratione, sublata ad cerebrum ab atrabile euaporatio, melancholica accidentia excitat &c.

#### De signis Melancholiae.

Signa principij melancholiae sunt timor & maestitia sine



causa, solitudinis dilectio, iudicium corruptum, ira uelocitas. Signa confirmatae melancholiae sunt si quae cogitare capite ore promat et promisceat actus et uerba ut si dicat timere casum coeli, uel putet se esse regem & sic adest timor et existimatio mala, & sermonis alienatio, sollicitudo & angustia & non timenda timet & c. Signa melancholiae in cerebro sunt superflua cogitatio & assidua sollicitudo melancholica, firmusque aspectus ad terram, uel ad aliam rem. Item capitis faciei & oculorum color niger, capilli crassi & nigri. praeceduntque male cogitationes ac insomnia, uel aliquae cerebri aegritudines ut epilepsia nec adsunt indicia per consensum afficientia. Signa quum a toto per consensum fiat, sunt gracilis corporis habitus qualis est niger hirsutus & ex toto melancholicus per naturam uel per acquisitionem, sicuti per sollicitudines, uigilias, malorum ciborum esus, uel per menstruorum uel hemorroidarum oppressionem, adest insuper multitudo pillorum uehementer nigrorum atque crassorum & c. Signa hypochondriacae melancholiae, quam Auicenna Myrachiam uocat, sunt, inflationes, rugitus, ructus acidi, ardor & hypochondriorum grauitas, aluus restringitur, uomitus, dolor uentriculi & proprie a cibo quousque digestum sit, accidunt etiam ex acceptione cibi multa accidentia, quae facta digestionis minuuntur, iuuantque a uomitu ructu flatibus & excretionis alui ac a concoctione. Signa humorum, si fuerit atrabilis sanguinea primum insaniunt cum risu uero uel fletu, nec ulla adest maestitia, si melancholia fuerit pura tunc maerent plorant mortem expetunt, si bilis perassata, tunc uehementer insaniunt effrenes ad modum ferarum euadunt & uiolenter homines uerberant & c.

Loci consentientes de signis Melancholiae.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 23. Si timor atque maestitia longo tempore perseverent ex eo atrabilis significatur. Auic. prima



tertij, tra. 5. ca. de sig. melancho. Signa principij melancholiæ sunt existimatio mala & timor sine causa, & uelocitas iræ & dilectio solitudinis & tremor & uertigo & sonitus & tinnitus & proprie in myrach &c. Raz. 5. 9. aliam. Quum alicui malæ cogitationes sine causa acciderint, & timor & mestitia in eo præualuerint est principium melancholiæ Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. Differunt inter se melancholici, nam omnes timent, mærent, uitam damnant, odio habent homines sed nō omnes mori cupiunt. De signis confirmata melancholiæ loquitur Auic. loc. cit. ibi, Quum autē confirmata est, tunc adest timor & malitia existimationis & angustia & sollicitudo & alienatio sermonis & fastidium propter multitudinem uentositatis & species timoris ex eis quæ non sunt aut sunt, penē infinitæ, Nam quidam timent casum cæli supra se, alij q̄ terra eos absorbeat, alij timent latrones & quandoq; imaginantur se factos reges &c. Razes loc. cit. At si quæ cogitare ceperit, ore promat, uerba sua actusq; permisceat, iam perfecta est melancholia. Faciunt quoque ad hunc locum quæcunque ex Gale. in. 5. de sympt. cau. & 3. de loc. aff. cap. 7. supra recitata sunt. Itidem habet Paul. lib. 3. cap. 14. & Aet. ser. 6. cap. 9. ibi, In summa melancholia multiformia deliria sunt ob particulares corruptas imaginationes, non pauci mortem timent &c. De signis melancholiæ in cerebro lege Gale. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Quum autem propria melancholiæ accidentia auctiora uidentur, circa uentriculum uero nulla, aut pauca admodum sunt, haud ab re existimaueris primitiuam in cerebro affectionem consistere, ob atrabilem in ipso congestā &c. Aet. ser. 6. cap. 9. Cognitio an totum corpus melancholicum sanguinem habeat, an iuxta solum cerebrum talis sit nigriores & hirsuti & qui uenas amplas habent aptissimi sunt ad atrabilis generationem, inter dum homines rubicun-



di in melancoh'icam temperiem transeunt, similiter & fla-  
 ui praesertim ubi uigi'ijs laboribus & curis & tenui uictu  
 aut melancholicis edulijs usi fuerint &c. Vide etiam quaecun-  
 que supra ex Gale. de causis primitiuis uerba fecimus. Iti-  
 de adserit Auic loc. cit. ibi signa eius quae in cerebro est, sunt  
 proprie superfluitates cogitationis & assiduatio sollicitudi-  
 nis melancholicae &c. De signis per consensum totius corpo-  
 ris loquitur Paul. lib. 3. cap. 14. ibi, peculiare melancholice  
 notae sunt, gracilis corporis habitus niger hirsutus & ex to-  
 to melancholicus uel natura, uel acquisitione per sollicitudi-  
 nes uigilias &c. Auic. loc. cit. eius quae facta est, commu-  
 nitate totius corporis est nigredo corporis & arefactio &  
 retentio eius quod euacuatur ex splene & stomacho et quod  
 euacuatur cum periodis exano & menstruis &c. lege Gale.  
 3. de loc. aff. cap. 7. Facit etiam mentionem de signis melan-  
 cholice hypocondriacae. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Quumque circa  
 uentriculum prima inceperint accidentia, ipsisque auctis me-  
 lancholica sequatur affectio, deinde alui deiectione & uomi-  
 tu & proba concoctione ructibusque leuetur is qui laborat,  
 hypocondriacum flatuosumque morbum ipsum nominabimus  
 &c. Auic. loc. cit. Signa myrachiae sunt grauitas in myrach et  
 attractio ad superiora & nausea inseparabilis et mali ia ani-  
 mae & corruptio digestionis & eructuatio acetosa & sputum  
 humidum & rugitus et exitus uentositatis &c. Lege eum fu-  
 sius, lege etiam Paul. lib. 3. cap. 14. ibi, Qui hypocondriaca la-  
 borant habent cruditates acidos ructus ardorem & ipsorum  
 grauitatem praecordia sursum conuelluntur &c. Razes. 9. al-  
 man. Qd' si cum melancholia fuerit dolor uentris & inflatio  
 et malus color, et digestionis corruptio, et uomitibus acetosus,  
 &c. De signis humorum loquitur fusius Auic. loc. cit. ibi, Et  
 cholera nigra faciens melancholiam, quando est cum sanguine.



est cum gaudio & risu, & non comitatur ipsam tristitiam uehemens & si est cum cholera, tunc est cum agitatione & lesione & demonio & est similis mania, & si fuerit cholera nigra pura, tunc aderit cogitatio plurima & audacia minus, nisi moueatur & rixetur et habet odium cuius non obliuiscitur & c. Lege etiam Paul. lib. 3. cap. 14. ibi, si quando flauis bilis supra modum exusta in nigram fiat mutatio & c.

#### De cura melancholice sine materia.

Quum dictum sit supra, cerebrum uel primario affectu uel per consensum laborare & q. primarius affectus uel ab intemperie nuda sine humorum complexu, uel cum humoribus complexa perficitur, idcirco primum de cura eius qui sine materia fit agamus. Hec igitur mala temperies triplici scopo remouenda erit, Primum alteratione cum ijs presertim, quae cerebrum & cor roborant, Secundo cum euacuatione & diuersione, nam si quispiam humor fuerit in fluxu, euacuari debet ac diuertere, Tertio cum sympt. remotione. Alteratio fiet cum humectantibus calidis uel frigidis prout in dyscrasia expediet roborantibus tamen spiritus cor & cerebrum. Spiritus simpliciter roborant oua uinum aqua carnis, spiritus & sanguinem purificant margaritae capillus ueneris fumus terre & c. lapsum temperamenti cordis emendat, si sit frigidus, muschus ambra melissophilon borago, si calidus, camphora, rose, sandali, acetosa uiola nimpha coriandrum, coralli. Euacuatio fiet per simplicia uel per composita, simplicia sunt helleborus niger, aloes, agaricus, colocynthis, epithimum, sena, myrobalani chebuli, lapis lazuli, lapis armenius serum lactis & c. Composita sunt diasene, confectio ha mech, hiera hermetis, hiera iusti, pillule de lapide lazuli pillule inde, decoctum senae epithimi & c. Remotio sympto. uersatur circa uigiliarum remotionem, cum somniferis



tam intrinsecus quam extrinsecus adhibitis, caueant se ab imminuentibus periculis, ne alta petentes interdum se precipitent, uel ne arepto ferro alios percutiant uel semetipsos interimant &c.

### De cura melancholiæ cum materia.

Cura malæ complexionis cum materia in cerebro per scopos quinque absoluitur, Primo per sex rerum non naturalium institutionem, Secundo per materiæ præparationem. Tertio per euacuationem, Quarto per reuulsionem ac deriuationem, tum a cerebro, tum a corde, ad alia membra minus principalia, Quinto per resolutionem residui & cerebri ac cordis roborationem. Victus ratio in melancholia sit calida & humida, magis tamen humectans quam calefaciens, sitq; probi succi concoctu facilis, uitentur quecunq; atram bilem generant, de quibus supra in causis primitiuis satis copiose a Galeno dictum est, Commendantur uolucres montanæ non pingues, oua gallinarum mollia, pisces petrosi, carnes hædinæ & lactentiū animalium, uitentur animalia in stagnis degentia, Potus sit uinum tenue album non uetus, abstineant a copia potus ne cibi ex uentre fluitent, acetum a cibo commendatur, somnus non prohibeatur, imo cum remedijs sæpe arcessendus est, uicem motus leues frictiones suppleant, coitus uitetur & sudor copiosus, in accidentibus animo caueant mærorem & tristitiam, sed sonoris cantinellis ac modulationibus letificentur, uitentq; cogitationes &c. Præparatio materiæ fiet per syro. & per decocta, Syrupi sunt, de pomis, de epithimo, de fumo terræ de lupulis de uiolis de suc. boraginis de cort. citri &c. Decocta sunt ex epithimo senapolypodio lupulorum thimo fumoteræ boraginis mentæ calamo aromatico, melissophillo mace rosmarino xyloaloe &c. Euacuatio, si materia in capite contineatur, non fiat per uenæ, sectionem nisi uel copia san-



guinis adsit, uel præservationis gratia id fiat sed potius per atram bilem subducentia eam, moliemur, prout supra dictum est. Reuulsio & deriuatio fient per enemata, frictiones, cucurbitulas de quibus alias satis copiose uerba fecimus. Resolutio residui per intrinseca & extrinseca perficietur. Extrinseca erunt balnea sacculi et epithemata, balnea uel naturalia sponte scaturentia, uel artificialia cum herbis prædictis parata, sacculi quoque parantur ex floribus buglosse boraginis mellisophili rosarum & cum been albo et rub. sandalis garyophilis &c. Similiter epithemata cum debitis aquis & pulueribus cordi dicatis componantur. Intrinseca sunt sacharum buglossatum boraginaceum rosaceum uiolaceum addendo ijs aliquid diamusci dul. & electuarij de gemis &c.

#### De cura melancholiæ per consensum.

Cura melancholiæ per consensum binis intentionibus præseruatiuis potius quam curatiuis perficitur. Quarum altera cauet ne hic humor abundet. Altera cerebrum roborando, efficit nequid in se recipiat, & siquid receperit id expurgando a se expellat. Humor non abundabit, si per sectionem uenæ, (præsertim atrabile uniuersum corpus occupante,) uel per purgantia pharmaca superius habita patiens euacuetur, præparando tamen interim ac alterando prout in discrasia expedit, rursusq; repurgando, deinde reuellendo ac diuertendo cum cucurbitulis lotionibus, aut mēstruorum uel hemorrhoidarum euocatione, et in fine resoluendo siquid supersit &c. Roboratur cerebrum cum humectantibus calidis uel frigidis prout morbus requireret tam intrinsecus quā extrinsecus apliciatis, sicuti fieret epithema cū rosis nenuphare folijs salicis uiolarū boraginis mellisophylli stechadis et hedino capite &c.

Loci consentientes de cura Melanch. sine materia.

Auic. prima tertij, tra. 4. cap. de cur. Mel. Si melancholia fuerit



fuerit ex malitia complexionis singularis frigide aut sicce sufficiet, ut administres calefactionem cordis cum letificantibus e medicinis de musco & thyriaca & medridato & similibus, et cura caput cum eis quæ dicta sunt in cap. de stoliditate & c. Gal. etiam. 3. de loc. aff. cap. 7. decura melancholie sine materia loquitur, ibi, Interim morendi sunt amici, qui me curantem uiderunt, frequentibus balneis, uictuq; humido boniq; succi nulloq; adhibito præsidio huiusmodi morbum me curasse, ubi nondum oblongū temporis tractum, nocuus humor euacuationi resisteret & c.

Arcul. in. 9. alm. nouem modos roborandi ac alterandi spiritus & cor docet quem tu fusius uidere poteris. Decura in cerebro cum materia loquitur, ibi. Auic. prima tertij, tra. 4. Si est ex materia melancholica in cerebro confirmata tunc thesaurus curæ est tres res, Prima euacuatio materiei, Secūda ut admistres cum euacuatione humectationem assiduam cum embrocis & oleis calidis, Tertia ut administres confortationem cordis in complexione frigida cum calidis letificantibus & c. De uictus ratione lege. Aet. ser. 6. cap. 10. ibi. post balnea cibos damnus concoctu faciles flatu exortes plerunq; conueniunt panes clibano cocti probe parati, uolucres non pingues non uirosæ, montanæ, oua gallinarum mollia, pisces, petrosi, & molles carne, uitentur in stagnis degentia & in paludibus ex carnibus conueniunt hædina & lactentium animalium & magis extremæ partes probe concoctæ. Vinum sit tenue et album et non ualde uetus. Nec acervatim detur inter cibum, nec magna copia exhibeatur, ne cibi in uentre fluitent & c. Paul. lib. 3. cap. 14. etiam de uictu facit mentionem, ibi, uictus omnibus melancholicis confert probi succi & medio criter humidus uitanda sunt caro bubula & quæcunq; atrabilem generant & c. Itidem Auic. ibi, sumat cibos laudabilis



chymi humectatiuos ualde & fiat augmentum in hoc ut corpus eius tenerescat cum cibis conuenientibus &c. Lege eum fustus. Rases in Diuis. potet uinum album subtile clarum cum aqua plurima. Aqua sit boraginea inquit Guai. De preparatione materiae habes. Aet. ser. 6. cap. 10. ibi, optimum est pulgij decoctum saepe bibere & ante purgatoria et post. Mesu. cap. de melanch. fac ut cadat digestio equaliter in materiam, quoniam est cura uera &c. Hip. in lib. de atra bile, Primum quidem bona digestio curae sit deinde purgatio, Et Auice. loc. cit. Incipe a digestiono et paulo infra laudat syrupum in quo semina flatus discutientia decoquantur. De euacuatione melancholiae loquitur Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Nam ubi uniuersum corpus sanguine melancholicum continet, curatione a sectione uenae incipere oportet, ubi uero solum cerebrum sanguinis detractione aeger non indiget, quanuis ob aliam forte causam mitti possit &c. Itidem adserit Aet. adiungens ni praeservationis gratia detractionem faciamus. Auice. prima tertij, cap. de cur. mel. Amplius euacua in principio rei cum medicinis lenibus in quibus recipiuntur epithimum pulpa colocynthidos & scamoneae parum, deinde cum decoctione in qua sit epithimum & agaricum, & postea si non confert administra hieras magnas deinde helleborum sed cum timore & cautella, quae si non conferunt, rursus reiteta & in omni hebdomada euacua uice una &c. B. Nota melancholicos ob grauitatem humoris per inferiora purgari debere, unde Hippo. aphor. 4. aphor. 9. Melancholicos plenius inferiores, eadem ratione contraria apponentes, unde dixit  $\alpha\delta\ \rho\alpha\tau\epsilon\ \rho\alpha\varsigma$  pro  $\sigma\phi\alpha\delta\ \rho\alpha\varsigma$  i. plenius pro fortius quam humor de sui natura ad exitum sit ineptus. Paul. libr. 3. cap. 14. purgentur per initia epithimo uel aloe. Aet. ser. 6. cap. 10. In quibus uitiati humoris magis redundant agrum purgabis per hieram ruffi aut archigenis



aut iusti, conducit etiam sero lactis aluum subducere quod a lacte per cocturam separatur. B. Modus seggregandi lac a sero habetur non solum hic ab Aet. Sed etiam à Diosco. cap. de lacte, ubi etiam modum bibendi demonstrat.

De reuulsione & resolutione loquitur Auice. ibi, Quūq; purgaueris attende ad cor cum his quæ multotiens diximus & administra masticationes gargarismata & odoramenta bona muscum & ambram & alfeniati & xylo aloen & c. B. Alfeniati sunt species aromaticæ ut gariophyllum & similia. Mesu. Secundum regimen est faciens resolutionem cum mediocritate uide Arcul. & ceteros practiçantes de resolutione & c. De cura per consensum lege primum illud Paul. Morbum qui ex totius corporis consortio trahit originem, uiribus ualentibus, a sanguinis missione curare incipies & interposito tempore uiribus recollectis inferius purgare conuenit & si hæmorrhoidibus aut mensibus suppressis morbus proueniat horum purgationem moliamur. Itidem ait Aet. ser. 6. cap. 9. ibi, Quum igitur totum corpus melancholicum sanguinem habuerit & c. Itidem Auic. loc. cit. ibi, Nam si uides uenas plenas qualitercunque sit cholera nigra est sanguinea, phlebotometur igitur ex nigra & c. Lege etiam Gale. 3. de loc. aff. cap. 7. De alijs intentionibus habes plura iuxta modernos authores, Auice. pro resolutione utitur triphera. 3. iij. ephitimi 3. i. hiera 3. s. Aet. theriaca præsertim hieme & uere. De roboratione cerebri lege Auice. ibi, Succures illi cum eis quæ caput infrigidant & humectant ipsum ac confortât, ut non recipiat quod peruenit ad ipsum ab alijs & c.

#### Observationes in cura.

Auic. prima tertij, tra. cit. Oportet ut cura eius fieri incipiat antequam confirmetur quoniam facilis est in principio, & praua et difficilis cum est confirmata, sitq; studium tuum



in humectando magisq; incalefaciendo. Itidem ait Aet. ser. 6. cap. 10. ibi, Incipientem affectionem curare oportet &c.

#### Observationes de cibo.

Auic. loc. cit. Et prohibe ne comedant post cibum illū, aliū & ab intermissione cibi super cibum iam corruptum, & alienent a se fabas carnes salitas lentes & caules & uinū crassum & nouum et omne sal & omne falsum & acre & acutum & quod est uehementis acetositatis, sed sumat pingue & dulce & cibos generatiuos sanguinis laudabilis &c.

#### Observationes de euacuatione.

Mesu. cap. de melancho. tria in euacuatione annotanda proponit. Primum ut non semel laboriosam & subitanam euacuationem faciamus, sed pro temporis interstitia, nam subitanea ac uiolenta euacuatio uix a natura regulatur. Secundū q̄ solutiuum sit commensuratum non excedens mediocritatē. Tertium non spoliatur a rebus lenientibus et humectantibus. Hoc idem sentit Auic. ibi, euacuato in rei principio cum medicinis lenibus &c. B. Adde tu q̄ pharmacū in se habeat aliquid ex medicinis membra principalia & spiritus roborantibus &c.

#### Observationes de sectione uenæ.

Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. Quum speraueris in uniuersi corporis uenis melancholicū sanguinem contineri, quo certiores habear notitiam, mediam cubiti uenam seca, quæ communis est quod si fluens sanguis non uideatur melancholicus. statim supprimatur, si uero talis appareat, euacua quātum pro laborantis corporis habitus satis esse conieceris &c. Itidem Aet. cap. 9. adserit Auic. loc. cit. Amplius si phlebotomas & in uenis sanguinem subtilem, non retineas sanguinem propter hoc, quoniam multotiens in ipsa precedit subtile. Et similiter oportet ut amplifies phlebotomiam, ut non effluat quod subtile



est & retineatur crassum. Mesu. si sanguis exuberat in toto et uenæ plenæ sunt, euacua ex uena nigra & post ipsam ex basilica et hoc in melancholia, in mania uero fac, e, contra, Incipe a basilica deinde ex uena nigra & posthas phlebotoma ex sa phenis & c.

### Observationes de alteratione.

Arcul. & Marc. Catin. fac q. alteratio, non uirtutæ solum, sed etiam numero euacuationi correspondeat, ita, ut non fiat statim sed successiue ut dictum est.

### Observationes de resolutione.

Auic. loc. cit. non administrentur pura resolutiua ut non incrassetur humor propter resolutionem puram & c. et paulo post, Quumq; administras embrocas, non est uia administrandum infrigidantia pura super caput & c. Intellige in mania & c. Michael. Sauo. diuretica in hoc casu sunt suspecta ex eo quod tenue educunt & crassum aptum in melancholiam conuerti reliquunt & c.

### Melancholiam incitantia.

Inducunt melancholiam et maniam carnis uacinae, nimius anacardi usus alleum hyosciamus lentes, solatrum fluuiiale, uitis alba & quæcunque sanguinem crassum efficiunt.

### Melancholiam curantia.

Curant melancholiam, absinthium, epithimum, fumus terræ, borago, buglossa, lupuli, anacardi, aurū, margaritæ, calamus aromaticus, sena, helleborus niger, eupatorium, mellisophyllon, matricaria, scylla, stechas, thimus, myrobalani chebuli & nigri, oximum fluuiatile, diasene, confectio hamme, confectio esdra nic. ius galli decrepiti, serum lactis, pliris arcoticon nic. rosata magna nic. dianacardinum serapio. 8. antido. mitridatū, lapis armenius, lapis lazulus, pillule inde, pillule de lap. lazuli. sal indum, sacharum buglosaceti



boragineaceum, rosaceum, muscus, letificans almans. cū de gemis, & mille alia quæ arte parari possunt. Vide de hac re. Varignanam cap. 8. tra. 2. Plura composita afferentem, uide etiam Montag. conf. 47. de ægritudinibus cap. Vide insuper Arcul. Michael. Sauo. & Gord.

### De pronosticis melancholiæ.

Hippoc. lib. de atrabile Morbus hic quum nondum fere incepit curari debet, nam inueteratus difficulter curatur ac tractatur, cognosces esse confirmatum ex signis supra positis. Et aphor. 6. aphor. 53. Desipientiæ quæ cum risu fiunt securiores quæ uero cum studio periculosiores.

### Obiectio.

Quomodo esse potest risus in melancholia quum dictum sit, marorem & tristitiam esse eius accidentia?

### Responsio.

Duplex est risus fictus & uerus, sed de hoc lege Gentilem & Arcul. qui de hac refusus sermocinantur, intelligeq; securiores pro minus periculosas. Et aphor. 6. aphor. 21. In insipientibus si uarices uel hæmorrhoides superuenerint insanie solutio. B. Fit solutio, natura ad ignobiliore partes humorem melancholicum transmittente. Auic. cap. de Melan. si accadat casus appetitus tunc ægritudo est mala, et si accidant in corporibus eorum ulcera tunc mors est propinqua. Si uero cholera nigra appareat in egestionem uomitu, urina in coloris cutis lentiginibus & panno & ulceribus, scabie uaricibus elephantia & cursu quod ex ano profluit est signum bonitatis, quia hæc signa omnimodam a sanguine discretionem ostendunt &c. Et aphor. 6. aphor. 56. In morbis melancholicis ad hæc periculosi decubitus stuporem corporis uel conuulsionem uel furorem uel cecitatem significat. Et aphor. 6. aphor. 2. Atrabile uexatis et renū passionibus hæmorrhoides



superuenientes bonum. Auic. prima tertij, tra. s. preparati ad hoc sunt trauli & syllabam multotiens repetentes antequam dictionem proferant & c. et hæc ægritudo plus accidit uiris, sed in mulieribus est deterior, et multiplicatur in iuuenibus et senibus. Et plurimum melancholiā habens est spleneticus, & ægritudines quibus succedit melancholiam sunt sicut febres temporales & mixtæ, & melancholia accidens successionem alterius ægritudinis calidæ, facilis est curæ, ita, ut embrocationibus remoueatur & c. B. Trauli dicuntur qui proferre non possunt, r, & s, ob humiditatem linguam mollificantem, Dixit accidere plus uiris quam mulieribus quia calidiores sunt uiri fæminis. De successione huius morbi per alias ægritudines lege. 3. pronost. tex. 29. in commẽ. Gale. & c. Hippoc. de morb. uulg. melancholici magna ex parte morbo comituali laborant & econtra. B. Quia habent communem causam idcirco facile alter in alterum mutatur & c.

Authores dissentientes circa Melancholiam.

- 1 Adserere, in hoc morbo idem esse affectum & causam.
- 2 Adserere, in omni specie melancholiæ sectionem uenæ congruere.
- 3 Adserere, pituitam adeo assari posse ut melancholia efficiatur.
- 4 Adserere, Melancholiam confirmatam sine controuersia posse sanari.
- 5 Adserere, humorem melancholicum, qui est fex sanguinis non differre a melancholia.

Ad primum Gale. lib. 2. artis cur. Melancholiæ nomen, & causa ipsum faciente prouenit, & humor qui ipsius est causa melancholia ab omnibus dicitur. Igitur sicuti differt causa ab effectu, ita, hic affectus a sua, & sic idem non erunt.

Ad secundum Gal. 3. de loc. aff. cap. de Melan. Vbi uniuer-



sum corpus sanguinem melancholicum continet, curationem a uenæ sectione incipere oportet, ubi uero solum cerebrum, infirmus sanguinis detractio non indiget, in omni igitur specie sectio uenæ non congruit.

Ad tertium Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. Igitur ea quæ atrabilis constituit, in melancholiam transit, quæ uero a pituita parta est, in aliam affectionem permutatur, melancholiam haudquaquam efficiens.

Ad quartum Alex. ca. de melanch. Si confirmatur hic morbus cerebrum ad sui naturam mutat, & æger ad assumptionem medicinarum fit inobediens &c. Hippoc. lib. de atrabile, non curatur confirmatus quia in insaniam sæpe conuerti solet, idem etiam Aet. & Auic. adserunt.

Ad quintum Gal. lib. de atrabile et de plenit. circa finem Porro dum ea ueluti fex sanguinis permanet neque ad huc acida facta est, satius forsitan sit, humorem melancholicum illam appellare, nondum melancholiam sed melancholicum potius humorem solemus appellare quoniam prope accessit ut in melancholiam uertatur, melancholia uero dicitur, quæ iam atrabilis est, & sic per hæc uerba inter se differunt.

#### De Ophthalmia.

Lippitudo græce οφθαλμία dicta, est adnatæ tunicæ inflammatio rubore caloreq; plurimo, ac punctationibus eueniens in hoc genere continetur etiam perturbatio siue uacillatio a græcis ταράξις dicta, quæ nihil aliud est quam oculi humiditas cum calore & rubore naturæ alieno ob extrinsecam causam forinsecus adueniente. Sequitur etiam tertia species ophthalmiæ a græcis dicta χημοσιs arabice alquardenegi et fit quotienscumq; ab inflammatione uehementi utraq; palpebræ ita inuertuntur ut uix oculi ab ipsis contegantur.

Loci consentientes de ophthalmiæ.



Gal. 1. de diff. mor. cap. 13. Lippitudo est membrana quæ ce-  
 ratoidi tunica adheret phlegmone. Itidem de part. art. med.  
 cap. 3. ait et in lib. finit. med. est inquit phlegmone circa oculos  
 cum rubore & plurimo calore & motu difficili ac punctio-  
 nibus nata. Auic. tertia tertij, tra. 1. Ophthalmia alia est uera  
 & alia ei similis, quæ nominatur conturbatio & uacillatio,  
 ophthalmia uera est apostema in coniunctiua, et alia quidem  
 est quæ est apostema simplex non pertransiens terminum, &  
 alia est quæ magis est pertransiens termini in magnitudine,  
 in qua superabundat albugo super pupillam & tegit eam &  
 prohibet clausionem & nominatur chimosis & apud nos  
 alguardenegi & c. B. ex his intellege tres esse ophthalmie spe-  
 cies, Prima est *ταραξις* quæ levis est, nam remota eius causa  
 remouetur, Secunda ophthalmia quæ est apostema simplex  
 non pertransiens terminum et in ea est uenarum exuberatio  
 fluxus. & dolor Tertia *χημωσις* quæ est ophthalmia magna  
 pertransiens terminum in magnitudine in qua superabundat  
 albugo super pupillam & c. Amplius scito omnes oculorum  
 morbos esse in triplici differentia. scilicet ex phlegmone fluxu &  
 ulcerationibus, quid sit phlegmone iam declaratum est, Fluxus  
 uero est tenuium delatio humorum citra uoluntatem quæ co-  
 hiberi non potest, Ulceratio uero est ceratoidis ruptio ab ictu  
 uel a ualida inflammatione oriens de his uide Gale. lib. fin. me-  
 dē. Habet etiam unaquæque oculi tunica morbos a quibus af-  
 ficitur, quæ seperatim a Paulo, & in uno capite ab Aetio  
 declarantur. De his uide etiam Manardum episto. 2. lib.  
 7. Loquitur insuper Gale. de his primo de diff. mor. cap.  
 13. & 4. de sympt. cau. circa principium. Paul. lib. 3. cap. 22.  
*ταραξις* est oculi humiditas cum calore & rubore nature alie-  
 no, non ex corpore sed a foris adueniente causa. Gale. lib. fin.  
 med. chemosis est ambientis oculum membrana quod album



quoq; appellatur extuberatio albæ carnis persimilis &c. Vide etiam Paul. loc. cit. ibi chemosim uocant &c.

### De causis ophthalmiæ.

Causæ initiatrices sunt puluis fumus sol aer uel quæcunq; ex sex rebus non naturalibus & sibi annexis oriuntur. Causæ antecedentes sunt sex sanguis bilis pituita atrabilis, materia aquosa & flatuosa. Causæ coniunctæ sunt hi humores ophthalmiam ad actum producentes, aut inflammatio aut alius quispian tumor. Causæ generationis ophthalmiæ binæ sunt, prima fit cum materia ex superfluitate alimenti ad natæ tunice, paulatim congeritur, aut ipsum alimentum non probe concoctum in ea permanet & apostema efficit, Secunda est cum materia per modum fluxus a capite per uenas & arterias musculos ac nervos obticos siue intrinsece siue extrinsece ad natam oculi tunicam se confert aut quum ab alijs corporis partibus materia transmittitur ad oculum iam debilem ob eius temperaturam, uel a generatione existentem. Causæ doloris oculorum in inflammatione fiunt aut ex acrim humorum influxu, aut a distentione tunicarum repletarum aut a crassibus humoribus & a flatuosis spiritibus &c.

### Loci consentientes de causis Ophthalmiæ.

Gal. in lib. de ocu. cap. 8. Ophthalmia quæ uisum turbat triplex est cuius causa uel est exterior ut sol fumus puluis, uel interior sicut humores ad coniunctiuam fluentes. Paul. lib. 3. ca. 22. perturbatio oculi fit a foris adueniente causa ut a sole fumo puluere oleo &c. Auic. tertiatertij, tra. 1. itidem ait ibi, fit a causis extrinsecis facientibus in ipso botor & rubificantibus oculum, sicut a soda adustiua a sole puluere et fumo & frigore & propter constrictionem ipsius &c. De causis antecedentibus loquitur etiã Auice. loc. cit. ibi, Quum ophthalmia sit apostema & omne apostema fiat a sanguine uel a phleg-



mate, uel a melancholia, aut a cholera, aut a uentositate, tunc similiter ophthalmiae causa nō euacuatur ab una istarum causarum & c. Alex. lib. 1. ca. 23 idem ait ibi considerandum cuiusmodi sit *περιττωμα*. i. superfluum, utrū ex humore atrabili sanguineo bilioso pituitofo ue ortum sit & c. Lege etiā omnes fere practiçantes de hac re loquentes. Quod autem humores ophthalmiam ad actum producentes sint causa coniuncta patet ex Auice. dum dicat, sed aduentus eius plurimū est propter cursum materierum & multitudinem uaporum & c. De causis generationis ophthalmiae lege etiam Auicen. ibi, et quādoq; humor apostemans generatur in ipso & quādoq; est adueniens ei a cerebro secundum semitam catarrhi per uiam uelaminis intrinseci & c. lege hunc locum uberiùs & plura ad rem facientia inuenies, lege etiam Alexan. lib. 1. cap. 23. ibi diligenter prospiciendum est, Vnde nam quod redundat in oculos ex solo ne capite, an ex uniuerso corpore manet, mox arterias ne ante per uenas siue per utraq; in eū sese locum recipiat, & c. De causis doloris ophthalmiae loquitur Auic. ibi, uiolentia doloris ophthalmiae aut est propter humorem mordicantem et corrodentem tunicas, aut propter humorem plurimum extensiuum aut propter uaporem grossum & c. Gal. 12. meth. doloris causas in genere longo sermone in uestigat, quæ breuiter ita se habent, omnis dolor aut ob uehementem & aceruatim irruentem alterationem fit, aut ob continuitatis solutionem, continuitas soluitur ruptione contusione ac corrosione. Hæc uero uel ob distentionem aut grauitatem aut mordacem qualitatem producuntur. Si igitur nil extrinsecus sit, quod distendat grauet & corrodāt, tunc distentio ab interno humore multo aut a flatu concluso aut a plurima siccitate oritur, grauitas a dura aliqua magna aut graui mole corpori extra illapsa contingit, aut ab interno



aliquo magno ac graui tumore, mordax qualitas ex humoribus acribus ac mordacibus prouenit, alteratio autem per uehementem fit caliditatem aut frigiditatem siue spirituum siue humorum siue partium solidarum, quæ omnia in omni dolore considerata sunt, uide illum tu uberius.

De signis ophthalmiæ.

Signa communia ophthalmiæ sunt tumor grauitas dolor et rubor. Signa ueræ ophthalmiæ sunt quum album oculorum in ruborem mutantur cum fluxu lachrymarum & lippitudine in angulis oculorum lachrymalibus collecta. Signa temporum ophthalmiæ sunt si materia ab humore oculi proueniens aquea & tenuis fuerit tunc est morbi principium, si uero crascescat et ad album tendat, erit morbi incrementum, si palpebras quas græci *βλεφαροὺς* dicunt adglutinat, erit morbi consistentia præsertim si lachrymarum copia præcesserit, si uero hæc omni minuuntur erit morbi finis. Signa humorum sunt & primo sanguinis oculi rubor & tumor & uenarum plenitudo, temporum pulsatio dolor potius extendens quam pungens grame & glutinationes apud somnum fiunt. In biliosa adest punctura uehemens dolorq; adurens et uehemens, rubor oculi paucus, lachrymæ tenues & acutæ quandoq; exulcerantes & per somnum non agglutinantur, tumorq; paruus uisitur. In pituitosa adsunt tumor parua caliditas, rubor ad albedinem decliuus cum pauculo dolore & multa grauitate, glutinationes iuxta somnum fiunt & color faciei est albus. In melancholica dolor debilis, grauitas cum offuscatione, exiccatio cum perseverantia, paucitas glutinationis et minute sunt grame & paucae lachrymæ. Signa flatuose ophthalmiæ sunt extensio sine grauitate, ruboris paucitas sine lachrymarum fluxu. Signa perturbationis sunt leuitas curæ et causæ præcedentes & quantitas apostematis primitiui. Signa quando fit non



per consensum sed per essentiam in capite sunt dolor capitis præcedens & grauitas &c. Si consensu uentriculi præceßit uomitus nausea &c. Signa fluxus humoris per partes exteriores sunt frons extenta uenæ exteriores plenæ &c. Si per intrinsecas tunc præcedit frequens sternutatio dolorq; ab interna parte oculi, antequam ophthalmia appareat &c.

### Loci consentientes de signis ophthalmiæ.

Signa communia tetigit Gal. 2. de loc. aff. cap. 7. ibi, Inflammatis partibus accidit ut rubescant tendantur, renitantur intumescant & doleant uide de his Arcul. in. 9. alm. De signis ueræ ophthalmiæ meminit Razes. 9. alm. ibi, Cum ea quæ in oculis alba sunt & in rubedinem mutata fuerint, fluxerintq; lachrymæ & in angulis oculorum lachrymalibus lippitudo collecta fuerit, dicimus tunc egrum pati ophthalmiam & quanto plus symptomatum uehementia aut ipsorum adfuerit minoratio tanto magis erit ophthalmiæ fortitudo uel debilitas. Signa temporum ophthalmiæ habentur ex Auice. tertio tertij, cap. de sig. opht. ibi, Cunj; palpebræ conglutinari incipiunt tunc iam maturationis adest propinquitas dum uero perseuerat fluxus aquosus est initium adhuc &c. Vide in hoc latius Arcul. & Sauonaro. De signis humorum loquitur Alex. lib. 1. ca. 23. ibi, sanguis cognoscitur quum sanguineo colore omnia tincta sint uultusq; cum rubore suffunditur, receptacula sanguinis plena ui suntur, grauitas sentitur, functiones solitæ segnius perficiuntur, lachrymæ nec mordaces nec acres erunt &c. Notæ bilis sunt biliosa complexio, lachrymæ mordaces, non solum hirquos qui, a Græcis καυτοί dicuntur exurentes sed & genas & quasunque partes attingunt &c. Auicen. loc. citato. Sanguineam ophthalmiam significat color oculi exuberatio uenarum, & pulsatio



temporum &c. Vide fusius etiam de alijs humoribus, & nota q. Arabes pro lippitudines superfluitatem quartæ concoctionis in oculo intelligunt & quandoq; accipitur pro illa humoris parte quæ oculū infestat ut Razes, & quas uocat Aet. glutinationes & granas, Arabes dicunt lippam &c. De signis perturbationis meminit Auicen. ibi, post dicamus q. conturbatio cognoscitur leuitate sui & causa sui & quantitate apostematis &c. Similiter de signis per consensum & per essentiam ibi ophthalmiam in capite signat sola grauitas capitis & si est cum communitate stomachi asociatur ei nausea et conturbatio &c. Signa fluxionum per partes exteriores habet Paul. ibi. fluxiones extra caluariam notant uasa in fronte & temporibus distenta & caput ueluti reuictum tum q. ex agglutinentis sicca præsidio sunt. Si hæc desint & floris impetus per rogetur & sternutamenta nonnunquam moleste elidantur humorem sub calua contineri cesendum est. Itidem ait Auice. Si uia fluxus a cerebro ad oculum non est nisi per uelamen extrinsecum tunc frons est extensa & uenæ exteriores sunt plenæ &c.

#### De cura perturbationis.

Perturbatio per eius causæ ablationem curatur & si quid doloris remanet per alterationem in contrarium reijcitur. Nam impressio calidi per frigida, frigidi per calida facile remouetur &c.

#### De cura ueræ ophthalmiæ.

Quinq; in cura occurrunt scopi, uidelicet uictus ratio, reuulsio et deriuatio, humorū præparatio, euacuatio, et symptomatum ablatio. Victus sit in principio parcus boni succi facile concoctilis uitentur acetosa salsa coitus motus, potus uini præsertim in principio, laudantur somnus, aer obscurus alui excretio assidua. Reuulsio et deriuatio fient per sectionē uenæ



saphenæ commuis & cephalice ab eodem latere præsertim si plethorica fuerit dispositio, fiet etiam per frictiones a superioribus partibus ad infimas descendentes, uel per cucurbitulas uel per clysteria et pillulas soluentes ut Razes, Preparatio humorum fiet in calido humore cum frigidis tenuem humorem in crassantibus ut cū syro. de papauere rosaceo iuiubino de granatis &c. In frigido cū calidis ut rhodomelle oxymellite simplici &c. Euacuatio perficitur rursus uel per sectionem cephalicæ eiusdem lateris, uel per soluentia pharmaca, soluunt humorem calidum pillule aureæ. Aggregatiuæ electuariū de succo ros. Decoctum myrabolanorum citrinorū casia manarheub. Soluunt frigidū pillule chochiæ diaturbit diaphinicon electuarium indum cofectio hamech &c. Ablatio symptomatum completur doloris causam auferendo & cum anodinis mitigando, et ad leuia stupefacientia usq; perueniendo &c.

#### De cura locali ophthalmiæ.

Cura localis triplex est, prima repellit materias ad oculū fluentes cum frigidis stypticis ut oculus non recipiat in principio morbi, Secunda est repulsio admixta resolutioni conueniens augmento & statui, Tertia est pura resolutio conueniens postremæ status partim et declinationi. Exēpli gratia primo ophthalmiæ calide apponatur albumen oui cum aqua rosacea, in secunda parte principij sief. album sine sarcacolla, in augmento sief. album cum sarcacolla, & tandem addatur aliquid aquæ feniculi uel decoctionis fenu græci melliloti. s. citoniorum &c. Commendantur etiam in resolutione balneum & marum &c.

#### Loci consentientes de perturbatione & ueræ ophthalmiæ.

Aet. ser. 7. cap. 3. perturbationes oculorum facillime curantur si æger a causa ledente discedat ut a sole fumo & alio si



mili &c. Auic. in cura conturbationis & ophthalmie leuis  
 quæ cursu eius procedit sufficit quandoq; causæ abscissio ut si  
 fuerit a repletionē sanguinis aut alterius humoris cū euacua-  
 tione &c. Lege hunc locum fusi⁹. Paul. loc. cit. facillime discu-  
 titur si obseruentur omnia quæ foris accidentia lumen per-  
 turbare possunt item parciorē cibo & aluo de facili respon-  
 dente &c. De uisus ratione in uera ophthalmia loquitur  
 Aet. ser. 7. cap. 8. ibi, Alimenta danda sunt leuia concoctu faci-  
 lia & ad digerendum uentri commoda, urinā cientia, nihil  
 acre & salsum habentia aut crassi humoris &c. Itidem ait  
 Auic. tertia tertij, canon communis in regimine ophthalmie  
 materialis est minoratio cibi & ipsius exiccatio & electio  
 eius quod generat humorem laudabilem et alienatio rei quæ  
 est malæ digestionis & alienatio coitus & motus & potus  
 uini & comestionis acetosi et salsi &c. Similiter et Paul.  
 li. 3. cap. 22. adserit ibi, per initia conuenit nihil assumere &c.  
 De reuulsione & deriuatione locum habes in Auic. ibi, tertia  
 tertij, cap. 10. Quod si materia fuerit sanguinea adhibebis  
 uentosas post phlebotomiam & assiduabis fricationem ex-  
 tremis &c. & cap. 9. Interdum administrantur caput  
 purgia & quæ per nares materie partem extrahunt &c.  
 Paul. lib. 3. ubi πρὸς ἐπιφορὰν ραίματα agit post generales  
 inquit corporis euacuationes, medicamentorum usus est quæ  
 per nares atq; os pituitam eliciunt caput etiam attondetur et  
 incisa cute exasperabitur, huc etiam spectant quas in capite  
 χειρουργίας administramus αγγειολογίαν φημί καὶ ἀρτη-  
 ριοτομίαν ὑποπαισμον τε καὶ περισκυφισμόν, καὶ καὶ  
 σὺν κατὰ τῆς πυφῆς, ἕως ὀστέον, καὶ σιγύαι κατὰ τὰ τοῦ  
 ἰνίου μετὰ εὐχαράξεος reuellere .s. possunt impetum fluoris  
 &c. De humorum præparatione loquitur Mes. ca. de ophth.  
 ibi, Quinta res est alteratio & digestio eius quod est trans-  
 missum



missum & intelligitur tam de extrinseca quam de intrinseca alteratione, uide in hoc casu Arcul. Catin. Gord. & c. De euacuatione quam eradicatiuam uocant meminit Aet. ser. 7. cap. 8. ibi, ubi oculorum distentio fuerit & multus rubor & ad contactum resultus & ardor & lachryma multa & calida tunc sectio uenae adhibenda erit humeralis appellata ita ut animi deliquium succedat, quo dolor eximatur & feruor inflammationis extinguatur & c. Aet. cap. 9. Si uero uniuersum corpus humoribus uitiatis fuerit refertum, tunc iuxta redundantem & affligentem humorem euacuandum, Nam si pituita magis aquosa redundauerit exhibe pharmacum exi euphorbio & sic de reliquis. Auic. tertia tertij, cap. 9. & oportet si fuerit ophthalmia uehemens ut fiat phlebotomia usquequo timeatur lipothomia & paulopost si agritudo sit cronica tunc facienda est phlebotomia ex lachrymalibus & phlebotomandae sunt ambae arteriae quae sunt post aures & c. Et si materia fuerit cholericam euacuabis post phlebotomiam cum eo quod educit choleram & c. & cap. 2. In ophthalmia frigida oportet ut euacuetur humor frigidus et quandoque necessarium est reiterare & c. De ablatione symptomatum habes Paul. cap. 22. Interdum semen papaueris ad leniendum dolorem miscetur, si magna necessitas doloris est etiam opij paululum adhibetur. Auic. loc cit. & quandoque doloris uehementia facit necessariam stupefacientium adhibitionem sicuti succi pomorum mandragorae lactucae papaueris & aquae sumach & c. Similiter & mes. cap. de ophthalmia inquit ibi sextam rem complent administrationes medicinarum dolores sedatiuarum & c. Hip. aphor. 6. apho. 31. Dolores oculorum meri potio aut balneum, aut uenae sectio, aut medicamentum epotum soluit. B. Intellige quod ad remouendum dolorem oculorum, alij pharmaco soluentem indigent, alij sectione uenae, alij fomento, alij potu uini, prout

Q



eorum exigit dispositio, non enim omnia hec auxilia eidem homini adhiberi iubet. Competit uini potus quum crassos humores attenuet & interdum transmutet et euacuet, tum quia facit ut somnus concilietur & sic per accidens dolores sedat. Balneum competit, etiam si dolor tumore molli & laxo, uel a fluxu calido minus fieret, Balneum enim partim dolorem remouet partim signum est rei demonstratiuum, quum sectio uenæ dolorem sedet & purgatorium pharmacum iam manifestum, nam remouendo causam, dolor ipse etiam remouetur. Idcirco in ophthalmia unicus tantum erit medendi scopus, ut scilicet, Inflammatio remoueatue que nec amoueri poterit, nisi causa a qua dependet & ipsa auferatur hoc autem fiet per uentris solutionem ac uenæ sectionem &c. De cura locali loquitur, non solum Mesu. sed & Gale. & Paul. Mes. cap. de ophth. In principio morbi repercussiuus utendum in quibus sit facilitas deinde resolutiuus ita ut perueniatur gradatim & cum successione paulatim ab eo quod est repercussiuum usque ad resolutiuum. Gale. 4. de compos. med. per loc. cap. 2. Adhibenda sunt pharmaca repulsoria non exasperantia, id est non uehementem sortita adstrictionem, sed quæ tum propria sua substantia sunt moderatiora tum lenitiui liquoris &c. Auic. tertia tertij, cap. 10. Quumque repuleris materiam per euacuationem & attractionem & apocrustica, tunc gradatim tendas ad maturatiua et sint in primis mixta apocrusticis, est ergo conueniens in primis eorum compositio cum aqua rosacea & aqua feni græci est bona maturatiui sedatiua doloris & est maturatiuorum dignior & non est in ipsa attractio, postea transi ab his ad decoctionem melliloti, in qua sit dissoluta sarcacolla alba nutrita in lacte mulieris & asine, Quumque descendere inceperis adde in administratione resoluentium, quod sit fortius sicuti sarcocolla in



aqua feniculi uel feni græci & administra balneum si sciueris cerebrum esse mundum & da in potu post cibum per aliquas horas aliquid uini antiqui puri in parua quātitate &c.

Observationes in ophthalmia.

Gale. 4. de compos. med. per loc. cap. 2. Manifestum est omnia pharmaca huiusmodi afectionem curantia sub communem omnium inflammatorum curationem cadere assumereque necessario quidpiam pro partis ipsius natura, quæ excellentē molitiem, & ad hoc ut ledatur aptitudinem, super omnem totius corporis cutem nata est propter sensus subtilitatem et substantiæ raritatem &c. Auicen. loc. cit. cap. 9. Et penitus oportet ut non sit in medicina administrata in oculo & proprie in ophthalmia asperitas nec qualitas saporis acetosi aut acuti, & Paulo infra, & oportet ut patiens ophthalmiam uel rheumatismos ad oculos deuitet in unctionem capitis & destillationem alicuius olei in aurem &c.

Observationes de repercussione in ophthalmia.

Aet. ser. 7. cap. 4. Quicumque oculi secundum naturam uenas amplas habent & sanguine plenas, Item qui glauci sunt omnino non ferunt colyriorum adstrictionem quoniam repellentia oportet ut sint frigida & stiptica, unde fac repercussiuā ne nimia in frigidatione in frigident quia oculum congelescent & uisum auferunt, Secundo fac ut oculum roborent Auice. loc. cit. Et oportet in quantum possibile est ut retardetur colyriorum administratio usque ad tres dies & sufficiat regimen prædictum ex euacuationibus & attractionibus materiarum ad extrema &c. Et Paulo infra oportet ut in principio non administrentur inspissatiua fortia & quæ sunt uehementer stiptica, quoniam inspissant tunicas & prohibent resolutionem & magnificant dolorem & proprie cum dolor fuerit fortis &c. Hoc idem confirmat Aet. ser. 7. cap. 9. ibi, Re-



pulforia colyria quum sint fere uiribus frigidiora obstructionem & corporum condensationem faciunt, & dum humorum materias concludunt, maximas inflammationes & graues dolores inducunt & c. B. Intellige obstructionem fieri si materia in oculo contenta fuerit frigida, Nam in calida & tenui corrodeute maior audacia erit in administratione stypticorum inquit Auic. imo non est malum apud me inquit uti opio ipsum. n. sanat celeriter, uel intellige repulforia esse mala quotienscūq; materia ex uelaminibus intrinsecis ad oculū fluxerit, unde Auic. Quum initium est ex uelaminibus intrinsecis cura est difficilis lege Paul. & Mes. de hac re plura loquentes & c.

Observationes de lacte adhibendo in dolore ophthalm.

Aet. ser. 7. cap. 10. Qui lac pro ouo infundunt uolentes dolorem obtundere decipiuntur, Nam lac a caliditate in oculo præter naturam, facile alteratur, et acrius euadit, unde pro paruo solatio diuturnam affectionem propinant & c. Auice. loc. cit. non est conueniens ut dimittatur destillatio lactis in oculo tempore longo imo oportet ut remoueatur & renouetur omni hora & c.

Observationes de resolutiuis.

Auice. Resolutiua in principio ophthalmiæ uehementer deuota, & oportet ut intendas ante omnia ad mundificationē lippitudinis cum facilitate & non noceas oculo & c.

Ophthalmiæ nocentia & uisum debilitantia.

Nocent oculis, acetum, amyllum, fumus argenti uini, semen canabis, folia castanearum, caules, coriandrum, crocus, lac, lactuca, oliuæ, opium, oximum pisces, portulaca & quæcunq; his uersibus ioci gratia annotauimus.

Hæc oculis multum, sol, puluis, fumus & æstus

Ventus, cum fletu, uina, uenusq; nocent.



Acria ne mandes, nec quæ sint plena uaporum,

Nec cepas, lentes, allia, porra, fabas,

Zoar primo, thei sir tra. 8. cap. 21. inquit capita gallinarum a proprietate causare cecitatem, Item damnat carnes siccas salsas pinguedinem crassam & uiscosam & proprie porcinam, superfluumq; animi & corporis laborem &c.

Ophthalmiæ curantia & uisum roborantia.

Valent ad ophthalmiam, absinthium, aloes, flomos, berberina, camphora, album oui, psyllium, opium, rosa, sarcaecolla, mellilotum, fenugræcū, semperuiua sumach, portulaca, Sief album Mes. Puluis albus Haly. 21. anti. emplastrum ex pomis coctis zucharo & aqua rosacea, addendo aliquid camphoræ uide Muntagn. conf. 63. Vide etiam Varig. tra. 3. cap. 8. Item Gord. Sauon. & Arcul. &c.

De pronosticis ophthalmiæ.

Hipp. aphor. 6. aphor. 17. Lippientem alui profluuium corripit bonum. B. Quia humorum abundantia euacuatur simul & ad inferiora retrahitur dans nobis exemplum ut in lippitudinibus aluum nos quoq; subducamus Auic. Et ophthalmia est uelocioris status in qua lachrymæ magis currunt & quæ acuticrem habet mordicationem, & tardioris, quæ est magis sicca. B. Cognoscitur an longo uel breui tempore sit lippitudo duratura, aut a multitudine materiæ ad oculum fluente, aut ab oculi imbecillitate, aut a uiarum latitudine, quod si longo durauerit tempore, ulcerationem uel oculi interitum pronunciat. Hip. aphor. 3. aphor. 12. si hyems australis & pluuiosa fuerit &c. & in fine, lippitudines siccæ fiunt &c. lege insuper aphor. 13. & 16. & 21. eiusdem lib. 3. Auic. loc. cit. si initium ophthalmiæ erit ex uelaminibus intrinsecis cura est difficilis, & omnis aegritudo quæ fit per communitatem uelaminum exteriorum est magis salua &c.



Authores dissentientes circa morbos oculorum.

- 1 Adserere, uisionem fieri extra mittendo, & non itus suspi-  
ciendo cum Platone.
- 2 Adserere, sectionem uenæ nō conuenire in omnibus oph-  
thalmiæ speciebus.
- 3 Adserere, in doloribus oculorum stupefacientia esse ual-  
de utilia.
- 4 Adserere, Balneum in ophthalmia minime prodesse.
- 5 Adserere, oculos esse complexionis igneæ, quum maxime  
luceant.

Confutatio dissentientium circa morbos oculorum.

Ad primum respondet Aristo. in lib. de sens. & sensa. 4. *impossibile sit fieri extramittendo probat. Præterea Auer. 3. collig. Si uisio inquit fieret extra mittendo, sequeretur q̄ in obscuro uideretur, sicut in luce, neq; lux ut medium, neq; re-  
the, nec tunicæ opus essent inuidēdo, neq; destructo aliquo isto-  
rum, uisus destrueretur, De his uide Arist. loc. cit. interrogan-  
tem empedoclem, quomodo uisus extenderetur usq; ad astra,  
si quid corporeum foret quod ab oculis emittitur, lege de his  
fufis Conciliatorem differen. 64. & c.*

Ad secundum Auic. tertia tertij, cap. 9. Et phlebotomia ex-  
cephalica est conueniens omnibus speciebus eius. Itē Razes.  
9. alman. cap. de oph. In principio curationis minuenda est  
semper cephalica, et quāto fortior fuerit ophthalmia, tanto  
plus est minuendum de sanguine itidem ait Mes. et sic in om-  
ni spetie conueniet, si non ratione euacuationis, saltem ratio-  
ne diuersionis & c.

Ad tertium Gal. aphor. 6. comm. 31. Si talia sint debilia tunc  
fluxiones non reprimunt uehementes, si uero sint ualde stu-  
pefacientia, ut ex eis maximam oculi inflammationem non  
sentiant, tunc necessarium est simul uim uisoriani offendi,



adeo q̄ cessante inflāmatione, uel debiliter uel nihil omnino uideant simul autem & quandam præduram dispositionem, quæ difficulter sanari possit in oculorum tunicis derelinqui, & sic per Galenum nullo modo sunt utilia.

Ad quartum Gale. eodem comm. Securissimum est fomentum & omnino aliquam afferens utilitatem, uel tanquam signum ad cognitionem, uel tanquam causa sanitatis, nam si nihil influit omnino in oculos fomentum contentam in ipsis superfluitatem dissoluens, sanitatem restituit, si uero ad huc influit, suo calore affert aliquod leuamen, & paulo post dolore auget & tunc fit signum dignoscitiuum & sic utroq; modo sum opere confert. ut Gal.

Ad quintum respondet Arist. de sen. & sensa. & quinto de generatione animalium dicens q̄ oculus est cōplexionis aqueæ, quia aqua est impræssionū susceptibilis, nec potest esse ignea, quum ignis nimium agitetur & de facili resoluatur nihil pene retinens, igitur non cōplexionis igneæ, uerum oculus quo ad eius spiritus naturam ignis obtinet, sed in ipso simpliciter dominatur aqua. Nam constat q̄ tactus & gustus terre attribuantur, oculus aquæ, auditus aeri, olphatus igni ex funali enim uaporatione perficitur, quæ ignea esse perhibetur & c. Lege tamen de hac re Concil.

#### De oculorum suffusione.

Affectus quia latinis suffusio a græcis ὑποχυμα, ab Aui. aqua a uulgo chattarata dicitur, est inter chrystaloidem & corneam circa pupillam humoris aquei concretio, quæ ubi perfecta fuerit uisum impedit, hanc aliqui cum glaucomate idē putarunt sese decipientes, nam hypochyma sicuti est aquosi humoris concretio, ita glaucoma est naturalium humorum in cæsum colorem, mutatio, Præterea in glaucomate nil prorsus, in suffusione aliquantulum cernitur.



## Loci de suffusionis descriptione.

Gal. lib. finit. med. suffusio est humoris aquosi in chrystalloiden & corneam concretio Aet. ser. 7. cap. 51. suffusio est præterfusio humorum circa pupillam congelatorum ut ubi perfecta fuerit, uisum impediat & c. Paul. lib. 3. Hipochymata humorum dicimus effusionem, qui inter tunicam uisum ceras toidē & chrystaloidē concretescentes impediunt, uisum Auic. teria tertij, cap. 18. Descensus aquæ est egritudo opilatiua & est humiditas extranea, stans in foramine uenæ inter humorem albugineum & syphac & corneam. Quare prohibet penetrare formas ad uisum. B. Aduerte q̄ una eadem infirmitas est chataracta, suffusio, aqua gutta et imaginatio apud arabes, in hoc tamen differunt, quia imaginatio est tanquam suffusionis principium, in quo id uideri imaginamur, quod uere non est, aqua uero & gutta est quum in modum aquæ uel guttæ suffusio uideatur, Nam dum currit & in compræssione digiti dispergitur aqua dicitur, dum uero firmari incipit, gutta at quum iam dudum firmata est, uocatur chattaracta, Aet. loc. cit. Glaucedo est chrystalini humoris in cæsum colorem mutatio. Itidem ait Paul. loc. nuper cit.

## De causis suffusionis &amp; eius spetiebus.


Cause uel fiunt primario affectu in oculo, ex nutrimento huius partis non bene conuerso, aut superfluitate nutrimenti non resoluta, uel fiunt per consensum capitis humiditatem hanc ad oculum transmittentis, uel ex uaporibus oris uentriculi ad oculos eleuatis deinde a frigiditate oculorum in humiditatem conuersis, Speties suffusionum uariantur in quantitate & qualitate et loco, in quantitate quia interdum tantæ molis est ut integram in oculo obstructionem pariat, interdum tam parua ut non totum lumen occupet, sed per partem res uideantur, interdum etiam ita crassa est, ut nihil in lumine comprehen-



datur, interdum adeo subtilis ac tenuis ut res quidem, sed ueluti sub nube cernantur, Ambae hæ curam nō admittunt cum acu, sed tantum quæ inter has species media quodammodo fuerit. Species in qualitate sunt multi formes ratione coloris, Nam quædam aeri quædam uitro sunt similes, Alie sunt albe, alie uirides, alie flauæ siue citrinæ &c. Differunt loco, quia alie fiunt in tunicis, alie in humoribus in tunicis quum aliquod uestigium siue occultum siue manifestum ab ophthalmia uel ab alio morbo relinquatur uel quum adeo crassescant ut uisio impediatur, in humoribus quum uel eorum substantia fiat humiditas aquosa, uel eorum complexio colorem inalteret & nutrimentum transmutet &c.

Loci consentientes de causis & speciebus suffu.

Gal. 4. de loc. aff. cap. 2. sunt & alij oculorum affectus quibus ei per consensum adueniunt, unde subdit igitur accidentia suffusorum uisis similia uidentur, oculis nulla propria affectione molestatis, sed aut oris uentriculi aut cerebri cognitione id accidere solet &c. Et. 1. de loc. aff. ca. 2. Accidit nonnunquam ut efficiens causa pertransiens, non firmum in particulam faciat effectum, ueluti quum suffusioni similia quædam oculi imaginantur, collecto in ore uentriculi tenui excremento, unde uapores quidam subleuati, deinde circuenti a uisifica facultate similes imagines moueat, quales per suffusiones apparere consueuerunt idq; maxime solet euenire ijs quibus oculorum humor exquisite purus est, aut uisifica facultas quam facillime sentit. Et. 3. de loc. aff. ca. 1. Itaq; affecto stomacho oculi similibus infestantur casibus quales in suffusionibus apparere solent, dicendum est, illos pati, elato ad cerebrum ab humoribus in uentriculo contentis, fumoso quopiam uapore &c. De his lege etiam in fine cap. 7. eiusdem lib. & quomodo consensus fiat intelliges, Gal. 4. de sympt. cau. cap. 2. facili-





tas uisifica offenditur uel neruo ad oculum descendente affecto, uel cerebro & c. lege fusius totum hoc caput. De speciebus suffusionum loquitur, Gal. 4. de sympt. cau. cap. 2. ibi, Haud aliter accipienda sunt ea, quæ de aquosi humoris quantitate substantia & colore, diximus & c. Auic. tertia tertiæ, cap. 18. Et ipsa quidem diuersificatur in quantitate & in qualitate, in quantitate quandoq; est plurima & opilat totum foramen, & non uidet oculus aliquid, & quandoq; est pauca quia opilat partem eius & dimittit partem detectam & c. Gal. in lib. de ocul. ca. 12. huius color aquæ est diuersus, quædam. n. aeri, quædam uitro assimilatur, alia est quasi alba, & c. Itidem ait Aet. ser. 7. cap. 51. Auic. loc. cit. Diuersitas in qualitate quandoq; est in essentia quoniam alia est subtilis & clara & alia est crassa ualde & quandoq; est in colore quoniam alia est aerei coloris alia alba & est margaritalis & c. Gal. 4. de sympt. cau. cap. 2. Quod alia per locum affectum fiat diuisio demonstrat dicens, unus affectus ad tunicam ipsam rhagoidem spectat, alter ad humorem tenuem effusum, qui inter crystalloideam & rhagoidem medius existit, quod etiam intelligendum est de ceratoide, unde paulo infra adserit q. si ceratoidis tunica crassior densiorq; fuerit hebetem efficit aciem, si uero humidior ac densior, non hebetem solum obtusumq; reddit uisum, uerum etiam efficit ut qui sic affectus est. putet se, per tenebras aut nebulam aut per fumum res ipsas intueri & c. Itidem ait Auic. ibi, ca. 9. Nam aut existit in tunicis, aut existit in humoribus, quæ existit in tunicis est ut sit super tunicam corneam uestigium oculum ualde, quod remansit a uariolis aut ophthalmia & c.

#### De signis suffusionis.

Signa præcedentia sunt, ut qui sic affectus est, ueluti quædam caliginosa uel paruos culices uel fumosa & nebulosa ui-



dere uideatur, aut circa lucernas circulos uel dupplicatū lumen se intueri arbitretur, quæ imaginationes uariantur in quantitate, quia parua uel magna, in essentia, ut crasse tenues occultæ, in situ ut rara dense nebulosæ, in figuris ut sunt granosæ muscosæ & capillares &c. Signa absolutæ suffusionis cognoscuntur ab artis perito & per longitudinem temporis raro. n. pertransit sex menses, similiter signa colorum per se manifesta inspicienti apparent. Signa ipsius obstructionis cognoscuntur in compressione oculi, nam si statim aperto oculo, uideatur, diuidi ac in partes seperari tunc est suffusio subtilis ualde, si uero nullo modo moueatur, sed in se remaneat erit crassa ac densa, nec per acū ambæ admitti poterunt, si uero dilatari sed non in partes diuidi uideatur, ea est quæ per acū curam recipit. Signa loci obstructionis cognoscuntur, si clauso altero oculo pupilla alterius aperti dilatetur uel constringatur indicat non esse obstructionem in uis spiritualibus per quas ab uno in alterum fit transitus & hoc præsertim quum maxima accrassissima non fuerit suffusio, cognoscitur etiam esse inter pupillam & ceratoiden, si pupillæ uisio impediatur. Signa quando fit per cōsensum sunt, quia si a toto adsunt febres ad quarum augmentum suffusiones augentur & ad earum recessum declinant, si a stomacho aucta stomachi mala dispositione, crescunt, & remota remouentur, uel si utroque æqualiter oculo apparitio fuerit, tunc cataracta erit ex cōsensu stomachi, si uero fuerit in uno tantum oculo uel in utroque sed diuersimode, erit ex cerebro &c.

Loci consentientes de signis suffusionis.

Aeti. ferm. 7. cap. 51. Præcedentia signa sunt ueluti culices parui, caliginosa quædam oculis sepe obuersari uidentur, quidam pili formia uident, alij ut lanarum flamenta, aut aranearum texturas, aut circa lucernas circulos dum uero auge-



tur affectio augentur & ipsa accidentia & c. Auic. tertia tertij, cap. 19. Signa portendentia aquam sunt imaginationes prædictæ & q. accidit cum eis conturbatio sensibilis & q. imaginantur res luminosæ sicut candellæ duplices. Et cap. 9. imaginationes diuersificantur in quantitate & sunt parvæ uel magnæ uel in sua essentia & sunt grossæ subtilis & c. De signis obstructionis an sit curabilis loquitur Alexa. ca. de aqua ibi, quā passio fuerit confirmata & fuerit curabilis signum erit q. dum aspicitur oculus uel pupilla uidetur clara & cædi dilatationi cum præmitur digito aut instrumento deinde redit ad ipsum & non frangitur & c. Auic. tertia tertij, cap. 18. & illa quæ magis susceptibilis curæ ex parte essentiæ est subtilis quæ cum eam conspexeris & super ipsam digitis tuis compressio nem feceris seperabitur uelociter, deinde redibit et aggregabitur. Gal. lib. de oculo, cap. 12. quando chatarracta sit curabilis, sic dignoscitur, si uno oculo clauso pupilla alterius dilatetur possibile est sanari, sin autem minime, Causa quia neruus concavus quo uisibilis spiritus ad pupillam ducitur, opilatus est & sic signa habes loci obstructionis, hoc idem habes ex Auic. loc. cit. ibi, Inter aquam & opilationem intrisecam distat & c. De signis per consensum loquitur Gal. 4. de loc. aff. cap. 2. ibi, distinguendum utrum a cerebro an a uentriculo hæc affectio proueniat, primum ex eo q. alter oculus uel uterq. similiter uisis occupetur, nā si utriq. oculo hoc accadat affectus erit ex uentriculo, distinguendum etiam est ex tempore, nam si per plures dies uel menses suffusionis accidentia apparuerint & nihil tenebrosum in pupilla uideatur, tunc ab ore uentriculi affectus procedit, sed si perpetuo hæc apparitio perseuerauerit, nec aliqua suspitio sit ex uentriculo tunc per essentiā morbum intelliges, maxime si una pupilla altera sit turbidior, idq. magis ubi sumpto ex aloe medicamento nihil uariæ



uerint &amp;c.

## De cura suffusionum.

In cura suffusionis diuerse sunt intentiones, quarū prima est q̄ si a uentriculi imbecillitate proueniat, roboratione indigemus, si multitudine pituitæ in eo contenta, præparatione et euacuatione, deinde oculi roboratione, ut ne quid suscipiat & susceptum resoluitur ac exiccetur. At si suffusio a cerebro uel uitio oculi peruenerit, confirmata, non nisi per manualē operationem curam admittit, non confirmata adhuc pululans quinque medijs auferetur. s. Regimine sex rerum non naturalium, humoris præparatione, euacuatione, reuulsione ac deriuatione, exiccatione & resolutione. Victus ratio erit donec morbus transierit attenuatoria, nam pisces & cibi crassi nutrimenti & quæcunq; flatuosos uapores pariunt & humefiant ac replent fugienda sunt uinum pariter & coitus et balneum & aer humidus uitentur. Pro potu hydromel conuenit. Humoris præparatio quoniam plerunq; ortum habet a pituita, idcirco cum oxymellite simplici & composito cum syrupo de stechade rhodomelle et cum decoctis feniculi rutæ euphrasie betunice stechados rosmarini & similium perficietur. Euacuatio primum per sectionem uenæ si corpus fuerit plethoricum. si minus cum phlegmagogis ut pillulis chochijs sine quibus lucis Asaiareth. r. de agarico, cum electuarijs & simplicibus ut pluries repetitum est. Reuulsio & deriuatio fient cum clysteribus nascalibus masticatorijs nari fusorijs cū cauterijs cucurbitulis extremarum partium frictionibus, aut balneis extremis partibus adhibitis &c. Resolutio suffusionis et uaporum tam per intrinseca quam per extrinseca paratur intrinseca erunt electuaria inter quæ laudatur cōfectio humana Mes. Item triphera myrobalani conditi & alia multa, quæ a cæna comeduntur. Extrinseca multa sunt abstersoria q̄ suffusioni quadrant, qualis est aqua mellis stillata more chy-



mico, aqua feniculi rutæ euphragiæ serapinum in uino granatorum dissolutum, Puluis hirundinum, urina infantis & colyrium de felibus Razis, & alia multa quæ infra annotabuntur.

### Loci consentientes de cura suffusionum.

De cura percunsum uentriculi lege Arcul. Mar. Cati. Gord. & ceteros practiçantes habes insuper Galeni auctoritatem de dolore capitis per consensum quæ ad hunc locum reduci potest. De operatione manuali quam quid agendum foret non expressimus nunc auctoritas Auic. tertia tertij, cap. 20. Satisfaciet quæ talis est, quum uoluntas adest ut fiat cura cum instrumento. permittitur habenti quam, ut nutriatur piscibus recentibus & cibis humectatiuis & administretur ex eis aliquid quod resistat nocumento aquæ & præcipiatur infirmo aspicere ad lachrymale domesticum & ad nasum & conseruetur iuxta illam figuram, nec sit iuxta fenestram uel in loco uehementis luminis & perforet artifex cum acu & uadat inter duas tunicas usquequo sit coram foramine & deponat cattaractam, nec deponere cesset usquequo oculus clarificetur, cumq; curam cum instrumento operatus fuerit pone super oculum uitellum oui conquassatum cum oleo uiolato & dormiat super collū tribus diebus in tenebris & c. Vide eum tu fusius. Et nota q; triplex est cura iuxta chyrurgos, Prima fit cum acu ferrea uel plumbea incuruata, Secunda cum acu acuminata incuruata quæ dum suffusioni super ponitur eam in uacuum extrahit, Tertia cum cauterijs circa fronte super oculum læsum ita q; abscindatur fluxus & exiccetur suffusio. De his uberius legere poteris placentinum Arnaldum et Guidonem, lege etiam Paul. lib. 6. cap. 21. ubi de hac manuali operatione pertractat uberrime, uide etiā alios practiçantes & c. De nichil ratione loquitur Auic. tertia tertij. cap. 11. Et oportet



et ut uitet pisces & cibos ingrossantes et uaporatiuos & potum plurimum aquæ & uini & frequentiam phlebotomiæ et uentosarum &c. & ca. 19. et caueat habens eam repletionem uinum & coitum et sit contentus comedere semel in meridie et fugiat pisces & fructus & carnes grossas &c. Aet. ser. 7. cap. 51. Dieta omnis sit attenuatoria, a uino abstinendum est per totam curationem et ab omnibus replentibus caput &c. Razes. 9. alman. itidem habet, ibi, non comedat pisces nec omnia quæ humectare possunt, sed æger ex calefactiuis & exiccantiis nutriendus est, hydromel propterea in potu exhibendū est &c. De humorum præparatione loca non adducam, quæ iuxta Arcul. Gordo. Sauona. et Marcum Catina ualde pateant. De euacuatione Aet. ser. 7. cap. 51. inquit curandi sunt qui suffusione tentantur in principio sanguinis detractione ex cubito &c. Paul. li. 3. ca. de glau. suffusione tentatis succurremus sanguinis ex cubito detractione & purgatione euacuationibus acrioribus, Auic. loc. cit. oportet ut incipias & mundifices corpus & proprie stomachum deinde deuenias ad mundificandum caput, et scias q. hiera picra est mirabilis iuuamenti in eis & similiter pillulæ aureæ & medicamenta in quibus ponuntur centaurea & cucumer amarus &c. Razes similiter ait. 9. alman. tribuens pillulas chochias &c. Mesu. cap. de aqua, quando est in principio & non est confirmata succurritur ei cum medicinis & cum mundificatione sæpius reiterate & proprie cum chochijs hiera picra & hiera colocynthidos &c. De reuulsione et deriuatione plura habes ex Aet. sermo. 7. cap. 51. ibi, & si nihil impedit etiam clysteribus acrioribus & purgatione utemur deinde cucurbitula occipitio affigenda est cum scarificatione & pituitam per os trahentibus narifusorijs &c. Auice. tertia tertij. cap. 2. Deinde mundificandum est caput cum gargarismis & caput purgijs & ma



sticationibus, et dicitur q̄ appositio sanguisugarum super tempora confert in initio sui & phlebotomia arteriarum post aurem &c. De resolutione loquitur Mesu. ca. cit. ibi, et succurritur cum administratione medicinarum resoluentium sicuti est aqua rutæ cum serapino aut aliquo ex fellibus animalium cum melle et succo feniculi &c. Auic. itidē adserit. ibi, Quæ sunt ex siccitate conferunt quandoq; humectatiua nota, sed si sunt ab humiditate, conferunt eis omnia aleophol. i. colyria quæ abstergunt, Vide Arcul. Gordo. & Marcum Catinarium & ceteros practicanes &c.

#### Observationes in manuali cura.

Auic. tertia tertij, cap. 20. In regimine curæ quæ fit cum instrumeto oportet ut ante ipsam præcedat mundificatio corporis & capitis proprie, et fiat phlebotomia si necessaria fuerit, et obseruetur ne ille qui cum instrumeto curandus est habeat in oculo rupturam et timeatur ut accidat in tunicis apostema, aut sit assuetus pati tußim, aut sit uehementis rixæ, uel ocis irænam hæc mouent ad profundū uel reditum. Arcul. Ne primum te ad curandum intromittas ni prius magistrū pluries operari uideris.

#### Observationes de euacuatione.

Paul lib. 3. cap. de glau. Si ueluti culices oculis obseruari uideantur ex quadam humorum prauitate, uel biliosioribus sursum distributis medicamentum dialoes amarum exhibeatur. B. i. quum sciuerit esse morbū ex bile utere picra. si minus alijs compositis, nam picra stomachum & caput una simul uice expurgat ac euacuat &c. Auice. loc. cit. Vomitus quantumuis conferat ex parte mundificationis, tamen est nocitiuus in proprietate aquæ.

#### Observationes de resolutione.

Aet. ser. 7. cap. 51. Medicamentis utendum est primum simplicibus



plicibus uelut melle, succo faniculi, deinde cōpositis liquidis siccis collyrijs quæ paulo post describentur. Auic. tertia tertij, cap. 2. Et oportet ut incipias primo a medicinis lenitiuis sicut faniculum cum melle, Deinde gradatim perueniatur ad medicinas compositas ex serapino &c. Et hæc non nisi post modificationem corporis &c.

#### Suffusiones curantia ac perseruantia.

Curant suffusiones adeps piscis & uipere recens, oleum antiquum com melle, fel aquilæ cum melle, asa, aspaltum, berbena, ciclamini succus cum melle euphorbium, sarcacolla, segapinū, myrrha, lac ficus, gumi oliuæ, oleum benedictū nic. mirabile, sief de felibus Haly. Sief rubeū Serapionis, Fel, canis, capræ, auis rapaciū scorpionis marini, gallinæ, tauri, testudinis hyenæ, uulturis, aquilæ, succus faniculi, semen raphani, oximum, rosmarinus, & sal. Prohibent suffusiones fieri pillulæ sine quibus, pillulæ optomerae Auic. Hiera archigenis, hiera magna, hiera andromachi mes. in cur. sod. frig. Caput purgiū Alex. eodem in loco lege insuper Varignanā cap. 12. tra. 3. ubi tractat de descensu aquæ ad oculum. Vide etiam Razem cap. de cataracta. Item Placentinum qui puluerem describit, multum ab ipso commendatum &c. Vide fusius Montagnanam conf. 66. cap. 4. de remedijs conuenientibus diminutioni & corruptioni uisus &c.

#### De pronosticis suffusionum.

Paul. loc. cit. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt, hypochymata uero curantur. sed nō omnia. B. Intellege glaucomata non curari, quæ ex prægressa suffusione fiunt, humore iuxta pupillam uehementissime congelato ac resiccato. Vnde. Auice. de obstructione uisus, inquit, ex siccitate fit ut oculus in se ipsum colligatur & corrugatur, & nominatur hæc ægritudo glauconia, fit enim oculus propter eam

R



varius multorum generum, & non est ei medicamen, & Aet. quæ glaucescunt incurabiles sunt & c. Auic. tertia tertij, cap. 18. Et illa quæ est magis susceptibilis curæ, ex parte coloris est aerea & alba margaritalis & quæ ad uiriditatem parumper declinat. Genus autem gypseum et uiride & nigrum et plumbeum uehementis nigredinis & citrinum non recipiunt curam quæ fit cum acu & c. Gale. 14. meth. cap. ult. Hypochyma iam incipiens digeritur, ubi diu constitit non potest.

Arcul. 9. almans. cataractæ quæ totum oculum occupant sunt incurabiles. Item nimium crassæ quæ non per compressionem mouentur neque acu, neque medicamentis curantur. Itē cataractæ ex integra obstructione nerui optici factæ curationem non admittunt, & quæcumq; siue a percussione, aut post ægritudinem cerebri fiant difficulter sanantur.

#### Autho. dissentientes circa suffusiones.

- 1 Adserere, locum affectum in suffusione esse ambiguum.
- 2 Adserere, suffusiones fere omnes per chirurgiā posse curari.
- 3 Adserere, parorasis idest hallucinationem esse suffusionis spetiem.

#### Confutatio dissentientium circa suffusiones.

Ad primum haly abb. 9. theoricæ cap. 13, tenet q̄ locus suffusionis sit inter chrystaloidem & corneam, pro quo habes etiam rationes in descriptione superius ex diuersis authoribus recitatas.

Ad secundum Paul. lib. 3. cap. de glau. & Auic. ut supra dictum est in pronosticis, multa suffusionum genera, quibus non est dare remedium proculdubio recitauerunt, ex quibus concludi potest, non omnia fere, sed ualde pauca posse curari, sicuti etiam nobis experientia demonstrat & c.

Ad tertium respondet q̄ si parorasis esset speties suffusionis, sequeretur q̄ hyposphagmatici & icterici suffusiones pati di-



cerentur quod à ratione alienum est, nam isti parorasi laborant ut testatur Gale. 4. de sympt. cau. ibi, si uero humores non multitudine sed colore peccauerint secundum eiusdem coloris naturam parorasis. i. hallucinatio suborietur, nam qui ictero laborant, omnia quæ uident pallere arbitrantur. Qui uero hyposphagmate, omnia quæ aspiciunt rubra putant &c. sed hoc falsum, igitur &c.

### De Aurium doloribus descriptione.

Dolor aurium græce ὠταλγία dictus, est tristis ac molesta auris sensatio a contraria re de repente ac uiolenter simul et uehementer imprimēte facta, cuius species enumerantur quinque ut dolor punctorius stimulas tensiuus grauis et pulsatilis &c. Loci consentientes de dolorum aurium descriptione.

Plato in Timeo, Pathos præter naturam uiolenter ac assa- tim incidēs dolorem excitat Gale. 4. de sympt. cau. cap. 6. Hoc Plato uolebat quū diceret molesta sensationem in corporibus sensu præditis fieri si compositum ipsi pathema ex uiolento simul & conferto acciderit &c. De speciebus dolorum lege Gale. 2. de loc. aff. & 3. cap. 7. ubi, mentionem facit de torpido ulcerofo stringente lacerante &c. de quibus cum de doloribus agemus in genere loquemur, lege etiam Auic. & Arcul. 9. almans.

### De causis doloris Aurium.

Omnis dolor, aut per consensum aut primario affectu fieri solet, cuius causa est, aut mala intemperies, aut soluta continuitas, Mala intemperies aut fit à frigiditate, aut à caliditate aut ab utraq; & hæc cum materia uel sine materia esse potest, soluta uero continuitas fit aut à flatu extendente, aut ab humore corrorente, siue putrefaciente, aut ab aliquo tumore abscessu uel inflammatione. Quæ uero per consensum fiunt, aut a toto, aut a parte oriuntur, a toto sicuti per crism p.



febres, a parte, ut a stomacho a matrice, qui uero per se ueniunt. i. a parte lesa uel erunt in auris cartilagine, aut in meatu aut in auditorio neruo & c.

#### Loci consentientes de causis dolorum auris.

Gale. 12. meth. cap. 7. doloris causa aut est diuisione uel alteratio & c. de omnium dolorum causa in genere loquens & c. ut supradictum est. Gal. lib. 3. de comp. med. per loc. cap. 1. Dolores aurium aliqui ex frigidityte a uentis inducta fiunt, aliqui ex balneis frigidis medicatisue, aliqui ex inflammatione interdum circa meatum cutis, interdum in profundum progressa, ubi auditorius neruus ad inflammatam affectionem puenit, aliqui ex flatu uentoso transitum non habente, aliqui ex humoribus saniosis & mordacibus dolorem excitantibus oriuntur. Auicen. quarta tertij, cap. 6. Dolor auris aut fit a nalitia complexionis, aut fit causa apostematis aut bothor, aut causa solutionis continuitatis & c. uberius hunc locum leito & plura ad rem facientia inuenies: lege in super Alesan. lib. 1. cap. 24. ubi diffusius rem pertractat, uide & Arcul. Nauo. & Gord.

#### De signis dolorum auris.

Indicia omnino communia, ab etate temperie anni temore arte & uictu precedente sumuntur, item ex laborantis relatione. Signa si fiant a mala intemperie siue calida siue rigida cognoscuntur per ea quae in contrarium adhibentur. Signa particularia sunt, nam si a flatu fiant, tunc dolor erit consuius non grauens, & sonus clarus auditur non confusus, si a caliditate, praecesserunt calefacientia & a frigidis iuuantur, si a frigidityte grauitas & tumor una sentientur, & auditus impiedietur, si a soluta continuitate ex eo cognoscitur qd aliquid sanguinis uel puris effluit, si ab inflammatione tunc dolor erit continuus, grauitas cum tumore & febre continua



aderit, quod si intensiora hæc symptomata fuerint, quam q̄  
liceat, cum alienatione & frigiditate extremorum, tunc erit  
inflammatio in intrinseca auris parte, cognoscitur apostema  
esse sanguineum uel biliosum quum intensius se habeat dolor  
in bile & sanguine, mitius in pituita & melancholia & c.

Loci consentientes de signis dolorum auris.

Paul. lib. 3. cap. 23. Aurium dolor qui a frigiditate fit, ex an  
ni tempore, ex uictu præcedente & ex laborantis temperie  
cognoscitur, at qui ex calida intemperie prouenit ob id cogno  
scitur q̄ feruoris cuiusdam sine grauitate seu tensione sensus  
aderit, qui uero ex glutinosis crassisque succis fit ex capitis au  
ditusq; grauitate & uictus præcedentis ratione depræhendi  
tur & c. Auic. quarta tertij, cap. de taraxen. Si fuerit apostema  
calidum in ipso neruo significat febres cum quibus est horri  
pilatio & tremor & concomitatur ipsum permixtio intel  
lectus alienatio & c. Si uero non sit in neruo tunc aderunt ex  
tensio dolor grauitas & pulsus, si causa erit uentositas signifi  
cant ipsam sonitus & tinnitus, nec aderit grauitas, si ulcus et  
bothor significat pruritus cum dolore & sanie, si ab humore  
frigido leditur a frigidis & fit fortior in frigidioribus par  
tibus diei, si est a calido est a contrario & c. Vide de his Ar  
cul. longe alijs melius rem pertractantem, Vide etiam Auice.  
quarta tertij, tract. 1. cap. 25. de signis apostematum in radice  
auris.

### De cura doloris aurium.

Omnis curatio per eius causæ ablationem perficitur, &  
si quid malæ complexionis impressum fuerit, ac derelictum,  
cum suis contrarijs tam intrinsecis quam extrinsecis remoue  
bitur uerum si humorum fluxus ad aurem timeatur cum re  
uelientibus et euacuantibus auferendus erit, accidentia remo  
uenda & uictus ratio instituenda erit & c.



Dolor uero ex inflammatione uel erit creticus uel non creticus. Creticus duabus intentionibus curabitur, Prima crisi adiuuando, Secunda symptomata remouendo & uictum ordinando. Crisi quadrifariam adiuuatur, Primo multitudinē humorum euacuando, ut uirtus in reliquum potentius exonerata agere conetur, Secundo uirtutem roborando cū his quæ sanguinem & spiritum cumulant, & hoc fiat ante crisim, ne in crisi natura impediatur, Tertio meatus præparando & superfluitates auris abstergendo ante crisim, Quarto uirtutem stimulando si natura ad crisim tardauerit, uel si moram natura in crisi contraxerit in expellendo. Remotio symptomatum fit quotiens dolor modum excedens non frigidis & repellentibus, sed rebus mollientibus & anodinis demulceatur, nam frigidis et repellentibus interdum crisis impeditur. Dolor ex inflammatione non creticus, septē exigit intentiones quæ sunt euacuatio, Reuulsio, Repercussio per se, et resolutioni mixta, Resolutio pura, ablatio symptomatum et sex rerum non naturalium institutio, Euacuatio fiet per sectionem uenæ si sanguis peccauerit, uel per cholagoga, si bilis, ut cum rheubarbaro casia, manna, electuario de succo rosarum diapruni solu. cū pillulis aureis & c. uel per phlegmagoga, si pituita, ut cum pillulis chochys turbit, agarico & c. uel cum pillulis indis de lapide lazuli confectione hamech, si fuerit atrabilis. Reuulsio fiet cucurbitulis frictionibus & c. Repercussio in materia calida perficitur, cum oleo ros. et quarta parte aceti per decoctionē resoluti, uel in materia frigida cum oleo amigdalorum amararum uel camomillino & c. Repercussio resolutioni mixta fiet si subscriptis addatur mucilago. s. citoniorum. s. lini fænu-græci & c. Resolutio fiet per resoluentia & mollientia, quale est diachilon minus, uel emplastrum ex farina hordei cocta cū oleo camomillino. Resoluit etiam ac maturat apostema



ta auris emplastrum ex farina fabarum cum oleo liliorum alborum et est expertum uictus ratio sit tenuis in frigidans in causa calida, uel e contrario in frigida, uinum carnes et oua uidentur, quanquam uinum in causa frigida absente apostemate conueniat, aer sit calidus potiusquam frigidus, nam frigidum inimicum neruosis partibus est. Symptomata remouentur, si fuerint uigiliae per ea quae somnum conciliant, si syncopis uel surditas per ea quae de syncopi ac surditate dicentur, dolor interim cum anodinis uel narcoticis, de quibus plura ex Auic. et Aet. & iuxta neotericos practicantes habentur.

Loci consentientes de cura doloris aurium.

Quod omnis cura per eius causae ablationem fiat habetur non solum ex paulo sed ex Gale. 3. de compo. med. per loc. cap. 1. ibi, Dolores a frigiditate oborti, calefacientibus quam celerrime curantur, et dolor ab aqua medicata circa meatum auditorium contenta, oleo assidue infuso curatur & c. Paul. lib. 3. cap. 23. Dolor aurium a frigiditate calefacientibus curabitur praesidijs, ut oleo rutaceo laurino, at ex calida conceptu intemperie, contraria discutiunt, ut oui albumen, in aurem demissum, lac muliebre, oleum rosaceum, oleum lumbricorum & asellorum quos graeci *ὄνους κατὰ τοὺς ὀφθαλμούς* uocant, Quod si a crassis ac glutinosis succis fiat, uel a flatu exitum non habente cum medicamentis curabitur, quae auriunt incidunt ut aphronitrum cum aceto & melle, uel fel ouillum cum oleo amygdalino & c. Aet. ser. 6. a cap. 73. usque ad caput. 76. inclusive de his uberrime pertractat, ubi habes quod omnia amara citra mordacitatem ac molestiam meatus auris purgant & extergent, ac crassos humores impactos secant & c. Auic. quarta tertij, cap. 8. si autem est causa caliditas supersua oportet ut infrigides cerebrum cum extinguentibus cognitis & destilles in aurem oleum rosaceum tepidum aut albumen oui, & si est dolor



uehemens permisce cum eo camphoram &c. lege eum fusius, lege insuper Mesu. ibi, summa sexta cap. de cur. Aurium. si dolor fiat a complexione siue materia solum alteratione indiget ut si calida, iuuatur ex infusione albuminis oui recentis aut mucillagine psyllij, si fiat a complexione frigida conferunt infusiones calide &c. De dolore ex inflammatione cretico & non cretico loquitur Nicolaus ibi accidunt hæc apostemata uis symptomaticis stimulata natura, & quandoque accidunt uincente natura, et fit sepe secundum semitam crisis et maxime in febribus & apostematibus cerebri. Vide Razē. 3 continētis ex autoritate Gale. de hac re loquentem. Vide etiā in hoc Arcul 9 almans. qui & si quinque modos in adiuvanda crisi declaret, nihilominus ad quatuor reducuntur ut dictum est, Lege etiam aphorismo. 20. primi lib. ibi, Quæ iudicantur & iudicata sunt integre, neque mouere &c. amplius Galen. in commen. dicentem ubi deficit natura adiuvandum, ne recidivas materia relicta faciat &c.

De dolore ex inflammatione nō cretico uerba faciunt omnes moderni ex quibus primum elicere poteris omnes a me dictas curandi intentiones, quos etiam breuiter habet Auice. quarta tereij, cap. 8. ibi, Et si causa fuerit apostema calidū profundum, quod est timor osum propter propinquitatem sui ad cerebrum usq; quo ad collectionem perueniat & suppurationem, tunc post phlebotomiam et euacuationem oportet ut ad ministres lenitiua in primis & in frigidantia & proprie lac mulieris uice post uicem, usq; ad diem tertium & similiter oleum rosaceum decoctū cum aceto deinde mucilaginem fenugræci sem. lini in aqua lactis &c. Paul. loc. cit. Si ex inflammatione auris laborauerit, statim sanguis mittendus est deinde fofus ex oleo dulci & calente per specillū in lana inuolutum adhibeatur extrinsecus etiam quæ dolor em leniunt, ma-



teri. unq; impactam concoquunt super acomodare &c. Lege Gale. 3. de compos. med. per loc. cap. 1. ibi dolor uero ab inflā matione ortus &c. Pro resolutione abscessus Gal. 12. meth. cap. 8. ad dolorem aurium ex humore frigido uel flatu, medi camento utitur, Quod ex castoreo & papaueris succo confi citur &c. Mesu. Expertum est diachylō in oleo anethino dis solutum et ex eis que sunt ultimi iuuamenti est æsopi cera tum, docet etiam cataplasma confici ad hoc idoneum ex fari na fabarum camomilla uiolis &c. De uictus ratione et de sex rebus non naturalibus legantur Arcul. & Matheus de grado fusus Auice. loc. cit. & habens dolorem frigidum potet uinū purum forte et dormit et cum excitatur non habet lesionem aliquam, &c. Quod aer frigidus sit nervis inimicus habes aph. 18. tertij, lib. ibi, frigidū inimicū osibus dentibus nervis.

De symptomatum ablatione legatur Auic. ibi, Et quandoq; necessariū est in curationibus dolorum uehementium in aure administrare narcotica sicut aliquid ex philonio cum lacte, uel opium & castoreum & crocus cum lacte mulieris &c. Aet. ser. 6 ca. 80. Vbi uero magnus est dolor necesse est stupefa cientibus sensum uti, ita ut ad lac muliebre et oui candidū mo dicū opij amisceamus, Amiscendū est & castoreum aduehe mētiōes dolores pari mensura, ad leuiōres dupla proportio ne &c.

#### Observatio de diuersione.

Hic ad memoriam reuocandum quod in quarta. primi di xerat Auic. Quod si ad diuersū trahere uolueris, materiam, primum dolorem mitigabis ac demulces, quo sedato ad curā te conferas &c.

#### Observationes de percussione.

Arcul. 9. almans. Antequam fiat percussio. obseruentur hęc non sit materia cretice expulsa, non sit uenenosa non sit furiosa, non plurima, non immediate a cerebro expulsa, non



ualde tenax et crassas non paulatim ne cōgesta, non fluxam ad partem extrinsecam auris.

#### Observationes de topicis.

Tusignanus septem conditiones observandas esse inquit in his quæ in aurem proijciuntur prima, q̄ inijcitur non sit calidum nec frigidum sed tepidum, & hoc etiam inuit Avic. cap. 8. Secunda, q̄ sit in parua quantitate, et hoc habetur ex Auenzoar primo lib. Theisr. tra. 41. ca. 1. Tertia, q̄ stet in aure pauco tempore. Quarta, q̄ antequam aliud proijciatur, primum sit expulsus. Quinta, q̄ cum aliquid inijcitur in aurē patiens iaciat super latere sano. Sexta, q̄ locus sit cum auriscalpio mondificatus propter tortuositatem auris. Settima, q̄ non administrentur repercussiva in apostematibus auris, & c. Gal. 5. meth. cap. 10. contra Thessali sectatores dixit aurē esse particulam siccissimam, idcirco quæ ualentissime exiccent opus esse, ut castoreum, uerum hic in dolore anodinis, illic in ulcere siccantibus fortius uti persuadet, uide tu illum fufius.

#### Observationes in narcoticis.

Avic. quartatertij, cap. 8. oportet ut postponantur narcotica usq̄ quo timeatur syncopis & proprie cum fuerint humores frigidi, nocent enim eis ualde, & post eorum usum administra castorium.

#### Auditui nocentia.

Fumus argenti uiui, semen arundinis, lanugo & flos Typhæ, folia castaneæ, puluis platani, & puluis inuentus super eius folijs.

#### Dolorum ac pulsationem Aurium curantia.

Dolori ac pulsationi aurium iuuat, uapor decoctionis absinthij, Aqua decoctionis acetosæ, succus acori cum rosa, oleū in radice aphodilli coctum, Allium cum adipe anseris, succus cucumeris asinini, succus cucurbitæ cum oleo rosato, in calido



dolore, crocus cum oleo rosaceo, succus dragonculi, hederæ, cannabis, Gallia cum oleo de been uel de cheiri, Galbanum cū oleo liliorum, grana granatorū cum melle, succus hyosciami, lactucæ asini, laudanum cum oleo ros. Succus maioranæ, melli loti, mentæ, paritariæ, peucedani, polygoni, foliorum populi, porri, plantaginis, præsij, rosarum, rubi, rutæ, salicis, serpentariæ, solatri, Adeps anseris, leonis, uulpis, Fel arietis, apri, bubali, Tauri, suis, Oleum liliorum, Amygdalarum amararū, scorpionum, de uitellis ouorum, de s. cannabis, oleum benedictum nic. de cherua, sisaminum, de nucleis persicorum, laurinum, de s. raphani, de anetho, de crisomilis, de been, yrinum, nardinum, Vrina, apri, bubali, tauri, capræ oleum de cinna- momo petroleum in frigido et antiquo pillulæ sine quibus, hieralogodion esdra, confectio Nicol. opium cum myrrha croco & oleo ros.

#### De pronosticis dolorum Aurium.

Hip. pronost. 3. tex. 15. Aurium dolor acutus cum febre continua ac uehementi difficilis est, Periculum enim delirij abolitionisq; imminet, Quia igitur fallax hic locus est, cito etiam aduertere oīa alia indicia a primo die necesse est &c. Auice. quarta tertij, ca. 6. Et peruersior dolor auris est ille, qui est ex apostemate calido profundo et proprie cū perducit ad comixtionem intellectus, ubi uero dolor est in cartilaginibus extrinsecis, nō est illic uehemens dolor, nec uehemens timor, sed prius interdum subito interficit, ueluti apoplexia, interficit, tamen magis adolescētes quā senes, sed ratio est, quia in senibus ignauior sensus nec humores sunt ad alienationem prompti sicuti in iuuenibus.

Authores dissentientes circa dolores Aurium.

1. Adserere, in omni dolore auris esse in primis repercutien-  
dum



- 2 Adferere, dolorem Auris non esse periculosum:
- 3 Adferere, in dolore Auris non esse secandam uenam:

Confutatio dissentientium circa dolores Aurium.

Ad primum Auic. quarta tertij, cap. 25. Si apostema fiat per uiam crisis oportet ut non intendas ad curam quatenus exigitur, ad curam, apostematum, adhibendo styptica & apostemata. i. reperiens in principio. Item reperiensio fit ad membrum principale, igitur in omni dolore non est perpe-  
tranda.

Ad secundum, Gal. 3. pronost. comm. 15. quod si dolor fuerit in cartilaginibus aut in summa auris parte, non est periculum mortis; At si in profundo ex auditorio meatu, doloris sensus affligat ut etiam nervus auditorius afficiatur, periculum im-  
minet, ne in consensum per ducto cerebro, mors repente se-  
quatur,

Ad tertium, respondent Auic. & Mes. q. in omni dolore a sanguine fieri debeat sectio uenae, In alijs doloribus reuulsuā imperant neoterici.

Descriptio ulceris Aurium.

Ulcus graecis ἔλκος dictum nil aliud est quam continuitatis solutio cum sanie, Quod interdum extrinsece, interdum in-  
trinsece accidit, Si intrinsece, uel erit in meatu uel in nervo auditorio, aut circa os petrosum uocatum, Prater ea uel erit ulcus mundum, sordidum uirulentum uel corrodens cum do-  
lore, cum mala intemperie & cum inflammatione uel alio  
tumore &c.

Loci consentientes de descriptione ulceris Aurium.

Gal. 2. meth. ca. 1. Vnitatis nāq; solutio, in osse fractura di-  
citur, in carnosa parte ulcus, Auic. quarta tertij, ca. 12. Ampli-  
us non possunt esse ulcera quin sint apparentia sensui, aut sint  
profunda & non profunda propinqui temporis uel croni-



ca &c. Lege Arcul. & plures ulcerum differētiās intelliges, Gale. 3. meth. ca. 4. memorat ulcus cauum & equabile recens & inueteratum, sordidum purum, liberum phlegmone, & phlegmone impeditum, Similiter de intemperie intelligendum, lege in hac re Placentinum, De ueris ulcerum differentijs, lege Gal. 2. meth. cap. 1.

### De causis ulcerum Auris.

Causæ ulcerum sunt uel humores corroderentes uel aliquis abscessus, uel casus percussio, & res quæ putrefacere uel corrodere possunt.

### Loci consentientes de causis ulcerum Auris.

Arcul. 9. almans. Causæ ulcerum sunt apostemata uel bothor cum rumpuntur nec non humores acuti, Item cerumen aurium & uermes, aut res ibidem natæ corroderentes ac putrefacientes, similiter casus & percussio, Gale. 4. meth. cap. 1. Est. n. horum duplex ortus alias ab excisione sæpe ab erosione, quo pacto fiat excisio patet, erosio uero si intrinsecus ab ipso animali prouenit uitiosi succi soboles est, si extrinsecus aut à ualentibus medicamentis aut ab igne.

### De signis ulcerum Auris.

Signa ulcerum auris manifesta sunt, si pus ex aure defluat nulla in cerebro præterita lesione. Si fiat ab apostemate statim ex uomica multa puris copia exiet deinde paulatiue & in pauca quantitate, E contra uero si ab humoribus corroderentibus paulatim in primis egredietur deinde magis abundabit. Signa ulcerum mundorum ab optima & concocta sanie cognoscuntur. Sordidorum ex crassitie ac multitudine exeuntis saniei. Virulentia ulcera ex fetore & putrida sanie subtili exeunte nobis innotescunt, Corroderentia si post saniem sanguis efluxerit, Fistulosa si longo tempore contracta si uirulenta sanie, si ex callosa ac indurata carne consistant &c.



## Loci consentientes de signis ulcerum Auris.

Razes. 9. almans. hoc tantum signum posuit .s. quum pus ab aure egreditur, De his signis fusius pertractat Arcul. & Auic. Similiter ceteri practi-  
cantes.

## De cura ulcerum Aurium.

In omni ulcerum cura quinque opus sunt medicamina, Abstergentia. s. corrodentia carnem generantia, consolidantia ac ad cicatricem inducentia. Abstergentia idcirco opus sunt, ut sanies crassa glutinosaque membro adherens, ammoveatur, qualia sunt tenuia ac calida circa secundum gradum sicut mel & c. Corrodentia ut super crescentia carnis minuantur, & sunt calida et sicca in quarto, ut flos æris alumen & c. carnem generantia, ut sanguis ulceri superueniens in carnem transmutetur, quod fieri nequit, nisi complexio temperetur & sanguis coaguletur, & sunt sicca in primo & temperata in actiuis, stypticis et abstersionis pauca, ut thus, Nec opus esset medicamentis in gignenda carne, quum ad naturam tantum pertineat, ni in generatione carnis excrementum tenuius ac crassius interdum efficeretur, ad quod id tandem opus est quod redundantiam absumat et sanguinem coagulet, quale est medicamen siccans & abstergens. Consolidantia, ut humiditas inter utraque ulceris superficies propinquas contenta, ita conglutinetur, ut altera superficierum ulceris alteri adhæreat, & sunt sicca in secundo, cum proportionem actiuorum ad membrum ut aloes sanguis draconis & c. Cicatricem inducentia sunt quæ absque mordacitate tantum superficiem exsiccant, ut cortex pini & c. Sed de his uberius dicemus in libro de chirurgia. Cura simplicis ulceris in corpore purgato indiget tantum abstersione & consolidatione, Si uero ulcus fuerit compositum puta cum inflammatione, uel mala temperie, aut dolore uehementi, tunc primum erit inflammationi ac reliquis



uacandum non neglecto interim ipso ulcere &c. Cura ulcerū  
auris malignorum præsertim corrodentium quinque medijs  
perficitur præcedat tamen euacuatio ac reuulsio ad hæc quæ  
dicenda sunt. Primo, Si quid est putridum uel corrosum uel  
induratum auferatur. Secundo, Quod remanet optime mun-  
dificetur. Tertio, substantia iam deperdita regeneretur. Quar-  
to, regenerata substantia ad cicatricem inducatur. Quinto,  
accidentia corrigantur et ratio uictus instituatur &c. Primo,  
putridum auferemus cum unguento ægyptiaco cum modico  
aceti uel uini dissoluto, uel si pars ueluti sensus expers sit, ac-  
cipiantur uiridis æris aluminis & mellis partes æquales &  
cum modico aceti fiat collyrium. Secundo, mundificatio fiet  
cum hydromelle uel rhodomelle, aut ænomelle aut oximelle  
simp. uel scillitico si materia egrediens fuerit ualde tenax. Ter-  
tio, substantia regeneratur cum his quæ mediocrē cum pauca  
mordacitate exiccationem, obtinent qualis est aloes Mirrha  
Sarcocolla Sandaraca cum melle & uino dissoluta. Quarto,  
ad cicatricem perducunt, olibanum, sief memite, sarcocolla  
&c. Quinto, accidentia corriguntur, ut si sit dolor cum præ-  
dictis in capite præcedenti, Si surditas cum his quæ de surdi-  
tate dicentur, Ciborum quantitas sit modica in principio do-  
nec ad substantiam regenerandam deuenierimus, tunc sit locus  
pletior, sed boni succi & facilis concoctionis &c.

Loci consentientes de cura ulcerum Aurium.

Gal. 3. meth. cap. 8. fieri non potest ut in ulcere, uel carnis  
productio, uel sinus impletio, uel agglutinatio, uel cicatricis  
inductio, recte unquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali  
modo se habeat, Verum purgari sordida, minuiq; super cres-  
centia, etiam carne statum non seruante, possunt &c. Ex qui-  
bus uerbis quinque dicta à me medicamenta ad ulcus sanandū  
opus esse cognosces. De abstergentibus quæ græcis ΠΥΤΤΙΚΑ



appellantur, loquitur Gal. 5. de fac. simpl. cap. 2 ubi inquit omnia nitrosa & amara ad expurgandos meatus intro ualeri, at cutis & ulcerum sordes non hæc tantum, sed & uiribus minora auferre possunt, qualia sunt dulcia quæ tenuium sunt partium ut mel & ex cerealibus eruum faba. lupini hordeū & c. Et cap. 14. de causticis seu urentibus loquens uehementer esse callida & carnis colliquantia ut arsenicum auri pigmentum sandaraca & chrysocolle & c. Et cap. 15. eiusdem lib. loquens de his quæ uim ἐπιουλοτικήν habent. i. cicatricem inducendi, esse desiccantia absquæ mordacitate dixit & c. De generantibus carnem lege Gal. 3. meth. cap. 3. ubi adunguem, quæ a me dicta sunt recitantur & plura ad hoc munus idonea etiā enumerantur De glutinatorijs etiam uerba facit cap. 5. eiusdē & quo pacto ab ijs quæ cicatricem inducunt, differant, aperte declarat, uide illum fusius. De cura simplicis ulceris lege Gal. 3. meth. cap. 4. De ulcere composito lege etiam similiter Gale. 4. meth. cap. 5. ibi uerum ulceris quod cum alio affectu coniunctum est & c. lege tu hunc locū uberius et inuenies q. sanari nō possit ulcus, nisi locus in quo cōsistit prius sit sanatus & c.

Breuis Galeni ulcerum curatio quæ quinto meth. cap. primo continetur.

Omne ulcus siccantia medicamina requirit, ulcus sinum habens non solum modice siccantia sed abstersoria ex postulat, quod uero coniungi labra petit ueluti cruuentum, magis siccantia tum quæ sine absterfione leuiter adstringunt, desiderat quod uero ad cicatricem perducere debet, non solum magis adhuc siccantibus sed strenue adstringentibus remedijs indiget, at si caro præter naturæ modum intumuerit, acrida et demolliētia quæ calida et sicca sunt adhibeantur, si uero ulceri aliquod symptoma adiunctū sit, primo id remoueat, deinde ulcus sanetur, si sordes inascantur tollendæ sunt, ijs quæ maio-

rem



rem adstringendi uim habeant, quàm quæ carne implent, si copiosa humiditas adsit, siccantibus medicamentis, quæ propriam speciem nō egrediantur, curandum, aglutoria sint igitur medicamenta siccantia & adstringentia, carnem generantia siccantia & abstergentia & sic de reliquis, si uero subiecta caro intemperata sit, primum eius intemperantiæ succurrendū utiq; quæ siccior iusto est, humectantibus, quæ humidior siccantibus, quæ calidior, refrigerantibus, quæ fridior, calefacientibus, quæ geminata qualitate intemperata per geminam qualitatem contrariam curetur, consydera insuper intemperantiæ causas num a toto uel a parte per consensum, membrum ulceratum infestent. Primum enim causæ quæ adhuc intemperantiam fouet, medendum, post hanc ipsi quæ facta est intemperantiæ, sumitur etiam indicatio a particula, lesa, quæ si siccior fuerit ea magis siccari exposulat, quæ minus talis est, ea minus siccanda, simile etiam erit de calefaciendo refrigerando; præceptum, sumitur etiam a præcellentia membri aut a contrario statu, Itemq; ex sensu acri hebetæ ue quum hæc diuersum medendi modum petant & reliqua. De mundificatibus ac abstergentibus. ulcera aurium.

Mundificant ac abstergunt ulcera aurium, succus absinthij cum melle aphodilli etiam cū melle et thure, succus omphacij cum melle, erugo ferri cū aceto decocta, fel thauri cum lacte capræ, licium antiquis ulceribus mel cum sale gemeo tepidū, myrti decoctum, myrrha cum memite castoreo & opio, succus foliorum nuccum, & suc. oliuæ agrestis, uirgæ pastoris, urina pueri cum cortice granatorum, oleum amygd. mararum rhodomel cum matrisylua et betonica oleum mirtinum, therebintina &c.

#### De sonitu aurium.

Sonitus aurium, nil aliud est, si describatur, quam auditus.



corruptio, in qua uidetur homini audire id quod certe non audit, hos græci uocant ἥχους καὶ στυγμοὺς.

**Loci consentientes de sonitu aurium.**

Auice. quarta tertij, tra. 1. Hec dispositio est uox quam homo incessanter audit exterius. Et eius comparatio ad auditū, est imaginationum & tenebrarum quas uidet homo comparatio & c. B. i. uocem quandam homo audit ac si exterius audiret, & talem habet comparisonem sonitus ad aures, qualem imaginatio ad oculos & c. Vide etiam hanc met sententiam in Auicen. cap. de nocumentis auditus.

**De causis sonitus ac tinnitus aurium.**

Omnis causa sonitus & tinnitus uel est occulta uel manifesta, occulta aut fiet a sensus audiendi imbecillitate, aut ab eius subtilitate, imbecillitas fiet a mala quapiā complexionē. Manifesta nouem modis fiet, Primo ex aere extrinseco intrinsecum mouente, Secundo ex sanie sonitum in aure efficiēte, Tertio ex motu ab ebullitione humorum excitato, ut in febribus, Quarto repletionē superflua, Quinto humorum agitatione & uapore, Sexto casu uel percussione, Septimo ex humorum magna inundatione, Octauo ex fame humores commouente & aerem, Nono ex medicinis soluentibus quæ mouent & non educunt & c.

**Loci consentientes de causis sonitus ac tinnitus aurium.**

Gale. 3. de comp. med per loc. cap. 1. Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generantur, quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem, quorum neutrius affectionis certa cognitio in principio haberi potest.

Auicen. quarta tertij, cap. 9. et inundatio aeris quæ est causa uocis, aut est occulta, aut est maior illa, occulta quum interdum sonitus auditur, interdum uero minime & tunc idest, aut propter acuitatem sensus, aut propter debilitatem & c.



Lege usque ad illum locum inclusive & quandoque accidit sonitus post medicinas quarum proprietas est ut retineant humores & uentositates in partibus cerebri &c.

De signis sonitus ac tinnitus aurium.

Dabis operam ut in primis cognoscas qui fiant per se & qui per consensum per se enim fiunt quicunque sunt continui & assidui, per consensum uero qui sunt intermittentes, qui dispositione crescente augentur & desinente minuuntur. Signa ab acuitate sensus, sunt, quia a mediocribus sonis leditur, nec excellentes tollerare potest, nullusq; adest flatuosus spiritus nec uapor crassus nec repletio. Signa ab humore cum flatu, grauitas in aure percipitur imbecillisq; adest auditus, si uero ex flatu tantum, sonitus est clarior, nec ulla adest in aure grauitas, si ab humoribus crassis fiant, paulatine crescunt, si a siccitate, fiunt post euacuationes & febres. Signa apostematis suppurati, sunt, qui a dolor precessit sonitusq; confusus & sanies apparet. Signa debilitatis sunt superfluitates, si a complexione calida fit statim cum inflatione, si a frigida econuerso, cognoscuntur etiam ex pregressa dieta, a uomitu & a progressu pharmaco &c.

Loci consentientes de signis sonitus & tinnitus aurium.

Auic. quarta tertij, cap. 10. In illo qui est continuus et assiduus causa est aliquid stans in ipso cerebro, si autem quiescit deinde excitatur post euacuationem, aut uacuitatem aut quum calor fit uel frigus fit fortis tunc est per communitatem, illum qui est per acuitatem sensus significat defectus causarum uentositatis & repletionis & mundificationis auditus & excitatio eius apud ieiunium & uacuitatem. Paul. lib. 3. cap. 23. sonitus qui fiunt a crassis glutinosissq; humoribus cognoscuntur q. non uniuersim sed paulatim increscunt ac nascuntur. Gale. 3. de comp. med. per loc. cap. 1. Incognitionem peruenimus non tan



tum ex procatarctidis causis, sed ex temperie ex dieta prægressa, ut a longo uini potu, a uiolento & multo uomitu, aut a prægressa plaga, aut ex auricularium pharmacorum usu & similibus, quin etiam si sonitus aut per interualla redit, aut perpetuo permanet, aut ex eo q̄ paulatim aut aceruatum fit sonitus, uerum exacta & certa cognitio habetur, ut si quis ex flatuoso spiritu exitum non habente, sonitum fieri putet, & seccantia uel attenuantia adhibuerit, admotisq; apophlegmatismis nihil pro fecerit, tunc certo cognosces ex auditu subtilitate sonitum fieri, præsertim si acuto audiendi sensu æger præditus appareat. Auic. loc cit factus a siccitate est post euacuationes & febres & factum a debilitate scies per superfluitates & quando est a complexione calida fit subito et cū inflatione, & frigida est e contrario & c. Vide de his latius Arcul. & reliquos practicantes & inuenies quæcunque a me dicta sunt.

#### De cura sonitus & tinnitus aurium.

Quum curatio fiat per cause efficientis morbum ablationem, tunc si a percussione uento, ebrietate & a cæteris procatarctidis causis fiat, cause primitiue per sua contraria remoueantur, & roboretur auris & cerebrum, si morbus hic generetur ex quadam crisi uel febre, primum discutienda erit febris & crisis non prohibeatur præsertim si ex se natura præualeat, si minus, iuuetur, si uero ab aliquo particulari membro per consensum oriretur primum id quod transmittit membrum euacuabitur, & ad aliam regionem materia diuertetur, & eius membri lapsa temperies per contraria permutabitur, Deinde membrum recipiens roborabitur ut puta cerebro cum oleo mirteo & auris cum oleo amygdalino amaro & c. In cura uero per se ex repletionem capitis ab humoribus crassis quatuor curandi erunt intentiones. s. euacuatio, Reuul-



fio ac deriuatio, humorum preparatio ac eorum extirpatio, cerebri & auris roboratio & regiminis institutio. Euacuatio fiet per ea quæ humorem superfluum euacuant qualis est hiera colocynthidos pillule fatidæ chochiæ &c.

Reuulsio similiter fiet cum clysterijs frictionibus et hemorrhoidarum ac menstruorum euacuatione.

Deriuatio post omnimodam euacuationem cū caput purgijs masticatorijs gargarismatibus &c.

Preparatio humorum præsertim pituitosorum fiet cum syropo de stechade de calamento, oxymelle simp. & composito & cum reliquis quæ supra memorata sunt, & cum decoctis saluie rosmarini uiolarum betonicæ, maioranæ, rutæ, origani &c. Humorum extirpatio perficitur cum pharmacis in euacuatione nuper relatis &c.

Roboratio cerebri et auris fiet remouendo eorum discrasiam, cū sacculis ex milio sale et furfure, asperso poteti uino torefactis, aut cum fomentis ex camomilla meliloto calamento origano stechade absinthio, aut cum pulueribus capiti adhibitis ut puta cum speciebus pleris arcoticon nic. & diamusci dul. aut cum his quæ in aurem infunduntur, quale est oleum amygdalarū amararum cum musco et nuce moschata, aut oleum de uitellis ouorum, aut castoreum in oleo ros. dissolutum.

Victus ratio sit calida & sicca, pluuiæ uenti ebrietates & satietas nauseatiua & uomitus uitanda sunt. Item mora sub radijs lunæ & solis &c.

Loci consentiētes de cura sonitus & tinnitus aurium.

Auic. quarta tertij, cap. 2. Sonitus creticus non oportet ut moueatur quoniam remouetur cum remotione febris, In eo uero qui fit ob cōmunitatem, oportet ut intentio sit membri facientis ipsum & proprie stomachi quare mundificetur & intendatur cerebro, & confortentur auris & cerebrum cum



oleo mirtino, auris uero cum oleo amygdalino &c. Itidem ait Mes. cap. de sonitu.

Paul. lib. 3. cap. περὶ ἤχων, si in febribus aut harū crisi-  
bus sonitus aurium euenerint, nullum eis negotiū faceſſere opor-  
tet, quippe magna ex parte statim finiuntur, Sin autem post  
morbū perseuerauerint absinthij decocto foueri aures debent  
& acetum ros. infundi &c. De cura per se ex repletionem q.  
tot sint intentiones quot diximus lege Arcul. & alios hac de  
re loquentes.

Auice. loc. cit. Et similiter factum a repletionem, oportet, ut  
mundificetur corpus & caput cum eo quod scis et subtilietur  
regimen &c. Mes. cap. de sonitu, quando fit per abundantia  
& repletionem in capite, cura eius est solutio & euacuatio  
cum hiera diacoloquinthidos & chochijs & similibus cum  
reiterationem & reiterationem &c. B. Intelligitur de materie  
minorationem ac eradicationem per hoc uerbū reiterationem du-  
plicatum.

De preparationem humorum & alijs intentionibus loqui-  
tur ibi, Aet. ser. 6. si adhuc remanet ampliori tempore omni-  
bus amaris & acris & attenuatorijs ac discussorijs utere  
que paulo antea descripta sunt &c. lege eum fusius lege insu-  
per Arcul. Sauo. et Gord. & Mes. ibi, Quando fit a uentositate  
grossa conferunt caput purgia sternutationes post mondifi-  
cationem &c. intelligens de deriuationem & de alijs prout in  
ipso reperies &c.

#### Observationes in cura.

Auic. quarta tertij, cap. 11. Oportet ut omnes isti uitent bal-  
neum solem & uomitum & clamorem & repletionem, &  
ut leniant naturas. i. uentres.

#### Curantia sonitum & tinnitum aurium.

Curant sonitum & tinnitum aurium, uapor aceti, absin-



thium cum felle bouino fel caprae cum succo porri tepido, colocynthidis decoctum in aceto, succus foliorum ebuli, fel thauri cum succo porri, acetum decoctionis hellebori, decoctio caricarum cum sinapi. succus rutae in cortice granati tepescens, uapor decoctionis hyssopi cum ficibus, oleum de been, cum adipe anatis, oleum liliorum alborum, oleum uiolaceum, amygdalarum amararum, decoctum lauri cum uino antiquo & oleo rosaceo &c.

### De pronosticis sonitus.

Gale. 3. de compos. med. per loc. cap. 1. si in febris sonitus fiant, minime curandi sunt, ut plurimum enim statim sedantur. Hippocra. aphorif. 4. aphorif. 60. Quibus in febris aures obsurduerunt, sanguis ex naribus fluens aut alius turbata, soluit morbum. B. intellige de fluxu cretico qui facile adueniens sonitum soluit. Arcul. Antiqui sonitus difficulter sanantur, qui uero ex natiuitate contrahuntur, nequaquam sanari possunt. &c.

### De graui auditu & surditate.

Differunt inter se grauis auditus & surditas, quum hic tantum diminutum auditum, illa uero omnimodam auditus ablationem significet, Hunc graeci κωφωσις, illam uero συνοισια appellat.

### Loci consentientes de graui auditu & surditate.

Auic. quarta tertij, cap. 2. omne auditus nocumentum, uel est ut destruat eum operatio aut auditus minuatur, ita ut quis audiat quod non audit &c. Lege Arcul. 9. almanf.

### De causis surditatis.

Omnis causa uel essentialis est uel per compatiendi rationem, Si essentialis aut auris pars aliqua laesa, est aut cerebrum, Si pars uel similis est, uel instrumentalis. Si similis tunc uel ab intemperie uel a soluta continuitate afficietur, Si instrumentalis, tunc ab obstructione aliqua aut a tumore aliquo



præter naturam innato aut ab aliquo aduentitio ut puta callo carne tuberculo, aut à sorde in auribus gignita, aut ab humoribus crassis uel à flatuoso spiritu occupante oborietur, Si causa sit per compatiendi rationem tunc uel à toto sicut in febribus, ex quibus uapores ad aures deferuntur, uel à crisi iam facta, uel à membro particulari propinquo & remoto sicut à cerebro, & à stomacho, Item fiunt surditates ex paucitate et crassitie spirituum, uel à consumptione corporis &c.

Loci de causis surditatis & grauis auditus.

Gal. 4. de sympt cau. cap. 3. Grauis auditus & surditas animanti euenire solent, aut ob auris partem aliquam, aut ob neruum à cerebro descendentem, aut ob cerebrum ipsum, si eadem in parte unde neruus oritur læsum fuerit, Proinde harum partium morbi ab illis huc transferendi sunt ut ij, qui ad similes pertinent ex intemperie & continui solutione æstimentur, qui uero ad instrumenta ex obstructionibus, siue ipsarum partium tumor aliquis præter naturam, meatum obstruxerit, ut puta abscessus phlegmone oedema & scirrhus, siue aduentitius, isque omnino præter naturam tumor in meatu ipse oriatur, ut quum callosum uel carnosum innascitur tuberculum, atq; huc pertinent sordes quæ creberrime in auribus gigni consueuerunt. Auic. quarta tertij, cap. 2. Nocumenta auditus aut sunt complexionalia, aut instrumentalia, aut resolutiua singularitatis, nocumentum in neruo auditus interdum accidit per omnes causas ægritudinum similium partium & instrumentalium & solutionis continuitatis, Aegritudines complexionis singularis & compositæ. Et quandoq; fit unaquæq; earum absq; materia et quandoq; cum materia melancholica cholericæ phlegmaticæ ex phlegmate crudo et uentoso. Instrumentales sunt sicut opilatio, quam facit humor aut sanies aut



apostema &c. Lege eū fusius. Arcul. 9. almans. Defectus etiā spiritum .s. quum sunt crassi, est causa grauedinis auditus & similiter paucitas spirituum & corporis exiccatio et consumptio. Vide de his Mesu. cap. de surditate, Item Gord. & Sauona.

### De signis surditatis & grauis auditus.

Et si per se surditas manifesta sit nec alijs indigeat indicijs, nihilominus an per essentiam uel per consensum fiat, nisi indicia cognoueris non facile rem percipies, Cognoscuntur igitur quæ fiunt per essentiam absente totius uel partis mala dispositione, econtra uero si per consensum ex totius et partis prgressa aegritudine, qua aucta surditas augebatur et remota remouebatur, cognoscitur etiam obstructio tantum ex intuitu subradijs solaribus, Cognoscitur fieri ex materia frigida crassa ex grauitate & loci frigiditate, ex comotione cum sonitu & quia læsio cum frigidis augetur, cognosces causam esse in neruo auditorio ex dolore, cognoscitur, ex crisi fieri per præcedentem morbum ad aures terminantē, & eo q, crisi finita remouetur auditio grauis &c. Reliqua signa ex relatione in firmi manifesta erunt, cognoscitur à flatu fieri ex sonitu & tinnitu.

### Loci consentientes de signis surditatis.

Auice. quarta tertij, cap. 4. factum à communitate cerebri significat dispositio in reliquis sensibus, sicuti in uirtute matrice, præterea præcesserunt nocumenta cerebri sicut si sensus & intellectus commixtio & reliqua quæ dicta sunt, in cap. de aegritudinibus cerebri, similiter de reliquis plura habet Auic. quem fusius legere poteris, lege insuper Arcul. nam si omnes ad unguem recitare uoluerimus, præter quàm deceat in mora essemus.



## De cura surditatis &amp; grauis auditus.

Si à nuda intemperie surditas peruenerit, per alterationem in contrarium sanabitur, Aurisq; roboratione ac regimine contrario discrasie indigebit, facta tamen aliquali reuulsione, si humorum fluxus timeatur, At si fuerit frigida intemperies, calidis remedijs curabitur ut pote cum oleo laurino costino amygdalino amaro in aurem infuso. Roborabitur auris, si his aliquanter styptica adhibeantur. Similiter calida intemperies cum oleo ros. cum aliquantulo aceti bullito curabitur. Si uero ab intemperie cum materia morbus fiat, cogitandum est in primis de qualitate humoris, deinde an principaliter in aure contineatur, an aliunde transmittatur. Et tunc in curatione scopi erunt quinque, euacuare. s. reuelleremembrum mandans corrigere, deinde causam coniunctam educere & resoluerem, deniq; discrasiam alterare & regimen in contrarium instituere, Calida igitur intemperies cum materia euacuabitur per  $\kappa\omicron\lambda\alpha\gamma\omega\gamma\alpha$  pharmaca, sicut cum decoctione fructuum, rheubarbaro, pilulis aureis &c. Frigida materia per sectionem uenae uel cum chochijs & agarico. Reuellitur etiam materia ac deriuatur per masticatoria, per errhina caput purgia, & per ea quae pluries a me dicta sunt, immo etiam per cauteria commissurae coronali applicita. Corrigitur membrum mandans euacuando corroborando & eius intemperiem alterando, Causa coniuncta resoluitur in causa frigida, per exercitium clamores & uociferationes in aure, uel per ea quae in aures initiuntur uel extrinsece applicantur, ueluti sunt suffumigia emplastra &c. uel lotiones cum aqua thermarum. Regimen in contrarium ordinetur &c.

## Loci consentientes de cura surditatis.

De cura surditatis sine materia loquitur, Auic. quarta tertij, tra. 1. cap. 5. ibi quod si illic est caliditas tantum, tunc cum



infrigidantibus curetur ex oleis & alijs aut succo granati, ita ut bulliat in cortice suo cum aliquantulo aceti thuris & olei ros. et destilletur in ipsam aqua lactuce aut solatri, Illi uero quod factum est à frigore conferunt omnia olea calida in quibus sit dissolutum castoreum &c. De cura intemperiei cum materia. Alexander libro primo, cap. 32. inquit, quando bilio si humores ad caput delati surditatem inducunt, non difficulter succurritur, modo uenter per κολάγωνα sedulo euacuetur, At si malum ex crassis & crudis humoribus oriatur, principio statim medicamento purgante euacuandum ut puta cum oxymelle Iuliano uel hiera uel eo quod constat ex euphorbio. B. De hac compositione quæ paratur ex euphorpio, meminit Mesues capit. de surditate, & modum parandi docet, sed in pondere, ipse decipitur, quum loco scrupulorum quatuor usque ad sex, ipse a quatuor dragmis usque ad septem in ouo forbili exhiberi iubet, quam quantitatem uix oui cortex absque uitello & albumine caperet. Auic. loc. cit. In eo quod est cholericiū oportet ut euacuetur cholera cum solutiuo uentris, Nam ut plurimum cū solutione uentris surditas remouetur, si uero fiat a materia frigida, calida conferunt &c.

Paul. lib. 3. cap. περὶ φουκοίας καὶ κωφώσεως. At ex crudis crassisq; humoribus prognatas surditates uel grauem auditum, uenæ incisione curato aut omnino purgatione ex hiera.

De reuulsione habes Alex. locum in primo lib. cap. 32. ibi purgatione uero egregie facta, utendum est apophlegmatismis quibus per os capitis pituita purgatur & ἐπιτοίς καὶ πταρμικοῖς &c. Vide de his latius Mesuen & Arcul. De resolutione loquitur Auic. loc. supra cita. ibi & exercitium est uehementis iuuaminis & similiter uociferatio uehemens in aure & clamores buccinarum & quandoq; ponitur in au



re caput embubæ, ut ad ipsam peruenire faciat uaporem decoctionum resoluentium & confert succus rutæ cum melle & castoreo & c. Obseruentur quæcunq; dicta sunt in capite de dolore auris.

#### Conferentia & acuentia auditum.

Confert & acuit auditum uapor siue fumus aceti, succus aristologiæ cum melle, succus foliorum capparorum uel oleum decoctionis eius radices, Castoreum cucumeris asinini succus, acetum decoctionis heliebori nigri, flos æris qui ex eo albus est tritus & insuflatus delet antiquam surditatem, Auice, oleum decoctionis seminis laureolæ, Mercurialis cum uino, instilata serpentaria, suffumigium sulphuris, radix brioniæ & uitis albe oleum laterinum albuchasis, oleum cucumeris syluestris amygdalarum amararum de been, oleum laurinū, Sotira Nicolai iniecta auditum reddit, theriaca magna, pillule aggregatiuæ, hieralogodion, & fel & urina capræ cum galbano.

#### De pronosticis surditatis.

Hip. aphor. 4. aphor. 28. Quibus biliosa deiectiones, superueniente surditate cessant, & quibus surditas superuenientibus deiectionibus, cessat. B. intellige cessare surditatē ex deiectionibus, præsertim si a febribus uel bile ad cerebrum mota ipsa fieret, nam in cæteris casibus locum non haberet Aph.

Paul. lib. 3. cap. cita. Quæ ab origine, uel a prima natali die, sed longissimæ et absolutæ surditates constituuntur, nullo remedio eliduntur, Quæ uero non absolutæ, sed diurnæ sunt, ipsæ etiam curam recipiunt, aut certe difficillimam & c. i. quæ ab origine sunt surditates arte curari non possunt, siquidem neruus auditorius meatum forte non habet, unde species soni hauriat, uel si habet, locum forte non occupat quem iure possidere deberet aut uehemens adeo inest obstructio ex



carne oborta, ut minime curationem admittat. Vide de his Mesuen. Hip. aphor. 4. aphor. 60. Quibus in febribus aures obsurduerunt, sanguis ex naribus fluens aut alius turbata soluit. De Parotidibus.

Parotides sunt abscessus post aures de genere inflammationum, quæ accidunt in carnibus glandulosis sicuti in emunctorijs.

### Loci consentientes de parotidibus.

Paul. lib. 3. Parotis est glandularum sub ipsis auribus passio, Gale. 3. de comp. med. per loc. cap. 2. Parotides ex genere inflammationum sunt, fiuntq; glandulis circa aures affectis, itidem ait Aet. ser. 6. cap. 89. Auic. quarta tertij, cap. 24. Hæc apostemata sunt ex genere apostematum accidentium in carnibus mollibus & proprie glandulosis & nominantur nascentia auris &c.

### De causis parotidum.

Parotides uel a parte uel a toto fieri possunt, a parte obstructis in capite humoribus, a toto corpore, si qua fuerit crisis in febribus, hoc autem contingit ob eam quæ est in febribus caliditatem, relata multitudinem ad caput, Fiunt interdum a materia sanguinea aut biliosa, Interdum a pituitosa aut melancholica aut uenenosa iuxta semitam epidimie &c.

### Loci de causis parotidum.

Paul. lib. 3. cap. 23. Parotis fit a materia morbi illic emanante, modo a capite humoribus in eo obstructis, modo a reliquo corpore in febribus crisin expertis oritur &c. Quod in febribus ob earum caliditatem fiant abscessus, lege. 4. apho. Gal. com. 21. ibi lassitudinem habentibus in febribus &c. Auic. loc. cit. cap. 23. Et hæc apostemata omnino fiunt a materia sanguinea aut cholericæ, & quandoque melancholicæ aut phlegmaticæ & quandoque ex his mixta. Vide latius in hoc Ar-



cul. & reliquos practicanes &c.

Alex. lib. 1. cap. 34. Parotidum igitur alie originem ad copiosum sanguinem referunt, Alie ad tenuem calidum & biliosum humorem, Alie ad gelidum crassumq; succum &c.

#### De indicatijs parotidum.

Si fierent a sanguine, rubor loci, dolor, febris sequens, caliditas, grauitas manifeste indicant, Si ab ile herysipelas, dolor punctorius, uel momordicans, febris succedens, color pallidus, pauca grauitas aderit, Si a pituita in compressione aderit inundatio, color albus, uel rubedo ad albedinem declinans dolor non intensus, nec sequitur febris nisi dum pus conficitur, adest etiam grauitas. Si a melancholia durities, nullus ferè dolor & color liuidus ostendunt.

#### Loci de indicatijs parotidum.

Auic. loc. cit. Significant quod est sanguineum rubedo & grauitas & expulsio eius apud compressionem et constrictionem in meatibus, et significant cholericum ex sanguine subtili, dolor mordiccatius fistulosus. i. corrosiuus sine grauitate multa &c. Alexa. loc. cit. loquitur etiam ipse de his indicatijs, ibi, Quæ feruentis humoris plenitati adscribuntur dolores intensissimos pariunt, quæ uero tenui subtiliq; humori herysipelaceas inflammationes referunt, nullaq; grauitate, neq; dolore locum excrutiant &c. de alijs indicatijs lege latius hunc locum.

#### De cura parotidum.

Cura eisdemet præsidij, quibus alios abscessus curare solemus perficitur præter quod nec styptica neque repellentia in morbi principio conueniunt, uerum sanguine exuberante, prius sectionem uenæ moliemur, qua peracta considerandum num parotides in tumorem attollantur, an adhuc altius delitescant, si in tumorem erumpant, tunc leniētibus mollientibusq; ac digerentibus medicamentis utemur, qualia sunt quæ ex



farina hordacea ex semine lini fenigræci, althea camomilla lapatho et insulsa axungia parantur. Si uero altius deliteſcant tunc natura cum attractorijs præſidijs ueluti cum cucurbitula et fotuum crebro uſu, adiuuanda erit. Si uero abſceſſus ad ſuppurationem ſe conferat, pus mouentibus utemur: deinde ſciſſa cute pus excerni cogemus, quod ſi dolores interim agrum moleſtent, his dolores mittigabimus quæ moderate humeſcant ac calefaciunt &c.

### Loci de cura parotidum.

Auice. quarta tertij, cap. 25. Oportet ergo ne intendas ad curam eius in quantum exigitur ad curam apoſtematum adhibendo ſtyptica & apocruſtica in principio, deinde compoſitionem regiminis, deinde reſolutionem puram. Imo oportet ut incipias et proprie quando accidit in febris cum dolore capitis et adiuues ad extrahendum materiam ad apoſtema cū omni ingenio & cum uentofis &c. Gale. 3. de compoſ. med. per loc cap. 2. Non utimur in parotidibus ut in alijs partibus inflāmatīs, in principio repellentibus ſed uice uerſa attractorijs, ut affligentem humorē ex profundo ad cutem attrahentes, naturæ opem feramus &c. Vide latius Aet. ſer. 6. cap. 89. Paul. lib. 3. ca. cit. Si igitur alte adhuc deliteſcens parotis in tumorem non attollitur, natura debet adiuuari præſidijs quæ coactas ſordes ex trahant, uel etiam cucurbitula adglutinata uel crebro fotuum uſu. Sin inflammatione tentata in tumore erumpat, ijs quæ leniunt et cōcoquant utemur cataplaſmatis, at ſi ſanguis exuperare uideatur prius ſeſſione uenæ ipſum euacuabis, deinde medicamentis utere quæ puri mouēdo ſunt & ubi abſceſſus ad ſuppurationem ſpectarit cute deſciſſa pus excernetur uel acri medicamēto erumpetur &c. Vide Alex. tral. longe fuſius de ſingulis his tumoribus differentem.

De mittigando dolore lege Auice. ibi, ſi fuerit initium eius



cum dolore uehementi, sis contentus uaporatione &c.

De pronosticis parotidum.

Auic. loc. cit. Et fortasse consequitur quandoq; ex uehementia doloris eius ut interficiat, & apostematum quæ fiunt sub origine auris, illud est magis incolume quod est secundum semitam bonæ crisis. Illud uero quod est a crisi cum qua non est signum maturationis, aut præcedit bona crisis est malū &c. B. ratio est quia quæcunq; ante materiæ concoctionem a natura fiunt crises, malæ sunt, quæ uero cocta materia, bonæ, nam satius est naturam uincere quam uinci. Paul. loc. cit. si in altū recurrat coluuius, periculum haud mediocre subsequiturum est &c. lege etiam de his fusius Arcul. & Sauonarolam.

De narium affectionibus & primo de polypode & ozena.

Tres inueniuntur narium propemodum similes affectus, Sarcoma quod inde descriptione polypi ponitur, Ozena & Polypus, Sarcoma est præter naturale incrementum carnis in naribus, Ozena uero est ulceratio profunda in naribus tetri odoris atq; halitum emittens, Polypus uero est quoddam sarcoma simile polypis piscibus, nam sicuti illi multas habet propagines mollesq; sunt atque augentur, ita hic quoque affectus, Differt tamen sarcoma a polypo magnitudine tantum & opificio &c.

Loci consentientes de polypede & ozena.

Gale. 3. de compos. med. per loc. cap. 3. Et Paul. lib. 3. cap. 24. Polypus tumor est præter naturam in naribus ortus, polypedis carni similis iuxta substantiæ proprietatem, Ozena uero ulcus est putridum ex humorum acrium illuuiæ creatum. Gale. lib. finit. med. differentiā inter polypum & sarcoma enarrat. Auic. nullum agit de polypo caput, nisi illud sit in quo de hemorrhoidibus & alharnabeth agit, ubi carnes esse in naso

additas



additas asserit, nec de ozena sermonem facit, nisi forte in capite ulcerum nasci contineatur. Vide latius Gale. 3. de compos. med. per loc. cap. 3. ibi ex genere tumorum præter naturam polypodes in naribus generantur &c.

#### De causis polypedum & ozenæ.

Ozenæ cæterorumq; ulcerum ac tumorum causæ esse possunt multiplices, sicuti a uulnere ab abscessu, ab humorum acrimie influxu, a uaporibus acutis paulatim rodentibus donec ulcera pululant. Causæ etiam esse possunt quæcunque hæc omnia irritare possunt, similiter polypodes fiunt ex humoribus crassis a cerebro ad nares influentibus, uel ex ipsarum narium nutrimento, a facultate nutritoria & auctrice, in carnem mutato &c.

#### Loci de causis polypedum & ozenæ.

Gale. 3. de compos. med. per loc. cap. 3. Manifestum est affectionem hanc polypodis ex crassis & uiscosis humoribus generari, & ozenæ ex humorum acrimie & putrescibilium influxu generantur, ita ut si acres solum sint egre curabilia ulcera producere consueuerunt, non tamen graueolentia. Auic. quarta tertij, de ulcer. in naso cap. 3. Quandoq; generantur ulcera in naso ex uaporibus acutis aut malis aut chatarrhis acutis &c. De his legito acuratius Alexan. lib. 1. cap. 35. Et Paul. ibi, ozena est ulcus ex humorum acrimie illuuiæ creatum &c.

#### De polypodis & ozenæ cura.

His ambobus curandi scopus idem est, ut primum corpus euacuetur, Materiaq; per reuulsionem ac deriuationem adhuc fluens intercipiatur, caputq; firmetur ac corroboretur, quo corroborato ad narium curationem progrediendum, ita ut in ozenis affecta pars tum per repellentia tum discutientia pharmaca reficetur, sed in polypo partim adstringant partim siccant ac extenuent, partim discutiant ac cōdensent,

T



si igitur totius corporis humorum copiae indicia adsint, Euacuatio prius aut per sanguinis missionem, aut purgatione per hieram perficietur, deinde loco indantur remedia. Cura ozenae erit prout de ulceribus aurium dictum est. Polypodis uero cura fiet si cum filo tenui ligetur & in radice sua incidatur, & ubi aeger manualemente abominatur operationem procurandum est, ut acris medicamentis polypes extirpetur sicut cum puluere corticum granatorum arsenico aere usto, nitro cantaridibus &c.

#### Loca de cura polypodis & ozenae.

Gale. 3. de compos. med. per loc. cap. 3. Ceterum curatio utriusque his communis ozenae & polypodi, ut primum caput sicce tur firmetur et corroboretur, quum palam sit, ob uitiatorum humorum redundantiam, defluxum ex eo provenire, quo roborato ad naris curationem progredieris, scopo in ozenis proposito, ut affecta pars permixte facultatis pharmacatum repellentia tum discutientia reficetur, Repellunt austera & acerbata quae adstringentia dicuntur, Discutiunt uero calida et sicca facultate praedita, similiter in polypode mixta materia medicamentaria, opus est ut partim astringat partim seccet & attenuet partim discutiat condenset &c. Paul. lib. 3. ca. 24. itidem ait ibi, quum totius corporis humorum copiae suspitio fuerit, haec prius aut sanguinis dimissione aut purgatione ex hiera euacuetur &c. Auice. & Mesf. Curationem polypodis manualemente docent, per incisionem & cauterium cum ferro ignito, aut acris medicamine, quos si lubeat, leges. Arcul. recitat ung. de quo inquit modernos se profiteri omne polypum et carcinoma curare, & est medicina fortis, cuius operatio durat tribus diebus, sed circumstantes partes cum defensiuis & succis frigidis defendatur cuius descriptio haec est. R. cantaridum p. i. arsenici sublimati p. s. uel plus & minus prout



fortius aut imbecillius operari desideras et cum oxymelle simplici aut sapone nigro fiat unguentum, caue tamen membra principalia, nam tota uis in arsenico reponitur & c.

### Polypum & ozenas curantia.

Faciunt ad remotionem polypi, puluis antimonij, arsenici, aristologiae, calcanti, ciclamini, dragontee, æris usti, floris æris, cum melle uel succo serpentariae, succus mali granati, uel delict granorum eius acetosorum cum ossibus suis cum melle coctus ad spissitudinem, hermodactilus cum ære usto. Faciunt etiam ad ulcera narium, aloes, aristologia auri pigmentum, ciperus, ciclamen, licium, plantago, sicla, sumach bleta & c.

### De polypi & ozenæ pronosticis.

Auice. quinta tertij, cap. 2. Carnes additæ si sunt molles albæ et nō sit in eis dolor sunt facili curacionis, quæ uero sunt rubæ aut fuscae uehementis doloris cum sanie fetida, sunt difficilis curæ. B. Molles quia pituitosæ facile curacionem admittunt, sed liuidæ difficulter quum cancri propemodum naturam sapiant. Mesu. cap. de polyp. nar. Polypus qui fit in naribus durus niger & non tractabilis et mollis & putridus et fetidus fortassis non sanatur, sed qui elongatur et pendet habens radicem gracilem non nimis profundatam curatur per incisionem & c.

### De dolore dentium.

Manifestum est quid dolor sit dentium, sed locus doloris adeo latet ut uix a medico diuinari possit, quæ de re triplex erit doloris locus aut in substantia ipsius dentis, aut in neruo ad radicem dentis prostrato, aut in gingiuarum substantia inflammationem patiente & c.

### Loci consentientes de dolore dentium.

Gale. s. de compos. med. per loc. cap. 8. Ex dentium affectionibus aliquæ euidenter apparent, ueluti quum perforati de-



nigrati aut detriti sunt, aut frigida nec calida ferunt, sed ab utrisq; aut ab altero solo dolor eis contingit, aliqua non manifeste apparent, ueluti quum circa corpus dentis in profundo obortus sentitur & c. lege de his Paul. lib. 3. cap. 26. et Auic. settima tertij, cap. 4.

#### De causis doloris dentium.

Causa doloris dentium aut est mala intemperies aut soluta continuitas, si mala intemperies uel nuda erit uel cū materia, quae si fuerit multa partes extendens dolorem excitabit, si uero pauca tenuis & acris tunc ulcus inde orietur & per consequens dolor, at si erit intemperies nuda absq; materia, tunc erit uel flatuosa, uel nimis calida & frigida & c.

#### Loci consentientes de causis doloris dentium.

Auic. septima tertij, cap. 4. Causae doloris dentium sunt aut malitia complexionis pura cum frigore & calore, aut est cum materia aut uentositate, si cum materia, uel haec est multa uel pauca crassa uel acuta, aut materia apostemans dentem, uel erodēs, uel uermēnāsci faciens et tunc uel a capite, uel a stomacho, uel atoto ut in febribus materia descendit & c.

Gale. 5. de compos. med. per loc. cap. 8. perforantur dentes ex acrium ac rodentium humorum in fluxu uelut ulcera in cute citra externam causam similiter dentes liuidi siue denigrati ex humorum uitiatorum in fluxu fiunt & c.

#### De signis doloris dentium.

Dentes esse affectos cognoscimus ex sua nigridine uel corrosionē, sed si in suo permanserint colore inquirendum est, num malus color in gingiua uideatur, aut si tumida, aut quid erosionis uel putrefactionis in se habeat, nam tunc ex sedens non dolet, sed ex mala affectione in gingiua, uerum si nihil horū adfuerit coniecturandum est affectionem esse in neruo, praesertim si dolor in profundo sentiatur, cognoscēs etiam



hæc si gingiuam gingiue uel dentem denti comparaueris, ita etiam mala intemperies siue calida siue frigida per colorem cognoscitur, ut si pallida rubea alba, item ex applicitis iuuantibus ac nocentibus &c.

Loci consentientes de signis doloris dentium.

Gale. 5. de comp. med per loc. cap. 8. Si dentes liuidi per omnem suam substantiam facti appareant, nihil mirum est ipsos quid inflammationi simile pati &c.

Auice. septima tertij, cap. 5. Omnia ferè recitat quæ à me nuper relata sunt, uide in super Arcul. 9. almans. & Mesu. cap. proprio.

De cura doloris dentium.

Cura duplex est uniuersalis & particularis, Vniuersalis in se continet euacuationem reuulsionem & fluxus cohibitionem, Euacuatio fit uel per sectionem uenæ aut uentris solutionem, præsertim ubi abscessus aliquis aut sanguinis copia in causa fuerit, secetur igitur primum uena cephalica, deinde quæ sub lingua latet, Reuulsio fiat cum cucurbitulis & extremarum partium frictionibus &c. Fluxus cohibetur per pillulas alchaiber nominatas. Cura particularis duplex regularis & coacta, Regularis erit in materia calida, ut primum destillationes reppellantur cum frigidis sicut rosa mirto camphora &c. deinde repellentibus discutientia comisceantur, & in fine resoluentia & maturantia prout ad inflammationes pluries dictum est, adhibeantur. Cura coacta consistit in auferendo sensum, quo ablato dolor sedatur, Si uero inflammatio fuerit in neruo dentis, tunc dens eradicandus erit, Si uero præ molitie dens erosus sit, reddere oportet eum duriorrem per austera & acerbam medicamina, Si liuidi & nigri per resiccantia pharmaca.

Loci consentientes de cura doloris dentium.



Gale. 5. de compos. med. per loc. cap. 8. Erosiones dentium, siue cauernæ, per exiccationem influentis humoris uitiosi sanantur, qui si paucus fuerit ex localibus auxilijs exiccantibus medella sufficit, si multus influens humor, uniuersi capitis rationem habere conuenit, sed si caput a reliquo corpore afficiatur, totius corporis cura gerenda est, Porro erosos dentes qui præ molliæ perpeſsi sunt reddere oportet duriores per austeræ & acerbæ medicamenta, Simili etiam cura indigent liuidi & denigrati cum perforatis per resiccantia pharmacæ & c. Auicē. septima tertij, cap. 6. Inquirendum an per se uel per consensum fiat dolor, si per consensum, incipe ab euacuatione membri consentientis cum phlebotomia & uentris solutione cum hiera aut scamonio si uero per se cum scarificatione & similibus, deinde si materia calida cum frigidis, si frigida cum calidis, si sicca cum humedantibus & dolore lenientibus, si fuerit in causa siccitas confert ut fricetur dens cū butyro & adipe anatis & c. Mesu. Intentio in cura duplex est uniuersalis & particularis, uniuersalis habet tres res prima est euacuatio & c. Vide eum fusius uide etiam Arcul. 9. almans. cap. proprio, & alios practicanes & c.

#### Obseruatio in cura doloris dentium.

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9. In dolore dentium citra gingiuarum, inflammationem, siue in proprio dentium corpore, siue in neruo dolor fiat uehementissimis opus est medicamentis, siue quis uelit repellere, siue discutere doloris causam, siue humor sit siue uentus, & propterea, omnia acerrimo aceto præparentur & c.

#### Nocentia dentibus.

Nocent dentibus, brastica, dactili, gumæ, granata dulcia, lac, nix porrum raphanus.

#### Curantia dolores dentium.



Ad dolorem dentium ualent acetum, uinum decoctionis acetosæ, acorus aphodillus, allei decoctum cum pini ligno & olibano, alumē, amygdalarum folia in aceto cocta, assa, been, betonica, borax. pulsationem dentis mirabiliter tollit chameleontis nigri decoctio, cappares, lac capræ, radix celidoniæ, cypressus, colocynthis, cornu cerui decoctum, radix curcumæ masticata hedera, galla, gith, gramen, lacca, malua, melissa, mezeron, morus, nasturcium, peucedanum, pinus, pyretrum, portulaca, rosmarinus, sandaraca, rosa, ruta, sumach, saxifragia hyssopus, asparagus oleum uermium terrestrium, myrtinum, de citro, de uitellis ouorum, oleum benedictum nic. & dentifricium democriti Auic. tra. 4. sum. 2. 5. Medicamen andromaci, Auicen. eodem in loco, Mitridatum Nic. Sotira Aui. prima quinti & c. Reseruant a dolore dentium succus cepearum sanguis testudinis marinæ fricatus & c.

#### De doloris dentium pronosticis.

Auic. tertia tertij, cap. 5. Si affectio fuerit in gingiua nunquam remouebitur dolor cum dentis extirpatione, si uero in neruo fuerit, nec per remotionē dentis interdum remouetur & interdum iuuat. B. q. dentis eradicatio minime utilis sit, omnibus notum est, at si in neruo fuerit, exēpto dente facile curatur, quum materia quæ prius cum dente erat retenta, exitum habeat, non iuuat interdum quum materia sit crassa & neruo nimis adhereat & c. Hip. 4. aphor. aphor. 53. Quibus circa dentes in febribus quidam lentiores nascuntur, ijs fortes fiunt febres. Lege etiam pronost. 1. Tex. 24. ibi. si quis strideat dentibus non consuetus a pueritia ita facere malum.

Autho. erronei dissentientes circa dolores dentium.

1. Adserere, dentes per se dolorem posse pati cum 2o ar primo thesifir.
2. Adserere, dolores dentiū magis affici a calido quā a frigido.



3 Adferere, dentes ab alijs ossibus non differre.

4 Adferere, in dentibus non posse apostema spurium fieri.

Confutatio dissentientium circa dolores dentium.

Ad primum Arist. 1. & 3. De anima, pillis, ossibus, unguibus nullus est sensus quum sint naturæ terreæ, propter quod etiam plantæ nullum habent sensum, sed dentes sunt ossa per Auic. prima primi, cap. de anoth. ossium, & secundo, de generatione animalium cap. 6. igitur dolorem non patiuntur, nec obstat dictum Gal. 3. de sympt. cau. nec, Arist. problem. 2. & 3. cap. 6. problem. 12. ubi abetur q. dentes celeriter & dolent et sentiunt frigus & sic patiuntur, Nam hoc non per se sed potius per accidens euenit.

Ad secundum, Hip. aph. 5. aph. 18. Frigidum inimicum ossibus dentibus nervis cerebro, spinali medulla, calidū uero utile, ubi Gal. Quæcunq; partes sunt natura frigidiores & penitus exangues citius ac magis a frigido offenduntur quam a calido & c.

Ad tertium, Arist. 2. de generatione animalium ca. 6. et. 2. de anima inquit q. ossa non crescunt, ibi, omnium natura constantium impositus est finis magnitudinis & augmenti, sed dentes crescunt, ut patet experientia, igitur ab alijs ossibus differunt, alioqui in contritione & contactu, nisi crescerent omnino contriti perderentur.

Ad quartum. Respondet Serapio. 2. de dentibus, ibi, si dentes in suo toto corpore uiriditatem accipiunt, tunc nō mirandum si consequatur eos quod simile sit apostemati, uel dic posse apostemari per uiam congestionis. i. ex superfluitate nutrimenti, non per uiam rheumatis sicut alia apostemata lege cōcil. differen. 96.

De gingiuarum affectionibus.

Accidunt gingiuis inflammationes ulcera serpentina, Paru



lis & epulis inflammatio est calidi sanguinis influxus, Parulis est alicuius partis inflammatio, quæ nisi discussa fuerit in suppurationem uertitur, Epulis est carnis excrementia quæ ab inflammatione contracta ad itimos molares dentes pertinet, nonnunquam cum febre & dolore &c.

Loci consentientes de gingiuarum affectionibus.

Gal. 6. de comp. med. p. loc. cap. 1. inflāmatio est calidi sanguinis influxus &c. Act. ser. 8. ca. 24. Parulis est inflāmatio alicuius partis gingiuarum cum tumore, quæ ubi non dissoluitur, suppuratur. Epulis uero est excrementia carnis ab inflammatione consequuta iuxta interiorem dentem molarem aliquando cum febre & uehementi dolore internarum mandibularum, ut neq; os aeger aperire liceat, contingens &c. lege de his etiam Paul.

De causis gingiuarum affectuum.

Causa uel est extrinseca uel intrinseca, si extrinseca tūc erit uel pluuiosa constitutio calida & humida, uel ceteræ dispositiones ad humorū putredinem paratæ. Si intrinseca, uel a parte ortū habet, uel a toto, a parte sicuti a capite uel a stomacho, a toto sicuti in febribus uaporibus. s. ad gingiuas peruenientibus ex quibus ulcera & inflammationes oriuntur, eo q; in has oris partes tamquam tenues & debiles facillime imprisuntur &c.

Loci consentientes de causis affectuum gingiuarum.

Auic. octaua tertij, cap. 1. Gingiue accidunt apostemata causa materiei descendens ad ipsam secundum plurimum ex capite & quandoq; ex communitate stomachi et quandoque accidunt in principio hydropisis ex malitia formæ ob id quod ex uaporibus corruptis ad eam eleuatur &c.

De signis affectionum gingiuarum.

Cognoscitur humor putridus per colorem & tactum, Nā



cognitio nostra quæ per uisum quandoq; decipitur, ex tactu interdum certior fit, Ex tactu. n. omnes qualitates percipimus ut durum molle calidum frigidum, interdum inflammationes et ulcera per se manifesta sunt, et plerunque cum febre fiunt. Loci consentientes de signis affectionū gingiuarum.

Auic. loc. cit. & significatur genus materiei per colorem & tactum, & quandoque sunt, ex eis manifesta recentia uelocia ad suscipiendam curam &c.

### De cura affectionum gingiuarum.

Vbi totum corpus apparuerit, aut multitudinem humorū refertum, aut eorum malitia uitiatum, primum antequam ad topica peruenias, per sectionem uenæ per purgationem ac inediam curabis, quū uero ad topica accesseris, duo scopi erunt consyderandi, alter ab ipsius affectionis indicatione, alter a particula quæ curatur natura. In ipsa affectione conuenit ut in principio id quod influit repellatur, Repellentia sunt quæ adstringendi uim habent, post principium usque ad morbi finem pharmaco opus est repellente & discutiente, sed primo tempore adstringens præcellat, in fine uero discutiens inter medio tempore æquales utriusq; partes sint, si uero quid induratum de inflammatione relinquatur non sunt adstringentia cum discussorijs miscenda, sed ita curandum ut concoctoria præcedant ad discussoria, in particula natura consyderetur, superficiem oris esse cute totum corpus ambiente molliorem ac rariorem, quæ de re non fortibus auxilijs indiget &c. Cura parulidis fiet per discussoria antequam suppuretur, sicuti per collutiones ex decocto. s. lini, sed epulidis inflammatio cū discussorijs ac siccis deprimentibus auferetur &c.

Loci consentientes de cura affectionum gingiuarum,

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 1. Eandemet methodū enarrat quam nuper retulimus, sed longe satis fusiohem. Act.



ser. 8. cap. 24. & 25. Parulis dissoluenda est antequam suppu-  
retur per collutiones quales sunt succus ptisanæ decoctum se-  
minis lini, deinde siccis deprimenda est carnis eminentia, Si-  
militer epulis inflammatio cum dissoluentibus et siccis depri-  
mentibus curanda est, quod si suppurentur incidantur et ulcus  
per collutiones curetur. Habes remedia epulidis ex Gal. 5. de  
compos. med. per loc. cap. 9. & a Paul. lib. 3. cap. 26.

Auic. octaua tertij, cap. 2. loquens de inflammatione inquit, si  
materia est superfluitas calida tunc administra euacuationē  
& phlebotomiā, et cura in principio cum collutionibus oris  
infrigidantibus & sit in eis stypticitas sicut aqua myrti & fo-  
liorum frigidorum stypticorum & decoctio balaustrarū glan-  
dium & succus portulacæ arnaglossæ & c. Lege de his Gal. fu-  
sius in loco nuper citato & c.

Observationes de repellentibus & discutientibus.

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9. Inflammationes repel-  
lentibus circa asperitatem & discutientibus sine asperitate in-  
digent, hoc idem refert etiā Aet. ser. 8. cap. 20. Gal. 6. de comp.  
med. per loc. cap. 1. Quum gingiuarum caro sit mollis et rara  
idcirco fortibus auxilijs non indiget, Vitentur insuauia ob  
eius sensum, Item uenenosa, ne ob duos meatus subiacentes,  
aliquid in uentrem, uel pulmonem influat & c.

De linguæ batracho.

Ranunculus græce Βάτραχος dictus est tumorū uenarū  
quæ potissimum sub lingua cōtinentur, sunt inter auicinianos  
qui morbum appellant glandulam, crescit ac si noua lingua  
oriretur, unde sunt qui uelint carnem additam esse lingue ba-  
trachum alij apostema pituitosum.

Loci de linguæ batracho.

Paul. lib. 3. cap. 26. Batrachus tumor est ad inflammatio-  
nis similitudinem, sub lingua erumpens maxime in pueris, Ita



dem adserit Aet. ser. 8. cap. 37. De batrachi causa.

Si tumor fuerit pituitosus omnino ab humiditate uiscosa a capite descendente fiet, si uero caro addita tunc fiet sicuti et alia caro &c.

Loci consentientes de batrachi causis.

Auic. sexta tertij, cap. 17. Et causa eius est humiditas uiscosa &c. Vide ipsum fusius. De batrachi indicij.

Cognoscitur quia similis est ranæ, in colore, quum superficiei & uenarum lingue tumor sit &c.

Loci consentientes de batrachi indicij.

Auic. loc. cit. est similis glandula dura existens sub lingua, cuius color est similis colori composito ex colore superficiei lingue & uenarum quæ sunt in ea & est similis ranæ &c.

De batrachi curatione.

Considerandum in primis est num in puerulis an in perfecta etatis hominibus cura fieri debeat, nam si in puerulis tunc collutiones tantum conueniunt si uero in maturis hominibus tunc primum sectio uenæ sub lingua & si ranunculus magnus fuerit, oportet ut scindatur & extrahatur, uerum in primis experiunde sunt medicina corrosiua incisiua ac resolutiua, deinde si nihil profeceris, nil erit quod ab operatione manus te excuset, medicina igitur in principio parantur ex sale ammoniaco & gallis & diu fricetur locus, deinde, flore aris dragaganto & similibus uti poteris &c.

Loci consentientes de batrachi curatione.

Aet. ser. 8. cap. 37. In cura hoc discriminis est ut aliter in pueris ac imperfectæ etatis hominibus medendum sit, si quisdem ijs sectio uenæ sub lingua illis uero collutiones tantum conueniunt, lege de his Paul. lib. 3. ca. cit.

Auic. sexta tertij, cap. 18. Eperiantur in ipsa medicina corrosiua incisiua resolutiua in quibus est superflua exiccatio



ut sal ammoniacus & fricatio cum flore aris & dragant.  
& administrentur phlebotomia sub lingua & medicinae for-  
tis alcola, si autem non ualuerint, non erit excusatio ab ope-  
ratione manus &c.

De aphthis. i. oris ulceribus.

Quas graeci ἀφθες dicunt Auiciniani alcola, nos pustulas  
in superficie oris appellamus &c.

Loci consentientes de aphthis.

Gal. 6. de comp. med. per loc. cap. 4. Aphthae sunt ulceratio-  
nes in superficie oris obortae habentes quidpiam caliditatis  
ignae &c. Aet. ser. 8. cap. 39. idem refert.

Auice. sexta tertij, cap. 23 agit de his sub nomine alcola &  
ulceribus malignis &c. Vide Hippocra. 3. aphorif. aphor. 24.  
ibi, In etatibus talia contingunt paruis & nuper natis puerulis,  
oris ulcera quae aphthae uocantur &c.

De causis aphtharum. i. oris ulcerum.

Fiunt aut a lacte nutricis uitiato, aut ex humorum uitio-  
forum ad os influxu aut ab acredine eorum quae bibuntur ac  
comeduntur &c.

Loci consentientes de causis aphtharum.

Gale. 6. de comp. med. per loc. cap. 4. fiunt ut plurimum  
pueris lactentibus quum uitiosum fuerit nutricis lac, aut non  
probe ipsum concoxeris infans &c.

Auice, sexta tertij, cap. 23. Non accidunt eis nisi propter  
malitiam lactis, aut malitiam digestionis eius in stomachis  
ipsorum & quandoq; accidit ex humore omni.

Aet. loc. cit. Fiunt etiam in his qui ad perfectam aetatem  
peruenerunt tum propter uitiosorum humorum ad os defluxum  
tum propter acredimen eorum quae bibuntur ac comeduntur  
&c. lege aphor. 3. Gale. comm. 24. ibi, causa harum nil aliud  
est quam mollities instrumentorum quae neque tactum neque



lactis sustinent qualitatem & comm. 32. eiusdem ubi inquit a substantiam tenuem habentibus & a mordacibus humoribus fieri & c.

#### De aphtharum indicijs.

Cognoscuntur ex tactu et visu aphthæ, ex tactu dum calor & tumor excitantur, visu cognoscuntur ob colorem, nam albus pituitam flauus bilem, rubeus sanguinem & niger atram bilem significat & c.

#### Loci consentientes de aphtharum indicijs.

Aet. ser. 8. cap. 39. Cognitio omnium facilis est ut pote visui & tactui subiecta, ad tactum quia calidiores quam expectat loci sunt, tumoresque excitantur, visu uero cognoscuntur ob colorem, nam rubicundiores a sanguine & c.

Auice. sexta tertij, cap. 23. Cognoscitur ex colore suo, album enim est phlegmaticum ex phlegmate salso in pluribus & citrinum est cholicum uehementis inflammationis quam alia & nigrum est melancholicum & rubeum clarum est sanguineum & c.

#### De cura aphtharum.

In primis curandum est ut humor ex quo ulcerationes fiunt statim euacuetur, deinde fiat uenæ sectio, nam in his ulceribus maxime conducit, quibus peractis, tunc si sub rubræ fuerint ulcerationes, uti oportet refrigerantibus & moderate adstringentibus a principio præsertim & in puerulis, Deinde his quæ citra mordacitatem discutiunt, si uero subflauæ fuerint, tunc similibus utendum sed frigidioribus, si nigræ discutientibus & c. In adultis uero efficacioribus remedijs utendum & c. Loci consentientes de cura aphtharum.

Auic. loc. cit. cap. 24. Oportet ut intendatur primo humori dominanti & facienti alcola et euacuetur ex corpore toto si est dominus, deinde phlebotometur ex uenis quæ sunt sub mento. Phlebotomia enim confert omnibus agitudinibus oris calidis & c.



Gale. 6. de compo. med. per loc. cap. 4. Quæ in superficie tantum sunt, facile ex moderatæ adstringentibus curantur, quæ uero diuturna & depascentia sunt, fortioribus remedijs utendum Aet. ser. & loc. cit. Si sub rubræ infantium ulcerationes fuerint a principio cum his quæ mediocriter adstringunt & refrigerant, deinde his quæ citra mordacitatē discutiunt, si subflauæ ijsdem similiter utendum, uerū magis frigidis & c. Vide fusius. **Observatio in cura aphtharum.**

Auic. sexta tertij, cap. 24. Et oportet ut alienet omnia olea usque ad oleum de oliuis & c.

#### Aphthis nocentia.

Nocent ori & palato quedam species brassicæ & capparorum, lacticia melongia nuces raphanus.

#### Aphthas curantia.

Ad ulcera oris prosunt absinthium, omphacium, alumen, butyrum, camomilla, camphora, acatia, aloes, berbena, lutum armenum, plantago, rosa, rubus, spodium, dragagantum cum amylo & aqua ros. dissolutum, granata mala, galla, oliua, malua, litium, lac, aphodillus & c.

#### De aphtharum pronosticis.

Auic. loc. cit. cholericum est uehementis inflammationis, sed omnibus malignius est melancholicum siue cum apostemate siue singulare sit. Et omne ulcus eueniens in superficie oris est uelox ad dilatandū. B. scito ulcera in temporibus pluuiosis & in febribus pestiferis multiplicari, quod uero, ulcus facile dilatetur, ut ait Auice. ex eo forte contingit, quod locus in quo ulcera fiunt caliditate non deficit, & cutis mollis & humida facilius ulceratur. Paul. lib. 1. cap. 10. Quod modo criste nigrescit, omnium perniciosissimum & lethale est & c.

#### Finis Secundi Libri.



## IOANNIS BACCANELLI.

## MEDICI REGIENSIS.

De Consensu Medicorum,  
in curandis morbis.

## Liber Tertius.

## De tonsillarum collumellæq; inflammationibus.



Onsillæ aliis glandulæ ob quandā glandis  
similitudinem, a tole qui authore festo est  
faucium tumor, dictæ sunt, fiuntq; circa co-  
lumellam ex utraq; parte infra fauces &  
Græce *αμυγδαλæ* & arabice amygdalæ vo-  
cantur. *κλωίς* uero siue gurgulio, uel co-

lumella (quanquam gurgulio proprie pars sit gutturis a nari-  
bus ad pulmonem constans ex cartilagine et carne per quam  
spiritus meat ac remeat) accipitur tamen pro columella ca-  
runcula, quæ dum summa existit, gurgulio dicitur, dum ue-  
ro columnæ instar propendit, columna uel columella, hæc  
dum superius angusta est & inferius rotunda, ob uuæ simi-  
litudinem uua et uuula dicitur dum uero gracilescit, uel ab in-  
fluxu humido laxior euadit, tanquam loro similis pendens,  
lorum dicitur.

## Loci consentientes de tonsillis &amp; gurgulione.

Gal. aphor. 3. comm. 26. Tonsillæ sunt locorum ad isthmū  
attinentium inflammationes. B. intellige per isthmum partē  
illam quæ os & gulam interiacet dicta per methaphoram.  
Aet. ser. 8. cap. 40. gurgulionem quidam collumellam appet-  
lant, uua uero nomine accipienda est quædam in eo affectio,  
quum uua acino simile summum gurgulionis apparet, lorum  
uero aliam affectionem uocant, quum ex suffitu, nimium igni

tus



tus gracilescit & loro similis propendet & c.

Gale. 6. de compos. med. per loc. cap. 3. Columella carnosissima quædam est particula in summo ore dependens, quæ duobus nominibus appellatur, a ueteribus græcis gargareon & cion. i. gurgulio et columna quanquā non cion, sed cionidem posteriores medici. i. columellam uocarint, nec dicenda uua est quæ sit hæc gurgulionis affectio & c. Gale. aphor. 3. comm. 26. Tonsille sunt non nunquam solius tunica uentri ac gulæ & faucibus toti; ori communes inflammationes, nonnunquam uero & subiectorum ipsi musculorum & c.

#### De causis tonsillarum & gurgulionis.

Omnis inflammationis causa procatartica est uel nimia meri potio, multa; ciborum maxime acrium deuoratio, causa uero antecedens est humorum influxus, uel humores liquidi, quibus lingua larinxq; et aspera arteria humescere solent, ad malignum redacti, uel uapores ipsi a febrili calore concitati ac elati, cause coniunctæ sunt humores ad actum inflammationem reducentes & c.

#### Loci consentientes de causis tonsillarum.

Gale. 6. de compos. med. per loc. cap. 3. Fiunt hæc quemadmodum dictum est de alijs inflammationibus ex humorum influxu & c. Aet. ser. 8. cap. 45. Tonsillarum inflammationes plerunque fiunt a nimia meri potione et a multa ac auidiore ciborum deuoratione maxime acrium & asperorum fiantq; ijs maxime qui plurimo abundat sanguine uel pueris qui texturam habent teneram. Auic. nona tertij, cap. 12. Illis quandoq; accidit catarrhus apostemans eas (nam de columella loquitur) ita ut prohibeat anhelitum & quandoq; mollicatur uua præter apostema & indiget eo quod adstringit & c. B. scias q; arabes quatuor uuule morbos enumerat et sunt apostema, ulcus, corrosio, & casus, apostema fieri potest, a quacunq; ma



terialulcus, tantum a materia ulcerante, corrosio a multa & acri materia, casus a sanguine uel a pituita gurgulionem re molliente.

#### De columelle indiciis.

Cognoscitur facile per uisum si lingua deprimatur, uel si æger in radice linguæ aliquid insistere sentiat difficultas præter hæc deglutienti adest, item dolor & interdum febris, cognoscuntur humores ex eorum coloribus, apostemata uero ulcera & corrosiones per se ex uisu manifestantur &c.

#### Loci consentientes de columellæ indicijs.

Gale. 6. de compos. med. per loc. cap. 3. Cognoscitur hoc si quis aperto plurimum ore toto linguam deprimat &c.

Aet. ser. 8. cap. 45. In tonsillarum inflammatione accidit difficultas transglutendi, dolor et aliquādo etiā febris &c. Vide in hoc Auice. qui tantam deglutienti difficultatem interdum esse inquit, ut æger digitis suis eam cōprimere cogatur, donec transglutiat & hoc præsertim fit quum tonsillæ & columella plus iusto humiditatis recipiunt uel laxantur uel inflammationem experiuntur.

#### De cura tonsillarum & gurgulionis.

Si ex inflammatione periculum immineat, primo euacuandum per sectionem uenæ cubiti, deinde reuellendum ac derivandum cum cucurbitulis collo ac mento affixis & cum gargarismis, primo leuiter adstringentibus postea ex decocto fursur, passularum paratis quod si ad suppurationem uertantur tonsillæ, tunc fiant gargarismi ex decocto caricarum & aqua mulsa, si uero augeat morbus uenæ sub lingua seccentur, aliisq; subducatur, postquam pharmacis acribus multū discusorijs utendum est, si uero quispiam sectionem gurgulionis moliatur, reuera præstantius est cauterio gurgulionem resecare quam ferro, si quidē nullo potiore remedio tota humiditas ad illam extremitatem defluxa exiccabitur quam caute



rio,ustionem siue incisionem faciendam denotant uuula attenuatio & si ab extremitate eius resudet ueluti pus & liuiditas eius partis appareat &c.

Loci consentientes de cura tonsillarum & gurgulionis.

Gale. 6. de compos. med. per loc. cap. 3. Comuniter tum tonsillis tum columella inflammatis aut exulceratis in principio conuenit quies inedia & consequens dieta gargarismi simplices leuiter adstringentes, in uigore morbi alius subducatur, gargarismi ex decocto ficuum aut ptisanæ succo in quo passulæ sint incoctæ, si uero tonsille ad suppurationem ueniunt, gargarismi fient ex decocto ficuum aut aqua mulsa calida, si amplius augeat malum et principium suffocationis suspectum sit, alius forti clysteri uel glande subducatur, Vena cubiti secetur, cucurbitulæ cum scarificatione collo ac mento affigenda, fomentis ac cataplasimatis frequentius & gargarismis utendum, quod si morbus ad nullum horum presidiorum cedat, sed augeatur uenæ sub lingua secetur, aut iuxta angulos oculorum uel ea que in fronte est &c. De sectione gurgulionis loquitur Hippoc. pronost. 3. cap. 9. tex. 13. ibi, gurgulio cum periculo secatur, aut uritur, & scarificatur quandiu rubidus fuerit & magnus, nam inflammatio ad hæc consequitur & sanguinis eruptio, sed hunc oportet alijs medicamentis extenuare, ubi uero seperatum fuerit quod sanè uuam uocant, extremūq; gurgulionis maius & liuidum fuerit superior uero pars tenuior, in hoc sane tempore tutū est manus admolliri, præstat autem alio prius euacuata manū adhibere si tempus permittat et homo non suffocetur &c. Auice. nona tertij, cap. 15. Consideretur uuæ subtiliatio & detumitio & proprie in inferiore parte eius, et si ingrossatur extremitas eius, & resudat ex ea sicut pus tunc est melior hora incidendi cum ferro aut medicinis cauterizantibus &c. B. Quoniā uocis plectrū



est columella ut Gale. de usu partium, & in eius incisione sequitur quandoque sanguinis profuuium, fitque ex eius abscissione ne frigidior inspiratio, inde est ut thorace & pulmone refrigeratis quandoque multi intereant, idcirco cautius procedendum arbitror, nedum partem sanare cupimus maius nocuumentum inde sequatur. Habes etiam remedia per omnia morbi tempora ex Aeti. serm. 8. cap. 45. & a Paulo lib. 3. cap. 26. Vide & alios practicantes & c.

#### De angina & strangulatione.

Angina quæ a græcis, στυάχη, dicitur, est musculorum faucium interiorum inflammatio, qua fauces anguntur & strangulantur, anhelitum uel deglutionem impediens, Sicuti παραστυάχη, exterior, Hic morbus ab imperito medicorum uulgo deflexa uoce a synanchi, squinantia dicitur, dicitur tonsillæ etiam, quâquam plinius tonsillas ab angina seiungat, Strangulatio uero est subitus ob inspirationis defectum interitus, Angina quatuor habet differentias ut infra in Aet. uidebitur.

#### Loci consentientes de angina & strangulatione.

Gal. aphor. 4. commē. 34. Quum musculi gutturis anteriores una cum ambiente tunica inflammationem patientes uiam spiritus ualēt intercludere medici talem dispositionem uocāt synanchē & c. Paul. lib. 3. cap. 27. Angina quæ στυάχη a græcis dicitur, musculorum faucium interiorum est inflammatio sicuti παραστυάχη exteriorum. Auicē. nona tertij. cap. 8. Loquens de suffocationibus describit esse apostema in gutture anhelitum uel deglutionem uel utrâque impediens & c. Gal. aphor. 4. commē. 34. Strangulatio nil aliud est quâ subitus interitus ob inspirationis defectum, qui fit ex angustia aliquius instrumenti ex ijs qui seruiunt respirationi & c. De angina differentijs loquitur. Aet. ser. 8. cap. 47. Angina quatuor



differentiæ existunt, prima quum fauces inflammantur. Altera quum nec circa oris regionem, nec iuxta fauces nec forinsecus quicquam apparet, sed iuxta asperæ arteriæ extremum suffocatio ægrum angit, tertia, quum externa regio unâ cum interna fuerit iuxta mentum inflammata, quarta, quum cervicis vertebrae a suo loco excidunt, unde lingua a luxata vertebra ad suam radicem impulsâ quandoq; ex suis proprijs locis excidit et difficultas respirandi magis infestat, unde aperto ore semper hiare atq; aerem attrahere æger cogitur &c.

B. Præter has quatuor differentiâs a loco sumptas, sunt aliæ quatuor species ab humoribus sumptæ. s. a sanguine bile pituita atrabile quamvis raro hæc ultima ob sui crassitiem eveniat, Speciem uero, quæ ex luxatione cervicis verticuli contingit, caninam suffocationem uocat. Auicē. ad similitudinem canis qui aperto ore uehementer ex lassitudine anhelat. Vide Gale. 2. prorrhēt. commē. 54. & aphor. 4. commē. 35. De alijs anginae speciebus mentionem agit Hip. & Gal. 3. pronost. tex. 16. & ibi quid sint fauces euidenter exponit, Similiter aphor. 4. commē. 34. Inter gulam & guttur spatium fauces nominat &c. Lege de speciebus anginae. Gal. 4. de loc. aff. ca. 3. circa finem &c.

#### De anginae causis.

Causæ procatareæ sunt ciborum facultas qualis est potus frigida, ebrietas nimia satietas frigiditas aeris et quæcunq; ex respiratione attrahuntur mala. Causæ antecedentes, sunt totius uel partis repletio, aut partium quæ circa fauces gutturisq; existunt, uel humores fluētes ut sanguis bilis pituita &c. Causæ coniunctæ sunt humores anginam actu facientes qui partim fluxi sunt partim fluunt, ex quibus binæ species pullulant, Altera. s. a glutinosa frigidaq; fluxione, Altera uero a calida et acri &c. Loci contentientes de caulis anginae.

Aet. ser. 8. cap. 47. Anginae causæ multæ sunt. frigiditas ma



gis quam ardor & plagæ & ex piscibus ossa ad tonsillas im-  
 pacta & potus frigide & ebrietas, nimia satietas & quæ ex  
 respiratione attrahuntur mala Auice. nona tertij, ca. 8 Et quan-  
 doq; causa est propter quosdam cibos & c. Et subdens causam  
 antecedentem inquit q̄ nō est semper repletio totius corporis,  
 nec superabundat superfluitas nisi in membris uicinis gutturi  
 & facit euenire apostema & c. Et subdit quandoq; accidunt  
 ex sanguine uel ex cholera rubra, aut ex phlegmate, Raro ue-  
 ro ex melancholia. De causis coniunctis loquitur. Gale. 4. de  
 Vic. rat. in mor. ac comm. 30. Ethip. eodem in loco, ibi, Synan-  
 chus. i. angina fit quum hyeme uereq; fluxio multa & uiscosa  
 ad uenas iugulares defluerit & c. Vnde Gal. fluxionum quæ  
 a capite deferuntur, quædam sunt substantia tenues, Aliæ ex  
 crasis uiscosisq; humoribus fiunt. Tenuēs penetratis latis ue-  
 nis in angustioribus detinentur. Crassæ uero contrarium obti-  
 nent, ut in latis contineantur, strictas penetrare non ualentes  
 quum igitur in faucium uenis tales impacti fuerint humores,  
 pars in tumorem attolitur & c. scias q̄ quum nerui & liga-  
 menta ad partes inflammatas extenduntur tunc uertebrae uel  
 intra uel ad latus, ob eorum copulam qua simul coniunguntur  
 cito uertuntur. Et de his lege Gal. aphor. 4. comm. 35. et Aetiū  
 in præallegato loco & c. Vide etiam Gal. aphor. 3. comm. 22.  
 ubi anginam fieri inquit ex biliosis humoribus qui ad fauces  
 autumnō decumbunt, et a pituitosioribus qui uere cum ortho-  
 pneæ accidunt & c.

#### De anginae indicijs.

Indicia anginae sunt, difficultas spirandi, febris, genarum  
 rubor, deglutio impedita, dolor circa guttur, tumorq; non ex  
 trinsecus apparēs, interrupta uox, Fluxionū humoris indicia  
 sumuntur a colore a dolore, & a sapore, cognoscuntur a colo-  
 re, si rubidus flauus albus linēs humor fuerit, a dolore, si gra-



uis tensius pulsabilis ut in sanguine, si pontorius ac mordicans ut in bile, si paruus et obtusus ut in pituita &c. a sapore, si dulcis ut a sanguine, si amarus ab ile, si salsus uel insipidus a pituita, si ponticus ab atrabile &c.

Loci consentientes de anginae indicijs.

Paul. lib. 3. cap. 27. Anginae notae sunt, spiritus recta ceruice uix trahitur, nonnullis febricula oboritur, faciei rubor, aeger ore coniuet cibū potumq; deglutire non potest. Gal. 3. predict. comm. 16. quia inflammatione uexantur musculi in gutture, merito dolore afficiuntur &c. Hip. 4. de uict. in mor. ac. tex. 30. Præterita quæ intuenti apparent haud quaquā tumentia uidentur, tēdinesq; ceruicis posteriores tenduntur uoxq; ἀπὸ τοῦ στόματος. i. abrupta est &c. Auic. ipse inquit quidetur loqui cū naribus additq; exitus amborū oculorum & egressio lingue, lege fusius de signis quando extrinseci laborant musculi, quando ue intrinseci &c. De indicijs fluxionum humoris. Lege Auic. nona tertij, ca. 9. ibi, & signa eius q̄ est sanguinea &c. Similiter ibi, et signa cholerica et ibi signa phlegmatica sunt falsedo & sapor baurach &c. lege etiam Arcul.

De cura ipsius anginae.

Curatio in remouenda antecedente causa triplicem scopū exigit, Primo ut euacuetur, Secundo ut fluxio prohibeatur, Tertio ut reuclatur. Euacuatio fiet per sectionem uenæ usq; ad defectum animi, exclusiue, ni morbus inducias dederit, ualida maxime existente uirtute cum repletionē copiosa, at ubi morbus moram fecerit partienda erit sectio uenæ, ita tamen ut nō desinente morbo, primum a communi, deinde a cephalica extraxeris. post hanc ad secandas sub lingua uenas te conferes, uerum si pauca fuerit repletio a cephalica eiusdem lateris ad uenas sub lingua, incipies, deinceps si abundauerit bilis alius soluenda erit cum bilem educentibus. Fluxio prohi-



beat<sup>ur</sup> cum his quæ materiam incrassant, qualæ est diacodion et opiata. &c. Diuersio fiet per cucurbitulas frictiones enematæ. Confert etiam diuersio per deriuationem. Curatio in remouenda causa coniuncta, siue phlegmone discutiatur, siue in pus conuertatur, tres etiam medendi scopos expostulat, Primus erit reperiuties quæ reperiutia nisi facta euacuatione suspecta sunt, Secundus partim repellens partim discutiens esse debet maxime dum uiget morbus, Tertius discutiat tantum, & hoc a medio statu usq; ad morbi inclinationem, quod si ad sup<sup>u</sup>rationem inflammatio uertatur, tunc aperientibus abstergentibus ac mondificantibus opus erit, at si patiens a dolore præmatur tunc anodinis ut gargarismis ex lacte caprino dolori ipso uacandū erit, Interim dieta sit tenuissima, sufficit. n. ut sumatur ptisana, uel panis in aqua decoctus et bibatur aqua &c.

Loci consentientes de cura anginae.

Hip. 4. de Vic. in mor. ac. tex. 30. sanguinem igitur ex brachijs detrahens mox uenas quæ sub lingua sunt secabis &c. Itidē adserit Paul. lib. 3. ca. 27. Auic. nona tertij, cap. 10. Oportet ut euacuetur in principio uniuscuiusq; materia faciens illud cum phlebotomia & solutione uentris & ut retrahatur materia ad partē diuersam saltem cum uentosis positis super loca longinqua opposita ei & ligatione extremitatum dolorosa &c. Lege in hoc Mes. & Paul. fusius. De cura causæ coniunctæ loquitur Mesu. cap. de synanch. ibi, distinguamus in administratione particularium operationum per tempora morbi, Nam in augmento sit magis uincens medicamen stypticū & prohibitium agitationis et discursionis rheumatis &c. Lege fusius nā præter has intentiones etiam remedia docet in omni tempore morbi oportuna. Auic. Similiter loc. cit. ait, ibi incipiatur cum medicinis stypticis mixtis cum ijs quæ parum abstersionis habent et gargarizatio cum aceto est ex eis



quæ repellunt & prohibent attractionem humiditatis plurimæ, deinde fiat gradatio ad maturatiua & c. Et ca. 2. Et quandoq; dolor fit fortior in principio rei, quare oportet ut stypticis admisceatur aliquid quod sedat dolorem sicut syrupus uiol. & c.

Paul. li. 3. ca. 27. loquitur de uictu quum dicat cibus sit tri-duo aqua mulsa inde ptisana cremor cum dulci quadam portione, deinde & ouorum lutea & c.

#### Observationes de phlebotomia.

Mes. cap. de synan. sit principium nostrum a phlebotomia si morbus accidit ex plenitudine sanguinis, si uero cum sanguine abundet cholera præponimus euacuationem cholerae ad sanguinis detractionem, deinde facimus sequi phlebotomiam. Paul. lib. 3. ca. 27. Non uniuersim sed pluribus interpositis uicibus euacuetur, ne cumulata, uniuersimq; facta euacuatione, anima ipsis deficiente suffocationis periculum superueniat & c. Auic. nona tertij, cap. 2. Idem adserit et Aet. ser. 8. cap. 47.

#### Observatio de gargarismatis.

Auic. loc. cit. Gargarismata postponantur, si illic est repletio & si fuerint gargarismata dolorosa sed administrentur post mundificationem & c. Mirum in modum laudantur etiam uentosæ super collum ad secundam uertebra si deglutio fiat difficilis & c.

#### Observatio de reperiussiuis.

Mesu. loc. cit. Reperiussiuæ nisi facta euacuatione suspecta sunt, unde Gal. 3. art. parue corpus, plenum existens reperiussionem non recipit & c.

#### Observatio de uictu.

Auice. loc. cit. Et prohibeatur nutrimentum, ut sit corpus eius utens sanguinis eius nutrimento, & conuertens ipsum a parte apostematis quare minorent cibum necessario aut uoluntarie & c.

#### Nocentia gutturi.

Nocent gutturi amyllum, mustum, platanus, urtica, nux, pi



retrum, andachoca, &c.

Anginæ conferentia.

Anginæ conferentia, sunt acetum per se gargarizatum, omphacium, oxymel, agrimonium cū uino, uinum granatorum, diamoron, rob nucū, succus rubi, ebuli, anisum cum melle hyssopo & aceto, gargarisma, stercus canis ossa comedentis, uiola purpurea, hyssopus, Antirū confectio hali. 27. antid. diaolibanum nic. diayrundinis. Auic. prima quinti, Philoniū romanum Theodoricon magnum hali. 7. antid. Hiera archigenis &c.

De pronosticis anginæ.

Hip. aphor. 6. apho. 37. Ab angina habito si tumor fiat in collo bonum, foras. n. morbus deducitur, & similis sententia est. 7. aphor. phor. 50. Et ratio aphor. est quia satius est ex intimioribus & principalioribus membris morbos extrudi quam ediuerso. Hip. prædict. 3. tex. 16. Angina grauißima est ac celerrime interimit, quæcunq; nec in ceruice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit, sed plurimū doloris infert, ac spirationis difficultatē, orthopneam dictā. Hæc. n. eodē die & 2. & 3. & 4. Strangulat, quæcunq; uero dolorem alteri sub similem infert, attollitur uero, ac ruborem in faucibus efficit admodum exitiosa sed paulo longior quā superior est. Paul. lib. 3. ca. 27. Pueris raro talis affectus accidit, nisi cum ceruicis uertebrae affectæ loco excidunt, uerū illis ceu curā nō recipiētibus ac deploratis manū admoliri nō oportet. B. Habes aph. 43. secūde sectionis strangulati ac dissoluti nondū mortui nō referuntur quibus spuma circa os fuerit, nam in ijs exitiale signum est spuma circa os uerum Gal. inquit nonnulli etiā strangulatorū quibus circa os spuma uisa est relati sunt, unde etiā Auic. quum tamen quandoquæ accidat ut præfocatus spumet, deinde sanetur. Hip. aphor. 4. aphor. 34. Si a febre habito, tumore non existente in faucibus strangulatio repente superuenit, lethale. B. Habes hanc met sententiam. 2. prorrh. tex.



53. ubi inquit fauces dolētes & c. Ibi q; lib. huius author a Gal. damnatur. Et aphor. 4. aphor. 35. si a febre habito collum perversum uertitur & uix potest deuorare sine ullo tumore, lethale est. B. Vbi non uisitur tumoris uestigium dictum est inflammationē in gutture, uel in eius musculis esse, quare exitiale signum est, maxime quum febris adsit tanquam una ex causis mortem portendentibus unde Auic. Si cū prae-focationibus uehemens febris fuerit tunc mors festinat quoniā febris facit aegrū magno anhelitu indigere & c. Et apor. 5. aphor. 10. Quicumq; ab angina liberantur, ijs ad pulmonem uertitur et in septem diebus pereunt si uero has effugerint, suppurantur, B. Dictum est ab Hip. 2. aph. aph. 19. Quod, acutorum morborum non sunt certae prae-nuntiationes aut salutis aut mortis quia nonnunquam humor noxius ex uno loco ad alterum transfertur, unde si angina ad pulmonem uertatur, uel interficit, uel in pus conuersa suppuratur, si ad cor omnino aegrū perdit, Aui. 9. tertij cap. 9. quum autem facies sit uiridis & denigratur situs oculorum, tunc ipse moritur, Similiter quando minuitur pulsus & infrigidantur extrema & grossitudo linguae & ipsius denigratio sunt ex signis malis & c.

Hip. praedict. 3. tex. 20. Securissima est angina, si rubor quā maxime foras uertatur Et praedict. primo fauces dolentes tenues cum quadam difficultate strangulantes uelociter exitium afferunt & c.

Authores erronei dissentientes circa Anginam.

- 1 Adserere ab inflammatione asperae arteriae strangulationem posse effici.
- 2 Adserere, in gutture nullum posse fieri tumorem absque dolore.
- 3 Adserere, in angina non conducere repercussiuā, ne materia introcludatur.



4 Adserere, anginam pluries fieri à pituita quam ab alijs humoribus.

5 Adserere, sectionem uenæ in omni angina non conferre.  
Confutatio dissentientium circa Anginam.

Ad primum Gale aph. 4. commē. 34. Asperæ quidem arteriæ Inflammatio difficultatem spirandi aliquam efficere potest, strangulationem uero non potest.

Ad secundum Gal. eodemet comen. quum tumorum triplicem differentiam enumerasset, postea in fine comenti inquit possibile esse multitudine humiditatis pituitosæ præcipue, in deficiente tunicam gutturis interiorē, aliquem fieri tumorem absque dolore.

Ad tertium Respondet Auic. 9. tertij cap. 10. & gargarizatio cum aceto est ex eis quæ repellunt & prohibent attractionem humiditatis plurimæ, hæc tamen non conduceret si materia esset crassa ac tenax, uide tamen de his supra in observationibus &c.

Ad quartum Gordonius & Gilbertus anglicus & Gerardus de solo super. 9. almans. cap. de squinantia dicunt quod apostema hoc fit secundum plurimum a sanguine & raro a pituita, præterea quum hæc inflamatio sit & morbus per acutus a frigidis fieri nequit, igitur non pluries fit a pituita.

Ad quintum Auicē. 9. tertij cap. 10. oportet ut euacuetur in principio uniuscuiusq; materia faciens illum cum phlebotomia, præterea si non euacuatua saltem reuulsua, in omni angina spetie conueniet, habes etiam de hoc supra plures auctoritates &c.

De destillatione grauedine & raucitate.

Destillatio a Græcis κατάρροα dicta, nil aliud est quam superabundatis humoris ex capite in partes subiectas fluctio, Differt a bronco qui raucedo & a coryza quæ grauedo a la-



tinis dicitur, eo q̄ catarrhus fauces, & palatum obtineat, Bronchos guttur ac arteriam Coriza uero nares tantum molestet, has species destillationum Gerardus quidam his duobus uersibus explicuit.

Dum fluit ad pectus dicetur Rheuma catarrhus

Ad fauces bronchos ad nares dico corizam.

Loci consentientes de destillatione grauedine & raucitate.

Paulus lib. 9. cap. 28. cōmunis est omnibus uitijis excrementie humiditatis ex capite in subiectas partes descensus, si in nares defluat *κρυσα*, si per palatum ad nares *καταρροα*, Si inguttur & asperam arteriam ita ut membranam interiorē exasperet *βρογχος* & *απτηριακον* a græcis dicitur, Si fluctio in pectus pulmonesq; decunbat tuſſis siue ut ipse inquit *βρυχεσ* *αυτοισ γινονται κακ. ιδε* & c. Gal. 6. de simpt. cau. cap. 4. Destillatio est per palati foramina multorum humorum de latio & c. Vide etiā Aet. Ser. 8 cap. 53. & Gal. 2. pronost. cōmē. 49. ibi umorem de naribus secretum tenuem et incoctum omnes medici grauedinem nominare solent & c.

De causis destillationis grauedinis & raucedinis.

Causæ procatartice sunt aer frigidus, mora sub radijs lunæ, Septentrionales uenti dum humiditates exprimunt, Similiter aer calidus, uenti meridionales caput replentes & humiditates liquefacientes, Item somnus coitus et omnia ad caput euaporantia ad ipsum replentia, sicut ebrietates & crapulæ exercitium & ira, Causæ antecedentes sunt uel per se uel per consensum, Per se sunt humores superflui in capite existētes, Intemperies calida frigida & humida, per consensum sunt aut a toto corpore ut in febribus humorem eliquantibus, aut membro particulari, ut a stomacho indigerendo debili & a reliquis mēbris, Causæ coniunctæ sunt humor actu fluens qui



sepe est calidus subtilis interdum crassus & frigidus &c.

Loci consentientes de causis destillationis.

De causis procatarteticis lege comm.aphor.5.lib.3.ibi,Au-  
stri caput aggrauantes caliginosi &c. Item aphor.12. & 13.  
eiusdem lib.ibi, in comento inquibusdam uero coacto in unū  
& cumprasso quodammodo capite expressa materia inuti-  
lis ad loca capite inferiora descendit &c. Aet. Ser.3.cap 53.  
Destillationis & muci causa est cerebrum quod a frigore ad  
frigidam intemperiem perducitur &c. nam in hoc loco anu-  
merat omnes alias procatarteticas causas a me superius de-  
scriptas, Gal.6.de sympt.cau.cap.4.Destillationis & grauedi-  
nis cerebrum statim causa est ut pars quidem similis is uel a  
frigore uel a solis ardore ad intemperiem redactum, ut Instru-  
mentum uero quatenus a plenitudine infestatur, Lege latius  
Mes. de cura catarrhi ibi Austerarum facit ac replet caput  
&c. Lege similiter Arcul comm.almans.cap.de catarrho, Itē  
Gor.Sauon. &c. De fluxionum causis lege Gal.2. de diff.feb.  
cap.2. Nam ibi, ex parte laborante binas causas intelliges,  
Alteram ex accensa caliditate, Alteram a dolore excitato,  
Vnde minus plus ue attrahitur quod influit, Nā si uehemēti-  
or fuerit calor multum attrahit, si minus tunc debilius, Simi-  
liter & in dolore, Ex parte uero mittente, Nam si pars mit-  
tens minus superfluitatibus abundet, parum aliquid attrahen-  
ti parti Immittit, Si uero plus materiae inutilis habeat, tantū  
ingerit amplius quanto plus a naturæ modo recesserit &c.

De destillationum inditijs.

Id scias uelim q̄ destillationum indicia ex capitis intem-  
perie siue calida siue frigida sumi possunt, Item a sapore, odo-  
re, calore, & ab ipsius symptomatibus, ut gratia exempli, Si  
caput calidæ fuerit temperaturæ, facies rubescit uel flaua est,  
si uero frigida erit alba et pallida A sapore, ut si quod influit



acris aut salsi, aut amari uel fetentis quidpiam habuerit, calidam censeto, Si insipidi uel dulcis frigidum A colore ut quod rubescit, uel flauet, calidum, quod albescit uel liuet frigidum. A symptomatibus, ut si adsit ardor punctio siue mordacitas, calidum, Si nullius sensus particeps cum grauitate & narium obstructione, frigidum. Relinquo ea etiam inditia quæ sumi possunt ab his quæ iuuant & nocent sed ad differentiam quæ est inter tenuem et crassam destillationem nunc transeo, Tenuis igitur cognoscetur ex eo dum expuitur, quod labilis sit et fluens, at, e, conuerso crassa inglobum uertitur & in se permanens non fluit, Si quid uero in medio crassum et incircūiancetiabus partibus tenue fuerit, tunc Iudica destillationem omnino esse tenue, quum hæ partes ad crassitiem nondum deuenierint. Signa quod destillatio sit a toto sunt quia in febrium augmento augetur & in earum remissione remittitur, Similiter de particularium partium consensu intelligendum est, Signa per essentiam in capite sunt si diu perseuerauerit destillatio, nec adsit aliarum partium morbus de quo suspicari possit & c.

Loci consentientes de indicijs destillationum.

Paulus lib. 3. cap. 28. Qui ex æstu grauedinem uel destillationem concipiunt ijs particula incalescunt, acris tenuisq; humor tum per nares tum per os descendit facies rubescit & nasus, Qui ex frigore, ijs frons & caput undiq; distenditur meatusq; & moides dicti clauduntur & c. lege de his Auice. & Arcul. Mes. & Razem fusius & inuenies plura quæ tuo arbitrio huc traduces & c.

De cura destillationum.

Sex in catarrho requirunt medendi intentiones Prima regiminis regula. 2. erit catarrhi alteratio siue digestio. 3. euacuatio. 4. Diuersio 5. catarrhi interdum fluentis retentio. 6. accidentium correctio ac capitis roboratio regimen erit in catarrho



calido si calida omnia uidentur et ea quæ etiã cerebrum debilitare possunt in frigido, Somnus lōgus & meridianus et supine dormire in frigido malus est, Digestio siue humoris præparatio in calido cum frigidis in crassantibus sicut cum syrupo uiol. de Iuiubis de papauere mirtino cum aquis farfaræ endiuie aqua ordeï et similibus parabitur. In catarrho frigido si crassa fuerit materia cum calidis attenuantibus sicut cum syrupo de glycyrriza de hyssopo de præssio oxymelle simp. & comm. posito, cum aquis cap. uen. saluie Decocto pectorali calido, euacuatio in calido fiet cum fructuum decocto cassia mana rheubarbaro & cum pillulis Aureis Agregatiuis de hiera simplici, In frigido cum pillulis de hiera cum agarico polypodio Turbit pillulis chochijs &c. uitetur sectio uenæ si possibile fuerit si minus fiat a uena communi. Diuersio siue reuulsio fiet per caput purgia, Masticatoria & cauterizantia, uel per fricationes lotiones, iuncturarum ligationes cucurbitulas & hirudinum applicationes, Caput purgia fiunt per liquores per nares attractos ut puta in calido cum aqua uiollacea uel hordei &c. In frigida cum aqua maioranæ cum succo blitis, Decocto nigelle ireos uel cyclaminis, Cauteria fiant incommissura coronali uel in humeris, Retentio catarrhi quæ fieri non debet nisi maxima urgente necessitate pluribus medijs perficietur primo cū stypticis ut cū bolo arménio spica olibano secūdo cū his quæ a proprietate in crassant ut cum Iuleb uiolaceo Zucchero uiolaceo penidijs, diadragmato loch de papauere, Diacodione liquido pilulis bechichijs, tertio cū gargarismis ex aqua rosacea aceto sandaraca &c. uel cum pillulis de cynaglof. Remotio symptomatum erit, per ea quæ malam capitis intemperiem siue calidam siue frigidam remouere possunt, Roborabitur deinceps caput in causa frigida cum confectione pliris arcoticon nic. cum diamusco, in causa



causa calida cum electuarijs frigidis &c.

Loci consentiens de cura destillationum.

Mesu. cap. de cat. commune est sex res, prima ponit studiū in uita patientis. 2. adequat materiam. 3. abscindit eam. 4. diuertit. 5. abscindit fluxum eius. 6. corrigit accidentia & de his singulatim agit ut latius uideri potest. Hercul. & Marcus catinarius de his etiam fusius per tractant, Videant in sua praxi qui optant rem medulius introspicere, De Reuulsione euacuatione & deriuatione loquitur Gal. 4. Meth. cap. 6. ibi Destillationem fluere incipientem ad contraria trahendam esse dicimus, fixam uero in laborante particula euacuandam, Similiter meth. 5. cap. 2. Quæ uero in oculis aure palato fluxiones accidunt eorum aduicina deriuatio est per nares &c. Hinc etiam elice quot modis fiat reuulsio, Lege etiam Aet. Ser. 8. cap. 53. ibi expedit fontem malorum excindere sanato uidelicet capite &c.

Observationes in cura.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 5. Dicit exemplificans de grauedine & destillatione q. qualitas et quantitas excrementorum atque causarum, quæ præcesserunt contemplatio & capitis dispositio siue calida ut in uisione, siue frigida in refrigeratione, primum a te considerentur, quæ nisi discrete cognoueris, idoneam dispositioni curationem haud quaquam inuenies.

Observationes in phlebotomia.

Mesu. in cur. cat. phlebotomiam non nisi in tribus casibus fieri posse adserit. primus si destillatio calida fuerit cum multa sanguinis copia in corpore calido, secundus si calida descendens in aliqua principali parte figatur ut in oculis pulmone diaphragmate, tertius si cum febre & maxime continua fuerit destillatio, ita ut in uenis putrescere humores existimentur, in cæteris uero nequaquam.

Observationes de gargarismatis.

X



Mesu. suspecta sunt gargarismata in quatuor casibus. pri. Si est suspitio catarrhi ad pectus et pulmonem fluentis. i. in paratis ad phthisim & asthma. 2. si sit de genere subtiliū acutorum & mordicantium, eo q̄ facile cum gargarismis concitatur. 3. in præfocationibus quæ fiunt cito. i. in paratis ad suffocationes. 4. si sit uehementis multitudinis.

#### Observationes in diuersionibus.

Marcus catin. in cur. cat. inquit nota q̄ caputpurgia et sternutatoria non debent a principio fieri, Sed factis euacuationibus, quia per ista fit motus & agitatio & c.

Mesu. Securius est regimen diuersium quam abscissium & licet regimen diuersium dilatet materiam & multiplicet, tamen multiplicatam conuertit ad partem communem non timorosa & c.

#### Observationes in abscisione catharrhi.

Mesu. Et sunt ex stolidis qui ante digestionem & mundificationem communem, administrant abscindentia catarrhi, et sunt causa cumulationis & multiplicationis ipsius, Fiant igitur post mundificationem & sedationem agitationis uehementis, In aliquibus tamē casibus in principio fieri potest, primo si ad partes nobiles reperet, aut catarrhus esset præfocatiuus & c.

#### Catharrho conferentia.

Conferunt catharrho Auellane assate cum pipere sumptæ Betonica, bolus Armenius, cinamomum gramē, lac caprinū, grana lauri, Manna, Myrrha, Vitella ouorum sorbilia, fumus sandaracæ, laudani, et aspaliti uapor, suffumigium utriusq̄ storacis retinet catharrhum, item suffumigium uernicis, sebesten & hissopus, Acharistum nic. confectio de iacur Mes. Phylozium romanum Auic. loch de papauere Pilula pro catharrho mes. 10. antid. Pilula de papauere mes. Rob de nucibus Mes. s. antid. Rob de papauere hali. 19. antid. Syrup. de papauere etc.



## De pronosticis destillationum.

Hip. aphor. 2. aphor. 40. Raucedines & grauedines in ualde senibus concoctionem non admittunt. B. quia frigiditas illa ex senili etate acquisita, reprimi non potest, imo & in quibusdā iuuenibus difficulter concoquuntur. Hip. prædict. 2. tex. 49. Grauedines & sternutamenta per omnes morbos qui in pulmone fatigent præire & subsequi malum est & c. B. Ratio est quia, si grauedines sint signa, indicant pulmonem malis humoribus repleti, si uero sint causæ sunt etiam malæ ex eo q. ab alijs affectionibus prauis comittantur. Lege etiam pro his aphor. 12. & 14. & 31. libri tertij aphorif. & plura intelleges de pronosticis & c.

## Authores dissidententes circa destillationes.

1. Adserere, sternutamenta in destillatione esse salubria.
2. Adserere, cum Artemide medico plumbea lamina prouocare tremula pectori esse applicanda.
3. Adserere, Destillationes tantū uocari quæ ex capite per asperam arteriam ad pulmonem feruntur.

## Confutatio dissidentium circa destillationes.

Ad primum Gal. prædict. 2. comm. 49. sternutamentum sequitur grauedines magna ex parte, sed sane concutit thoracē & uitiat pulmonē, igitur in destillatione non est salubre, quia ex suo motu efficit, ut materia a capite ad subiectum pulmonem descendat, uel signum est in salubre ostendens per consensum etiam affici cerebrum ut ibi, Gal. Ad secundum Hip. 5. aphor. 24. aphor. frigida qualis est nix & glacies pectori inimica tusses mouent & destillationes & c. Sed plumbea lamina sunt huiusmodi igitur pectori non applicanda, Ad tertium Gal. aphor. 3. comm. 12. non quas communi uocabulo destillationes consueuimus nominare, quæ scilicet fiant ex capite ad pulmonem per asperam arteriam, sed omnes fluxiones, quæ



feruntur per uenas a capite ad partes inferiores &c. s. uocamus destillationes &c.

De tussis definitione.

Tussis *bonæ* græce dicta, est quodā aggregatum ex duobus motibus. s. dilatatione & constrictione impetuosa pulmonis & pectoris, ad expellendum nociua, a uirtute expulso-ria naturali pulmonis facta, cum adiutorio diaphragmatis, Nam tussis ita pectori inest, sicuti cerebro sternutamentum ut per eam nocumentum a pulmone expellatur & a membris quæ per pulmonis consensum patiuntur &c.

Loci de tussis definitione.

Gal. 5. de sympt. cau. cap. 4. Tussis nil aliud est quam uehementissima efflatio, qua plurimus spiritus celerrime foras erumpens impetu suo extrahit exploditq; ex crementa meatuum ipsius obstruentia &c. Auic. fen. 10. T. 3. cap. 1. Tussis est ex motibus quibus expellit natura nocumentum ex membro aliquo & hoc membrum est pulmo & membra quæ ei continuantur. Vide de his latius Gal. loc. cit. cap. 3. et. 4. de sympt. cau. Similiter de loco læsionis uide cap. 6. eiusdem quinti lib. &c. Vide etiam Arcul.

De causis tussis.

Causæ procataclicæ sunt sicut dictum est in destillationū causis, causæ antecedentes uel per se sunt uel per consensum, per se ut mala intemperies cum materia, uel sine materia calida frigida sicca humida, aut solutio continui uelut in ulcere pulmonis in phtisi, per consensum uel a toto ut in febribus aut a partibus, ut a cerebro destillante, uel a pectore ut pleuritide et orthopnea, aut diaphragmate ulcerato, uel in abscessum conuerso, aut a stomacho, splene, hepate, quum abscessum patiuntur, nam facta diaphragmatis compræssione, siue a tumore, siue ab alio quopiam fit tussis, Materię in pulmone quandoq; imbibuntur, interdum inherent obstruunt & resolutis partibus subtilibus in petram condensantur, Causæ tussis siccæ sunt



uel mala complexio, uel materia in pulmone contenta, quia  
uel nimis crassa expulsionem inepta, uel apostemata pulmonis,  
uel materia in uenis pulmonis contenta sua acuitate uel mul-  
titudine stimulas, uel imbecillitas facultatis expulsoe &c.

Loci consentientes de causis tussis.

Aet. Ser. 8. cap. 54. Cause tussis sunt uariae Nam humor a  
capite ad asperam arteriam destillans tussim efficit Asperi-  
tas insuper intrinseca pelliculae arteriae asperae, cibi & po-  
tus praeter labentes tussim promouent. Lumbrici stomachum  
infestantes etiam tussiculas paruas excitant, Similiter & acris  
humor stomachum perturbans & intemperies frigida instru-  
mentorum respirationis tussim irritant: Vide de his fusius  
Auic. 10. 3. t. 3. cap. 1. ibi cause primitiuae tussis sunt &c. Nam  
fusissime has pertractat, Vide insuper Gal. 5. de sympt. causis  
cap. 4. & ibi intelliges quomodo intemperies tussim excitet,  
& a mala intemperie dolor fiat contra plures qui de mente  
Gale. hoc non posse fieri certo affirmant.

De signis tussis.

Signa male complexionis calidae cognoscitur ex precedē-  
tibus causis calidis & leditur ex similibus & iuuatur a con-  
trarijs, caliditas etiam sentitur ab aegro, uehementia sitis ma-  
gnitudo anhelitus & pulsus, rubor faciei cum tussi sicca, Si-  
gna complexionis frigidae, sumuntur ex causis frigidis prae-  
cedentibus, iuuatur a contrarijs &c. Signa tussis ex sanguine  
sunt rubedo faciei, uenarum tensio, sapor in ore dulcis & in-  
terdum sanguis excreatur, Signa bilis sunt flauities uultus, sa-  
por in ore amarus, sitis, & quod expuitur citrinum est, &  
ut plurimum tussis sicca est, Signa pituitae sunt, pallor faciei  
& albedo, Sapor insipidus aut salus cum humiditate super-  
flua, pauca sitis, circa fauces uiscosa pituita, comotio uomi-  
tus &c.



Signa atrabilis sunt, fuscus color, sapor ponticus, tardus euentus, longa duratio, Signa subtilitatis & crassitie extenuitate fluxuq; materie, & quia subito accidit & e, conuerso, materia uiscosa tarda influxu & c.

Signa siccitatis sunt, quia sedatur ex sorbitione Amyli, multiplicatq; quum fames & sitis adest, & apud somnum alieuiatur, Similiter dum comeditur & bibitur, Signa per consensum est antecessio lesionis uentriculi uel hepatis, tussis adest sicca, est insuper minus continua & minus laboriosa quam quæ est per essentiam Signa aparatis, ulceris & similium cognoscuntur ex relatis in pleuritide peripneumonia et phtisi.

Loci consentientes de signis tussis.

Aet. ser. 8. cap. 54. Tussis quæ cum titilatione partium ab utraq; palati parte contingit, palam ostendit destillationem a capite ad asperam arteriam & ad pulmonem deferri, quod si nihil expuatur tenuem fluxum indicat & c.

Aui. 10. 3. T. 3 cap. 1. de his pertractat signis ibi, signa intus si frigida est additio ex frigore & c. lege hunc locum fusius et habebis omnia quæ a me nuper relata sunt, lege etiam Arcul.

De cura tussis.

Dictum est in capite destillationis, fluxum humoris esse diuertendum, & quod iam fluxum est, euacuandum, Nunc etiam dicimus in tussis cura duplicem scopum requiri, Alterum in præparanda materia, alterum in abstergendo & præparatam educendo, Tenuis igitur, & acris destillatio per infrigidantia & incrassantia et fluxum intercipientia curatur, sicut cum syrupo de papauere, uiolaceo iuiubino cū decocto hordei iuiubarum sebesten, uel cum diacodione tempore somni uel pilulis bechichijs. Si uero fuerit frigida crassa ac tenax, tunc cū calidis extenuantibus ac diffecantibus digeratur, ut cum syrupo de glycyrriza de hissopo oxymellite. syrup. de



præstio oximellite scilicet cum de cocto caricarum passularum. cap. uen. hordei & c. cū loch de pino, de scilla, cum iure galli decrepiti & c. Euacuatur deinceps subtilis materia cum cassia electuario de sebesten addicta pectorali decoctione, uel cum pilulis Aureis Aggregatiuis & c. Frigida cum pilulis cochys elephanginis. T. de ag. & c. Quod uero superest in pulmone exiccetur tum bibendo, cum labendo ac euaporando de quibus satis pertractauit Mesu.

#### Loci consentientes de cura tussis.

Aet. ser. 8. cap. 54. Medemur tussi a tenui fluxu factæ per antidotū ex papaueris cap. inspissantes, aut per alterius pharmaci dolorem leuantis, Quæ autem a crasso aut uiscofo fit humore per extenuantia & discindentia, Instrumentorum respirationis frigiditati per calefacientia medemur. Quæ ab asperitate per lenientia et mordacitatem arcentia sanantur, qualia sunt ex arteriacis compositionibus simpliciora & c. Gal. de compos. med. per loc. cap. 2. & 3. non diuerso a nobis sermone hæc dilucidius pertractat ubi habet insuper multas ad tussim cosectiones & c. Lege etiam Auic. 10. 3. tra. 9. cap. de cura tussis & Arcul. & Mesu. Vide etiā quecunq; dicta sunt de destillatione, nam huc referenda sunt.

#### Observationes in cura per exiccantia.

Arcul. 9. almans. cap. de cur. tussis, Multas conditiones, obseruari in his iubet, primo & non nisi reiteratis euacuationibus exhibeantur. 2. q. non adsit febris notatu digna. 3. ut uirtus constet. 4. ut incipiatur a minima quantitate & c. Vide eū fusius.

#### Nocentia & conferentia tussi.

Nocent tussi, Acetum, succus ebuli præsertim tussi recenter factæ, nam antiquæ prodest, Mel, non spumatum, Noces, & c. Conferunt tussi Amylum cum zucharo & oleo Amygdalino, semen bobicis, Bdellium, Radix chamaleontæ, cinnamomū,



cochleæ, Adiantum, hisopus, dragagantum, Enula, faba fenuæ  
 græcū cum melle, phistici, furfur triticeum cum aqua hordei  
 decoctum & colatum in frig. et sic. tuſſi, galbanum, Gentiana,  
 Granata dulcia, iuiubæ, lac aſinæ uel capræ decoctum glycyri-  
 zæ in uino, Malua, Manna, maſtix, mulſa, oua cum melle, pa-  
 pauer, paſſulæ, peucedanum, grana pini, pulmo aſini, praſiū,  
 Roſmarinus, Sebeſten ſ. lini, ſerpentaria, ſulphur, Tea ſtorax  
 ptiſana terebintina cum melle, uiolæ, zedoaria, urtica, radix  
 ireos, compoſita ſunt, diacodion meſ. diapapauer meſ. in tuſſi  
 catarrhali, diaſulphur ſerap. diacodion compoſitum ſerap.  
 diaolibanum, diapienidion diadragantum, diairis, diacalamē-  
 tum, diatrion pipereon, diahiſſopū diazingiberis. el'm adip.  
 Auic. ſexto tra. electuarium gabadi hali, loch de pino de papa-  
 uere meſ. de alleis Auic. & Meſ. in quinta antid in cur. tuſſis  
 humidæ, loch de ſemine lini Auic quinta quinti, oleum amyg-  
 dalarum dul. uiolaceum ſiſami cucurbitæ, Pillule procatar-  
 rho Meſ. 10. antid. bichichie meſ. ad tuſſim Auic. ſyr. uiolace-  
 us, myrtinus, acetosus Meſ. Iuiubinus de praſio de hiſſopo,  
 de cannis depauere, alteraniabim & c. Athanaſia magna ſyr.  
 de liquiritia, de calamento, theriaca maior, trociſci de ſtella,  
 Ani. octaua quinti, de berberis de papauere, de arſenico & c.  
 Alleum coctum & baccae lauri & c.

#### De pronostiſis ipſius tuſſis.

Auic. decima tertij, loc. cit. Et tuſſis frequens plerunque  
 perducit ad ſputum ſanguinis Arcul. 9. almans. de cur. tuſſ. Si  
 diuturna ſit & frequens in prægnantibus abortum facit ex-  
 puitur ſanguis fractis in pectore uenis.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 46. Qui gibbi ex anhelitu aut  
 tuſſi efficiuntur, ante pubertatem intereunt, lege etiam apho.  
 54. lib. 4 quibus ut plurimum tuſſes ſiccæ leuiter irritantes in  
 febris ardentibus ſunt & c. Vide etiam Hippoc. in cap. de



destillatione aphor. supra recitatos.

Authores dissentientes circa tussim.

1. Adserere, tusses a nuda intemperie fieri non posse.
2. Adserere, tussim siccam a nulla alia causa fieri posse quam a mala intemperie sine materia.
3. Adserere, tussim plerunq; fieri causa tantum calida et sicca ut Gerardus.
4. Adserere, pilulas bechichias conferre in omni sicca tussi.

Confutatio dissentientium circa tussim.

Ad primum Gal. 5. de sympt. cau. cap. 4. tussim inquit fieri, refrigeratis tantum respirationis instrumentis, ita ut affe-  
 ti nihil inter tussendum expuant, itidem ait Aet. ut supra de  
 causis dictum est. Ad secundū Gal. 2. prædict. comm. 42. inquit  
 q̄ si humor crassus & viscosus uel adeo tenuis sit ut expelli  
 nequeat, siccam tussim efficit, Vnde modice crassus facile se-  
 reatur. Et aphor. 4. comm. 54. Sicce tusses sunt in quibus nihil  
 expuitur, fiunt etiam aliquando ob intemperiem instrumen-  
 torum quæ seruiunt respirationi, aliquando in faucium aspe-  
 ritate, uel a paucis & tenui humore destillante, Igitur sicca  
 tussis etiam a materiali causa effici potest. Ad tertium Gal.  
 aphor. 3. comm. 23. ob hanc igitur ipsam frigiditatem, tusses  
 hyeme maxime fiunt &c. Similiter. 9. 12. eiusdem lib. caput  
 prius repletū in calida et humida constitutione, frigus autem  
 superueniens ueluti manus quædam extrinseca capiens ac  
 præmens, quandam uti spongiam, cerebri illam, quæ in ipso  
 continetur, humiditatem, Vnde fiunt tusses & grauedines  
 &c. igitur a causa frigida & humida plerunq; et magis quā  
 a calida & sicca fieri potest. Ad quartum dicimus pilulas bi-  
 chichias conferre tantum in causa calida & sicca ut testatur  
 Mesu. Sed tussis sicca ab alia causa fieri potest ut monstratum  
 est, qua de re in omni sicca tussi conferre non poterunt &c.



## De Asthmate dispnia &amp; orthopnea.

Asthma est affectus qui respirandi difficultatem cum magno conamine persequitur. Hæc spirationis difficultas dum modica est *ἁσπνοία* græce dicitur, at quum uehementior sit, et spirare eger sine anhelitu et sono non potest, tunc *ασμα* uocatur, si uero accadat inspirando ut non nisi recta ceruice spiritus trahatur, tunc *ορθοπνοία* nominatur, quos igitur græci uocant *ασματικούς* latini anhelosos siue suffiriosos dicunt. Loci consentientes de asthmate dispnia & orthopnea.

Auic. decima tertij, cap. 4. asthma est egritudo pulmonis cum qua patiens non inuenit excusationem ab anhelitu frequenti sicuti est anhelitus quo laborat præfocatus & festinatus. Gal. abporis. 6. comm. 46. Multæ sunt spirandi difficultates, sed solam illam Hippoc. consuevit asthma nominare in qua contingit satis crebrum anhelitum fieri, uocant *το ἀστικόν* i. anhelare id quod fit in cursibus et uehementioribus exercitijs &c. Vide de his Gal. 7. de cōpos. med. per loc. cap. 6. ibi, qui citra febrē dense respirant &c. B. Nota quod asthma interdum sumitur pro difficultate spiritus sine febre et apostemate, interdum pro constrictione non facta a causis materialibus, interdum pro malitia spirandi a materia crassa inherente facta, & sic in hoc loco a Gal. accipitur &c. Gale. 4. de uic. in mor. ac. comm. 21. sicca orthopnea ea est spirandi difficultas quæ sine sputis uel tussi usque adeo uehemens est ut inclinari citra suffocationem, qui ita afficitur, non possit.

## De causis harum affectionum.

Causæ procatareæ sunt caliditas uel frigiditas aeris casus percussio nimius corporis motus fumus argenti uiui, odor retum pectus constringentium &c.

Causæ antecedentes per se ut a mala intemperie frigida coarctate uel obstruente, uel a materia, ut plurimum pituitosa



sa in pulmone uel eius bronchijs infarcta. Per consensum fit uel a toto ut in febribus & hydropo, aut ab aliqua parte sicut ab occipite neruis uertebri colli, a pectore diaphragmate hepate stomacho splene, ab occipite inquā spiritibus ad pectoris musculos transire non ualentibus, a neruis motum diaphragmatis impediētibz, a colli uertebri & pectoris quum extrasedem diuertuntur, a pectore sicut ab eius angustia abscessu paruitate ulcere & colluue, a diaphragmate hepate splene ob eorum abscessus & ulcera, interdum fit etiam ab exiccatione pulmonis &c. Cause coniuncte sunt ipsi humores infarcti in arterijs & uenis pulmonis morbum facientes & similia.

Loci consentientes de causis.

Aui. decima tertij, cap. 40. Et quādoq; accidit propter multitudinem uaporis, quando coarctatur in pulmone & propter uetositatem coarctatam in membris anhelitus et quādoq; causa generationis in ipso est frigiditas eius. Vide de his latius apud Mes. cap. proprio.

Gale. 7. de comp. med. per loc. cap. 6. loquens de causis antecedētibz inquit manifestum est coarctationem locorum præter naturam intrinsecus adesse, cuius etiam sensum ægri manifeste perceptant, coarctatio uero fit quum aut crassorum & tenuium humorum multitudo pulmonis bronchijs fuerit infarcta, aut tumor abscessui similis in ipso constiterit &c. Auic. loc. cit. Et quādoq; fit propter nocumentū in ipso pulmone et in eis quæ ipsi continuantur propter inuiscationem humorum crassorum in arterijs & ramis eorum & quādoq; in cana pulmonis & eius raritate et in locis uacuis. Et istæ materiæ effusæ sunt ad ipsum ex capite. Et quādoq; isti humores nocent sua qualitate quantitate et multitudine et quādoq; fit & raro ab exiccatione pulmonis, & quādoq; fit propter communitatem membrorum uicinarum comprimētū mēs



bra anhelitus & c. Vide de his Gal. 4. de uic. in mor. ac. com. 21. & 3. aphor. comm. 26. & 4. aphor. comm. 50. ibi. n. a quibus causis spirandi difficultas fiat aperte intelliges, lege etiā. 4. de loc. aff. cap. 7.

De indicijis asthmatis orthopneæq;.

Frequēs adest anhelatio nec spirare possunt nisi recta ceruice, pallescit eorum facies. Si ab intemperie absq; materia fiat, adest pectoris lenitas absq; sensibili grauitate, tussis sine sputo, calida ex caloris sensu & ex anhelitu & pulsu magno frequenti cognoscitur, frigida ex frigore in partibus spiritibus percepto, & ex anhelitu pulsu paruo ac tardo, sicca ex asperitate ex siti & a causis exiccantibus. Humida ex causis contrarijs, uel intemperies omnes cognoscuntur ab his quæ iuuant & nocent, nam calidis frigida prorsunt, frigidis calida, humores cognoscuntur ex sapore odore crassitie ac tenuitate, locus laesus cognoscitur quoniam si in pulmone est lesio tunc adest grauitas screatus tussis laboriosa et difficilis anhelitus, si in aspera arteria sonus adest in respirando, screatus facilis, si in bronchijs screatus fieri non potest nisi cum multa tussi, si fiat a peripneumonia signa suo capiti ascribentur, si fiat asthma a toto per consensum sicuti in febribus, ex eo inde cognoscetur q; ad earum augmentum augetur & in recessu minuitur, si per consensum ex partibus facile etiam cognoscet ex earum morbis superuenientibus & c.

Loci consentientes de indicijis asthmatis.

Auicē. decima tertij, ca. de sig. asthmatis. Si humores uel humiditates fuerint causa asthmatis, tunc aderit constrictio in principio anhelitus cum excreatione oscitatione et retentione humoris permanentis et grauitas cum sputo & c. Vide hunc locum fusius, nam de singulis signis hic pertractatur. Vide insuper Arcul. Sauo. Gordo. & c.



## De cura asthmatis &amp; orthopneæq.

Primus in curando scopus, (dummodo totius corporis repletio appareat) sit sectio uenæ. 2. sit humoris præparatio ita ut tenuis incrassetur, tenax & uiscosus attenuetur cum syrups in capite catarrhi memoratis. 3. sit euacuatio prout oportuna fuerit in humore peccante. 4. sit humoris cum cucurbitulis & frictionibus ad partem oppositam reuulsio. 5. residuum exiccat. 6. sit regimen ex his quæ dilatant anhelitum, uitentur acria acetosa styptica, tolleretur famis & potus, uitetur insuper somnus meridianus ac diurnus &c.

## Loci consentientes de cura asthmatis &amp; orthopneæ.

Paul. lib. 3. cap. 29. Hæc cura sit ut per abstergentia extenuantiaq; medicamina glutinosus humor et crassus abscindatur, quod si necessitas urgeat etiam uena ante omnia incidatur, et quantum uires patiuntur, sanguis detrahatur &c. Gal. 7. de cõpos. med. per loc. ca. 6. Cæterum curatio ambarum affectio= num aliquid commune habet & aliquid cuiq; proprium, cõ= mune utrisq; est, ut redundantia humoris affectiones generantis consumatur & expendatur, proprium uero, ut si a crassis uiscosisq; humoribus fiant per attenuantia et extergentia consumantur &c. Consule in his & alijs non solum Auicem. sed Mesu. ipse. n. singula declarat. Vide & Arcul. & alios practi= cantes.

## Observationes in præparatione humorum.

Paul. loc. cit. duo notat alterum ut quum crassitiem et tencitatem humorum secamus & attenuamus humiditatem cum pharmacis adhibeamus quo facilius efferantur unde largior rem potum anhelosis commendat, alterum ne uehementer calidis, uel frigidis in hac affectione utamur, quia tenaces et crassi humores a uehementi calore uiscosiores redduntur & sic difficulter auelli possunt, frigidis necrascant ac cogantur



Et c. Vide similiter Aet. ser. 8. cap. 57.

Auic. loc. cit. Vitandæ sunt medicinae multum incisive, ibi, Et non sis contentus Et c. Secundo, Miscendæ sunt medicinae hepaticæ sicut eupatorium, cū pectoralibus præsertim si crassities hepatis asthmati adiungatur. Tertio, quum morbus sit natura longus medicinae sæpius permutentur, non ex eodem genere in aliud, sed in eodem consimili facultate mutatae permaneant ut uoluit quarta primi cap. 1. ibi, immo in una medicatione medicinam permuta Et c. Quarto in egritudinibus chronicis inter pollationes fiant, Quinto si causa coniuncta et antecedens aduersentur, attendatur illi quæ magis infestat De observationibus aliarum intentionum lege Mesuen.

#### Conferentia asthmatis & orthopneæ.

Conferunt asthmatis et orthopneæ acetū scilliticum, amygdalæ amaræ ammoniacum, cum melle, assa fetida in ouo sorbili, bolus armenius, calamentum, cappares saliti, decoctum centaurij ma. dauci, diptami, enulæ, caricarum adiantigeniæ, iuniperi granorum lauri, marubij, origani pastinacæ, oxymel scilliticum, peucedanum in ouo sorbili. pix humida cum melle, sulphur in ouo sorbili uel fumus eius in ore per embolum scilla thymus, hissopus cum ruta ficubus Et melle allium coctum betonica gentiana, ius galli antiqui galbanum, fenugræcum cum melle, urtica cū melle, bacca lauri, myrrha, uiolezucharū, composita sunt. T. de agarico, alipta muscata nic. præsertim in pueris, diapapauer, diaprassium loc. de pino mes. loch. de scilla serap. loch. de papauere hali, quadrumeron conf. nic. rosata magna nic. syrupus de hissopo, de prassio de calamento de iuiubis de liquiritia theodoricon magnum hali. 6. antidota teriaca magna nic. hiera logodion, hiera archigenis, Phylonium romanum Et c.

#### De pronosticis asthmatis.



Hippoc. apho. 4. apho. 50. Difficultates spirandi in febre intermittente, lethale; Vide etiam aphor. 46. lib. 6.

Auice loc. cit. hæc ægritudo cum accidit decrepitis nō forsitam sanatur, nequæ maturatur, quum ipsa in iuuenibus ut plurimum sit difficilis et est ægritudo longa habens cum hoc paroxysmos acutos iuxta similitudinem paroxysmorum epilepsie & spasmi, & multotiens mutatur ad peripneumoniam & c.

Authores dissentientes circa difficultates spirandi.

- 1 Adserere, asthma uerum non esse morbum pulmonis.
- 2 Adserere, orthopneam non posse fieri absq; febre.
- 3 Adserere, apnæam non dari posse in animali uiuente.
- 4 Adserere, pulmonem esse propriū anhelitus instrumentū.
- 5 Adserere, anhelitum esse motum tantum naturalem. & non uoluntarium.
- 6 Adserere, spirandi difficultatem indicare tantūmodo lesionem membrorum spiritualium.
- 7 Adserere, uinum inspirandi difficultate nō esse exhibendū.
- 8 Adserere, pharmaca non ualde soluentia in asthma conuenire.

Cōfutatio dissentientiū circa difficultates spirationis.

Ad primum Razes quarto, cōm. cap. 1. Asthma est ueraciter, quod in canalibus pulmonis habet humiditates multas uiscosas prohibentes ex ipsarum uiscositate ne aer trahatur quantitate oportuna et Auic. asthma est ægritudo pulmonis, igitur erit uerus morbus pulmonis. Ad secundum Gal. aph. 6. comm. 46. nō nulli similiter asthma nominant, nō nulli orthopneam, quando absq; febre egroti iugiter anhelitum habent difficilem, ex quibus uerbis cognoscitur orthopneam absque febre fieri, Ad tertium Gal. de loc. aff. cap. 7. in fine, Nam impossibile uidetur ut animal omni spiratione exacte priuatū,



in uita seruari possit, quāuis animalia quæ in cauernis latent thoracem mouere minime uideātur, quare aut exiguam fieri spirationē, ut sensum effugiat, aut huiusmodi animalia tunc spirationem omnino non indigere, sed eam spirationem quæ per uniuersum corpus fit, sufficere, quippe hanc, cor ipsum per arterias efficit, ex quibus apparet ut apnæa dari possit uiuente etiam animali. Ad quartum Conciliator differentia. 99. Sciendū q̄ instrumentū proprium anhelitus est diaphragma, pulmo uero coadiuuatium se habens ut ad seccantem se ra &c. probat etiam alia potiori ratione ex eo quod insensibilis sit pulmo tum quia tot musculos in pectore frustra natura procreasset. Ad quintum. Auic. 10. 3. tenet q̄ anhelitus completur duobus motibus inter quos sunt duæ moræ &c. ita ut componatur ex motu uoluntario & naturali, Itidem confirmat Gal. de usu partium &c. Ad sextum Hip. prædictionum. 1. tex. 27. & Gal. in eodem. comm. At uero inquit rara spira- tio hoc est multo tempore interposita, si magna est indicat delirium, si parua extinctionem natiui caloris, igitur aliam a thorace etiam læsionem indicat &c. Ad septimum Razes. 4. comm. Vinum tenue et subtile facit ad asthmatis passionē, si in potu accipiatur multa quantitas, hoc tamen intellige in resolutione materiæ, uel ubi uinū sit cibus et potus. Ad octa- uum, Paul. lib. 3. cap. 29. ex antidotis hiera & purgatio conti- nens, ex ualidissimis medicamentis petita, item Auic. utitur helleboro & colocyntide præterea probatur etiam ratione, nam materiæ quæ sunt a uis ductuum remotæ, educi non pos- sunt nisi per pharmaca uehementia, sed in asthmate ita sunt, igitur non nisi per ualidissima pharmaca educi poterunt & per consequens uehementi indigent pharmaco &c.

#### De peripneumonia.

Peripneumonia nil aliud est quam pulmonis inflammatio  
cum



cum febre acuta & spirandi difficultate, & est duplex uera, & spuria, uera cum a sanguine, spuria quum ab alijs humoribus oriatur, unde nō immerito Mesuas alioquin oculatus a cōciliatore reprehenditur differentia. 100. dum inquit ueram fieri ex pituita & esse minus mortalem & c.

Loci consentientes de peripneumonia.

Paul. lib. 3. ca. 30. *ἡ περὶ πνευμονίας, φλεγμονὴ τοῦ πνευμονος* & *στὴν* similiter Aet. ser. 8. cap. 66. peripneumonia est pulmonis inflāmatio cū febre acuta, itidem Auice. decima tertij, tr. 1. 4. ca. 10. peripneumonia est apostema calidum in pulmone, lege Gal. 2. meth. & in lib. de finit. med. Item in lib. de part. art. med. cap. 4. ibi peripneumonia tantum dicitur quum a sola inflammatione pulmo afficitur, & c.

Mesu. cap. de peripneu. ex ea quedam est uera quedam nō uera & c. Vide eum tu latius, uide etiam conciliatorem loc. cit. lege etiam de his Hippoc. & Gal. prædict. 1. tex. 29. Item Arcul. & Gord. & ceteros practicautes & c.

De causis peripneumoniæ.

Causæ antecedentes sunt angina pleuritis catharrhus, uel alia materia ab aliqua corporis parte ad pulmonē transmissa. Causæ coniunctæ sunt humores ibi coarctati & putrefacti, sicuti est sanguis bilis pituita, fieri enim potest ferē ab omni humore.

Loci consentientes de causis peripneumoniæ.

Halyabbas in sua praxi, et hoc apostema aliquando fit ex materia sanguinea aut ex cholera quæ ad pulmonē incurrit nōnunquam a catarrho a capite descendentes, interdum pleuritide iugulatione & c. nam pulmo imbecillis ea facile suscipit, quæ ab alijs membris repurgantur. Paul. lib. 3. cap. 30. idem sentit, ibi, Inflammatio fit ut plurimum a ualentibus in eam partem de stillationibus aut angina aut suspirio aut pleuriti-



de &c. De causis uero cōiunctis loquitur Auic. decima tertij, cap. 10. ibi & peripneumonia fit ab omni humore sed ut plurimum fit a phlegmate, quoniā in membro raro non continetur humor subtilis &c. B. intellige Aui. uelle peripneumoniā a sanguine et a pituita frequenter fieri, raro ex bile, rarissime ex atrabile, unde Auic. plura capita facit de hac re, quem legere poteris, Gale. aphor. 7. comm. 12. causas peripneumoniarum etiam tetigit, quem fusius uidebis.

#### De indicijis peripneumoniarum.

Indicia communia omni inflammationi sunt rubor tensio dolor, Propria sunt febris acuta grauitas absq; dolore, nisi pellicula ipsius thoracis sint inflammatae quoniam tunc dolor percipitur, spirandi adest difficultas, rubescunt malleoli & facies, nasus fit simus, uenae temporum eleuantur, appetitus deiectus est, linguae adest siccitas, tussis sicca praecipue in morbi principio, respiratio calida est sputum biliosum spumosum et quandoq; cruentum, uigiliae adsunt quae delirium & stuporem inducunt, extremitates frigidae, ungues liuidi incuruantur, & hi plerumq; in. 4. uel. 7. die pereunt, si uero ad salutem tendat morbus, sanguinis ex naribus profluuium sequitur & quedā excrementitia per sedem excernuntur &c.

#### De locis consentientibus de indicijis peripneumoniarum.

Gal. 4. de loc. aff. cap. 8. Quando cum spirandi difficultate, cui & angustia & grauitas coniuncta est acuta quoq; febris inciderit, is affectus inflammatio pulmonis est, quod si fuerit intollerabile incendium, angustiae uero & grauitatis sensus minor, erysipelas ipsum uexare censendum est, Et. 2. de loc. aff. cap. 7. Signa inflammationum communia sunt, ut partes inflammatae rubescant tendantur remittantur intumescant et doleant. Et. 2. de loc. aff. cap. 9. cognoscitur pulmonis inflammatio, quia tanta inducitur spirandi difficultas, tantaq; angustia, ut soffoc-



cari laborantes uideantur ac recti sedere conantur, calida ad est respiratio, quò circa ubi plurimum perflant, iuuari uideantur, in tussiendo modo hoc modo alio colore infectum expuitur, ut rubrum flauum rufum spumosum nigrum & liuidum, grauitatis sensus adest, dolorq; ab imo ad pectus et ad spinam et febris acuta adest & c. Lege de his fusius Aet ser. 8. cap. 66. Vide similiter Auic. decima tertij, cap. 2. ipse enim addit q; dolor ascendit ad iugulum & pulsatio est usq; ad spatulam & furculam & mamillas saltem apud tussim, et quando dormit superlatus prafocatur, & lingua primo rubescit, deinde nigrescit, & quod adest inflatio oculorum grauitas palpebrarum, pulsus undosus lenis & diuersus, & ibi reddit ratione horum omnium. Vide insuper Hipp. 2. pronost. tex. 60. Vide etiam Arculanum & Razem. 9. alman. ibi, cum alicui superuenerit febris & in aeris attractione tantam patitur constrictionem, ut se prafocari putet & c.

#### De cura peripneumonix.

Primus in medendo scopus erit reuulsio ut inflammationis augmentum prohibeatur, quæ fieri potest cum sectione uenæ cum cucurbitulis cum impositione enematum & c. Secundus est humoris digestio, unde si fuerit a sanguine uel a bile conueniunt syrupus uiolaceus iuiubinus cum aqua hordeacea uel zucharacea, uel syrupus mirtinus de papauere cum decocto pec. si uero fuerit a pituita conueniunt syrupi de glycyrrhiza, de hissopo, oxymel simp. miscendo secum syr. uiol. cum decoctis pectori conducentibus & c. Tertius est euacuatio quæ fieri potest cum mana casia rheubarbaro. Troc. de uiol. de agarico cum elo de sebesten & c. Quartus est sputi prouocatio et completur cū his quæ in ore lambuntur, ut patet in cura pleuritidis & c. uide ibi plura

#### Loci consentientes de cura peripneumonix.



Gale. meth. 13. cap. 4. Quum aliqua particula phlegmone urgeri ceperit uidendum est an propter calorem aliquē, qui in illa præter naturam ortus sit an propter dolorem uel ipsius uel propinquæ alicuius partis hanc contraxerit quo. s. adempta causa phlegmone non amplius increseat, post hæc considera num uicina particula sanguinem largius ad partē phlegmone obsessam, transmittat, Deinde si corpus succorū æqualiter auctorū redundantia laboret, Si igitur corpus fuerit plethoricum, uel malo succo redundet, cogimur sanguinem mittere, et membrum, ne quid transmittat corrigere & c. Aet. ser. 8 cap. 66 si nil obstiterit, uena in cubito seccanda & si uires ualide fuerint ex utroq; brachio sanguis extrahatur & c. Vide latius Auic loc. cit. & Arcul. & Marcum Catin. & Saunarolam & Gordoni.

#### Observatio in sectione uenæ.

Arcul. 9. alman. Reiteratio sanguinis fieri non debet nisi plethori cum sit corpus, uel membrum influens sit hepar, uel aliqua euacuatio solita puta menstruorum hæmorrhoidarū repressa sit, aut si quam putaremus ad membra principalia materiā defluere, in alijs enim periculosa et suspecta est & c. Auice. decima tertij, cap. 1. Comendat plus sectionem uenæ quā uentris solutionem quia in ipsa inquit non est timor sicut in solutione, quum interdum non soluat interdum superflua sit, prohibet etiam narcotica quoniā sputum & maturationem prohibent & c.

#### Observationes in topicis.

Platearius nunquam utendum est reperiussiuis sed diaphoreticis & resolutiuis, Præterea caueant aquæ calidæ in fusionem super caput, quia liquefacit humiditates, et superfluitates ad pectus descendere cogit & c. Auic. loc. cit. unum aduertit q; in topicis exterius applicitis maior esse debet in penetrando uis quam in pleuritide, nam in penitiori loco affectio collo-



cata est, unde ad cataplasmata fomenta et linimenta addatur aliquid quod sit tenuium partium, & nota q̄ debent applicari tam retro supra spondiles quam ante ex directo partis inflammatae & c.

### Conferentia peripneumoniæ.

Conferunt peripneumoniæ, althea, amyllum, aqua mellis, butyrum cum melle, bolus armenius, capillus uen. semina cucurbitæ citruli melonum, crocus, decoctio hissopi, faba fressa in cibus, farina hordei caricæ cum fenugraco decoctæ, succus gentianæ, iuleb uiol. iuiubinū iuleb alkemes mes. in cur. pleurit. Glyzirhiza, origanum cum melle penidij, pix cum amygdalis & zucharo, porrum cum melle, mucilago psyllij. Ruta cum anetho sicco cocta, uiola, hypericō, iris, hissopus cum ruta ficubus & melle. Composita sunt oleum de amygdalis, oleum narcisi, de cucurbita uiolaceum, syrupus de cucurbita, uiolaceus, de uino granatorum dulcium, iuiubinus, unguentum uiolaceum, zucharum uiolaceū, confectio catafici haly. 6. an. tid. Dialthea, æsypum, diapapauer, diadragagantum, diaolibanum nic. Phylonium nic. cum melle, loch de papauere mes. rosata magna nic. sotyra nic.

### De pronosticis peripneumoniæ.

Hippoc. aphor. 5. aphor. 10. Quicumq; ab angina liberantur, ijs ad pulmonem uertitur & in 7. diebus pereunt, si uero has effugerint, suppurantur. Et aphor. 6. aphor. 16. a morbo laterali, uel pulmonia habito, alui profluuium adueniens malum, Et aphor. 7. aphor. 2. a morbo laterali inflammatio pulmonis malum, B. Nota peripneumoniam fieri a pleuritide, sed non e, conuerso, quia si mitis fuerit inflammatio, omnis humor noxius per sputum ex purgatur, si sit perniciosus, antequam costæ patiantur, strangulat. Et aphor. 7. aphor. 12. a pulmonis inflammatione phrenitis malum. Et secundo pronost.



cap. 69. qui purulenti ex pulmonia sunt &c. Vide tu Galeni commentum, item secundo pronost. tex. 64. ibi quibus abscessus &c. Et tex 67. eiusdem libri, Auice. peripneumonia quæ a colera rubea fit, secundum plurimum sua acuitate interficit cum sit uicina cordi & appositio cum infrigidantibus non peruenit ad locum &c. Mesu. & dixit Gal. q. peripneumonia est difficilis curæ quam pleuresis & magis promptior ad interficiendum eo q. solutio continui in pulmone raro est susceptibilis curæ uel quia uirtus cordis non tantum patitur immo deficit ab inflammatione eius &c. Arcul. peripneumonia longa & diuturna perducit tandem ad nocumentum hepatis ita ut erret eius digestiua & tumescunt pedes & crura interdum etiam uenter. Auic. decima tertij, cap. 2. Et Hip. dixit pro quando accidunt exituræ apud mamillas uel ea quæ sequitur ad eas & aperiuntur pustullæ euadunt, & similiter quando accidunt exituræ in crure sunt signa laudabilia &c.

Authores dissentientes circa peripneumoniam.

- 1 Adserere, peripneumoniam fieri non posse a pituita per uiam influxus.
- 2 Adserere, peripneumoniam pituitosam esse biliosa deteriore.
- 3 Adserere, in peripneumonia ex alijs morbis facta conferre sectionem uenæ.

Confutatio dissentientium circa peripneumoniam.

Gale. 2. de loc. aff. cap. 9. Respondet primo. Quippe iam ostendimus omnem inflammationem ex affluente fieri sanguine, quapropter si biliosus fuerit sanguis flauum aut pallidum erit sputum, si pituitosus & spumans candidum &c. ex quibus inferri potest hanc etiam inflammationem pulmonis a pituitoso sanguine gigni posse &c. Ad secundum, respondet Mes. & omnes auctores q. deterior est biliosa quam mor



bus sit acutior seua inducens accidētia &c. Ad tertium, Paul. lib. 3. cap. 30. Vitabimus sanguinis detractionem dum ex alijs morbis peripneumonia depēdeat et si in statum morbus fuerit &c.

### De sputo sanguinis.

Sputum sanguinis nil aliud est quam quædam sanguinis reiectione per os undecunq; proueniens, hic consydera potius locum a quo sanguis emanat, quam ipsam definitionem ut monet Gal.

### De causis sputi sanguinis.

Causæ eius primitiue sunt percussio casus uociferatio acuitas uocis, uomitus laboriosus, cibi acuti calidi, timor & angustia sanguinem acuens, sanguis suga gutturi inherens, frigus constringens caliditas dissoluens &c. Causæ antecedentes sunt multitudo materiei & ciborum aut retentio mēstruorum aut sanguis ex hemorrhoidibus, aut abscissio membri, aut acuitas humoris aut uehementia motus aut flatuosus spiritus &c. Causæ coniunctæ sunt quia si proueniat a uenis erit aut incisio, aut perforatio aut apertio, aut erosio, aut ualida abstersio, si uero non prouenerit a uenis, tunc erit uel uulnus uel ulcus quod a corrosione uel putrefactione uel ab abscessu sanguineo fiet &c.

### Loci consentientes de causis sputi sanguinis.

Auice. decima tertij, cap. 4. Causa primitiua fit expercussione aut casu super pectus aut super hepar, aut a reincijsua, aut a tussi frequenti aut a uociferatione, aut ab acuitate uocis sine gradatione, aut a rixa, aut a uomitu laborioso et proprie in preparatis aut a sumptione solutiuiorum acutorum aut ciborum calidorum aut a timore & angustia sanguinem acueniente &c. Gale. 4. de loc. aff. cap. 8. Voco præcedentes causas aut cum aliquis ex alto uel in ludo uel in certamine ceciderit, aut ubi lapis uel lignum thoracem offenderit aut ira cum exclamatione acuta uehementiq; uoce ut cytharedis tragedisq; ac-



cidit uasa diruperint, uide locum hunc fusius. De causis antecedentibus & coniunctis loquitur etiam Gal. 4. de loc. aff. ca. 5. Sanguis reijcitur uel rupto uel eroso uase aliquo, uel ore aliquius uenae patefacto rumpitur uas uel ob sanguinis abundantiam, aut ob frigus a uicinis partibus contractum aut ob innatam intemperiem, quandoque ruptionis causa est, aut uehemens motus aut humorum abundantia qui una per se uel una cum crudo & frigido & flatuoso spiritu uenas extendunt &c. Lege hancmet sententiam cap. 8. eiusdem similiter. 6. de symptom. cau. cap. 2. ad medium. Vide etiam Auic. decima tertij, tract. 3. cap. 4. Similiter lege omnes practi-  
cantes.

#### De signis sputi sanguinis.

Quoniam locum cognoscere ex quo sanguis emanat necessarium est, ne inter stolidos quos redarguit Gal. computemur, diligenter aduertendum, quod si a capite sanguis fluat quod capitis uel dolor, uel aliud nocumentum praecessit, si proueniat ab arterijs magno cum impetu exiit, eritque tenuior rubeus cum claritate, uixque cohibetur. Si a pectore praecessit dolor tussis & grauitas, si a pulmone habes Hip. aphor. 13. lib. 5. ibi quicumque spumofum sanguinem expuunt, ijs epulmoneeductio, fit cum tussi multa, extenuatio corporis alteratio in genis &c. Nota etiam quod spumofus sanguis de mente Auice. prouenire potest etiam a cana pulmonis. Si sanguis prouenerit a rupto uase, in primis erit multus, deinde paucus cum aliquali dolore. Si ab eroso uase accidunt affatim sanguinis uacuationes praeceduntque exigua sputa, atque acres ex capite in pulmonem destillationes eritque tenuis. Sanguis ex apertione orificiorum, in principio est paucus deinde augetur & est sine dolore, sanguis ab Apostematibus corrosionibus & ulceribus cognoscitur ex praecessione eorum et interdum expuitur sanies &c. Sanguis proueniens ex naribus facile cognoscitur, tum ex rubore fa-



ciei tum quia dum exprimitur nasus adhuc fluit, Vel rem breuius sic habet sanguis ab ore proueniens per quatuor modos cognoscitur, aut expuitur tantum & est ex partibus oris, aut exit cum screatu & est ex colatorio uel uuula palato et partibus eorum, aut exit cum uomitu et prouenit uel a meri, uel a stomacho aut ab hepate et finibus eorum, aut exit cū tussi, & tunc uel est ex pectore uel pulmone, aut cana, aut lacerto uocali aut epiglotti & c.

#### Loci consentientes de signis sputi sanguinis.

Gal. 4. de loc. aff. cap. 5. Cognoscitur sanguis qui a gula & uentriculo reijcitur ex ipso uomitu, Si ex spiritualibus partibus ex ipsa tussi, Si ex faucibus & gurgulione ex screatu, Si ex ore ex simplici expuitione, Cognosces ex erosa uel exesa uena, si nulla præcedente causa existente, sanguis plurimus inter tussiedū reijciatur, Cognosces a pulmone educi, ubi fuerit sanguis spumofus, Cognosces a partibus pectoris emanare si illic dolor adfuerit, nam in thorace multi adsunt nerui quibus dolores percipi possunt, Cognoscitur a primaria thoracis affectione fieri, si neq; multum neq; rubrum, sed nigricantem grumofumq; sanguinem conijeceris & c. Vide etiam ca. 8. huius lib. Item Paul. aginetam cap. 31. lib. 3. Item Aet. ser. 8. cap. 59. Et Auic. 10. 3. tra. 3. cap. 4. & ibi, adunguem omnia intelliges: Vide etiam Mesu. cap. de exitu sanguinis ab ore, similiter Arcul. & alios practiçantes.

#### De cura sputi sanguinis.

Primus scopus in medendo erit, sex res non naturales ad frigidum & siccum ordinare ut sanguis cohibeatur & frigeat, Cibi igitur sint uiscoli glutinosiq; stiptici & frigidi quales sunt ptisana hordeacea, uel ex amylo confecta, aut pisces uiscoli, carnes crasse pingues, & Animalium extremitates, Cōueniunt etiam caseus recens portulaca lentes miliū Alica



ac coriza, Bibatur aqua calibeata, uitetur exercitiū loquutio  
 & c. Secundus erit reuulsio quæ fieri potest per phlebotomi-  
 am multoties repetitam, quæ pro singula uice sit modica,  
 Hinc ualet ligare extrema, Menstrua & hemorrhoides euo-  
 care, cucurbitulas natibus affigere & c. Tertius est malam  
 sanguinis qualitatem temperare, reprimendo eius aquosita-  
 tem, uel (ut ita dicam) biliositatem, Si enim fuerit aquositas  
 illa pituitosa præparetur cū rhodomelle & syrupo rosaceo,  
 deinde euacuetur cum myrobalanis chebulis & rheub. At si  
 sanguis fuerit biliosus digeratur cum syrup. rosaceo de .s. ace-  
 tose, de granatis, de omphacio, de citonijs mirtino, de portu-  
 laca, cum aquis plantaginis portulacæ & c. deinceps euacue-  
 tur cum Myrobalanis citrinis & rheu. cum cassia. Quartus  
 est sanguinis cohibitio, quæ primum & statim fienda erit, ne  
 forte adeo uires agrotantis prosterнат ut difficultas sit in re-  
 uocando, primum conuenit portulaca lapis hematites coral-  
 lus cornu ceruinum ustum, terra sigillata, Bolus armenius. s.  
 mirti, flores et cort. granatorum Gumi arab. & c. Sextus est  
 ut si sanguis in pectore uel uentriculo coaguletur, statim dis-  
 soluatur cum oxymelle simpl. & composito cum aquis hisso-  
 pi scabiose aliqui exhibent Theriacam & coagulos leporis  
 & c. Loci consentientes de cura sputi sanguinis.

Auice. 10. 3. tra. 3. cap. 6. loquitur de sex rebus supra natura-  
 libus dicens & cibi conuenientes eis. sunt omne conglutina-  
 tiuum & opilatiuum, & omne consolidatiuum & omne in-  
 frigidatiuum sanguinis prohibens feruorem eius & custodiā-  
 tur ab omnibus causis mouentibus sanguinem ut sunt cibi ca-  
 lesfacientes saltus clamor rixa coitus loquutio plurima & c.  
 Vide de his latius Mesuem.

De Reuulsione loquitur Paul. lib. 3. cap. 31. Quibus destilla-  
 tio cruentum sputum concitat, uena protinus debet incidi et



pro uirium modo sanguis detrahi. Auic. loc. cita. cura est ut succuratur cum phlebotomia basilica in qua existimatur esse resolutio singularis &c. & fricentur eius extremitates & ligentur incipiendo a superioribus ad inferiora &c. Vide de his latius Marcū cat. Arcul. Gor. et reliquos practicantes &c.

Item Mesuem ibi, secundam rem complent administratio nes phlebotomie cum iterationibus &c. De Rectificatione sanguinis loquitur Auic. loc. cit. ibi & sumant in potu medicinas frigidas conglutinatiuas &c. Vide de his uberius Mes. & Arcul. De constrictione sanguinis loquitur Gal. 7. de compo. med. per. loc. cap. 4. Curamus apertionem osculi alicuius uasis per obturationem & rupturam per eius conglutinationem, & uasorum erosionem per renutritionem erosorum, obturatur osculum dilatatum per adstringentia, conglutinatur ruptum per eadem & quaecunq; ipsis in compositione citra mordacitatem resiccantia & glutinosi quid habentia miscent, ut lemnia terra, Renutriuntur corrosa per cibos boni succi & pharmaca carnem gignentia &c. Vide fusius Gale. 5 meth. cap. 5. 6. & 7. Item Aet. ser. 8. cap. 63. & Auice. ibi & confert tribuere ei in potu troiscos de charabe &c. Vide de his iuxta Arcul. Mar. cat. Sauon. Guielinum plac. Gordonium & reliquos practicantes &c.

#### Observationes de euacuatione.

Mesu. cap. de flu. sang. ab ore, Si fuerit acuitas & inflammatio & ebullitio in sanguine propter mixtionem cholerae acutae in ipso, oportet ut euacuetur cholera prius deinde phlebotometur, Hoc enim est secundum canonem artis demum sequatur in frigidatio &c.

#### Observationes in adstringentibus.

Gale. 7. de compo. med. per loc. cap. 4. Conueniunt adstringentia ijs qui non tussunt simplicia, Sed illis qui ex pulmone,



aut thorace, aut arteria sanguinem reiectant, miscenda sunt adstringentibus calida & tenuium partium existentia ut per totum corpus distributio fiat, ubi uero circa stomachum, aut alium affectio hæc cōtingat, huiusmodi pharmacorū mixtura opus non est & c. Razes. 15. cont. In ruptura uenæ pectoris & phtificis noli prohibere sreatum perseverante adhuc catarrhi descensu ad pectus uel pulmonem & c.

### Cohibentia sputum sanguinis.

Cohibent sreatum sanguinis, Aloes, Amylum, Balauſtie, Barba hyrcina Betonica, bolus armenius, cinis cancri, cortices castaneorum, cauda equina centaurium maius, Nux cupressi, cydonia & eorum flores, coagulum leporis & hædi, colla piscium, corallus, corrigiola, Coriandrum, cornu cerui uſtum cum dragaganto, Radix dracontea, Hematites, Gummi arabicum & Amygdalarum, Cortex glandium, flores granatorum, Hyoscyamus, charabe, lachryma lentisci, litium lutū sigillatum, Mastix, fructus Myrti, Mumia cum mastice, Oenanthe, omphacium, cortex rad. oliuæ, cortex olibani, Albumen oui, pix portulaca, plantago, psylium, Rheubarbarum, Rosa, succus rubij salix, sandaraca, sanguis draconis, symphitum, synopida in ouo cortex suberis sumach, spina alba, spodium cum succo plantaginis stercus apri, Terra samia, Triticum, Vernix, Virga pastoris, hypocistis. Compos. sunt. Troisci hemathicorum mes. in cap. sputi sang. T. de charabe de terra sigillata, de papauere, de stella Auic. Triphera saracenica nic. Theriaca maior Auic. Sotira confectio, Confectio mirabilis Mes. in cu. tuſſis hum. Medicamen Andromaci Auic. Phylonium persicum Diaolibanum nic. loch de papauere Hali, Dia papauer Mes. Diasulphur Serap. Aqua aluminosa, calibeatā, Athanasia magna Auic. 15. & c.



## De pronosticis sputi sanguinis.

Hip. aphor. 4 aphor. 25. Sanguis quidem supra qualiscunq; fuerit, malus infra autem bonus. B. Si immoderantia sanguinis adsit siue inferne uel superne exeat, semper malum est. Immoderata n. nullo modo naturæ quadrant &c. Et aph. 4. aphor. 47. Excretiones in febribus non inter mittentibus liuide cruentæ fetide omnes male, Et aph. 4. aph. 27. Quibus in febribus sanguinis fluxerit multitudo quacunq; ex parte &c. Et apho. 5. apho. 3. ubi sanguis plurimus fluxerit, singultus aut conuulsio superueniens, malum, B. Intelligi nisi a plenitudine proficiatur, alioqui ad ualeitudinem confert, Verū si ex euacuatione alius morbus sequatur, necessario pronosticum erit malum. Nam hip. aphor. 7. apho. 9. A profluvio sanguinis desipientia & conuulsio malum. Et apho. 6. aphor. 10. caput dolēti & circundolēti pus uel aqua uel sanguis esluens per nares aut os aut aures morbum soluit, Et aphor. 7. aph. 15. A sanguinis sputo puris sputum malum, B. Hoc intellige de sputo maligno quod ex pulmone educitur, alioqui sensus aphor. non esset semper uerus. Et aph. 7. aph. 37. Quicunq; euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare, si uero cum febre, malum curare uero acerbis et refrigerantibus. Gal. 7. de compos. med. per loc. cap. 4. In reiectione sanguinis, primum periculum est, ne immoderata euacuatio fiat &c. Auic. 10. 3. tra. 3 cap. 4. Et ille cui accidit sputum sanguinis est preparatus ut adueniat ei ulcus pulmonis, Et ille qui est a pectore non est tantum timoris quantum in eo q. est ex pulmone, Et multoties quidem est sputum sanguinis causa sanitatis apostematibus in hepate aut splene &c. Lege & aph. 3. aph. 29. ibi, Iuuenibus autem sanguinis sputiones tabes febres acutæ &c.

Authores dissidentes circa sputum sanguinis.  
 2 Adferere sputū sanguinis cum tibi semper a spiritalibus

R. BLANCHARD

PROF. FAC. MÉD. PARIS



membris provenire.

2 Adserere, spumofum sanguinem semper esse indicium affecti pulmonis.

3 Adserere, Aperitiua in sputo sanguinis a retentione mēstruorum facto conferre.

4 Adserere, omnem sanguinis reiectionem per superiora semper esse malum.

Confutatio dissentientium circa sputum sanguinis.

Ad primum Gal. 4. de loc. aff. cap. 5. Nos uero sanguinem quid a cerebro ad gurgulionis partes internas ut ad fauces affatim descēdat, tuſiēdo educi sepe numero conspeximus, quippe gutturi subito irruēs tuſim mouere potest, ex quibus reprehendit medicos qui eruptionem periculosissimam tanquam pulmone affecto credebant. Ad secundum Auic. cap. de sig. spu. sangui. Et quādoq; est spumofus sanguis ex cana pulmonis proueniens, & paulo post Et spuma cum dolore pectoris significat locum ægritudinis, unde non semper erit a pulmone spuma & c. Ad tertium Auic. 1. 3. de cur. spu. sang. Caueant a cibis calidis & omnibus calefacientibus, sed aperitiua sunt calida igitur non conferunt, Præterea hip. aph. 7. aph. 37. cura cum acerbis & refrigerantibus, non calidis & prouocantibus, sed in hoc casu fac ut monet Gal. 5. meth. ubi per sectionem uenæ mēstrua prouocat, et non aperitiuis. Nec styptica cum aperitiuis admiscenda sunt quum alterum ab altero facile in operatione impediatur. Ad quartum Gal. apho. 4. comm. 25. inquit eam quæ supra fit per os solam excretionem nō esse semper malam illa quæ fit per nares omissa quæ etiam non est mala, quoniam hip. aph. 7. aph. 37. Quicumq; euomunt sanguinem si sine febre quidem salutare & c. igitur non semper erit mala & c.

De purulentis & tabe siue phtisi.



Empiema est puris collectio in media inter thoracem & pulmonem regione, Tabes uero quæ a græcis *φθίσις* dicitur, est pulmonis uel thoracis ulceratio cum febre debili ac tussicula corpus consumens Nam a uerbo *φθίνειν*, quod est diminui dicta est, ex ulcere. n. corpus consumitur diminuitur ac colliquatur, Hæc differt ab hectica, quum omnis phthisicus sit hecticus et non, e, contra, præterea hectica tam ab ulcere, quàm a non ulcerato pulmone oritur, Marasmus etiã ipse consumptionem corporis importat quæ a febre acuta dependet, Tabes tres sunt species, una quum corpus non alitur, ita ut summa macies oriatur a græcis *ατροφία* dicta, Altera ubi malus corporis habitus est in quo ferè omnia alimenta corrumpuntur & hanc græci *κακίαν* uocant Tertia est quæ a græcis dicta est *φθίσις*, Et fit quum a capite in pulmonem catarrhus descendit et frequens tussis oritur, Interdum tamen a medicis pro uno & eodem morbo accipiuntur.

Loci consentientes de empiemate & phthisi.

Paul. lib. 3. ca. 32. *ἐμπύμα κατὰ τὰ κενὰ τῶν θωρακὸς ἢ τοῖ κατὰ τοὺς πλεύρωτας συνίσταται*. i. si uerbum uerbo reddideris Empiema in uacuis thoracis regionibus uel in membrana costas subcingente colligitur.

Gal. lib. de Tum. præter naturam, cap. 3. *ἐμπύμα* hoc est purulentos dicunt quibus pus in media inter thoracem et pulmonem regiones fuerit collectum, Similis sensus habet 5. meth. cap. 8. & apho. 6. comm. 27. & 4. de loc. aff. cap. 5. Aet. ser. 8. cap. 67. phthisis proprie est ulceratio pulmonis ad sanguinis spuitiones consequens, Gal. aph. 7. comm. 16. quam proprie phthoen nominant græci, hanc hip. phthisim appellat quæ pulmonis ulcera insanabilia consequitur & totius corporis cum febre parua extenuationem, Vide etiam hanc definitionem in lib. defin. med. & 5. de loc. aff. cap. 3. Vide etiam Mesu.



ibi phthisis est detrimentum desiccationis et consumptionis cadens in corpus ex calore febrium habitualium & ulcere pulmonis.

De causis empiematis & phthisis.

Empiema fit uel a sanguinis eruptione, uel ab ulcere, aut ab inflammatione abscessa & rupta, aut a catarrho a capite ad pectus fluente. Cause primitiue phthisis sunt aer, motus uio lenti corporei, Regio borealis frigida & sicca, cibi & potus falsi & acres ac caput replentes, casus percussio autumnus pluuiosus & temperies egri frigida & sicca & c. Cause antecedentes sunt destillatio acris mordicans ac corrodens, aut præcedens peripneumonia iam putrefacta & ulcerata, aut pleuritis rupta, aut putrefactio & corrosio præcedens in substantia pulmonis, aut aliqua causarum sputi sanguinis uenam aperiens & c. Causa coniuncta est ipsa materia producens phthisim ad actum & c.

Loci consentientes de causis empiematis & phthisis.

Paul. lib. 3. cap. 32. purulenta screatio fit uel propter sanguinis eruptionem, aut ab ulcere in pulmone aut ab inflammatione abscessa & rupta, aut a destillatione a capite fluente ad pulmonem, & c. De causis primitiuis plura habes ex auic. 10. 3. cap. 13. ibi, & causa extrinseca est sicut casus & percussio aut multiplicatur quum eslati boreali sicce succedit Autumnus pluuiosus & c. Vide de his Arcul. fusius, De causis Antecedentibus loquitur Mes. cap. de phthisi, ibi, ulceratio huiusmodi causam habet, aut ex præcedenti catarrho acuto ulceratiuo instillante in pulmonem, quandoq; ex præcedenti pleuritide aut peripneumonia & c. lege eum fusius, Lege etiam Auic. 10. 3. tra. 4. cap. 19. ibi, cause ulcerum pulmonis sunt catharrhus mordicatus & c. Vide etiam Gal. 4. de loc. aff. cap. 8. fusius de his causis pertractantem & alios practiçantes & c.

De signis empiematis & phthisis.

Signa



Signa ab exeuntibus sunt sputum saniei cum signis suis, urina est naturalis uerum interdum oleaginea, Interdum habet fursures quæ omnia humidi consumptione significat in processu morbi lienteria aut diarhea superuenit, & sudor in fine digestionis, Signa a qualitate mutata sunt febris continua uniformis, genæ liuescunt pedes tumescunt carnes consumuntur, ungues curuantur, pallidi apparent. Signa ab actione lesa, male dormiunt, pulsus minutus frequens uniformis diuersus in fine, hanelitus naturalis sed in fine ob uirium imbecillitatem diuersus Appetitus deiectus & quod sursum uergit fœdi est odoris &c.

Loci consentientes de signis.

Hip. prædict. 2. tex. 60. Cognoscuntur purulenti principio si febris nō dimittit, Sed interdiu tenuior, noctu uehementior, Si copia sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas adsit, nec quidquam tamen dignum comentatione expuunt, si oculi caui red duntur maxilla ruborem contrahunt, ungues manuum curuatur, digiti potissimum sumi calescunt, In pedibus tumores consistunt, neq; cibum appetunt & pustulæ circa corpus erumpunt, &c. B. causas horum signorum habes in comm. Gal. Lege de his Paul. lib. 3. cap. 32. ibi phthisis confirmata &c. Lege etiam Gal. 2. de morb. cau. cap. 7. & fusius. 1. de diff. feb. cap. 9. Lege etiam Aet. & Paul. ibi, pus collectum attestantur grauitas pectoris, tussis ualida siccaq; &c. De signis preparatorum ad phthisim loquitur Gal. & Hip. aphor. 5. aphor. 9. ibi tabes fiunt &c. Et Auic. 10. 3 tra. 4. cap. 20. ibi isti sunt alati habentes pectus strictum &c. ubi infert q, collum gracile & longū præseferunt & humeros admodum alarum et scapulas quasi a pectore semotas habent si macilenti sint, et carnē cū humorum acrium influxu, mollem habeant ad phthisim inclinati sunt, Vide de his fusius Arcul. & Gal. de diff. feb. 1. cap. 9. Cognosce etiam ex Gal. & Hip. pronost. 2. tex. 62. quatuor erunt

Z



ptionis suppurationis signa, quæ sunt dolor, spirandi difficultas, tussedo, & scretio quæ si continentur & uehementer infestent, celerem significant eruptionem, si minus diuturniorē &c.

#### De cura phthisis & empiematis.

In primis an phthisis curari possit lege conciliatorem differentia. 193. Sicuranda erit unica erit intentio, ut uidelicet causam tam conseruatricē quam productricem amoueamus, quæ si fuerit a sanguine per sectionem uenæ reiteratam. Si a bile per cholagoga, si a phlegmate per ea quæ pituitam educunt, quamquam sciam Auicē. a Raze in hoc differre ut ipse solutiua ad causam remouendam exhibeat, quæ a Raze ratione phthisis factæ interdiciuntur, Si uero fiat phthisis a pleuritide cura erit in capite pleuritidis nota, Si ab empiemate tūc puris concoctio adiuuetur, deinde euacuetur, Nam suppuratio, si rūpatur, uel deorsum tendet et tūc expurganda erit p aluū intestina ac uesicā, si sursum uersus pulmonem, tunc per asperam arteriam elicitā tussi educetur, Verum si neutra harum a natura tentetur, superest tantum ut locus in quo sanies consistit, ita aperiatur, ut extrudi possit, Si phthisis proueniat ab ulcere tunc cura erit ut in primis ulcus abstergatur cum hydromelle, aqua hordeacea, cum cicerū, ac zachari aqua uel cum decocto hissopi &c. deinde fluxus destillationum prohibeatur cum his quæ pulmonem roborant, sicut est syrup. mirtinus, puluis pulmonū uulpis &c. 3. residuum permanēs excietur cum melle & galbano, deinde ulcus consolidetur cum bolo armenio Aliqui exhibent lac quod abstergendi & conglutinandi uires habet, sunt qui exhibent aquam hordeaceam cum cancris fluuiialibus coctam & præcipue confert &c.

#### Loci consentientes de cura phthisis & empiematis.

Mesu. cap. de phth. primam rē complent quæ abscindunt uocamenta catharri & si causa eius fuerit ex empiemate per



ripneumonia et pleuritide cura eorum dicta est secundum re-  
compleant euacuaciones causas abscidētes, unde si cognoueris  
ex plenitudine sanguinis phebotomamus ex basilica si chole-  
ram abundare euacua Auic. cap. de empie. Cūq; eruperit sa-  
nies & existimas q̄ pauca sit, ut mundificetur cum sputo ad.  
40. dies, tunc oportet ut administrentur post eam abstersua  
lauatiua mundificatiua dādo ea in potu quum incipit expui,  
id, quod erumpitur & cum decocto hissopi rad lilij. syrup. de  
Melle & c. Paul. lib. 3. cap. 32. puris concoctio primum adiuuā  
da est fomentis cataplasmatibus, promouet etiam rupturam uo-  
mice sani lateris incubitus, mulse sorbitio & succus ptisanæ  
cum melle, Valentiū decoctum hissopi & thymi cum melle  
& c. Vide latius de his Gal. 5. meth. cap. 8. et Aet ser. 8. cap. 65.  
et decura ulcerum. 5. meth. cap. 1. Et Auic. de cura ulcerum par-  
tium pectoris & inuenies quæcūq; a me dicta sunt & c.

#### Observationes in cura.

Gal. 5. meth. cap. 8. In ulcere pulmonis primum fac, ne, ma-  
gno aeger utatur respiratu, sed super agat silentium, Fræte-  
rea statim a ruptura uasis facta curam incipias quo cruen-  
tum adhuc uulnus priusquam phlegmonem excitet glutines.

Mesu. cap. cit. Quando consolidatio & conglutinatio uul-  
neris queritur, tunc cibaria sint desiccatiua nō eleuata in gra-  
du multæ exiccationis & sint conglutinantia ut sunt extremi-  
tates porcorum & hædorum & c. Et paulo infra prohibea-  
tur eis omnis lubricitas uentris et constipatio uiscerum Nam  
lubricitas uehemens resoluit uirtutem & c.

#### Conferentia tabidis.

Conferunt tabidis, ius adipis capre bibitum, Amylū, Bar-  
ba hirci cum aqua hordei, Betonica, lutū armenium, Butyrū,  
decoctio cancrorum, dragagintum, fanugræcum, Gumi albo-  
tim, peucedanum, pix humida plantago portulaca, Confectio



dicta mirabilis mes. in cur. tus. hu. loch. de pino de papauere, Troc. de papauere hali, Phthisicis cōferunt radix acori cū pti sana, et Betonica, Berbenaca, Cācri cū aqua hordei, decoctio .s. citoniorū, cocleæ, cum uino, Iecur apri uel lupi .s. lini lutū armenum, Marubiū, Porrum, pulmo cerui, plantago, salvia, Stercus uacarū, Cōfectio de satirion Mes. confe. dicta mirab. confect. de Iacur mes. in cur. pht. diadragagātū, Diapenidion, diarhodon, diapapauer nic. Phylonium rom. loch. de spodio Auic. loch. album Mes. in cur. tus. hu. syrup. de papauere, uiola ceus de hissopo, de psyllo mes. Triasandali nic. Troc. de cāph. Mes. de citonijs serapio de arsenico & Zacharum ros. nouū.

De pronōtīcis phtīsis & empiematis.

Aet. ser. 8. cap. 65. quoniam rumpuntur suppurationes uel sursum uel deorsum. Quæ sursum in uacuum thoracis locum funduntur periculosiores sunt. B. nota q. supuratio multis modis terminatur, aut statim sua multitudine suffocat, aut a colluie pulmo putrefit, unde phthisis, aut sputo ex purgante liberat, aut per uiam magnæ uenæ ad uesicam cum urina crassa extruditur, aut per uiam secessus per intestina euacuatur, aut per tumore in cute pectoris enatum & ruptum educitur qui modi ferre omnes præter primos optimi reputatur Hip. aph. 5. apho. 11. Qui a tabe molestantur, si sputum quod ex tuſiunt graue olet iniectum carbonibus & capilli a capite defluunt, lethale B. capilli defluunt uel ob maximum alimenti defectū, uel ob humorum perniciosam corruptionem & est pessimū signum.

Hip aph 5. aphor. 12. Quibuscunq; tabe laborantibus capilli a capite defluunt ijs alui profluuio superueniente moriuntur, Et apho. 5. apho. 14. A tabe habito profluuium aluii superueniens lethale, et aph 6. aph. 27. Quicūq; suppurati aut aquam intercutem patientes uruntur, aut secantur, si pus aut aqua



uniuersim effluxerit, omnes moriuntur. B. Vide etiam apho. 10. & 13. & 22. & 29. lib. 3. circa hanc materiam item. 8. lib. 4. Et apho. 7. apho. 16. a puris sputo phthisis & fluxus, quum uero sputum retinetur, moriuntur. Aet. ser. 8. cap. 67. Difficillime curantur ulcera pulmonis eo q. citra tussim non repurgantur & a tussi mutuo ulcus corrumpitur, Præterea pharmacorum uires ad ulcus pertingere non ualent priusquam in uentre permutantur, præterea pulmo per spirationes semper mouetur & tussiendo lancinatur, Itidem si curentur ita ut fistulose et callosæ cicatrices relinquantur, progressu temporis fricantur et leui ex occasione recidiuantur. B. Vide de his fusius Gal. 5. meth. cap. 8. & 7. de compos. med. per loc. Intellige tamē tu ut Gal. q. ulcera in superficie pulmonis facta curari possunt sed antiqua & a phlegmone facta difficulter, uel plane nunquam sanari possunt. Vlcera uero pectoris facilius curantur tum quia carnosum est pectus tū quia paruo motu indiget, tū quia substantiam ita mollem & ad erosionem pronam non habet ut pulmo, Vide de his latius Gal. loc. cit. et. 4. de loc. aff. cap. 5. ibi ulcera in pulmone & c.

Hip. aph. 5. aph. 15. Quicumq; ex morbo laterali suppuratur, si in. 40. diebus purgantur a die qua fit ruptio liberantur si minus ad tabem transeunt. Et pronost. 2. tex. 63. supersunt, quos febris eodem die dimisserit ac cibum citius appetunt & a siti liberati sunt & uenter exigua et consistentia deijcit, & pus album leue & con color est et sine labore ac tussi ualida reijcitur, Qui uero contrariū habent, pereunt & c. Et. 2. pronost. tex. 52. Quicumq; dolor circa thoracem & pulmonem non desinit, adhibitis oportunis auxiliis in suppurationem uerti sciendum est. Vide textus alios sequentes ad pronosticiū etiam maxime spectantes.

Gale. 5. meth. cap. 8. Si phlegmone semel inuasit exigua



glutinandi est eius spes in longius tamen protrahere potest tempus & c. B. ratio est quia in pulmone nec sanies nec pus elui potest, quod in phlegmone soluta prima est intentio, nec uulnus glutinari, quum in perpetuo motu ob respirationem pulmo sit.

Authores dissentientes circa empiema & phthisim.

- 1 Adferere, omne empiema esse per incisionem uel uestionem curandum.
- 2 Adferere, cum Erasistrato nihil ex thoracis spatio in pulmonem posse recipi.
- 3 Adferere, phthisim fieri posse a siccitate per se.
- 4 Adferere, humiditatem per se posse pulmonem ulcerare.
- 5 Adferere, phthisim ex ulcere pulmonis antiquo esse curabilem.
- 6 Adferere, lac nullo modo competere phthisicis.
- 7 Adferere, zacharum rosaceum recens nullo modo conferre phthisicis.
- 8 Adferere, abstergentia ex purgantiaq; solum in phthisi conuenire.

Confutatio dissentientium circa empiema & phthisim.

Ad primum Gal. apho. 6. comm. 27. uestione tantum indigen qui plurimum habent puris adeo ut desperent per sputiones posse expurgare, sed omne empiema tale non est, igitur nec per incisionem curandum & c. Ad secundum respondet Gal. 5. de loc. aff. cap. 3. ibi, in namq; uel ex thoracis spatio in pulmonem quidpiam recipi impossibile esse sibi persuadentes & c. & ibi docet modum & uiam qua fit hic transitus, Similiter & 5. meth cap 8. Ad 3. Gal. aph. 3. comm. 16. Morbi tabitudines nominati ad has duas sequuntur constitutiones & ad frigidissimam ex qua nonnulla ex uasis quae sunt in respirationis instrumentis dirumpuntur, & ad alteram quae coniuncta



habet cum caliditate humiditatem, quarum occasione caput repletum mittit ad pulmonem fluxiones, a sicca uero constitutione, omnia alia magis quam tabitudines consequuntur et sic a siccitate nullo modo phthisis oritur. Ad quartum Conciliator differentia. 193. in eius appenditio inquit q̄ humiditas per se nō causat phthisim nisi fuerit cūiuncta humido catharrhali uel caliditati uel frigiditati.

Ad. 5. Gal. s. meth. cap. 8. ulcera pulmonis non modo adcurandum sunt difficiliora, sed quibusdam etiam impossibilis eius cura uidetur, & hoc ratione & experientia, Ratione quoniam pulmo est semper in motu, sed quæ sunt sanāda quiete indigent, Experientia, quia neminem eorum ita affectorum sanātū uiderim, item. 4. de loc. aff. cap. 8. multos ex hoc morbo defecisse, imo inquit quapropter omnes perire necesse est.

Ad. 6. Gal. s. meth. cap. 12. Veteres uero etiam mulierē lactantem, ijs qui phthoe consumeretur adstare uoluerunt, quorum sententiæ ipsæ quoq; accedo & c. ubi lac sumopere commendat, Itidem adserit septimo meth. capi. sexto, Præterea id quod est facilis assumptionis, optimæ digestionis et bonæ nutritionis, item optime humectans consolidans & abstergens confert phthisicis, sed lac habet has cōditiones ut refert Auic. igitur est dandum phthisicis, quare si ab alijs uitetur, idcirco fit, quia in febre putrida non competit & c. Ad septimum Auic. decima tertiā, tra. 4. cap. 6. Vnum de maxime conferentibus phthisicis est zucharum rosaceum et ex eis quæ multoties sum expertus in corporibus et regionibus diuersis est ut utatur pane cum zucharo ros. & si angustetur anhelitus datur in potu syrupus de hissopo & si inflammatur dentur trocisci de camphora & c. Mesu. ex rebus mirabilis iuuamēti ad consolidationes & sanationes ulcerum pulmonis est zucharum ros. recens & supra quod non præterijt annus & c.



Ad octauū, Cōciliator diferen. 194. Medici plerunq; errant circa phthisis curationem, eo q; uolentes purgare saniem tantum absterfuiſis eam ex purgantibus utuntur, ut sanguinis ſtutum denuo inducunt & c. ibiq; notat, Zucharum roſ. non niſi præcedentibus mundificatiuis eſſe exhibendum & c.

#### De pleuritide.

Pleuritis duplex uera & mendosa, uera eſt ſubcingentis coſtas pectoris membrana cum ſuis muſculis inflammatio cum dolore pungitiuo & acutiſſima febre, mendosa uero eſt inflāmatio in paniculis pectoris extrinſecis. Intrinſecus enim in pectore tres continentur membranae quarum quædam a Græcis dicuntur *υποχωρότες*. i. ſubcingentes latine, arabice pleuræ, quæ uero recte per medium thoracis ad iugulum feruntur, *διαφραγματούτες*. i. interſipientes, barbære mediastiū dicitur, deinde diaphragma & c.

#### Loci conſequentes de pleuritide.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 3. Inflammationes quæ in ſubcingētes coſtas membrana, ac muſculis illi continuis fiunt, morbum quem lateralem uocant efficere ſolent, hæc met ſententia eſt iuxta Gal. de part. art. med. cap. 4. & de conſtit. art. med. cap. 15. & aphor. 6. comm. 3. ibi qui acidum ruſtum & c. Meſu. Pleureſis quædam uera quædam non uera, uera eſt apoſtema cadens in paniculis & lacertis & c. Non uera quæ fit in lacerto & uelamine extrinſecis & c. Vide de his Auice. decima tertij, cade pleuritide. Item Alex. et Aet. ſer. 8. cap. 68. ibi, Pleuritis exquiſita & propria eſt inflammatio membranae extrinſecus latera ſuccingentis dolorem pungitiuum uehementer inferens, cum acutiſſima febre & c.

#### De cauſis pleuritidis.

Cauſe primitiuae ſunt caſus percuſſio pectoris, denudareq; ſe poſt laborem in aere frigido, uenti ſeptentrionales, aquæ



frigide potus & similia. Cause antecedentes, sunt humorum influxus, uel eorum superabundantia, uel retentio superfluitatum exire consuetarum. Cause coniuncte sunt sæpius sanguis et bilis inflammationem actu producentes, raro pituita, rarissime melancholia, quia quod est densius raro ad hæc mēbra penetrat & c.

#### Loci consentientes de causis pleuritidis.

Gale. lib. de constit. art. med. cap. 5. Inflammatio ex humorum influxu suboritur quia hæ partes non æque ut cutis sunt densæ & compactæ sed rare potius. Et aphorif. 6. comm. 33. idem adserit, ibi quum unaquæq; inflāmatio ex alicuius humoris & c.

Auic. decima tertij, cap. de pleu. Et materia huius apostematis ut plurimū est cholera aut sanguis cholericus, quoniā in membris tunicosis, non penetrat nisi subtilis sanguis cholericus uel purus & c.

Mesu. cap. de pleu. Commune est intrinsecis ac extrinsecis paniculis ab omni materia apostemari, uerum a sanguine & cholera frequētius, a phlegmate et cholera nigra rarius & c. & hæc de causis antecedentibus & coniunctis. De causis uero primitiuis lege Arcul. Gord. Sauona. & Auic. ibi, & quandoq; facit pleuresim, multitudo potus aquæ frigide & frigus additum, & facit euenire caliditas uehemens & potus uini puri & c.

#### De indicatijs pleuritidis.

Signa pleuritidis inseperabilia sunt, febris acuta, dolor punctorius, modo ad iugulum, modo ad præcordia tendens, spiratio frequens et exigua, pulsus serinus ac durus, tussis magna interdum cum screatu interdum absq; sputis, quorum signorum si unum deficiat, uera pleuritis esse non potest. Signa materiæ inflammationem efficientis, sumūt ex colore sputi, unde si rubeus fuerit, sanguinolēta erit inflammatio, si flauus



*biliosa, si spumosa pituitosa, si niger, bilis assata. Signa pleuritidem ab inflammatione hepatis interstigentia, sunt, quia loco pulsu dolore colore & tussi differunt. Loco, quia infra costas in dextra tantum partem sentitur durities uel tumor. Pulsu quia in inflammatione hepatis undosus est. Dolore, quia non acutus sed grauis. Colore, quia facies male colorata. Tussi, quia adest sine screatu spirationeq; maiori, contra uero in pleuritide. Signa quibus differt peripneumonia a pleuritide sunt, quia in peripneumonia pulsus est undosus, & genarum mala rubent ac si fuco deliniarentur. Signa quibus differat a phrenitide sunt quia pleuritis sine alienatione praesertim dum incipit prouenire solet, contra uero phrenitis cum alienatione incipit & cum anhelitus constrictione desinit & c.*

*Loci consentientes de indicis pleuritidis.*

*Gale. 5. de loc. aff. cap. 3. huius signa inseparabilia sunt, febris acuta, dolor perinde ac si locus intendatur uel pungatur, spiratio frequens & exigua, pulsus paruus arteriam durum & quodammodo intensam demonstrans, Tussis magna cum sputis coloratis nonnunquam sine his & c. Orib. aphorif. 1. commen. 16. ibi accessiones & c. Signa inquit pleuriticorum sunt quatuor. s. tussis, respiratio difficilis, febris, & dolor acutus, quorum unum si deficiat pleuritis esse non potest. B. habentur haec met signa ab Hippoc. 4. de uic. in mor. acu. tex. 72. & lege causam horum signorum ex ipso Gale. in commen. Gale. de constit. art. med. cap. 15. ex colore sputi quis humor peccet, nobis demonstrauit, ibi, si sputum colore rubro inficitur, tunc sanguinolentum erit, si flauo, biliosum, at si spumosa excreetur, pituitosum, si niger fuerit screatus, tunc iudicandum an fluctio siue biliosa siue sanguinolenta assetur & c. Lege etiam fusius. 5. de loc. aff. cap. 3. et aphor. 6. comm. 33. ibi quae a flauis ac rufis sputis fit ex biliosis humoribus & c. De alijs signis*



quibus ab alijs morbis interstinguatur pleuritis, fusius habes iuxta Paul lib 3. cap. 33. & a Gale. 5. de loc. aff. cap. 3. De signis pleuritidis mendose fit mentio a Gal. ibidem. 5. de loc. aff. ibi, sunt & alij laterum dolores cum febre & exigua respiratio ne & c. Et sunt hæc grauitas lateris sine tussi, nullum redditur sputum, dolor extrinsecus est tumor deinde extra apparet & c. Signa concoctionis pleuritidis habentur ex Galeno in comm. 12. lib. primi aphorif. ibi, accessiones et constitutiones morbi indicant & c. Lege Galenum etiam secundo de loc. aff. cap. 9. ibi, quod si tussiendo nihil expuat, fieri potest ut nihilo minus pleuriticus sit ille & c.

#### De cura ipsius pleuritidis.

Cognoscas id in primis licet, an notha uel uera sit pleuritis, si notha tunc cura tentatiua utitor cum fotu tum humido tum sicco, quale est decoctum camomillæ anethi melliloti. sili ni fenugraci & c. uel sacculum ex sale milio fursure & c. & cum his quæ potius uentrem leniunt quam ualide soluant si uera fuerit pleuritis, uel ad resolutionem, uel suppurationem, uel ad alium morbum transmutabitur. Si ad resolutionem, tunc in primis id quod influit reuellendum cum sectione uenæ cum leuibus clysterijs cum cucurbitulis cruribus applicitis, cum fricatione partium inferiorum, Secunda intentio erit materiae preparatio, quæ si fuerit sanguinea uel biliosa præparabitur cum syrupo uiolaceo, iuiubino, cum aquis uiolarum, hordei, citruli, melonis indi, cucurbitæ & c. uel cum decocto rerum pecc. frig. Verum in materia biliosa requiritur id quod plus infrigidet et humectat quam abstergat, in sanguinea plus abstergat quam humectet, in pituitosa plus abstergat quam infrigidet quale est decoctum hissopi & syrupus de liquiritia hydromel & oxymel Tertia intentio est euacuatio a loco in quo sit inflammatio & perficitur cum sectione uenæ ex eodẽ



latere patiente, uel solutione uentris, ubi materia ad has partes declinet, nā quo natura uergit eo ducere oportet per loca conferentia & hæc fiet tutius per cassiam mannam rheobarbarum. T. de agarico de uiolis & c. Quarta intentio erit spiritus euocatio ac facilis educio & perficitur cum iuleb. Syrupus iam dictis, uel aliquo eclegmate, uel inunctione ex oleo uiolaceo amygdalino dulci etc. Quinta intentio est residui resolutio quæ fiet cū topicis in modū emplastri et fomenti cum camomilla & c. Si uero ad suppurationē uertatur Prima intentio erit puris concoctio quæ fiet cum emplastris ac unctionibus molliētibus sicut cū oleo amygd. dul. butyro, adipe galinæ & c. Secunda intentio est rupturæ uomica promotio, quæ fiet cum ualida tussī et cum his quæ dilatāt pectus qualis est mulsa sorbitio, incubitus eiusdem lateris cū ualido corporis motu & c. Tertia intentio est absterfio cum aqua sacchari uel hydromelle cum iure cicerum. Quarta intentio erit conglutinatio & perficitur cū bolo armeno & cum similibus & c. At si ad aliū morbū transmutetur, cura eiusdem morbi curabitur & c.

Loci consentientes de cura pleuritidis.

Hippocra. 2. de uic. in mor. ac. tex. 1. lateris dolorem siue is per exordia fuerit siue postea exortus sit, tentare calidis fomentis dissoluere non abs re existit & c. et hæc de cura nothæ tentatiua, ubi laudat fomenta ex aqua calida & quæ ex sale milio parantur. Auic. de cur. pleu. plura habet ibi, uerū humida cum non iuuant non nocent & c. De cura ueræ pleuritidis loquitur deinde Hippocra. 4. de uic. in mor. ac. tex. 73. ibi, si dolor sursum uel ad clauiculam, uel ad mamam uel brachiū ascēderit. Venam brachij internam seccare oportet qua parte dolor afficit, sanguinemq; auferre pro corporis habitu anni tēpore etate immo si dolor acutus fuerit usq; ad animi deffectum detrahes, postea clysterē exhibebis, si uero sub thorace



dolor fuerit pleuritico uentrem sub purgabis. Lege etiam secundo de uic. in mor. ac. tex. 10. 11 ubi non ad animi usque defectum uenā secare iubet, sed eo usq; extrahere, donec rubidior multo, aut pro rubido liuidus fluxerit &c. Quo nam latere secanda sit uena, dubitauit primus Gentilis, deinde omnes neoterici quāquam meo iudicio efficatiores sint eorum rationes, qui a parte læsa dicunt extrahi, quam qui ab opposita, Pro his Lege Manardum lib. 12. epistolarum ad Iacobū pharusium plures rationes adducentem. Galenus secundo de uic. in mor. ac. comm. 11. tutius est per uenæ sectionem euacuare, quam per purgantis medicamenti administrationem etiam si ad hypochondriorum regionem dolor finiatur, immo per uenæ sectionem nullum impendet periculum, eo discrimen maximum subeunte, quod per purgationem tentatur, maxime quum morbus hic acutus sit cum febre uehementissima. Quod etiam diuersio ad hanc intentionem spectet lege Auicen. ibi, oportet ut prohibeas materiam euenientem cum euacuatione et attractione &c. De secunda intentione loquitur Mesu. ibi, Mondificationem corporis oportet ut præcedant preparatiue ad materie digestionē necessaria, et si materia fuerit cholericā requiritur infrigidatio maior cum humectatione non spoliata a uirtute abstersionis &c. Si materia erit sanguinea requiritur uirtus infrigidationis minor & abstersionis maior, si phlegmatica requiritur minor infrigidatio & maior abstersio. De tertia intentione loquitur Auic. decima tertij, de cur. pleu. ibi, dicamus igitur q̄ cura est phlebotomia si sanguis fuerit uincens, & si est humor alius euacua non cum eis quæ sunt sicut mirobalani &c. Paul. lib. 3. cap. 33. Recentiores omnibus uenam incidunt, ueriti ut opinor turbationem quā purgatio solet accersire &c.

De quarta intentione plura habes ex Mesue ibi, quintum



rem complent administrationes medicinarum sputum facilitantium, quæ fiunt cum humectantibus et lenificantibus procedendo ad res temperatæ abstersionis &c. Auice. loc. cit. oportet ut si tua magnifica intentio ad hoc ut sputum facile sit & ex eis quæ multiplicant sputum est dormire super latus infirmum &c. De alijs intentionibus curatiuis habes etiam plura ex Auice. loc. cit. ibi, & ex eis quæ sunt sollicitudo attendenda est ut succuras maturationi ægritudinis, et si sanies fiat oportet ut succuras cum mundificatione &c. lege de his uberius Mes. Marc. Cat. Arcul. Gordonium & cæteros practicautes.

#### Observationes circa curam tentatiuam.

Mesu. cap. de pleu. Et canon est debere ab humidis & debilioribus incipere & quanto compactior & siccior fuerit materia, tanto tardius ad fortiora prorumpere, ne resoluitur quod est subtile & cadat durities in residuo. Cauendum insuper ne uapor ex euaporatorijs ad nares ægri ascendat, dissolutionem enim & tristitiam & anhelitus constrictionem generat &c.

Hippocra. secundo de uic. in mor. ac. tex. 9. Verum si fomētis dolor non placetur, non diutius calefacito siccatur enim id pulmones atque ad suppurationem excitat &c.

#### Observationes in phlebotomia.

Auicen. decima tertij, cap. de pleu. Cumq; phlebotomas et euacuas & non sedantur accidentia tunc scias q̄ prohibitio collectionis quā quæris difficilis est non igitur reiteres phlebotomiam ut non congelletur materia, quæ habitura est collectionem et post hæc dispositio debilitatis uirtutis, non est quæ tollerare possit phlebotomiam & solutionem, sed necessariū est tunc uti clysterijs &c. Mesu. oportet phlebotomiam præponi solutiuis, nisi uentris fuerit constipatio, tunc enim præcipimus lenire prius naturam &c.



## Observationes in solvente pharmaco.

Auic. decima tertij, cap. 1. in solutiuo est timor magnus, ipsum namq; interdum mouet & quandoq; non soluit, et quādoq; superfluit, uide de his Gal. 2. de uic. in morb. ac comm. 2. deinde inquit auic. nec soluatur uenter cum pharmaco laborioso, sed leniente, & uitentur styptica sicuti myrobalani.

## Conferentia pleuritidi.

Conferunt dolori lateris et pleuritidi, amygdalæ anethū, berberina, betonica, bdelium, brasicā, galbanum, gentiana, malua capillus uen. uiolæ, hordeum, passulæ iuiubæ, peucedanum, saluia, uerbascū, urtica, iris illirica, colatura furfuris cocti in aqua hordacea, althea, alchana, camomilla, carica, hisopos, penidij, zucharum uiolatum & quęcunq; dicta sunt superius in capite peripneumoniæ.

## De pronosticis pleuritidis.

Hipp. aphor. 3. apho. 23. Hieme uero morbi laterales &c. Et aphor. 6. aphor. 33. qui acidum eructant, non ual de morbo laterali corripuntur & aphor. 6. aphor. 16. a morbo laterali uel pulmonia habito alui profluuium adueniens malum. B. Intellige de fluxu a natura non regulato, nam qui a uirtute regulante fit etiam in principio bonum, nisi ullum aliud accidens fuerit quod uirtutem prosternat, unde Auic. & fluxus in principio apparens bonum est signū &c. Et aph. 5. aph. 8. quicunq; morbo laterali laborantes in. 14. diebus non repurgantur, ij ad suppurationem uertuntur, Et apho. 15. eiusdem, quicunq; ex morbo laterali suppurantur, si in. 14. diebus purgantur, a die qua fit eruptio liberantur si minus ad tabem trāseunt Auic. decima tertij, cap. de pleu. quæ est propinqua cordi & parti sinistrae est deterior, sed ad hoc ut maturetur conuenientior, & quæ est remotior a parte sinistra est salubrior, sed ex parte resolutionis & maturationis magis inobediens



Et paulo post, et apparitio fluxus sanguinis narium est ex signis bonis ultimis in pleuresi, B. adde tu q non tantum a nari-  
bus sed ab hemorrhoidibus et matrice proueniens sanguis in  
casu laudatur, Gal. 10. meth. cap. 5 si pulmonis uel membra-  
nae quae costis subtenditur, uel uentriculi uel iocineris phleg-  
mone sit, quae has partes occupet, non modo his qui imbecilles  
sunt uiribus, sed etiam quibus ualentiores sunt mortifera esse  
solet Hip 3. prorrh. tex. 5. dolor lateris ex sputis biliosis, si  
absq; ratione euanerit in furorē aguntur. B. facto scilicet bilis  
ad cerebrum transitu, Auic. decima tertij, tra. 4. cap. 1. Et quan-  
do accidit praegnantibus est perniciosum, et accidens decre-  
pitis ob debilitatem uirium in spuendo interficit. B. Nam. so-  
let hominem interimere uel ex eius uehementia symptomatu,  
uel ex praefocatione. Primo modo praegnantes moriuntur. Se-  
cundo decrepiti non ualentes materiam extrudere.

Hip. lib. de aere et aqua, qui habent uentrem natura humi-  
dum, minime morbo laterali atq; alijs morborum generibus  
corripiuntur. B. hic locus citatur a Gal. aphor. 6. comm. 33. Et  
ratio est quia abundante bile aut pituita salsa et acri irrita-  
tur aluus ad deiectionem, in qua plures humores excerni so-  
lent et c.

Authores dissentientes circa pleuritidem.

- 1 Adserere, pleuritidem posse fieri absq; febre, anxionis  
exemplo.
- 2 Adserere, profluium alui in omni pleuritide esse, signum  
periculosissimum.
- 3 Adserere, pleuritidem plerunq; fieri a tenui pituita.
- 4 Adserere, repercussiuam in pleuritide iam facta conferre.
- 5 Adserere, pleuritide dextri lateris deteriore quam sinistri.

Confutatio dissentientium circa pleuritidem.

Impugnat primum Gal. aph. 1. comm. 12. ibi, In morbo late-  
rali,



rali acuta quidem febris una cum spirandi difficultate & tu-  
ssi & dolore lateris pungente signa passionis significatiua  
nominantur. Et. 5. de loc. aff. cap. 3 uocat hæc signa inseparabi-  
lia, igitur absq; febre fieri non potest.

Ad secundum, Gal. aph. 6. cōm. 16. In mediocri uero mor-  
bo laterali profluuium alui superueniens potest prodesse ra-  
tione euacuationis & magis quam signa cōcoctionis appari-  
erint inesse passionibus, neq; adest timor, sed morbus est ci-  
tra periculum.

Ad tertium, Gal. aphor. 6. comm. 33. Fulmo in omni parte  
rarus ac laxus promptius est omnes suscipere humores, mē-  
brana autem subcingens plus bilioso ob hanc igitur causam,  
quibus pituita natura superabundat, raro a morbo laterali  
corripiuntur, & c. ubi habes non plerunq; a pituita fieri.

Ad 4. Gal. 2. meth. cap. 17. Partius ad pectus est adstringen-  
tibus utendum quando talia humores, qui phlegmonem exei-  
tant, in pulmones & cor nonnunquam reprimant, & paulo  
post, quippe foras trahere potiusquam reprimere in eo debe-  
mus itidem ait Auic. decima tertij, in ser. comuni de cur. dolo-  
ris, unde non mirum si Mesu. a Gord. hac de re deridatur, quū  
in eo morbi principio principiante nullum opus medici ab  
infirmo petatur.

Ad quintum, respondet Conciliator diff. 100. Et tenet q; de-  
terior sit respectu situs materiæ item ratione nobilioris par-  
tis, item quia seuiora fiunt symptomata & c. Lege fusius ubi  
de peripneumonia agit.

#### De cordiaca passione.

Sunt cordis passionēs seinuicē consequentes numero tres.  
Prima, est cordis imbecillitas, Secunda, est palpitatio. Tertia,  
est cardiaca syncopa, Nam facta imbecillitate cordis uehemē-  
ti, agitur uirtus, unde palpitatio ex qua deinceps syncopis

AA



oritur, nec inter se differunt nisi secundum magis & minus, palpitatio est quædam dilatatio atq; contractio præter naturæ ordinem facta cardiaca uero syncopa est innati roboris labefactio & languor siue præceps uirium lapsus.

Loci consentientes de cardiaca passione.

Mesu. de egritud cor. Aegritudines cordis sunt, debilitas pulsus, tremor & syncopis, non aliter inter se differentes nisi sicut debiles & fortes, debilitas facta fortis, usq; adeo ut sit agitatiua uirtutis facit tremorem, tremor superueniens generat syncopim ultimitas in syncopi est extinctio & mors. B. nota q; arabes pro palpitatione cordis tremorem dicunt ne scientes inter palpitationem & tremorem interstinguere, sed de his fusius dicemus in fine huius morbi.

Gal. lib. de tre. & palp. cap. 5. Palpitatio est quædam dilatatio atq; contractio præter naturæ ordinem. Et. 12, meth. cap. 5. syncopa est præceps uirium lapsus.

Auic. decima tertij, cap. 6. Syncopa est destructio maioris partis plurium uirtutum motiue ex sensibilis propter debilitatem cordis & aggregationem totius ad ipsam &c.

Decausis syncopæ.

Cause syncopæ sunt uel extraneæ uel interaneæ extraneæ sunt ambiētis aeris malitia, uel res uenenatæ, uel animalium uenena, uel aliquis animi affectus, qualis est ingens dolor timor &c. uel plures motus uigiliæ respirationis prohibitio &c. Cause interaneæ uel primario affectu fiunt, uel per consensum totius & partis. Si primario affectu, erunt, uel mala intemperies cal. frig. sic. hu. uel mala compositio obstruens & spiritus præfocans, uel solutio continui, quæ si fuerit in superficie mors usq; ad diem secundum prolongatur, si ad uentriculos penetret statim interficit, uel erit aliqua inflammatio uel abscessus ex quibus breuiter aut aliqua mora facta mors



sequitur. Si per consensum totius corporis tunc uel erit febris acuta coliquans, uel uehementis raritas corporis ex qua magna sudoris copia elicitur. Si per consensum partis uel erit ab ore uentriculi uel a mala hepatis dispositione, aut uteri strangu-  
latu, aut a retentis menstribus, aut a uermibus, aut ab immodica hemorrhoidarum euacuatione aut a medicamento fiet.

#### Loci consentientes de causis syncopæ.

Gal. 12. meth. cap. 7. Occasiones quibus syncopæ succedunt sunt sex dolor uehemens, uigilie, immodica innanitio, interdum motus, & principiorum intemperies & cap. 5. eiusdem fit syncopæ ex ambientis aeris malitia, uel ex uenenatis facultatibus, uel ex animalium uenenis uel ex aliquo affectu animi & pluribus motibus, ex uigilijs, ex immodica eius tenuitate ex continentium corporum raritudine, ex respiratu prohibito et ex nutrimenti defectu &c. De alijs uero causis loquitur. s. de loc. aff. cap. 1. ibi affectus cordis si primario affectu fiat, erunt aut male intemperies, aut uenenosus humor, aut erysypelas, aut inflammatio aut alius quipiam præter naturalis tumor &c. Lege de alijs a me recitatis totum hoc caput, & 12. meth. ibi, si per consensum ab ore stomachi &c. Vide etiam de his quæ per compatiendi rationem fiunt Mes. longo satis sermone pertractantem, et Auic. decima tertij, cap. 6. et Paul. lib. 2. cap. 38. Similiter uide Act. & reliquos practiçantes, nam Auic. tres causas ponit quarum, Prima est attractio, totius aut maioris partis spiritus ad cor. Secunda est præfocatio spiritus in corde spiraculum nõ inuenientis. Tertia est paucitas spiritus in toto, ita ut non superfluat præter illum qui est in minera &c.

#### De signis syncopæ.

Signa ipsius syncopæ est animi defectus, pulsus parui, extremorum frigus & sudor frigidus pererrumpens. Signa pri-



marij affectus sunt quia nullam manifestā causam in alijs mē-  
 bris inuenitur, nec in ore stomachi, quū nō adsit nec uomitus  
 nec, nausea, Signa malæ cōplexionis calide sine materia sunt  
 caliditas æstus, incendium, febris, pulsus frequens & uelox.  
 Signa compl. frig sunt pulsus & anhelitus tardus rarus, Præ-  
 cefferuntq; longa ægrotudo, sanguinisq; euacuatio & c. adest  
 somnolentia color pallidus, Signa sicce comp sunt extenuatio  
 corporis, nulla sentitur humiditas plus durus & c. Si sanguis  
 uel bilis peccet, sentitur caliditas pulsus magnus plenus for-  
 tis. Si melancholia, adest timor tristitia sollicitudo pulsus du-  
 rus & c. Si pituita, abest sitis, cor percipitur ac si in aqua na-  
 taret, pulsus mollis & c. Signa opilationis sunt, diuersitas in  
 pulsus percepta cum imbecillitate et paruitate & c. Signa per  
 consensum sumuntur a membris communicantibus materiā,  
 Nam si a cerebro tunc præcessit dolor capitis uertigines, ima-  
 ginationes falsæ Si ab hepate cognoscitur ex debilitate calidi-  
 tate & grauitate in eo percepta cum suis alijs morbis. Si a  
 pulmone cognoscitur ex difficultate spirandi ex tussi & ex  
 catharrho. Si a stomacho cognoscitur ex uomitu nausea, diffi-  
 cultate digerendi & c.

#### Loci consentientes de signis syncopæ.

Paul. lib. 3 cap. 34. Notæ ipsius sunt, resolutio animæq; defe-  
 ctus, pulsuum paruitas, extremorū frigiditas & in sudorem  
 prorumptio. At si cor incaluerit magnam crebrāq; edi respi-  
 rationem, si refrixerit exiguam & raram.

De signis primarij affectus & per consensum. Lege Auic.  
 decima tertij, cap. 7. ibi, Et quādo syncopis non habet causam  
 manifestam & est cum tremore cordis frequente & non est  
 quod est in ore stomachi causa faciens ipsam, tunc ea est cor-  
 dialis confirmata, illa uero cum qua est nausea & conturba-  
 tio est stomachalis & c. Loci de alijs signis habentur fusius ab



ipso Avic cap. de signis tre. cordis similiter ab Arcul. Sauro. & Gor. & ab alijs.

### De cura tremoris cordis ac syncopæ.

Primum regimen erit contrarium causæ efficienti tremorem siue palpitationem nam si fuerit causa calida, regimen erit frigidum cordiale, si frigida, calidum &c. Secunda, quæ occurrit intentio erit digestio præsertim si ab aliquo humore fiat, in causa calida cum frigidis, ut cum syrupo uiol. de ribes, de suc. acetosa de limonibus acetoso simp. cum aquis uiolarum rosarum boraginis nenupharis &c. Tertia, erit euacuatio quæ peccante sanguine, (uirtute roborata) fiet per sectionem uenæ in parua quantitate, aut peccante bile per leuia phar-maca qualis est infusio rheubarbari in rebus cordial. cū myrobalanis citrinis cum manna ac casia. Pituita uero superabundante cum diaphinicone electuario indo cum myrobala-nis chebulis & agarico additis semper rebus cord. calidis, in melancholia peccante cum confectiōe hamech. pillulis indidis de lapide lazuli &c. Quarta, intentio est reuulsio qua reuellimus materias a corde & deducimus ad membra igno-bilia cum fricationibus cucurbitulis, cum sectione uenæ saphe-næ cum lotionibus & clysterijs &c. Quinta, est robur cordi addere remouendo intemperiem calidam cum frigidis, ut puta cum rosis camphora sandalis acetosa nenuphare & simili-bus in causa frigida cum calidis ut cum buglosa zedoaria mellisophilo cort. citri, musco ambra &c. aut cū compositis ut puta cum zucharo boraginaceo buglosaceo, electuario de gemis diambra diamusco, hinc etiam parari possunt epithe-mata. unctiones. sacculi pulueres &c. Syncopis maxime si in paroxysmo fuerit tres in eius cura requirit intentiones. Qua-rum prima prohibet resolutionē spirituum qui remanserūt, ne omnino resoluantur & sit cum irroratione faciei cum



aqua rosacea acetoq; mixta uel aqua frigida uel uino. Secūda, regenerat spiritus & uirtutem reborat, unde huc spectant, aromatica, & quæ cito reficiunt, qualia sunt uinum oua sorbilia, aqua carnis & similia. Tertia excitat uires & conuertit uapores & spiritus ad exteriora, cum fricatione extremi tatum, cum prouocatione sternutationis, facta com acri aceto & heleboro albo & c.

#### Loci de cura syncopæ.

Auice undecima tertij. tra. 2. cap. 4. de cura a causa calida inquit & stude ut sit aer in frigidatus ultima in frigidatione, ut sint rorationes et odoramenta aromatica camphorata & c. ubi comendat etiam res in cibo acetosas cum succis fructuum agresta & malis acetosis & c. Pro secunda intentione inquit da ei ad sorbendum syrupum de fructibus & c. Pro tertia intentione in materiali omni feratur auxilium cum euacuationis in sanguineo cum phlebotomia & extractione sanguinis ultima & c. lege eum fusius & plura inuenies a me dicta. Lege in super Arcul. Marc. Cati. Sauo. & Gord. et ceteros neotericos. De cura syncopis loquitur Gale 12. meth. cap. 5. Quum essentia uixium quibus regitur corpus tum in spiritu, tum in solidorum corporum temperamento consistat, hæc si integra sint seruari debent, si corrupta ad integrum reuocanda. Quæ igitur portio defluit hanc apponendo resarcimus, quod altera scit, in debitam temperiem per contrariam alterationem uindicemus & c. B. Habes curam illius syncopæ quæ per consensum oris uentriculi fieri solet ab ipso Gale 12. meth. cap. 3. præcipue si a crudis crassisque humoribus fiat, si uero a flaua bile habes similiter curam cap. 5. eiusdē lib. ibi, at quibus ex flaua bile quæ os uentriculi infestet, syncopa incidit & c. Lege Paul. agi. cap. 26. & 37. lib. 2. omnia ex Galeno satis belle recitantem & c.

Quot modis dicatur Medicina cordialis.



Auic. in lib. de uiribus cordis septem modis dicitur Medicina cordialis, Primo quia reficit spiritus & nutrit ut uinum & de hoc etiam loquitur ipse secunda primi summa de pulsibus, & undecima tertij, in cura syncopis similiter aqua carnis oua & similia. Secundo quia illustrat spiritus ut margaritæ & siricum. Tertio quia congregat substantiam cordis & spiritus prohibendo resolutionem eorum ut charabe terra sigilata, bolus armena. Quarto quia amica est cordi quale est dulce & odoriferum. Quinto quia per uirtutem suam alterant & uiuificant roborando per qualitates manifestas qualia sunt simplicia temperata ut borago buglossum aurum. Sexto quia euacuant depurando humorem melancholicum a corpore, aut euacuando quod nocet cordi ut sunt myrobalani etc. Septimo quia sua proprietate occulta roborat ac confortat cor, ut iacintus semina citri, buglossum & c.

#### Observationes in cura.

Auic. undecima tertij, tra. 1. cap. de can. uiribus cor. oportet ut sit uelox studium in cura malarum dispositionum cordis, ita ut non fiat error, quia incorrigibilis esset quod non accideret alijs membris & c.

#### Observationes in euacuatione.

Auic. loc. cit. obseruamus ne superfluat & cadat uirtus, deinde post euacuationem uiuificemus uirtutem, Repletio sanguinea remouetur phlebotomia basilicæ dextræ, & repletio uaporosa cum phlebotomia basilicæ sinistræ, In alijs euacuationibus misceantur medicina cordiales & c. Mich. Sauo. de mente Auic. inquit audaciores esse debemus in administrando phlebotomiam in aegritudinibus cordis quam pharmaciā, nam phlebotomia non peruenit ad cor ledendo sicuti pharmacia cum suis uaporibus.

#### Observationes in remouenda mala complexione.



Auic. in cura calide, si inueneris uirtutem debilem & timueris extinctionem, non erit excusatio quin permisceas frigida calidis. Marc. Cat. non debemus excessiue calidis & frigidis uti, & quum infrigidare desideramus, medicinam calidam aromaticam miscere debemus, quia frigida claudunt uias & penetrare non possunt, uel hæc simul miscemus ut naturalis color & spiritus una conseruentur, nam Auic. confidimus q. si natura fuerit fortis, discernet inter frigidum et calidum & afferet frigidum cordi & calidum spiritui & c. Vide eum fusius: Gale. 12 meth. cap. 5. ad robur uirtutis conseruandum & ad syncopalem accessionem, quo minus de repente incidat, cauendam, singulare præsidium est temperamēti custodia & c. Vide Mesu. de his & c.

Nocentia ac conferentia cordi.

Nocent cordi, alsecebram, colocynthis, euphorbium, genista, mezereon, lac, scamonium. Conferunt debilitati, syncopi et tremori, aurum, caro chochlearum, margaritæ, menta, mel lissa, & xyloaloes, ambra, borago, cinnamomum, crocus, granata acetosa lapis lazuli, acetosa, myrobalani, aqua florum mirti, rosa, poma acetosa, sandali, sena, spica inda, spodium, os de corde cerui, omphacium, zingiber, perdix, siricum, argentum, been, acetositas citri, coralli, coriandrum, doronici, emblici, endiuiæ, epithimum, folium, charabe, mumia, rheubarbarum, persica, uinum, oua, composita sunt diamargariton. electuarium de pomis mes. diamusculus dulcis, aromaticum muscatum mes. electuarium de gemis mes. pliris arcticon nic. confectio xyloaloes mes. diasenæ diaanthos diarodon nic. electuarium letificans mes. zucharum ros. boraginaceum diambra, ambra cum ligno aloe & osse de corde cerui cum aqua rosacea in modum pillularum, electuarium de citro, prælator, regum, mes. gallia muscata, oleum miliniæ



mes. oleum basiliconis nic persica & pira condita, rob de ri-  
bes de berberis de sumach de pomis de granatis acetosis de ci-  
tro, syrupus ros. de pomis de acetosa theriaca magna Auicen.  
triphera ioanitiij mes. teodoricon magnū troc, de xyloaloes,  
de musco almans, potio muscata nic. sotyra confectio & c.

De pronosticis syncopis & palpitationis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 65. In febribus circa uentriculum  
& fortis aestus & cordis tremor uel dolor malum. Et apho.  
2. apho. 41. Qui frequenter ac fortiter absq; causa manifesta  
exoluuntur de repente moriuntur.

Paul. lib. 3. ca. 34. si syncope ualida sit medicinae locus non  
est, sed si uires adhuc tantillum constent, aliquando ad sani-  
tatem recursus est & c. Gal. 12. meth. cap. 6. Existimandi sunt  
in sanabiles qui uiribus iam languentibus aliquod eorum uis-  
cus phlegmone infestetur, quoniam nutrire eos assidue non  
possumus nec seruare eos, si non nutriantur, licet & c. Auice.  
undecima tertij, tra. 2. ca. 6. & scias q; syncopis confirmata  
curam non recipit, & proprie quando perducit ad uiridita-  
tem faciei & conuersionem colli & ille cuius res peruenit  
ad hoc, tunc quum caput eleuat, statim moritur. B. Tria requi-  
runtur ad hoc ut confirmata dicatur, Primum q; sit continua,  
Secundum ut sit ut uehemens, Tertium q; nulla adsit causa  
manifesta ut dictum est in aphor. Gal. 12 meth. cap. 5. si copia  
humorum crudorum uires præmant & propter tum multi-  
tudinem tum crassitiem exiguos animalis meatus obstruant  
iam multis nominibus exitialis est syncope & c. Auic. loc. cit.  
Quumq; confirmatur in corde malitia complexionis non re-  
cipit curam, & quando non est confirmato non facile cura-  
tur, apostema quidem calidum est interficiens statim & fri-  
gidum ex eis est quæ sunt difficilia, quumq; cor non tolleret ut  
apostemetur, quomodo tollerabit ut collectio & saniositas in



ipso fiat, cor longinquius est adhuc ut toleret solutionem singularis. Et quando accidit ut penetret usque aduentres eius interficit statim, & si non est penetrans postponitur eius interfectio usque ad secundum diem. Et quando permutantur materię expulsę ad cor expleuritide & peripneumonia sunt causę magni timoris & mortis subitę. Et quando calor purus aut frigus purum peruenit ad cor moritur, & quandoquid congelatum loqui & iam moriebatur cum sudore & c. lege hunc locum fusius.

Authores dissentientes circa cardiacas passiones.

- 1 Adserere, idem esse palpitationem & tremorem cordis.
- 2 Adserere, syncopim frequenter accidentem esse signum mortale.
- 3 Adserere, sectionem uenę usque ad syncopim non esse faciendam cum Auerroe.
- 4 Adserere, uinum in defectu animi non esse exhibendum.
- 5 Adserere, in actu syncopis resicientia spiritus non premiti debere stypticis.
- 6 Adserere, syncopim & lipopsychiam nullo modo inuicem differre.

Confutatio dissentietium circa cardiacas passiones.

Inpugnat primum Gal. lib. de tre. & palp. ca. 5. ibi. tremor est parti quę sursum uicissimque deorsum feruntur, inuoluntarius motus, sed sursum ferri & distrahi, & ferri deorsum & contrahi non idem est, igitur nec tremor & palpitatio idem sunt & c.

Ad secundum Gal. aphor. 2. cōm. 41. Non omnes qui exoliuntur de repente moriuntur, sed qui sæpius, fortiter, ac sine causa manifesta exoliuntur igitur frequens syncopis hoc non efficit, sed tantum seruatis tribus dictis conditionibus.

Ad tertium Gal. apho. 1. cōm. 23. In maximis inflamma



tionibus & in febribus adurentibus, mensura euacuationis est usq; ad animi defectum, nam in febribus ardentij. imis statim totius corporis habitus refrigeratur. febris extinguitur et plurimis aluus citatur sudores emanant & c. In maximis vero doloribus nullum maius inueni remedium quam usq; ad animi defectum euacuare & c. unde argumenta Auerrois non concludunt quum plerunq; ea quæ natura incohat ars deinde perficiat & econuerso.

Ad quartum, Respondetur q; si uinum interdici deberet, maxime ijs qui syncopi laborant ex flaua bile interdiceretur, sed Gal. 12. meth. ca. 4. omnibus quos syncope male habet offerri iubet, eo q; deductionem in corpus promoueat, igitur in syncopi uinum erit exhibendum, intellige tu omnibus phlegmone in teriori non laborantibus & c.

Ad quintum, Respondetur, q; a Au exñs syncopis refici uirtus desiderat, & sic præcedent reficientia stypticis, sed si timeatur de futura syncopi, ob nimiam euacuationem, debent præmitti styptica & hæc ex Gal. 12. meth. ca. 6.

Ad sextum, Gal. 12. meth. ca. 5. loquens de succis grauanti- bus ac obstruentibus inquit, q; si nec obstruant, nec onerent, syncopem. ij. certe non inferunt, sed quas lipopsychias græci, uocant, ubi lipopsychiam a syncopi differre dicit, Præterea syncopis accipitur tanquam genus lipopsychia tanquam species, igitur aliquo modo in ter se differunt & c.

De uomitu nausea & uuluolosa subuersione.

Vomitum est motus facultatis expulsiuæ stomachi, cum quo expellitur id quod est noxium per uiam oris.

Loci contentientes de uomitu & c.

Gale. 6. de sympt. cau. ca. 2. Accipit nauseam pro uomitu, dum inquit, Nausea est expultricis facultatis motus deprauatus, quo per gulam id celerrime euacuatur quod uetriculo



est noxium, Interdum accipitur nausea per preuia ad uomitum dispositione, sicuti primo de loc. aff. cap. 4. dum inquit, Quod si humor quispiam in ipsis uentriculi tunicis continetur, nausea quidem uexabit, sed inanis & sine uomitu & que irritat duntaxat nullum humorem euacuans, & c. Et octauo de comp. med. per loc. cap. 2. Appellant eos stomachichos quibus nausea contingit & maxime si ad uomitum impellat, erunt igitur quatuor se inuicem sequentia symptomata, primū *αυτοπύεξις*, quæ fit quū stomachus intemperie uitiosus, aut humorum r edundantia cibos auersatur, hæc dum crescit nauseam parit, ex qua adhuc aucta, subuersio oritur, quæ fit dum fundus stomachi ad superiora uertitur, unde quum uehemens est subuersio uoluulosa, a Gale. 8. de comp. med. per loc. cap. 3. dicitur, non minus ac si uehementi contentione & uiolentia, ueluti in uoluulis siue ileis dum stercora uomuntur subuersio fiat, a qua demum uomitus siue reiectatio fieri solet & c. Auic. 13. cap. de uom. uomitus & subuersio sunt motus stomachi ad expellendum ex eo quod est in eo per uiam oris

#### De causis uomitus & nausæ.

Causæ procatactice sunt aer corruptus fædi odoris, cibibus & potus in odore sapore malus, aut nimia eius assumptio, aut mala eius preparatio & unctuositas, motus a cibo statim laboriosus ira & cætera animi accidentia imaginatio ali cuius rei obscene, similiter casus percussio, ueneni potus & animalium uenenosorum morsus.

Causæ antecedentes per essentiam sunt mala intemperies calid. frig. aquea, & flatuosa, materie stomacho inherentes uel natantes, quæ grauando pungendo ac extendendo uomitum excitant, Item acuitas sensus oris stomachi, mala compositio sicuti accidit in opilatione pyloron. i. ianitoris, uel moribus in numero, ut uermis mordicando ac pungendo, solutio



continui inflammatio & abscessus, pustula dolor & imbecillitas ipsius stomachi &c.

Cause p cōsensum uel fiunt a toto ut in febribus & tunc uel est creticus uel symptomaticus sicuti accidit in febribus malignis & est pessimus, uel fit a parte sicuti a cerebro materias transmittente, uel ipso percusso & uulnerato, uel ab hepate splene intestinis &c.

#### Loci consentientes de causis uomitus.

De causis primitiuis lege Arcul. & ceteros practi-  
Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2. circa medium, huiusmodi excre-  
tiones fiunt interim grauo ob multitudinē uētriculo, ut cuius  
plurimū cibi ingestum est, interim ob rē mordacē, quēadmo-  
dū p cruditates cibus ingestus uel acidum ructum uel nidorem  
uel amarorem uel acrimoniam refert, & in hoc genere con-  
tinentur pituitosa ac biliosa & serosa excrementa tum ibi  
nata tum ex uniuerso habitu animātis in ipsum deriuata. Est  
& tertium causarum genus quibus uenterculus ad uomendū  
concitatur, nulla uel graui uel mordaci re ipsum irritante, sed  
ob id duntaxat, quod præter naturam quippiam in eo conti-  
netur, uocantur præter naturam quęcunq; postquam concocta  
sunt, alere non possunt, quare non tam acida pituita & salsa,  
uerum dulcis & sanguis quandoque in uentriculo consisten-  
tes ipsum ad uomitum impellunt &c. Lege etiam Gal. 1. de  
loc. aff. cap. 4. Item aphor. 6. comm. 1. &c. Habes etiam de his  
causis sensum Auic. 13. tra. 5. cap. 8. ibi, Et id quod commouet  
os stomachi ad uomitum, aut est qualitas operatiua operatio-  
ne materię ex qua leditur membri comunicātis ut cerebri,  
aut aduentus percussiois, aut materia grossa imbibita aut in-  
fusa in ipso corrumpens cibum &c. Lege eum fusius, de his  
Arcul. uberius agit &c.

#### De signis uomitus &c.



Signa ad uomitum præcedentia sunt, nausea subuersio, tremor labiorum et hypocondriorum tensio. Signa uomitus qui fit per consensum sunt q̄ si a toto, uel a parte fiat, in eorū augmento uomitus & nausea augetur et in eorum morbi decremento minuitur. Indicia per essentiam sunt primo, si a nuda & mala intemperie sine materia fiat, q̄ tristis quidam aderit sensus in ore uentriculi, nec ulla aderit in uentriculo grauitas nec ructus exiens erit alicuius extranei saporis, sed frequens & inanis aderit nausea absq; uomitu. Signa a mala intemperie cū materia sumuntur a grauitate percepta, a ructus s̄. pore siue amaro dulci acido & fetido, a siti si humor sit calidis a putrefactione & ab eo q̄ uomitur. Indicia obstructionis pyleron sunt tarda concoctio & cibi descensus nisi more in causa sint aliæ cause. Signa uermium erunt commotio quædam, siue titilatio circa uentriculum. Signa solute continuitatis sumuntur a dolore ab exitu sanguinis & a similibus & c.

#### Locī consentientes de signis uomitus.

Auic. decima tertia tertij, tra. 5. Signa uomitus antecedentia sunt nausea subuersio tremor labium accidit tensio hypocondriorum. Signa humoris calidi putridi sunt sitis & sapor malus in ore et putrefactio apparens & c. Vide de alijs signis eum fusius. Gal. lib. de plen. circa finem libri, de his etiā signis mentionem fecit ibi. patet stomachum hoc loco appellari os ipsius uentriculi, ubi si pituita colligatur appetitiones excitat, si uero bilis flaua fuerit sitim & cibi fastidiū pariet, præterea os erit illis amarulentum, at si atrabilis, morosi et tristes & sine siti, saliuæq; plurimum illis scatet, nec tamen omnes cibum fastidiunt immo eorum in quibus atrabilis accida fuerit, nonnulli satis famelici sunt & c. Lege etiam primo, de loc. aff. cap. 4. ibi, rursus distinguendo inuestigabimus num ab iis



temperie ipsius uentriculi hoc eueniat, an a flaua bile in ipso contenta, an a iocinore, male suo officitio fungente, an is ex uniuerso defluat corpore, an etiam in ipso gignatur uentriculo & c. B. ex hoc loco postremo elice q̄ ex frigido ciborum cupiditas excitatur & c. lege de sig omnibus Arcul. & Sauo, & Gord. fusiſſime loquentes. Vide etiam platearium & c.

#### De cura uomitus.

In cura uomitus primum, considera an cibalis sit an humoralis, item an creticus an symptomaticus, si cibalis uel per essentiam uel consensum, si per essentiam tunc quatuor erunt curandi intentiones. Prima est causa uomitus remotio. Secunda, est uentriculi roboratio. Tertia, est diuersio & accidentiū correctio. Quarta, est uictus ratio. Prima igitur & secunda, intentio uno & eodem tpe cum contrarijs moderate stipticis alterantibus malam complexionem remouebitur. Tertia, perficietur cum reuulsione cum cucurbitulis suppositorijs clysterijs frictionibus, q̄ si acciderit syncopis eisdemet auxilijs ut supradictum est, curabitur. Quarta intentio sit moderantia in cibo & potu, participant aliqua stipticitate remedia et cibaria, sintq̄ faciliſ concocionis, saporis non ingrati, uini laudabile & quod patienti placeat & c. Si uero fuerit uomitus per consensum, tunc moderanda erit siue totius siue partis consentientis dispositio, similiterq̄ roborandus erit stomachus cum his quæ exterius & interius applicari possunt, deinde cum diuersionibus prohibere fluxum humorum ad stomachum. Quod si uomitus sit creticus, tunc uel integre iudicatur, & sic natura relinquendus uel in aliquo deficit & tunc in eo quod deficit supplere oportet si uero superfluat compescendus est. Vomitus uero symptomaticus uel ex stomacho prouenit, uel ab alijs membris aliunde deriuatur. Si primo tunc intentiones medendi erunt tres. Prima euacuatio humoris in



uentriculo contenti. Secunda est stomachi intemperies corrigenda simulq; stomachus roborandus. Tertia est diuersio ne fluant ab alijs membris humores & accidentium correctio quæ omnia etiam supra relata sunt. Si ab alijs membri proueniat uomitus, similiter in primis euacuandum deinde diuertendum & membra tam mandantia quam suscipientia roborandum, ut alterum ne mittat, & alterum ne suscipiat prohibeamus &c. Vomitus igitur si nõ fuerit qualis esse oporteat, tunc si sanguis cum alijs humoribus peccauerit, seccanda erit uena communis, maxime etiam si ex suppressione mestrurum & hemorrhoidarum proueniat. Si uero a sanguine peccet alijs humores tunc facta aliquali preparatione sicuti in bile peccante cum oxysachara syr. de agresta de granatis de citro de limonibus de endiuiâ de citonijs de papauere cum aquis endiuiæ plantaginis lupulorum &c. In pituita cum rhodomelle syr. de absinthio de menta de bisantijs de fumo terræ de epithimo cum aquis mente absinthij &c. Fiat euacuatio in bile cum rheubarbaro myrobalanis cit. pillulis aloephanginis, in pituita cum rheb. et myrobalanis cheb. agarico &c. reuulsio fiat ut dictum est cum cucurbitulis natibus ac coxis affixis cum ligaturis iuncturarum cum locionibus pedum cum proritatione urinae & sudoris. Fluxus etiam intercipitur, uias obstruendo, humores incrassando et uentriculum roborando cum diacitomite & troc. de olibano rases &c.

#### Loci consentientes de cura uomitus.

Auic. decima tertia tertij, tra. 5. cap. 12. Sermo uniuersalis in cura uomitus est huiusmodi, ut qui generatur a corruptione administrationis cibi retificetur, & adiuuetur ex quibusdam confortantibus stomachum boni odoris calidis & frigidis secundum q. conuenit, & ille cuius causa est materia mala, aut plurima euacuetur illa materia cum ebibitis & clysteribus



clysteribus & minoretur etiam cibus et subtilietur &c. Gal.  
 1. de loc. aff. cap. 4. Igitur si ipsum quod molestat nil aliud quā  
 intemperies fuerit, calidam refrigerando & frigidam calefa-  
 ciendo illico hominem iuueris, maxime si uideris refrigeran-  
 tibus tum medicamentis tum uictus ratione hominem sanari  
 & calorificis ledi &c. Lege fusius Gal. 8. de compos. med.  
 per loc. cap. 1. ad finem, & cap. 3. ibi uomitus ob imbecillitatē  
 grauati stomachi oborti curantur, &c. Vide de his Arcul.  
 & Gordonium, &c.

#### Observationes in cura uomitus.

Hip. aphor. 4. aphor. 6. & 7. Graciles & facile uomentes  
 purgare superius cauentes hyemem, uomentes uero difficul-  
 ter & mediocriter carnosos per inferiora, cauentes aestatem.  
 B. quomodo & quibus conueniat uomitus habetur ab Hipp.  
 in lib. de salubri dieta text. 17. ubi inquit uomitus hoc modo  
 irritare oportet homines obesi, ieiuni uomant currendo, aut  
 celeriter eundo, gracilliores & imbecilliores a cibo uomitū  
 prouocent. Lege etiam text. 20. & 22. eiusdem & uide in com-  
 men. latius Galenum.

Gal. lib. de sect. uen. ad finem, caue ne noxam stomacho in-  
 feras nam stomacho leso multæ alie corporis particule lea-  
 duntur &c.

#### Observationes ante uomitum.

Ioan. Arcul. cap. de uom. & eliciuntur ex Auicen. quarta  
 primi, cap. de uomitu, Insueti prius ad uomitū assuescant le-  
 uibus uomittiuis ne ad insueta tam cito fiat transitus. Secūdo,  
 Ante uomitum præcedat uentris lenitio, & cibetur cibus di-  
 uersarum uirtutum mixtis ex incisuiis abstergentibus uisco-  
 sis dulcibus unctuosus acetosis &c. Tertio, Ante uomitum fac  
 quod extrema & stomachus sint calida & quod tempus sit  
 calidum in meridie &c.



## Observationes post uomitum

Ioan. Arcul. finito uomitu lauet sibi faciem cum aqua rosacea, cui parum aceti sit admixtum, lauetq; os ex uino. Tardet cibum per duas horas & quum cibatur, tribuantur res boni odoris & suavis saporis paucae quantitatis facilis digestionis, uelocis penetrationis paucae superfluitatis, dormiat & non bibat &c.

Gal. 8. de compo. med. per loc. cap. 3. erit ob id curationis scopus ut simul ad affectas partes odoratas qualitates imponamus, quales aromatum sunt, nam quemadmodum graueolentia omnia stomachum subuertere solent sic odorata corroborare &c.

## Conferentia uomitui.

Conferunt uomitui, absinthium, acetum scilliticum, acetosa, omphacium alleum, alloe, anethum, anisum, aurata piscis, betonica, calamentum, castanea, cepe, citonium, citrum, corianderum torrefactum, grisomila, endiuiia, feniculum, phystici, garyophillum, malagranata acetosa, lupinus dulcoratus, mastix, mellissa, myrtus, mespila, nux muscata, olibanum, origanum, pira, piper, poma, pulegium, pruna, rosa, rosmarinus, sumach, spica scenoanthos, tamarindi, uuae non recentes acacia, &c. Composita sunt alipta muschata nic. Antidotum emagogum nic. Aquae thermarum, aluminosa, rosacea, aromaticum ros. mes. Confectio alchanzi mes. diacitomiten, diaolibanum nic. electuarium de myrto Auicen phylonium nic. cum posca, menta cum aceto, musc. almans. hiera picra, Gal. Pillula arō. baly. rob de ribes, de acetosa de agresta acetositatis citri, de berberis de citonijs, cornuum, fructuum granatorum pirorum pomorum, sy. de agresta de menta, de acetosa de succis, acetosus de citonijs mes. de fructibus, Auice. de citonijs de granatis de rosis, troc. de rosis de olibano almans. sotira nic. rosata nouella nic.

## De pronosticis uomitus.



Hip. aphor. 1. aphor. 2. In perturbationibus uentris & uomitibus spontinis si talia purgentur, qualia purgari oportet confert & leuiter ferunt, si minus contra. Et apho. 4. aph. 22. Morbis quibus libet incipientibus si atrabilis uel supra uel infra exierit lethale, & c. Et aphor. 7. eiusdem. Vomentes uero difficulter & mediocriter bene carnosos per inferiora timētes astatem. Et aphor. 6. aphor. 15. a longo alui profluuiio habito spontaneus uomitus superueniens morbum soluit. B. hic nota naturam esse medicorum magistrā, nam retractionem edocet quam imitari debet medicus. Et aphor. 7. aphor. 3. a uomitu singultus & oculorum rubor malum. B. quotiescunq; uentriculus ab humoribus infestatur, uel per uomitiones uel inferne eos abijcit & statim a singultu liberatur, quum uero singultus nō desinit, duorum alterum significat, uel cerebrum, uel uentriculum non mediocrem pati inflammationem & c. Et aphor. 7. aphor. 10. Ab ileo uomitus singultus desipientia uel conuulsio malum. B. quia nil ad inferiora descendere signum. Et aphor. 37. eidem quicunq; euomunt sanguinem, si sine febre quidem salutare, si uero cum febre malum, curare uero acerbis & refrigerantibus. B. Intellige de uomitu qui a uentriculo tantum prouenit non a pulmone. Est enim salutaris uomitus quum nullius inflammationis suspicionem afferat praesertim si sine febre fuerit. Vide Gal. in comm. Hip. pronost. 2. cap. 7. uomitio utilissima est si pituita ac bile mixta quam maxime est, si non multa, non crassa est syncerior enim deterior est. Et tex. 39. si uomitio fuerit porracea, aut humida aut nigra, quodcunq; ex his fuerit malum. Et tex. 40. Si idem homo omnes uomit colores exitiale admodum est. Et tex. 41. Vomitio liuida si graue olet ocysimam indicat abolitionē. Et tex. 42. omnis subputris ac fetidus odor in omni uomitione malus & c. B. Gabes rationes ex Gale. quur syncerum deterius sit



per mixto & de alijs quæ tibi in legendo apertissima erunt  
 & c. Auice. tertiadecima tertij. tra. 5. cap. 8. Et ex nausea est,  
 quæ est signum crisis et quandoque est signum malum sicut in  
 febribus pestilentialibus. Et quum multiplicatur in conuale-  
 scentibus indicat conuersionem. Et in administratione uomi-  
 tus cum æqualitate est iuuamentum maximum. Et assiduatio  
 eius maxime debilitat uirtutem stomachi & facit eum lacu-  
 nar superfluitatum. Et uomitus quidem ceticus euadere facit  
 spasmodum, nam accidit febricitanti spasmus aut epilepsia et su-  
 bito euomit humorem ut flos æris & euadit. Et multotiens  
 uomitus sanat ex singultu clamoso. Et ex administratione uo-  
 mitus cum æqualitate conseruantur renes & curantur nocu-  
 menta eorum & nocumentum pedum & eruptio uenarum  
 & c. Et deterior uomitus est ille uomitus sanguinis, nisi secun-  
 dum necessitatem sit. Et amatur quidem ut administretur in  
 mense bis & melior horarum uomitus est quæ est post bal-  
 neum & cibum & c.

#### Authores dissentientes circa uomitum.

- 1 Adserere, uomitum quolibet tempore & in omni homine  
 posse tuto prouocari.
- 2 Adserere, uomitum non nisi a re grauante uel mordaci  
 irritari.
- 3 Adserere, in syncope ex consensu uentriculi facta non con-  
 ferre uomitum.

#### Confutatio dissentientium circa uomitum.

Ad primum, Gal. aphor. 4. comm. 7. Cui imperandus est  
 uomitus oportet ut sit gracilis & facilis ad uomendum &  
 q. non sit hyems. & sic non quolibet tempore prouocandus  
 nec in omni homine, Nam mediocriter carnosos & difficul-  
 ter uomentes per inferiora, non per superiora purgandos  
 admonet & c.



Ad secundum Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2. est & aliud causarum genus quibus uenter ad uomendi impetum concitatur, nulla uel graui, uel mordaci re ipsum irritante, sed ob id duntaxat quod præter naturam quidpiam in eo cõtinetur.

Ad tertium dicitur q̄ est opinio Gal. 2. art. cur. ad glau. cap. 14. q̄ prouocetur irritando stomachum, Itidem Auic. 2. 3. de cura syncopis, Item Haly abbas. 6. pract. cap. de syncopi & in hoc latet Auerois quantumlibet, uerum si syncopis cum sudore fieret, hunc nequaquam fieri iubet. Auic. loco citato & c.

De corruptione concoctionis & eius imbecillitate.

Cõcoctio est secundum qualitatem quam nimirum uenter facit, dum cibos sibi similes reddit alteratio, quæ trifariã leditur, uel omnino abolita est, et talis permanet cibus, qualis ingestus est uel imbecilla fit & cibus tarde concoquitur unde ὀψαδὺς ὑπερβαῖα i. tarda cõcoctio a grecis dicitur, uel deprauata est & tunc cibus in alienam qualitatem permutat̃ur unde ἀπερβαῖα i. cruditas appellatur, Cibus uero interdum & ipse ita corrumpitur, ut nullam concoctionem admittere possit, & nullum proprium nomen habet & c.

Loci consentientes de corrup. concoctionis.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1. Concoctio est secundum qualitatem quam nimirum uenter facit dum sibi similes cibos reddit alteratio & c. lege eum fusius.

Et tertio de sympt. cau. cap. 4. Alteratrix similiter uel omnino abolita est quum cibus secundum omnes qualitates talis permanet, qualis assumptus est, Imbecilla quum tarde concoquit, Deprauata quum in alienam qualitatem cibi permutat̃ur & c. lege eum fusius, Lege etiam. 6. de symp. cau. cap. 1. ibi. At bisariam uitium fieri potest, aut enim tarde alterantur cibi, ut uix propriam transmutationem suscipiant, aut corrumpuntur omnino ut nullam concoctionem admittant, illud



*ἁπαρὺν* uero, Hoc uero nullum proprium nomen habet, Vide Auic. 13. 3. Tr. cap. 1. ibi et cibus aut conuertitur ad id quod facit digestionem integram, aut conuertitur ad id quod digeritur digestionem aliquam non integram etc. lege eum fusius.

De causis corrupt. concoctionis ac eius imbecillitatis.

Causae primitivae imbecillitatis concoctionis sunt aer corruptus fetidus, uaporibus malis admixtus, similiter uentriculi uel alicuius membri sibi compatiens caliditas nimium dissolvens, aut frigiditas calorem natium extinguens, Cibus qui sua qualitate mala, aut sua quantitate confici non potest aut quia intempestiue, aut non recto ordine, aut quum diuersimode ingeritur, Potus similiter quum bibitur plusquam ad cibum spectet, Coitus à cibo, & accidentia animi immoderata spiritus comouentia & c. Causae antecedentes & coniunctae per se sunt, mala uentriculi compositio, mala figura, ut si fuerit maior uel minor quam deceat, uel figure rotundae, quum naturaliter oblonga sit Causa similiter erit lapsus ad frigidam & siccam intemperiem, & humores cuiuscunq; generis in uentriculo superfluentes, Per consensum a toto fit etiam imbecillitas cōcoctio sicut in febribus hydrope, crisi, & c. a parte ut laeso cerebro splene hepate & c. Causae corruptionis uel erunt in uentriculo, uel in cibus aut in rebus superuenientibus, Si in uentriculo, uel fiet per proprios uentriculi morbos ex quibus corruptio ciborum sequitur sicuti ex solutione continui ex eius inflammatione & c. Si in cibus uel corruptio fiet per suam malam qualitatem, uel uaporosam uel acidam, aut fetidam aut putridam & c. uel per suam quantitatem ut dictum est & c. In rebus superuenientibus sicuti ab errore externo accidente, uel a uitiosis humoribus in ipso cumulatis.

Loci consentientes de causis.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1. causa cōis est alteratricis poten-



tia a scopo aberratio, fit autem bifariam, uel a potentia ipsa affecta, uel ab externo errore, Potentia rursus bifariam laeditur uel per suam ipsius essentiam, aut per aliquem instrumentorum morbum, error triplex est, uel a uentriculi excrementis aut a cibis, aut dormiendi tpe, Per suam essentiam ex intemperie quadam agentium qualitatum, Per instrumentorum morbos per erysipelata ædemata phlegmones scirrhus abscessus & pp alios morbos simplices & compositos in uentriculo existentes quibus male uentriculus concoquit laesa existentes eius potentia Interdum etiam animal non concoquit, aut ob immodicam ciborum potuumq; quantitatem aut prauam qualitatem, aut quia intempestiue, aut non recto ordine ingerantur &c. Lege Gal. 1. de loc. aff. cap. 3. ibi, corruptionis ciborum tres sunt differentie &c.

Auic. 13. 1. cap. de corrupt. dig. Et ad sumum causa in hoc aut est cibo aut in receptore cibi aut in rebus accidentibus superuenientibus eis &c. Vide eum fusius nam ibi omnes cause recitantur quæ nuper a medicis sunt &c. Vide etiam Gale. 3. de loc. aff. cap. 6. ibi quia concoctionis opus &c. ibique intelliges q, digestio fit in fundo uentriculi sicuti in eius ore ipse appetitus &c. Lege etiam Arcul.

De signis corrupt. concoctionis ac eius imbecillitatis.

Indicia debilis concoctionis cognoscuntur ex grauitate extensione & ex mala cibi tollerantia, Cognoscuntur etiam ex uisu & patientis relatu ex uentositate ex rugitu ex mora cibi in stomacho, ex pauca corporis refectioe, faciei; pallore & ex multo sputo, Signa diminuta concoctionis sunt si post decimam horam ructus odorem malum redoleat, Signa corrupta sunt si nidorosum fetidūq; aut aliam non consuetā qualitatem sapiat, Signa male temperaturæ & male compositionis soluti; continui ex dolore & ex his que de uomitu



dicta sunt iam patent, Intemperiem uero frigidam, & humidam attestantur, sitis modica sapor insipidus acidus ructus, color linguae albus pallor uultus cum albedine, Calida uero & siccam, demonstrat sitis assidua, sapor oris amarus & ructus foetens nidorosus, color linguae flauus, pallor cum flauitie, Attestantur esse in stomacho flatum, Rugitus & extensio, Signa corruptae concoctionis & materiae corruptae, sunt faetor, sapor inconsuetus & horribilis Nausea uomitus singultus & syncopis, Vbi uero mora fuerit pluriū dierum et non continuo haec adsint, aliunde materiam prouenire indicium certum est & c.

#### Loci consentientes de signis corrupt.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1. Corruptiones nidorose sunt a calidioribus & biliosioribus, Acide a frigidioribus et magis pituitosis, Acidas quidem creant quae pituitosa sunt et frigida fumosas quae calida & biliosa, & paulo post. Tardas et iam concoctiones cibi difficulter corruptibiles faciunt, si ultra quam uires tollerant sumantur similiter & uigiliae & c. lege locum fusius. Auic. 13. 3. Tr. 3. cap. 4. Illam quae leuis est significant grauitas & extensio & remanentia cibi in stomacho longior & c. Vide Auic. fusius hic & in cap. de corrupt. digestionis similiter Arcul. Cord. & ceteros practi- cantes et habebis quaecumque a me recitata sunt, & c.

#### De cura corruptae concoctionis & eius imbecillitatis.

Considerandum an per se uel per consensum ab alijs partibus afficiatur stomachus, si per se, tunc si a modica repletione fiat, per somnum longum sanabitur. Si uero a multa repletione, tunc edueto per uomitum cibo iam corrupto cum alijs humoribus admixtis, primum stomachi discrasiam per sui contrarium curato, & causas quae alteratricem facultatem debilitant auferro uentriculumque roborato, Vnde in causa fri-



gidi roboratur uenterculus simulq; materia preparatur cum  
 syrupo de absinthio de Mēta cum miua citoniorū aromatica,  
 cum rhodomelle, cum aquis absinthij mentæ, Roborant etiā  
 uenterculū plurimæ confectiones sicut Aromaticum ros. Dia  
 gallangā, Diaciminum, Diatrionpipereon &c. In causa ca=  
 lida primum facta euacuatione uel per uomitū uel per seces=  
 sum, materiæ preparatio fiet cum syr. rosaceo & alijs quæ  
 supra in cap. uom. memorata sunt, At si per consensum mor=  
 bus fiat, tunc quod transmittit membrum corrige per euacua=  
 tionem & reuulsionem, & stomachus ne humores aliunde  
 fluentes recipiat, roboretur, & sui demū intemperies per=  
 mutetur resq; non naturales in contrarium ordinetur. &c.

**Loci consentientes de cura corruptæ concoction. &c.**

Aet. ser. 9. cap. 24. Si a ciborum corruptione fiat cruditas,  
 statim per uomitum tollenda est corruptio, Quod si quis na=  
 tura difficulter euomat enemate succuratur, Si a defectu uen=  
 triculi cum his quæ concoctionem adiuuant curato &c.

Auice. 13. 3. tra. 3. cap. 5. Cum fuerit debilitas digestionis a  
 causa leui aut a repletionē antecedēte non plurima, tunc suf=  
 ficit in ea longitudo somni &c. lege eum fusius, Lege etiam  
 cap. 7. ibi primum est ut educatur corruptum in stomacho  
 cum uomitu aut solutione uentris, et rectificetur regimē &c.  
 lege eum ulterius et inuenies quodcunq; dictū est, lege Arcul.  
 & Mar. Catinarium &c.

**Observationes in cura cibandi.**

Aet. ser. 9. cap. 24. Ad cauendam cruditatem præuidere de=  
 bemus ut neq; in multitudine, neq; in qualitate eorum quæ  
 in cibo accipiuntur, neq; in acceptionis opportunitate neq; in  
 ordine delinquat sed quæcunque concoquere ualeat ea tantū  
 ingerat &c.

Auic. 13. 3. tra. 3. cap. 7. Cave a frigidis subtilibus quoniā sub



tilia corrumpuntur in eorum stomachis, non uomat ante cibum, ne stomachus debilis fiat, sumatq; res stomachum roborantes &c.

### Observationes in topicis.

Gal. 8. meth. cap. 5. Quaecunq; applicantur stomacho sint ualde calida, nam tepida firmitudinem uentriculi dissolunt, & talia in duplici uase calefacienda sunt ne eorum facultas uicietur &c. Nota etiam quaecunq; dicta sunt de uomitu circa stomachum supra &c.

### Conferentia concoctioni & stomacho.

Conferunt stomacho & concoctioni proficiunt haec simplicia calida & sunt Absinthium, Agaricus, Aloes, Calamentum, calamus aro, cardamomum, cinnamomum, ciperi, nuces cupressi, citrum conditum phistica, galanga, gallia, Gariophilum, grana pini cum zuccharo, Macis, Mastix, laudanum, metha, oliua, olibanus, oua passule, Rheub. Scoria ferri, uinum, xyloaloes, & zuccharum, Composita calida sunt, aromaticum ros. garyophyllatum, diamycinum, confectio Alexandrina, confectio de xyloaloes, de galanga, de citonijs, de Scoria ferri, Cerotum Alexandrinum Mes. emplastrum diaphinicon, oleum masticinum, de absinthio de menta, pilulae stomacicae, aloe phangine. syrup. de absinthio, de menta de fumo terre, de cort. citri, Tyriaca magna, Triphera minor, Troc. de ros. de absinthio, Hiera Gal. Simplicia frigida sunt, acetosa, Acetum, Agrestis, aqua calibeata, Belirici, Berberis, citonia, corallus, Coriandrum. Emplici, endiuiia, Cicorium, Vinum & aqua extinctionis ferri, granata, Karabe, chebuli, lactuca, Myrobalani, Mirtus, Nespila, persica, poma, pruna damascena, ribes, rosa. Sorba sumach, smaragdus, pdix, pellicula interior stomachi gallinarum cap. uen. coriandrum &c. Composita frigida sunt, Dia-citonicen, Diarhodon, electuarium de sorbis, rob de ribes, de



berberis de sumach, de citonijs, de piris de pomis, de grana-  
tis, de citro, syru. de pomis, de citonijs, de Myrto, ros. zucha-  
rum ros. oleum citoniorum, ros. &c.

De pronosticis corruptæ cōcoctionis et eius imbecilli.

Auic. 13. tract. cap. 3. Quandoque perducunt debilitas di-  
gestionis & conuersio cibi ad phlegma ad tremorem & fri-  
gus extremitatum & cōmotionem paroxysmi febris uerum  
pulsus nō est pulsus ut in initio febris. Et dicitur in libro mor-  
tis uelocis qui habens nauseatiua facietatem et tarditatem  
digestionis, bothor apparens niger super oculos eius simili ci-  
ceri, & rubet pars eius & uiridis fit pars alia tunc ipse mo-  
ritur in. 17. Gale. 6. de sympt. cau. cap. 2. Quum coctionis gra-  
dus quatuor enumerentur primus fit in uētriculo. 2. in uenis,  
3. in qualibet parte. 4. qui alterationis species est assimilatio  
dicitur, Porro concoctio uel omnino deficit, uel deprauata  
est, si deficit, corpus assumpto cibo non pascitur & fit atro-  
phia. Si deprauata est fiunt uutiligines leucas & elephas uide  
eum fusius, Auic. 13. 3. tra. 3. cap. 1. sanguis qui non est digestus  
digestione conuenienti naturæ non recipitur a membris sed  
putrescit & fatet, nec fit ex eo nutrimentū, nec bona assimi-  
latio unde non mirum si sequatur lyenteria hydrops scabies  
&c. Imo corrupta digestio in conualescentibus semper reci-  
diuam pronuntiat &c.

Authores dissentientes circa coctionem.

- 1 Ad serere, hominem posse uiuere naturaliter pluribus die-  
bus sine cibo.
- 2 Ad serere, a siccitate & humiditate absque alijs qualitati-  
bus actiuis coctionem ledi.
- 3 Ad serere, posse assignari tēpus moræ ciborū in stomacho.

Confutatio dissentientium circa concoctionem.

Impugnat primum Gentilis & experientia nam quum re



citasset ex Alberto uetulam in lombardia uixisse per. 40. dies sine cibo, ipse inquit hæc difficilia sunt in homine apud me, nam tales humores deberet potius putrescere & carere regimine nature quam nutrire &c. Vnde naturaliter loquendo non solum impossibile est, sed etiam non credendum &c.

Ad. 2. Auic. de noc. digest. Verum sicca & humida non perueniunt ad hoc. secundum plurimum, ut appareat ex eis solis cum æqualitate ambarum aliarum qualitatum nocumentum in digestionem, igitur non lædunt absq; alijs qualitatibus.

Ad. 3. quum diuersimode loquuti sint auth. de hac re idcirco difficulter tale tempus assignari impossibile existimo nam Auerrois dixit q; tempus moræ est. 16. horarum. gentilis. 10. horarum. Auic. de cur. feb. phlegmat. inquit hora cibi sit post paroxysmum teporem, & eradicationem eius, & ante paroxysmum ad minus quatuor horis, ubi concludi posset q; stomachus in spatio quatuor horarum sit a cibo uacuus. nã superius dixerat, caue ne occurrat paroxysmus nisi uentrem habeat uacuum, &c.

#### De appetitu canino.

Quum appetitus ad naturalem actionem pertineat, non ad animalem ut ipse Gale. ad appetitum necesse est ut præcedat inanitio, deinde inanitarum partiũ naturalis appetitus, hunc mox sequitur uentriculi per uenas suctio, deinde suctionis sensus qui est fames, demum animalis appetitus omnium ultimus hic erit duplex alter ad cibum & est appetitus calidi & sicci, alter ad potum & est appetitus frigidi & humidi, quorum uterq; trifariam aboleri potest, si uel suctionis sensus pereat, uel suctio non fiat uel corpus non inaniatur, unde dicimus q; appetetia, uel est abolita, uel imbecillis uel deprauata. Abolita quum nihil quis appetit, imbecillis quum in appetendo deficiat. Deprauata quum immoderatam cibi potionisq; exhi-



bitione appetat, aut ad alienæ qualitatis desiderium uertitur. Appetitus igitur caninus erit plurimum, quam possit diger intē sior appetentia, a cuius assumptione animal non satiatur, alie nam qualitatem appetere est ac si ea quæ secundum naturam non sunt, quis appetat, qui morbus a Galeno citta. 1. pica siue malacia, eo quod utero gerentes mulierculas infestet, uocatur, ita, ut carbones extinctos & testas & similes absurdos cibos appetant &c.

#### Loci consentientes de appetitu canino.

Gal. 4. de symp. cau. cap. 7. de his longiori sermone de his pertractat quem fusius uidere poteris, facit etiam mentionem de appetitu canino. 6. de loc. aff. cap. 2. ibi, qui canina appetentia uexantur &c Et. 5. de loc. aff. cap. 6. locus affectus demonstratur, ibi, Quæ aut canum moræ &c. & est os uentriculi deuoratorum pondus substinere non ualens &c. Similis etiā sensus habetur in comm. aphor. 20. lib. 2. Vide etiam latius Auic. tertia decima tertij. tex. 8. cap. 10. de corruptione appetitus, & Aet. ser. 9. cap. 20. & 23. de uitioso appetitu uide etiā Arcul. & alios &c.

#### De causis appetitu canini.

Causæ quæ caninum appetitum excitant sunt plures quandoq; excitatur hic appetitus post diurnas euacuationes ac febres prolixas, interdum a uirtute retentrice corporis, quandoq; a uermibus cibum assumptum deuorantibus, interdum a catharrho ad uentriculum stillante, sed ad summum tres erunt præcipue causæ frigiditas. s. cogens ac exprimens, caliditas resoluens & inanitio consumans, frigiditas erit uel acida pituita uel a melancholia &c.

#### Loci consentientes de causis appetitus canini.

Auic. 13. t. 2. cap. 12. Multotiens excitatur hic appetitus caninus post euacuationes & febres prolixas resoluentes & quandoq; accidit ex debilitate uirtutis retentiue in corpore,



Et quandoq; propter caliditatem superfluum in ore stomachi resoluentem &c. lege locum hunc fusius: Gal. 4. de symp. cau. cap. 7. Canina appetentia binæ sunt causæ quarum una est acidorum humorum uitium. altera est plurima per totum corpus inanitio, siue ipsa caloris uim sequatur, siue retētrici facultatis imbecillitatem &c. Habes etiam in. 2. apho. comm. 21. q. canini appetitus uel propter solam intemperaturam frigidiores, uel propter humores acidos quos exorbuat os uentriculi fiant. Similis sensus habetur a paulo li. 2. cap. 51. & ab Aet. ser. 9. cap. 21. & 22. sed latius consule Gal. loco citato, nā præter alia, plura exempla affert de siti immodica, sicuti de messore qui uinum in quo uipera extincta fuerat bibit et mortuus est. item de eo qui ex ueteri uino inebriatus et de his qui in naui aquam marinam bibere ausi sunt, & de quodam febre ardenti laborante &c. quorum causa erat falsus uel biliosus humor uentriculū mordicans quod uero uermes sint causa appetitus canini, legere poteris non solum Auic. sed & neotericos omnes &c.

#### De signis appetitus canini.

Signa humorum acidorum in uentriculo sunt multa deiectio eorum quæ deuorata sunt, Signa inanitionis sunt ipsius habitus exacta inanitio, nec cibus per totum corpus distribuitur. Signa frigiditatis sunt eo q. nulla uel parua adest sitis, copiosa adest deiectio, adest etiam fames assidua, & cibi assumpti grauitas, flatu multiplicatio, praua concoctio cum singultus copia. Signa caliditatis sunt sitis uehemens, corpus non impinguatur, nec quicquam per uomitum uel per secessum excernitur &c.

#### Loci consentientes de signis appetitus canini.

Gal. 4. de symp. cau. cap. 7. canina appetentia si ab acidis humoribus fiat cognosces quia eorum quæ fuerunt ingesta,



multa fiet deiectione, si ab inanitionem quia per habitus exa-  
ctam inanitionem cibus per corpus non digeratur &c. Raz-  
zes. 9. almans. si cibus nec eum grauat, nec ipsum euomit, nec  
per secessum expellit, signum est a ui caloris morbum fieri, si  
uero assidue famem patitur & cibus post assumptionem gra-  
uat ita ut uel uomere, uel persecessu reijcere necesse sit, signu  
est morbum a frigore oriri &c. Lege etiam Aet. ser. 9 ca. cit.  
Auic. 13. tra. 2. cap. 13. Signum eius quæ fit post euacuationes  
& ægri tudines est antecessio earum &c. Signa eius quæ fit  
ex frigore sunt paruitas sitis multitudo fecis inflatio &c. Si-  
gna ex caliditate sunt fortitudo sitis & non est uomitus ace-  
tosus et natura est ut plurimum cōstricta &c. Signa eius quæ  
fit ex debilitate uirtutis retentiue est multitudo ægestionis  
crudæ &c. signa ex humore acetoso aut melancholico sunt  
paucitas appetitus et acetositas eructationis &c. Vide Arcu.  
etiam & alios practicanes &c.

#### De cura appetitus canini.

Omnem operam dabis in remouenda causa, nam si fiat  
post euacuationes & febres prolixas tunc reficientibus un-  
ctuosus quæ os stomachi mundificant, opus est, sicuti eclegma  
est ex oleo amygdalino dulci cum zuecharo paratum. Si fiat a  
retentricis facultatis imbecillitate, tunc per contrarium eius  
complexionis curato, ut si humida cum siccis si calida cum  
frigidis &c. Si fiat a catharrho tunc cura erit prout dictum  
est in capite destillationū. Si uero fiat ab acida pituita quem-  
admodum sæpius fieri solet, tunc ijs potissimum utendum  
est quæ incidat ac repurgent, ut sunt dulcia salsa & alioqui  
abstergentia calida, qualis est hiera Gal. deinde uinum dulce.  
Profunt etiam calida pingua sicut butyrum cum brod ijs pin-  
guibus cinnamomo garyophillis & croco paratum. Si uero  
fiat a uermibus conferunt ea quæ uermes interficiunt, deinde



utetur stypticis. Si fiat a calore plurimo resolvente, remoue cum frigidis tam intrinsece quā extrinsece applicitis porros carnis obstructibus ut cum oleo mirtino ros. & c. abluanturq; aqua frigida & aceto nisi quid prohibeat, cibi uero sint frigidi crassi uiscosis quales acidi acetosi & congelati, unde confert etiam in hoc casu panis azimus & similes cibi & c.

Loci consentientes de cura appetitus canini.

Auic. decima tertia, tra. 2 cap. 14. Verum illos quibus accidit hoc post febres fortes & euacuationes oportet cibari ex utriusque quæ mundificant os stomachi quæ nō sint malæ substantiæ, quale est oleum amygdalarum dulcium cum zucharo & c. Illis uero qui patiuntur ex debilitate uirtutis retentivæ licet secundum plurimum debilitetur propter frigus, tamen debilitatur omnis uirtus propter omnem malitiam complexionis, idcirco oportet ut cognoscas complexionem & opponas cum contrarietate curæ. & c.

Hip. apho. 2. apho 21. Famem *ὄψυξις*. i. uini potio soluit. Gal. in com. inquit pro fame intelligi debere, non naturalem quæ ex longa inedia, aut ab alia euacuatione facta sit, sed tantum appetentiam caninam quæ uini potione & cibus pinguibus & oleaginis curatur, quia hoc symptoma plerunq; fieri solet a frigida intemperie siue nuda, siue humoribus imbuta, unde uinū calefaciendo excludit humores et stomachi intemperiem emendat.

Obiectio.

Videtur hoc in loco Auic. discordari a Gal. 1. in ordine assumendi, nam Gal. uino præmittit pinguia, Auic. pinguibus uinum dum inquit ipsum sanat sumptum in potu calefactum in ieiuno. Præterea, Auic. non semper laudat uinum ut Gale. maxime si adsit uentris solutio, quum dicat oportet ut omne uinum tunc deuitent & c.

Responsio.

Dicimus uinum tantum conferre post pinguia, uomitus ratione,



tione, sed ad resoluendum humorem uiscidum, ieiuno stomacho ut Auic. In reliquis uero sunt concordēs si bene consyderentur. Paul. lib. 2. cap. 51. Quoniam igitur a pituita potissimum acida constituitur affectus, ijs utendum est quæ hanc incidunt repurgentq; ut sunt dulcia salsa & alioqui abstergentia calida &c. Aet. ser. 9. cap. 22. Nullo alio tutiori medicamento expurganda est acida materia quam picro appellato pharmaco, quod non tantum calefacere sed dissecare repurgare extrahereq; ex profundo oris uentriculi, quin & uentri robur addit, ne facile humorem nocuum suscipiat, appetitus uero quia fortitudine caloris prouenit, non hoc medicamento, sed ijs tantum indiget quæ cutem condensare ac spissiore reddere possunt ut est oleum ex immaturis oliuis expressum, abstineant a potu uini & ab omnibus quæ tam intrinsecus quàm extrinsecus calefacere possunt &c. Lege Auic. ibi & similiter cura eius est, quæ accidit propter resolutionem plurimā &c.

#### Conferentia appetitui canino.

Conferunt canino appetitui omnia pinguia, uinum, diaciminum diatriō pipereō electuarium aggregationis. Auic. 3. 5. electuarium purgamenti ferri haly. 14. antid. tyriaca serap. Hieralogonion haly. 7. antid. hiera picra, Galen. &c.

#### De pronosticis appetitus canini.

Auic. 13. tra. 2. cap. 12. Et scias quod appetitus caninus multotiens perducit ad bulismum & subet & mortem &c.

Gal. 4. de sympt. cau. cap. 7. Non mirum si affecto ore uentriculi ubi appetentia consistit, quandoq; dolores et animi defectio sequatur, nam tum ob exactam sentiendi uim tum ob situs uicinitatem hoc contingere potest &c. imo ex neruorū aut arteriarum consensu cardialgia, morbus comitialis, grauis sopor & deliria consentiente cerebro eueniunt &c.

Hip. aphor. 5. aphor. 27. qui noctu bibere appetunt, ijs ad-

CC



modum sitientibus, si super dormierint bonum &c. B. quia conquieti per somnum subdescendit id quod sitim efficiebat. Et nota q. qui ex humidi deffectu ualde sitiunt, ijs dandus est potus nā succurere deffectui est inquit Gal. medicinale theo. Vide tamen de siti in lib. de febribus infra &c.

#### De bulimo.

Bulimos est intensus membrorū appetitus cum deiectione appetentie stomachi, unde uenæ fiunt uacue sed stomachus respuit ac aborret cibum, &c.

#### Loci consentientes de bulimo.

Auic. decima tertia. tra. 2. cap. 15. bolismus uocatur fames uacina & est membrorum fames cum sacietate stomachi & uenæ quidem sunt uacue & stomachus cibum respuit, &c. Gal. apho. 2. com. 21. Passio bulimos appellata est casus potentie appetitricis a frigiditate exteriori, qui a fame quidem inchoauit, sed non habet amplius eam adiunctam &c.

#### De causis bulimi.

Cause primitiue sunt motus per loca niuosa & frigida, uel mala uentriculi intemperies, uel eius imbecillitas uel frigiditas uirtutem attractoriam & sensibilibus mortificans similiter & inanitio &c.

#### Loci consentientes de causis bulimi.

Gal. 4. de sympt. cau. cap. 7. Accedit ad hoc bulimos. i. uehemens fames quæ fit quum simul penuria imbecillitate & refrigeratione uentriculus afficitur &c. Auic. 13. tra. 2. cap. 15. Et multoties accidit iter agentibus in frigore & congelatis. quorum stomachi ex frigore uehementi inspissantur et causa eius est malitia complexionis mortificans uirtutem sensibilem & attractiuam & fit ex humoribus &c.

#### De signis bulimi.

Signa bulimi recitata sunt supra capite de appetitu cani-



no, nam communia propemodum sunt. De his uide Gale. lib. de fin. med. ibi bulimos est ingens fames & est dispositio in qua fit cibi inquisitio ex paruis interuallis, qui hac detinentur, resoluuntur & concidunt, decoloresq; fiunt, perfrigescent ijs extrema corporis & torquetur stomachus, uixq; pulsus percipitur &c.

#### De cura bulimi.

Quum morbus fiat a frigore exteriori curetur cum calidis aromaticis in quibus adsit stypticitas, deglutiantq; panem infusum in uino odorifero cretico, deinde fiat aliqualis diuersio ligando extrema manuum & pedum. Somnus interdicitur pungantur ac suscitentur cum urtica & uirgis paruis suauiter flagellentur fiantq; emplastra circa regionem uentri culi ex odoriferis ac cordi congruentibus et si aduenerit syn copis, tunc spargatur eorum facies ex aqua frigida stringanturq; manus ac pedes, euellanturq; capilli quum uero syncopis definit, statim cibentur &c. In causa calida utantur frigidis uelut rosa. Nymphaea uiola coriandro preparato sandalis cāphora, fiantq; epithemata frigida ex aqua ros. nenupharis cū sandalis &c. Cibaria sint boni nutrimenti cum omphacio cōditi. Potus sit uinum granatorum cum iuleb ros. ungatur. etiā stomachus cum oleo ros. myrtino &c.

#### Loci consentientes de cura bulimi.

Auic. 13. tertij, tra. 2. c. 17. Est cura casus appetitus & oportet, ut odorentur cibi promouentes appetitum habentes species & fructus odoriferos & aromatica odorabilia, in quibus est stypticitas ut congregetur uirtus, et deglutiant panem infusum in uino odorifero &c. uide hunc locum fusius & omnem curam intelliges. Lege etiam Aet. ser. 9. ca. 20. de cura perditionis appetitus, nam ambo hi morbi similiter coincidunt &c. uide etiam Arcul. & Marc. cat. &c.



## De pronost. bulimi.

Aet. ser. 9. cap. 6. Assidui bulimi & exoluunt & in animi deliquia incidunt quibus ægre auxilium reperitur. B. Nota q. syncopis ex bulimo, tum ob corporis inanitionē tum ob oris uentriculi nocumentum cui cor compatitur, accidere solet, quæ si longo durauerit tempore plerunq; ægros ad interitum perducit etc. Intellige etiam de bulimo quæcunq; dicta sunt de pronost. appetitus canini.

## Authores dissentientes circa bulimum.

- 1 Adserere, idem esse bulimum & appetitum caninum.
- 2 Adserere, uinum in quolibet appetitu canino conferre.
- 3 Adserere, cibaria crassa tantum in bulimo et appetitu canino competere.

## Confutatio dissentientium circa bulimum.

Ad primum respondetur q. definitiones utriusq; datae sunt, quæ manifestant non idem esse, Præterea Gal. apho. 2. comm. 21. In fine eos reprehendit dicens q. pro generali & uniuersali faciunt specialem & particularem, Præterea bulimos tantum a frigidityte exteriori fieri potest, & non appetitus caninus, Nemo bulimos incipit cum fame, sed perseverat sine fame, quod non facit appetitus caninus & c.

Ad secundum Gal. eodem in comm. talem famem uini portio sanat, non autem eam quæ ex longa inedia, uel alui profluvio aut fluxu sanguinis aut alia aliqua facta euacuatione & c.

Ad tertium respondetur q. & si cibaria crassa eo q. magis sedent appetitum, uideantur congrua, nihilominus tenuia danda sunt, tum quia uirtus imbecillis est, tum quia facilius per membra distribuuntur & c.

## De dolore stomachi &amp; eius flatu.

Dolor stomachi est eius quidam tristis sensu a mala intemperie nuda uel materiali, aut a soluta continuitate proueniens,



cuius causæ primitivæ sunt percussio casus offensio stomachi  
 uel membri consentientis ut cerebri nerui intestinorum, uel  
 regimen cibi inordinatum uel aliarum rerum non naturalium.  
 Causæ antecedentes sunt nuda intemperies uel cum materia  
 acri et mordicante, uel, a sanguine pituita, aut potus aquæ fri-  
 gidæ, aut flatus extendens, aut soluta continuïtas sicut ab ulce-  
 ribus uel ab aliquo abscessu. Causæ cōiunctæ sunt ipsi humores  
 uel reliqua dolorem stomachi actu efficiunt &c.

Loci consentientes de causis dolori stomachi.

Auic. decima tertia tertij, tra 2. ca. 1. Dolor stomachi acci-  
 dit aut propter malitiam complexionis absq; materia aut cū  
 materia & proprie acuta mordicatiua, aut propter solutio-  
 nem continuïtatis ex causa uentosa extensiua aut mordicati-  
 ua adusta, aut aggregatiua ambarum rerum simul sicuti est in  
 apostematibus calidis &c. lege eum ulterius et inuenies etiā  
 causas quur dolor accidat ante comestionem et sedatur quum  
 comeditur &c. Consule in hoc etiam Arcul. 9. almans. Gal. 6.  
 de sympt. cau. cap. 2. spiritus in uētriculi spatij oriri solet quū  
 humores pituitosi ibi contenti uel cibi ab imbecilli calore in  
 uapores resoluuntur, Nam ut absolutum frigus uaporem non  
 excitat, ita calor magna ex parte quæ comprehendit uincens  
 plusquam pro uaporis generatione cibum extenuat, nisi for-  
 te suapte natura in flatum transeat, quare relinquitur q; a ca-  
 lore imbecilli cibos non omnino conficiente, sed quodammo-  
 do dissolvente, flatus siue spiritus exoritur &c. Lege etiam  
 fusius Gale. de causis flatus. 14. meth. cap. 7. ibi Porro halituo-  
 sum spiritum in animalis corpore ex succis &c.

De signis doloris stomachi.

Signa bilis sunt mordicatio, dolor pūctorius, sitis, oris sic-  
 citas atq; amaritudo. Signa pituitæ sunt oris salsedo præser-  
 tim si salsa fuerit pituita, inflatio grauitas sensibilis aliquan-



do frigiditas, interdum fit sitis ratione doloris & clamoris. Item adest uomitus pituitosus, pallor faciei & c.

Signa flatu sunt eructatio rugitus, ructus sunt uel strepitus extensio in hyppocondrio, iuuatur per emissionem strepitus, dolor permutatur frequenter. Signa apostematis sunt appetitus destructio, eminet in parte exteriori, praesertim si fuerit circa os uentriculi, si uero fuerit in fundo, concoctio destruitur, nec apparet eius eminentia, adest febris & c. Cognoscuntur ulcera ex sanie & reliquis exeuntibus & c.

Loci contentientes de signis doloris stomachi.

Auic. decima tertia, tra. 2. ca. 2. Et mordicatio cum inflatio ne est significatio materiei calidae propter qualitatem acutam, uel salsam, si mordicatio non est stabilis immo renouatur significat effusionem cholerae ex hepate & c. Et signa ex uentositate sunt eructatio & rugitus & extensio in hypochondrijs & c. de his consule Arcul. fufius. Gale. 6. de sympt. cau. cap. 2. Cognoscitur flatum esse in uentriculo quoniam si per os reijciatur facit fructum, si per inferiores partes, flatum reddit uel strepentem uel sine strepitu, quod si per neutram partem deferatur symptoma uentriculi efficit, ob imbecillitatem non potentis spiritum redundantem & nebulosum expellere & c. lege hoc totum caput, nam ex flatu acuto ac tenui sono et similiter ex bombosis diuinare te docebit qua ex parte flatus procedat, & alia ad rem facientia, lege etiam neotericos & c.

De cura doloris stomachi.

Diuersimode curabitur dolor prout causa efficiens fuerit, nam si nuda ac sola intemperies mala sit in causa tunc sola alteratione per contrarium curabitur, si uero materialis intemperies in causa fuerit tunc curandi intentio quouis intentionibus perficietur. Prima erit circa regimen sex rerum non naturalium, ita ut in contrarium causa omnia adhibeantur, ut



in calidis frigida et econuerso. Secunda est doloris mitigatio quæ statim in opus dirigenda est, quum stomachus sit membrum sensituum, ex cuius læsione facile totum corpus compatitur. Hæc duobus modis perficitur, Primo abscindendo doloris causam, & hæc fit cum solutiuis & sectione uenæ quod si materia nimis stomacho adhereat ac fixa & compacta persistat, ita ut aliqua præparatione indigeat præparanda tunc erit pro ut in altera intentione dicetur, Interim alter sedandi modus erit cum rebus anodinis quæ parari possunt per fots cataplasmata cerata oleis &c. Fots fiunt cum floribus camomille anethi melliloti & s. lini fenugræci althææ &c. Deinde in casu necessitatis ad opinata cõcurrendum unde in causa frigida damus phylonij rom. 3. s. usq; ad 3. i. cum modico uino et in calida tantundem requiei nicol. &c. Tertia intentio est humoris peccantis præparatio, unde in causa calida procedimus cum syropo acetoso simp. uel. oxyssacchara. syr. de endiuiâ, uiol de agresta cum aquis endiuiæ lupulorũ uiolarum &c. Quæ bilis si aliunde fuisset præparanda esset cum his quæ aliqualem in se stipticitatem continent ut cum syr. ros. de. s. acetosæ de granatis, de citonijs, cum aquis endiuiæ acetosæ plantaginis & cicorij &c. In causa frigida cum rhodomelle, oxymelle simp. & compos. scilliticoq; syr. de absinthio de menta, si fuerit pituita salsa cum sy. uiol. et oxymelle simplici cum aquis camomille endiuiæ, si melancholia cum sy. de fumoterræ de epithimo acetoso simplici syr. uiol & cum aquis fumiterre lupulorum boraginis &c. si sanguis extrahatur per uenæ sectionem. Quarta intentio est euacuatio, quæ in materia biliosa ita parabitur R. manne electæ mast. 3. xij. ℥i de s. ros. 3. ij. s. syr. uiol 3. i. cum decoctum fructuum & florum cord fiat potus. Vel in materia crassa cum casia diaphinicone, in melancholia cum casia et confectione bamech, laudatur in super his



ra Gale. simpl. pillule aleophanginae &c. Si in causa fuerit uentositas curat post euacuationem factam cum calefacientibus & exiccantibus præsertim si materiam fouentem habuerit, unde in hoc comendatur cucurbitula cum maxima flamma applicita. Item fiant fotus ex decocto mentæ absinthij camomille calameti pulegij rutæ cinnamomi galangæ calami arō. &c. uel cum oleo in quo ruta apium cuminum maratrum bullierint &c. Quinta intentio est malæ complexionis derelictæ remotio, quæ si fuerit calida frigidis remouebitur, si frigida cum calidis quæ parantur per cerata cataplasmata linimenta &c.

#### Loci consentientes de cura doloris stomachi.

Auic. 13. tract. 2. cap. 3. Cura eius qui est ex malitia complexionis calidæ sine materia est in potu sumere lac acetosum & aquam frigidam, & in cibo pullos perdices cucumeres cucurbitam portulacam, &c. & sic intelliges de frigida complexione quod per contraria curetur. Quod doloris mitigatio tribus dictis modis fieri possit, lege etiam Auic. 2. primi, doc. 2. sum. 2. ca. de cau. sedandi dolorem, Item quarta primi, cap. de sedatione doloris. Lege etiam neotericos præstitantes Arcul. & Mar. Cat. Mich. Sauona. Razem & Bauerium fol. 66. &c. Auic. 3. trac. 2. cap. 3. loquens de præparatione simul et euacuatione humoris dolorem efficientis, inquit, Et quando dolor fuerit ex humore cholerico calido euacuabis, & administrabis syrupum acetosum cum aceto, in quo fuit infusum absinthium, &c. Gale. 14. meth. cap. 7. In curatione omne principium est totum corpus euacuare ea euacuatione quam ferre potest, purgatio sit uel missio sanguinis uel purgatio tum per ea quæ subter expellunt medicamenta, tum per quæ supra ut uomitoria, deinde per ea ut in uno uerbo me expediã quæ calefaciunt & exiccant, &c. Gale. 12. meth. cap. 8. de cura fla-



tus uentriculi commendat cucurbitulam maxima cum flamma admotam, & ita hoc præsidium ualere inquit ut incantamenti cuiuspiam simile uideatur. Et 8. meth. cap. 5. flatus stannandi sunt, oleo, in quo ruta & semina quæ flatus discutiunt, fuere incocta ut sunt apriumini maratriti atq; alia id genus. Et 14. meth. ca. 7. est illud inquit commune præceptum omnium fere quos uitiosus succus creat morborum q; in fine calefactis & exiccantibus sit utendum & c. Vide Aet. ser. 9. cap. 27. ex Archigene curam & Auic. 13. trac. 2. cap. 3. ibi. Et dolores quidem stomachi frigidos & uentosos sedat & c.

Observatio circa curam doloris stomachi.

Marc. Cat. de mente Auic. debemus in primis cum diligentia & bona cura procedere, & causam cognoscere, ne si error contingeret, ob id quod stomachus chylum generat, talis error toti corpori communicaretur, & c.

Nocentia ac conferentia dolori stomachi.

Dolorem & mordicationem inducunt bleta, bulbus, fructus cedri, dactili, grana pini, iuniperus, lac, rapa, cruda, scamonium. Conferunt dolori et mordicationi, absinthium, aloes, acetosa, acetum scilliticum, betonica, calamus aromaticus, corallus, coriandrum, fursus, galanga, garyophillum, gentiana garyophyllata, granata acetosa, lactuca maiorana menta melilotum nepita, nux moscata, ostraca, oua semicocta origanum paritaria passula peucedanum portulaca pulegium rheubarbarum, rosa, ruta, rubus, lac sicomori, siliqua, sisamum spica, spina alba, scenoanthos. Composita sunt alphendidicon Auic. tertia quinti, Apozima de absinthio quarta quinti Auic. Athanasia maior hali. 6. antid. Ceratum hisopii filiagrios hisopii pauli, stomaticon mes. ij. antid. electuarium de carui Auic. de ambra serap. electuarium indum de baccis lauri, gallia muscata infusio hieræ mes. oleum de absinthio de menta de costo nar



dinum rosaceum masticinum myrtinum de citonijs. Pillulæ aleophanginæ masticinæ de hiera cum agarico hieræ simpl. Quadrumeron confectio nic. Rob granatorum de citonijs, theodoricon magnum Auicen. thiriaca maior, thiriaca diatesserō, triphera magna nic. triphera saracēnica mes. troc. de diarhodon de absinthio de rosis, unguentū cardumeni Auic. 2. antid. zuccharum ros.

### De pronosticis doloris stomachi.

Auice. 13. tra. 2. cap. 1. Et quandoq; moritur subito propter aduentum doloris ad cor. Secundo, & quandoq; descendit dolor & facit prouenire colicam, Tertio portendit in pręgnatibus pręfocationem matricis. Quarto, Timetur in illo in quo prolongatur dolor stomachi quod attrahat apostema stomachi, Quinto, Hippocra. in lib. mortis festinæ, quando apparet cum dolore stomachi super pedem dextrum quoddam simile uesicæ, tunc patiens moritur in uiginti septem diebus. Et si habet dolorem uentris, & apparet in supercilio eius uestigium & bothor, similis fabæ deinde fit ulcus tunc ipse morietur & huic accidit subet & c.

### Authores dissidentes circa dolores stomachi.

- 1 Adserere, succum absinthij magis conferre stomacho quā ipsius herbam.
- 2 Adserere, in omnibus maximis doloribus sectionem uenæ semper conuenire.

Ad primum Auic 13. tertij, quoniam succus eius est seperatus a stipticitate retenta in herba idcirco non ita conducit stomacho ut ipsa herba quæ ob partem terream in se manentē sit magis stiptica & confortatiua & c.

Ad secundum Auic. quarta primi, tibi quoq; cauere debes a minutione in hora fortis doloris, item cauendum a phlebotomia in corporibus habentibus subtilitatem nimiam oris



Stomachi quoniam ex ea in syncopin cadunt, Præterea in frigido crasso ac uiscofo humore non competit, igitur non semper competit sicuti etiam in dolore uires prosternente non competit &c.

### De imbecillitate hepatis.

Hepatis imbecillitas est alteratricis facultatis in proprijs actionibus impotentia absque alicuius uisceris malo manifesto, &cæt.

### Loci consentientes de imbecillitate hepatis.

Gale. 8. de compos. med. per loc. cap. 6. ad finem, imbecillitas hepatis est citra manifestum aliquod in uiscere malum in proprijs actionibus impotentia alteratricis facultatis. B. Intelligendusest hic Gale. de alteratrice facultate & si ad unguem eam non expresserit, nam, huic attractoria retentrix & expulsoria tanquam principaliori seruiunt.

Auic. 14. tra. 2. cap. 1. hepaticus est ille cuius est debilitas absq; re manifesta in operationibus hepatis &c. Inuenio iuxta Gal. in li. fin. med. iocinorosos appellari quos iecoris dolor cum tumore & duritie & corporis colore malo comitatur, & his febris ardens superuenit, & lingua arefcit, quæ omnino euenire solent, quum alteratrix facultas suo nõ probe fungatur officio, ad ipsam enim pertinet sanguinem generare, unde a Galen. quinto de loc. affer. capitulo septimo sanguifica speciatim alteratrix dicitur & ab Auic. digestiua, lege Galen. sexto de sympt. caus. cap. secundo.

### De causis imbecillitatis hepatis.

Causæ primitiue sunt casus & percussio super hepate & quæcunq; a rebus non naturalibus prouenire possunt, male dispositis. Causæ antecedentes sunt, uel per se, uel per consensum, per se fiunt, uel a mala intemperie sine materia, uel



ut placet Auic. cum materia abscessum uel herysipelā uel a de ma generante per consensum uero, uel a toto ut in febribus, uel ab aliqua parte quæcunq; sit debilitante fieri solent. Cause coniunctæ sunt uel ipsa intemperies uel quid aliud facultatem alteratricem actu imbecillitans & c.

Loci consentientes de causis imbecillitatis hepatis.

Auic. 4. tra. 2. cap. 1. Et id est, aut propter malitiam cōplexionis singularis sine materia, aut cum materia cuius principium est ab hepate aut a membris alijs sicut est fel quando non trahit coleram, aut splen quando non trahit melancholiam aut renes aut uesica, aut matrix per uehementiam fluxus sanguinis, & propter uehementiā retentionis menstruum & c. Et quandoque non est propter malitiam complexionis solam, immo propter apostema sanguineum herisypellā undimiā, aut propter ulcus & c. B. Nota an hoc loco decipiatur, Auic. Nam dictum est a Gal. non solum in descriptione iam dicta sed etiam 8. de compos. med. per loc. cap. 6. q. hepatica peculiariter appellata citra tumorem præter naturā contingat & c. Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2. Intemperies quæ alteratricis facultatis imbecillitatem parit, si calidior quam oporteat fuerit, interdum biliosum, interdum melancholicum excrementum efficit, si frigidior pituitosum & aquosum excrementum similiter parit. Lege insuper Gal. 5. de loc. aff. cap. ul. ibi, omnium facultatum essentia & c. Item. 3. de sympt. cau. et Aet. ser. 10. ca. 1. Et Paul. lib. 3. cap. 46 et Arcul. 9. almans. & c.

De indicijs imbecillitatis hepatis.

Indicia sumuntur a colore corporis ab egestionē, a dolore leui, ab intemperie cal. frig. sic. et hum. a facultatibus ipsius hepatis. Si uero per consensum morbus efficiatur, ex mēbris lesione a quo fit consensus. A colore cognoscitur quia si a fluxu sue palida bile, aut a pituita fiat tota cutis erit alba, siue



pallida siue flaua, ab egestionē quia quæ egerunt similia carnis loturæ apparent. A dolore leui, quia sicut ex cibo uentriculus premitur ita ex chylo iecur, unde dolor leuis accidit, a complexione cognoscitur ex eo quod a suis cōtrarijs iuuatur, a facultatibus hepatis, nā si ab alteratrice sanguis diminutæ erit concoctus qualis est sanguis pituitosus, aut superflue erit concoctus qualis est biliosus & adustus. Si ab attractoria facultate morbus fieret, tunc uix prima concoctione celebrata, chylus egreditur, quum ad iecur attrahi non possit si a retentoria, tunc id egreditur qualis intrauit. Si ab expulsoria, tunc id nō expellitur quod est superfluum, sed admixtum sanguini cernitur aut cognoscitur ex eo quod multæ ad uentriculum fluunt humiditates. Sunt & harum facultatum alia indicia, nam si sanguis corruptus sit uel ad putredinem decliuis uel colore uariis uel pituitosus, tunc alteratricem cognoscimus esse diminutam si totius corporis adsit macies & imbecillitas, tunc attractoriam uim esse imbecillem coniectamur, & sic de reliquis. At si morbus per consensum fiat cognoscitur ex alterius membri lesione, nam si per consensum fellis fieret tunc ex colore icterico cognoscitur, si ex consensu stomachi, ex concoctionis malitia, & sic de reliquis &c.

**Loci consentientes de indiciis imbecillitatis hepatis.**

Auic. 14. trac. 2. cap. 2. Color est ex rebus quæ significant secundum plurimum dispositionē hepatis &c. Et egestio & urina similes aquæ carnis significant debilitatem hepatis in generando sanguinem &c. Complexiones autem significantur ex radicibus prædictis &c. Lege fusius hunc locum &c. indicia a me dicta inuenies. Gal. 5. de loc. aff. cap. 7. Igitur aluum quum sedimina aquæ in qua mactata caro abluta est, similia esse uideris tunc efficacissimum esse affecti iecoris signū non dubites, & paulo post facit mentionem de complexionū



signis, ibi, calida intemperies hepatis & c. Habes tamen rem magis expeditam. 8. de compos. med. per loc. cap. 6. Ibi calida igitur intemperie circa hepar existente, colliquationes fiunt primum humorum deinde carnis ipsius hepatis & c. Similiter habes signa facultatum hepatis s. de loc. aff. cap. 7. ibi si attratrix facultas afficitur tunc cibum in uentriculo in succum transmutatum relinquitur & c. Vide 8. de comp. med. per loc. cap. 6. fusius de hac re. Item Paul. & Aet. & Arcul. & c.

#### De cura imbecillitatis hepatis.

Perficitur hæc cura quatuor medijs. Primo, remouendo causam imbecillitatis. Secundo, roborando hepar. Tertio, remouendo si qua aduenerint symptomata. Quarto, regulando ægrum in sex rebus non naturalibus. Causa si fuerit primitiua ut potus aquæ frigida remoue eam cum calidis ut puta cū potu uini & abstineat se ab aqua, et sic de reliquis causis primitiuis. Si causa antecedens in hepate fuerit intemperies calida, remoueatur frigidis sipticis hepati conducentibus, frigida calidis aromaticis aperientibus, humida siccis & c. Si uero fuerit apostema ulcus uel aliqua alia soluta continuitas curabis per ea quæ ad apostemata ulcera & solutam continuitatem faciunt, ut alias dictum est. Si causa sit per consensum ab alio membro tunc illius membri mala dispositio remouenda est cū euacuatione reuulsione ac membri roboratione, ne quid amplius ad hepar transmittatur, demum hepatis nocuum iam impressum remoueatur & c. 2. Robur hepatis fit decem medijs, ut ex Auic. & neoterics elicitur. 1. Cum leuiter calefacientibus ut naturalis eius temperies seruetur, & hoc intelligi potest de his quæ ad penetrandum exhibetur. 2. Cū leui apertione quā semper de obstructione hepatis timor sit & tunc utimur phisticis & absinthio. 3. Cū maturatione & lenificatione quæ cum passulis & uino granatorum confi-



citur. 4. Cum abstergentibus quæ parantur cum aqua hordeacea & hydromelle. 5. Cum incidentibus ut cum uino granatorum quod ad acetum uergit 6. Cum his quæ moderatam in se stipticitatem habent, ut scenoantho rosis absinthin. 7. Cum prohibentibus putredinem ut cinnamomo casia lignea. 8. Cum exiccantibus ut cum spondio 9. Cum mundificantibus ut cum melle & uino subtili. 10. Cum his quæ a proprietate ualent, ut spica, lupi hepar, limatijs rheub passulis. Verum in his memorie interim mandandum, quenam facultas principaliter lesa sit, ut eius robori magis intendas, nam attractoria uis calidis & siccis, sed magis calidis, retentoria frigidis & siccis sed magis siccis roboratur, alteratrix calidis & humidis licet magis calidis, ex pultrix calidis & humidis licet magis gaudeat humidis & c. In causa igitur frigida conueniunt absinthium rheubarbarum troc. de rheub. diacurcuma sy. de absinthio de eupatorio. Item electuarium Gal. in tex. Auice. descriptum, ibi, recipe ligni aloes rosarum spicæ nardi cinnamomi ante. 3. 2. & c. In calida conueniunt cicorium aqua limatiarum diarhodon abbatis triasandali. T. de rosis, syru. de endiuia de cicorea cum rheub. 4. Cibaria nullam crassitiem uel uiscositatē participant, carnes sint boni nutrimenti, unde conueniunt uitelli ouorum sorbiliū cum cinnamomo & pipere aromatizati. Item passulæ limatiæ & c. Portus sit aqua hordeacea cum aliquantulo mellis & c.

Loci consentientes de cura imbecillitatis hepatis.

Auic 14. Tr. 2. ca. 3. ut plurimum debilitas hepatis est propter frigus aliquod aut humiditatem aut siccitatem, aut propter materias malas retentæ in ipso, et propter hoc plurimum curæ eius est cū calefactione subtili cū apertione & maturatione & lenificatione permixta cū stipticitate confortate & prohibente putrefactionē, et sit cū medicinis aromaticis in quibus



est apertio & maturatio ut crocus, & quandoq; indigemus propter retentionem materiei in ipso phlebotomia & solutione uentris & c. Gale. 8. de comp. med. per loc. cap. 6. scopus curationis in eiusmodi affectionibus fit communis quidem iuxta intemperiei contrarietatem, Peculiarem uero per cuiusque contrariā, uerum in his siue exterius applicitis siue intra adhibitis semper aliquid ex adstringentibus miscere oportet ut iecoris robur seruetur & c. Et. ij. meth. cap. 16. si quidem in uentriculo & iocinore robur resolui est perniciosissimum & c. De cura facultatum hepatis laborantium habes plene iuxta Auic. loc. cit. ibi si debilitas adigestiua provenit confortata cum stipticis aromaticis, si a retentiua, adde in confortatione & stipticitate & minus de calefactione & c. lege fusius & inuenies cetera a me iam pridem exarata, lege etiam Arcul. in hoc & Marcum cat. De cibis lege etiam ibi Auice. & conuenientiores cibi sunt in quibus non sunt grasitudo & uiscositas, & c. lege eum fusius & Arcul.

#### Observationes in curatione.

Auic. Medicina hepaticæ sint apertiuæ cum leui caliditate quarum uirtus sit lenitiua & abstersiua nec stipticitate careant quum hepar sit membrum laxum & c.

#### Nocentia & conferentia imbecillitati hepatis.

Nocent hepati, aloes, assa, colocynthis, dactili, helleborus, euphorbium, esula, ficus, lac, mezerēō, ozimum, serpentaria, serapinum, scamonium, scebram, triphera ferunginea nic. Conferunt imbecillitati et eum roborant absinthium, acorus, aloes bonæ amygdalæ amaræ, ammonium, asarum, berberis, calamus, aromaticus, cinnamomum cortex citri, costum, cuscuta, crocus, cicorium, endiuidia, eupatorium, phystici, fumus terræ, granata acetosa, lactuca, laudanum, signum aloes liquiritia, hepar lupi, macis, mastix, myrobalani cit. nux mosc. orangium



ganum passule, rheubarbarum, rosa, rosmarinus, rubea, spica spinachia scenoanthos, Composita sunt citonia condita, conditum de citro de succo citoniorum de musco, diarhodon, dialaca, diacurcuma, diaireos, latificans mes. el. de mirto mes. de camphora Auic. empl. diaphinicon diaspermation, gallia sebelien mes. oleum masticinum, amygdalarum amararum, irinum, costinū, pillule aggregatiue de rheub. stomaticæ Auic. de agarico Serap syr. de endiuia de cicorea cum rheub. de acetositate diarhodon de fumoterra de absinthio tro. de ligno aloes de rosis de aniso de absinthio de lacca hali, de eupatorio, hiera damasceni, & udiarum ros. &c.

#### De pronosticis imbecillitatis hepatis.

Auic. 14. t. 2. cap. 2. & multotiens perducit ad hydropē, & colicam phlegmaticam &c. Arcul. debilitas hepatis notabilis quum inueterata fuerit, aut difficillime, aut fere nunquam emendatur, & lege etiam Gal. 8. de compos. med. per loc. &c.

#### De inflammatione iocinoris.

Inflammatiō est calidi sanguinis influxus quæ in hepatis substantia, uel in eius gibbosa uel concaua parte, aut in musculis uel tunicis colligētibus, uel in uenis eius accidere solet, nec inquirendum utrum in uenis mesenterij hæc accadat, quoniā si in concaua iecoris parte fuerit inflammatiō, etiam in uenis mesenterij necessario erit.

#### Loci consentientes de inflammatione hepatis.

Auic. 14. t. 3. cap. 1. apostematum in partibus hepatis accidentium quedam fiunt in ipso hepate quedam in lacertis positis super ipsum, & alia sunt quæ accidunt in meseraicis, & eorum quæ fiunt in ipso quedam accidunt in partibus eius superioribus & ad latus gibbosum, & alia in partibus inferioribus & ad latus concauum & alia in uelaminibus & paniculo & in uenis ipsius &c. Lege Gal. 5. de loc. aff. cap. 7. et 13.

DD



meth. cap. 14. ubi etiam inquit q̄ cauo iocinoris phlegmone obfesso protinus etiā ueniat quæ in mesenterio sunt una phlegmone laborare necesse sit, Vide etiam Gal. in lib. de tum. præter naturam. cap. 2. ibi inflammatio est calidi & c.

De causis inflammationis hepatis.

Causæ primitiua est nimius calor ex immodico motu aut ex sole igneq; acquisitus, aut acre medicamentum aut nimius potus uel cibus calefaciens percussio aut tersio & c. Causæ antecedentes uel per se sunt in hepate uel per consensum fiunt, Per se sunt intemperies calida malos humores attrahens aut intemperies frigida quæ alteratricem & expultricem debilitat, unde tumores fieri possunt, similiter obstructio ex qua humores retinentur, aut dolor materiam ad iecur attrahens, aut iecoris imbecillitas, Causæ coniunctæ phlegmonis est sanguis copiosior quam pars postulet in ipso hepate contentus & c.

Loci consentientes de causis inflammationis hepatis.

Gal. 13. meth. cap. 6. istius caloris causa aut est immodicus motus aut ex sole & ignis tepor, aut acre medicamentū & c. Auic. 14. t. 3. cap. 1. etiā de alijs primitiuis causis loquitur, ibi, & cibi quidem calefacientes & crassi, & qui non digeruntur ualde adiuuant ad faciendum apostemata in hepate, & quandoq; accidit propter percussione & torsione & c. De causis etiam antecedentibus hic uerba facit ibi causæ illius sunt complexio frigida prohibens digestionem & expulsionem aut debilitas stomaci aut opilatio congregans humores & c. lege eum fusiis Gal. 13. meth. cap. 3. Cōmunis omniū phlegmonarū generatio ex sanguinis influxu est copiosioris, quā pars postulet, Causa uero quur influit sanguis tum a partibus mitentibus, tum ab his quæ ad se attrahunt peruenire potest, mittūt enim partes quum nimium copia superuacuis est, aut quum a sua qualitate molestantur quæ uero attrahunt, ea ob



morbosum calorem attrahunt uel ob sui uel uicinæ partis do-  
lorem, aut ob partis recipientis imbecillitatē, ut testatur Gal.  
13. meth. cap. 5. Lege etiam de his Gal. 13. meth. cap. 6. ibi, dolor  
prouenit uel ob intemperiem & uulnus & contusionē & di-  
storsionem & tensionem uel obstructionem quandam &c.  
Lege etiam 14. meth. cap. primo, ibi, inflammatio fieri solet,  
quum sanguis copiosus in aliquam particulā procubuit &c.  
Lege de his uberius Arcul. 9. almans. &c.

De indicijis inflammationis hepatis.

Indicia hepatis inflammati sunt dolor inseperabilis in de-  
xtero hyppocondrio, grauitas in eo maior quam in opilatio-  
ne, forma corporis mutatur, apparet enim in facie et in alijs  
membris tumor siue inflatio, color tendit ad citrinum uel pal-  
lidum, nulla adest pulsatio ac in cæteris inflātionibus, Co-  
stæ nothæ ut plurimum dolent, exigua & sicca tussicula adest  
singultus quoque sequuntur, Dormire non ualent super latus  
dextrum, & super sinistrum dormire graue est, febris adest  
acuta. Signa quando adest in gibba parte sunt grauitas maior  
quam in cōcaua, singultus minor, tensio apud suspensoria, ma-  
nifestior sit tactui, præcipue in debili, tussis sicca, difficultas  
anhelitus maior, ob consensu diaphragmatis percipitur, uri-  
na pauca cum mordicatione, lingua est citrina ad nigredinē  
decliuis. Signa quādo fuerit in concaua, singultus maior, gra-  
uitas minor eo q̃ a stomacho sustentatur, tussis parua, & an-  
helitus paruus, dolor uehementior, nausea, appetitus destru-  
ctio, sitis uehemens, uomitus biliosus, frigus extremitatum et  
nigredo linguae & syncopis &c.

Loci consentientes de signis inflātionis hepatis.

Gale. 5. de loc. aff. ca. 7. Iecur affici declarant in dextra præ-  
cordiorum parte grauitas, dolor tota præcordia contrahens  
& ipsius usq; ad iugulum extensio exigua tussis, linguae color



in primis ruber deinde niger, ingens ciborum fastidium, sitis in exhausta, uomitus tum syncera bilis, tum quæ ouorum uitel-  
lis simulatur quæ postea eruginis colorem refert, alius ad-  
stringitur, si inflammatio cum eius uisceris imbecillitate ex-  
citetur, spiritus adest difficultas febris acuta etc. Et paulopost  
inflammationes in simis iecoris partibus fastidium nauseam  
uomitum biliosum, sitim ingentem tussim atq; dolorem usq;  
ad dextræ partis iugulum excitant, nonnunquam utriq; parti  
dolor adest nothæ costæ consentiunt, In gibba uero parte in-  
flamatione existente præter dicta tumoris cumulus compræ-  
hensim cōspiciuus in superficie tactui maxime si abdomē gra-  
cilescat, cōprehenditur, dolores circa respirationem & tussi-  
culæ magis intenduntur cum dolore ad iugulum extenso ut de-  
trahi uideatur magis quā in ima parte. Si uero in rectis mus-  
culis inflammatio accadat tumor erit præter naturam oblon-  
gus atq; per totum uentrem extensus umbilicum compræhen-  
dens &c. Lege de his Auic. 14. tra. 3. cap. 2. ibi signa commu-  
nia sunt q; inuenit æger grauitatem sub hypocondrijs in sepe-  
rabilem & inuenit illic dolorem uehementem &c. Lege simi-  
liter Arcul. 9. alman. Item Gal. 2. de loc. aff. ca. 9. ibi, si incogni-  
ta nobis fuerit inflammatio iubendum est ægro ut magnam  
edat respirationem &c. Vide etiam de hac re Paul. lib. 3. cap.  
46. & Aet. ser. 10. cap. 3. & Gale. 2. de loc. aff. cap. 8.

#### De cura inflammationis hepatis.

In curatione hac tota adhibenda est diligētia ne hepatis læ-  
sio per totū corpus dispergatur, Erunt igitur intentiones cura-  
tionis sex prima erit reuulsio. 2. reuulsio. 3. humoris præ-  
paratio. 4. euacuatio. 5. resolutio. 6. malæ cōplexionis de reli-  
ctæ remotio cū regimine sex rerū nō naturalium. Reuulsio fiet  
cū sectione uenæ basilicæ aut cephalicæ, quæ an fienda sit ex  
opposito an ex eodē latere dubitat, Cōciliator dise. 198. quem



fufius uidebis. Diuertimus etiam cum frictionibus ligaturis cucurbitulis circa partes extremas positis & similibus. Repercussio fiet tum per exteriora tum per interiora. Conueniunt extrinsecus epithemata & inunctiones ex oleo ros. de citonijs uel ex aquis rosarum solatri cum syndone madefacta & hepatis applicita quibus addi possunt pulueres ex sandalis rub. & al. & cit. ex rosis corticibus & floribus granatorum & aliquid camphoræ. sed in materia frigida accipimus aliquid absinthij mastice cum oleo ros. masticino & c. Intrinsecus ualēt sy. ros. de succo acetosæ cū aquis plātaginis cicorij cad. uen. & c. in causa frigida rhodomel syr. de duabus rad. oxymel cū syr. ros. Et hæc faciūt etiā pro tertia intētiōe uio tamē animaduerso q. stiptica tantū in principio, sed cū materia iam fluxa est, alijs non stipticis, uti possumus ut sy. acetos. simp. uiol. de endiua de fumo terræ & c. Euacuatio fiat rursus peccante sanguine cum sectione uenæ hepaticæ, aut peccāte cholera cum rheubarbari infusione aut cum alijs pharmacis prout millies dictum est. Resolutio fit cum his quæ resoluunt addēdo aliquid quod stipticitatis secum afferat, & hunc spectant inunctiones cataplasmata et epithemata cum anetho melliloto altheæ camomilla rosis absinthio similiter cū oleo anethino camomillino ros. & c. Si uero ad suppurationē uerteretur, tunc suppurantibus utendum qualis est decoctio passularum caricarum altheæ maluarum. s. lini fenugræci cum oleo amygdalarū dul. cum pinguedine gallinæ anatis butyro ex quibus paramus cataplasmata & c. Maturata inflammatione tunc uomica uomitu tussi & stertamentis & similibus prouocanda est, deinde abstergenda, si in gibba fuerit parte cum urinam prouocantibus & abstergentibus, qualis est aqua hordei cicerum rub. hydromel hydrosaccharum, & c. Si in concaua cum his quæ per secessum educunt, qualis



est casia serum caprinum tamarindi &c. deinde consolidan-  
dum erit siue conglutinandum cum bolo armeno & terra  
sigillata &c. Quod si abscessus ad duritiem permutetur quan-  
uis raro curationem admittat, nihilominus cum amollienti-  
bus procedemus sicuti cum althea maluis &c.

Loci consentientes de cura inflāma ionis hepatis.

Gale. 13. meth. cap. 6. Communis omnium phlegmonarum  
curationis indicatio est euacuatio, quæ uero adhuc in genera-  
tione sunt, in ijs prius euacuatione est influentis in affectū lo-  
cum sanguinis inhibitiō &c. Et cap. 11. eiusdem lib. Quum ie-  
cor inflammationem patitur, tum reuellendus tunc educendus  
qui ad iecur fluit, sanguis est, interna in dextro cubito insecta  
uena, propterea q̄ e directo & ampla uia cum uena quæ ca-  
ua dicitur societatem habet, qua nō apparente media seccāda  
est q̄ si ea nec se ostēderit reliqua ac tertia incidēda est &c.

B. Ex quibus notare debes q̄ stante uirtutis robore modo  
καταευθυ. i. e. directo extrahatur sanguis, & si alia atque  
alia uena seccetur, non multum referre quum singula uenæ  
sibi in euacuatione respondeant.

Auic. 14. tra. 3. cap. xij. phlebotoma igitur in primis & nō  
hæsites in hoc quum non est prohibiter fortis et extrahe san-  
guinem abundantē. Et scias q̄ indiges in initio eius eo quod  
est simile in casu de repercussione et in frigidatione &c. Gal.  
13. meth. cap. 16. In iocinoris phlegmone etiam si nihil affluat  
reprimentibus utendum & reddit binam rationem, primo  
quia in principio parum est quod affluit, tum magna ex par-  
te non crassum, tum recipientis partis uirtus ualentior, secun-  
do quia nondum in afflicta parte uiolenter impactū est, quum  
uero phlegmone in suo uigore consistit contrario modo om-  
nia se habent, adest enim multitudo sanguinis crassus ac impa-  
ctus, tū uirtus partis debilior, ut a se superuacua amolliri nō



possit. De digestionē lege Auic. ibi, medicinae conuenientes ad postematibus hepatis in initio rei quum illic est caliditas superflua sunt aqua endiuiae & aqua solatri cum sy. acetoso & charino et aqua hordei arnaglossae cuscute cucumeris cucurbitae &c. De euacuatione loquitur Gal. 13. meth. cap. 15. ibi, considerandum an gibba uel in caua parte fiat inflammatio, si caua parte purgare per aluum conuenit si in gibba per urinas, lege etiā 14. caput huius ibi expelli e iocinore oportet quicquid in totū atrae bilis tū saniei ex phlegmone prouenientis iam collectū est &c. De regimine resolutionis loquitur etiā Auic. ibi quapropter indiges ut incipias a regimine resolutionis materiei in hac ægitudine plus q̄ sit tua inceptio in reliquis apostematibus, timēdo lapideitatem & duritiem etc. De cibo et potu habes plura ex Gal. 13. meth. c. 14. ibi, Poscit ergo tum iecur ipsum, tū os meatus quī bilē transmittit cibos, & pharmaca quae obstructa recludāt, qualia sunt nō lēta, sed quae tenui cōsistentia sine qualitate mordēte, nam a mordentibus phlegmones irritātur, nō dulcia quia a dulcibus tū iecur, tū liē intumescūt, talia igitur erūt, ut in cibis ptisana et in phar macis oxymel cum aqua mixtū, punica mala et quaecūq; adstringunt interdiciūtur, quum bilis meatus os arētent, & bilē ipsam excerni prohibeāt, & phlegmonas ipsas quae in cauo sunt uisceris irritent magis q̄ in gibbo, nam quum ad gibbum perueniunt iam quae assumūtur mutata sunt ut sic nec adstringant uel mordeāt etc. Auic in fi. c. cibus aut melior est chisch hordei infrigidat enim & abstergit et nō facit acquirere opilationes & festinat eius penetratio, panis nō ex furmēto sed ex simila & ex oleribus lactuca, & attriplies, ex fructibus granata dulcia, & cæt.

## Obiectio.

Miror mirum in modum mala punica dulcia hic ab Auic. concedi tum quia abstringunt, tum quia ex dulcibus hepar



intumescit & aquam hordeaceam hic concedi & in altero sequenti textu renui, ibi & aqua hordei quamuis abstergat sine mordicatione, tamen est dulcis & dulce facit incurrere opilationes & c. tamen a raze Serapione & Haliabbate cōmendatur, & c.

### Responsio.

Gentilis putat Auic. tex. corruptum & loco aque hordei legi debere aqua mellis, uide tu commentatores Auic. & intelles causas, alterius obiectionis.

### Observationes in cura inflammationis hepatis.

Marcus cat. de mēte Auic statim inquit succurrendum est huic agritudini non tantum in iecore, sed in quocunq; mēbro principali alioqui cura esset uana & c. Gal. 13. meth. ca. 8. prohibendum ne tumor augeatur nec suppuretur, cauendo etiam ne ad scirrhu conuertatur, nam facile tumor in duritiem eua dit & c. Auic. 14. t. 3. cap. 12. nullis remedijs succurrendum nisi prius facta sit sectio uene aut antequā pharmacū non conueniente sectione, sit exhibitū, nam inquit si phlebotomas, & dimittis materiā in hepate & admistras stiptica & apocrustica proculdubio induratur apostema. Caue tamen in exhibendo pharmaco, ne nimirū soluentibus utaris, nam hepar ultra q; imbecille reddūt humores etiā commouent ut interdū maiori copia ad locū laesum resfluāt, & c. Vitandum insuper ne urinā prouoces morbo in cōcaua parte existente, aut soluas uentrem si in gibba parte tumor fuerit & c. Gal. 13. meth. cap. 22. Quaecunq; iocineri intrinsecus uel extrinsecus applicantur, non sint adu frigida, nam ultra q; ad locum difficulter penetrarent, meatus etiam cutis ocluderent, & c.

### Observationes de repellentibus & resoluentibus.

Auic. loc. cit. Repellentia sint in stipticitate remissa & nisi tumoris, ut augeat caliditas cum aperientibus & incidentibus misceantur resoluētia citius in iecoris inflammationibus



sunt applicanda quam in ceterorū membrorū tumoribus etc.

Conferentia inflammationi hepatis.

Conferunt inflammationi hepatis agresta attriPLEX berberis, camphora capillus uen. acetositas citri cucurbita, endiuiā, cicoreum, hepatica, lupuli, mercurialis, nymphaea portulaca rheub rosa sandali, semperuiua solatrum spodiū sumach tamarindi uiolae. Cōposita sunt, confectio de acetosis mes. elestuarium de psyllio mes. cerotum de sandalis, emplastrum de frumento mes. de semperuiua hali, oleum irinum rosaceum, syr. acetosus de pomis, de portulaca, triasandali nic. triphera persica. troc. de sandalis mes. de spodio de camphora unguentū ros. uiol. hiera siracost mes. papauer cum oleo rosaceo etc.

De pronosticis inflammationis hepatis.

Auic. 14. tra. 3. ca. 1. Et apostema quod est in gibbositate est deterius eo q̄ est in concavitate. Et apostema hepatis siue calidum siue frigidum opilationem facit & non relinquit corpori nisi sanguinem aquosum, & cum hoc debilitat hepar in separando aquositatem quæ si in meseraicis continetur est causa hydropisis carnosæ & aselitis. Item quādo permutatur calidum ex hepate ad splenē est bonum, si uero ex splene ad hepar malū. Et ca. 2. Interdū omnis species apostematū hepatis perducit ad hydropē, & scias quod quū apostemati hepatis associatur uentris solutio est mortale, & cap. 16. non euadit aliquis ex apostemate duro quiescente, & confirmato.

Hip. aph. 7. aph. 46. Quorum hepar suppuratur adurit, si pus purum et albū fluxerit, euadunt, nam in tunica his pus cōtinetur, si uero qualis amurca fluat, pereūt. B. quia si pus album et purū fluat, signū est q̄ ad carnē hepatis usq; corruptio nō pertingit, sed tantū in eius tunica fuisse, si uero ut fex olei fluat tunc declarat substantiam hepatis esse corruptam, idcirco non ab re moriuntur & c. Hipp. aph. 7. aph. 17. In hepatis



inflammationibus singultus malum. B. quia ex magnitudine inflammationis stomachus cōpatitur, unde fit singultus. Hip. aphor. 6. aphor. 18. Vesica descissa aut cerebro aut corde aut septo transuerso, aut aliquo extenuioribus intestinis aut iocinore, lethale est &c.

Authores dissentientes circa morbos hepatis.

- 1 Adserere, aquam hordaceam non conuenire in inflammationibus hepatis.
- 2 Adserere, profluuium uentris in apostemate hepatis ex abundanti materia non esse mortale.
- 3 Adserere, nutrimentum uiscosum non nocere hepati.
- 4 Adserere, hepati supercalefacto, cerusam tanquam frigidam esse applicandam.
- 5 Adserere, stipticiora magis conuenire in hepatis apostematibus quam stomachi.
- 6 Adserere, in apostemate hepatis phlebotomiam potius in pede quam in brachio fiendam.

Confutatio dissentientium circa morbos hepatis.

Ad primum, aqua hordei non solum ab Auic. sed a Serapio. 4. tract. cap. 2. & a rhaze in lib. diuis. & a Gal. 13. meth. ut supra, maxime igitur dum commendatur conuenit.

Ad secundum, Auic. quum hepatis apostemati sociatur fluxus uentris est mortale, & intellexit propter materie exuberantem, similiter factus ab imbecillitate hepatis est mortalis ut uolunt Auic. commentatores. Ad tertium, Serapio indiget hepar cibis & potibus & medicinis apertius non uiscosis sic subtilibus, non mordicatis neq; dulcibus neq; stipticis & ponticis eo q. opilant &c. igitur &c. Ad quartum, respondet. Conciliator differentia 197. quod per se cerusa nocet hepati quamuis cum alijs quæ suam uirtutem introferant possit interdū iuuare. sed melius esse cum alijs aromaticis operari,



Et c. Ad quintum, respondetur per ea quæ dicta sunt in cura, Nam Auic. 13. tra. cap. 1. Quoniam ex magis stipticis grande nocumentum resultat eo quod hepar uelocius quam stomachus correspondet duritiei quænam inducunt stiptica Et c. Et sic non conferunt magis hepati quam stomacho Et c. Ad sextum, Auic. allega. cap. inquit phlebotoma si tibi possibile est ex basilica, Et si non ex nigra et si non ex cephalica eo quod directius hepar respiciunt, Et hoc etiam habes ex Galeno in cura igitur magis in brachio quam in pede.

#### De morbo regio.

Icteria dicta est ab ictero aue quam nos galbulam siue ficcedulam dicimus, de qua facit mentionem Mart. dicens.

Galbula decipitur calamis Et retibes ales

Turget adhuc uiridi cum rudis una mero.

Dicta est etiam aurigo a colore auri, uel arquatus morbus a celestis arcus colore, aut morbus regius eo quia morbo affectos adparatu regio et ludis lasciuis uti perutile est. Hor. aut mala quem scabies aut morbus regius urget. Est autem morbus regius per totum corpus bilis suffusio quæ interdum nigra interdum flaua est ex qua color citrinus uel niger apparet Et c.

#### Loci consentientes de morbo regio.

Plin. Ictericis aris a colore uocatur, quæ si spectetur ab icterico, sanari id malum tradunt Et auem mori. De deductione horum nominum lege fusius cor. cel. Et Aet. ser. 10. cap. 17. et neotericos omnes. Gale. lib. finit. med. aurigo seu morbus regius arquatus uel est bilis refusio in cutem quo fit ut superficies tingatur lutea; fiat Et uitietur cutis, Et c.

Auic. decimaquinta tertij, cap. 3. Icteria est coloris corporis fœda alteratio ad citrinitatem uel nigredinem tendens obcursum humoris citrini Et nigri ad cutem sine putrefactione Et c. B. similis definitio legitur etiam penes concil. dis. 78.



adiungit tamē Auic sine putrefactione, quia reuera dum bilis putresceret nō icteritiam tantum sed febrem tertianam produceret. Vide Aet. serm. 10. cap. 17. & Paul. lib. 3. cap. 50.

De causis morbi regij.

Causae si extrinsecae fuerint tres erūt scilicet uirus alicuius animalis, assumptio ciborū icteritiam efficientiū uel bilem generantium & obstruentiū, et nimius labor in sole calido. Intrinsecae uel fiūt ab hepate uel ab alijs membris. Si ab hepate uel erit mala intemperies calida uel frigida cum abscessu uel sine abscessu, aut obstructio aut facultatis attractoriae uel secermentis imbecillitas. Si a splene tunc in causa est apostema, uel obstructio uel mala complexio uel eius facultatis imbecillitas, & sic de alijs membris intelligito. Interdum fit per morborum iudicationes, &c.

Loci consentientes de causis morbi regij.

Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. Morbus regius nonnunquam fieri solet iocinore nequaquam affecto per morbi iudicationē. Interdum citra morbi iudicationem dum sanguis extranea quadam corruptione in bile uertitur, qualis ferarū morsu fieri solet, aut assumpto ueneno. Interdū fit ab obstructione, aut ab inflammatione, aut a scirrho iocinoris, aut citra haec ab ipsa tantum iocinoris intemperie praeter naturā mutata, aut a iocinore suo munere non fungente, aut ob splenis uitia. Interdū ab attractricis folliculi fel continentis imbecillitate, aut quia folliculus est obstructus aut quia eius facultas secretiora est imbecillior. Interdum fit etiam ab obstructis aut infirmis uasis quae ab ipso exorta, ora sua in hepar extendunt &c. Auic. 15. cap. 3. ibi, icteritia citrina aut fit multitudine generationis cholerae citrinae aut propter euacuationis eius prohibitionem & multitudo eius generatur ab hepate propter causas calefacientes aut propter apostemata in hepate et in meatu cholerae.



aut propter opilationem retinentē choleram in felle aut propter caliditatē complexionis cholerae & c. lege fusius & tam intrinsecas quam extrinsecas causas icteritiae intelliges. Vide & Gordonium & Arcul. in proprio cap.

Gal. apho. 4. com. 62. Tres sunt affectus quibus morbus regius solet aduenire, tumor durus, inflammatio, & obstructio. B. Nam dū sanguis expurgatur et bilis a uenis ad meatus bilē recipiētes transfertur, si triū alterū adfuerit, necesse est sanguinem nō expurgari, sed una cū ipso bilem per totū corpus differri, unde morbus regius oritur. Vide Pau. li. 3. c. 50. et Au. de opilationibus hepatis ibi materia q̄ generat opilationem aut est humor opilās pp suam crassitiē, etc. lege eū fusius. etc.

#### De signis morbi regij.

Signa communia sunt pigrities & tumor ad motum grauians dulces cibos auersantur, rarijs imaginibus uexatur pruritus totius corporis adest, difficulter exudant, Alba oculorū & faciei tempora & male pallorem demonstrant, & c.

Signa male hepatis temperaturae per ea quae de imbecillitate hepatis diximus satis nota erunt, similiter & abscessus signa per ea quae retulimus de inflammatione hepatis & c.

Signa opilationis sunt grauitas dolorq; sub dextra parte, nullo tumore uel urgēte febre percepta, Itē si egestio flaua nō egrediatur sed alba. Signa imbecillitatis expulsoe facultatis sunt si ruina nullo colore infecta excernatur, etiā si nulla grauitas percipiatur, Cognoscitur et ex attractoria facultate fieri, si nausea uomitus, Amaritudo oris, nullo apparēte in iecore grauitatis sēsu adfuerit et flauus color paulatine et nō subitus fiat. Signa ueneni erūt, si nulla prius existēte humorū malitia, sed ex homine sano, statim icterus euadat, Nam absq; mora, uirus per totum corpus diffunditur, Signa sumpta a crisi sunt, si febres praecesserūt acutae, & alia quae crisin indicare



solent, Signa q̄ per consensum totius corporis fiat erunt ex febris quæ tenues sanguinis partes in bilem commutant, Signa q̄ fiat a chisti felle sunt q̄ accidit subito, & egestio est alba, adest amaritudo oris & sitis & si porrus qui uadit ad stomachum est opilatus tunc urina est colorata spissa crocea egestio tincta crocea & c.

Signa q̄ ex splene fiat, sunt durities splenis grauitas & icteritia potius nigra quam flaua & c.

Loci contentientes de signis morbi regij.

Aet. ser. 10. ca. 17. Cōmuniter omnibus ictericis adest pigrities & tumor ad motum grauens & c. Gal. 5. de loc. aff. ca. ult. si per morbi Indicium icterus fiat, Indicium erit q̄ excrementa & urinae secundum naturam se habebūt. Si sanguis externa corruptione in bilem uertatur, Indicium erit totius corporis prasinus siue porraceus color, Si ab obstructione folliculi felle fiat, signum erit q̄ citra febrem morbus regius accidit Vrgetq; in dextra præcordiorum parte grauitatis quidā sensus, Si uero ab inflammatione uel alio abscessu, tunc febris aderit cum biliosis deiectionibus & in dextra præcordiorū parte dolor, Si ab intemperie hepatis humorum corruptio contingat, tunc totum corpus herbis candenti pallore infectis assimilatur, interdum plumbeum aut magis fuscum colorem refert, Si ob splenis uitium tunc colores ueniūt multo nigriores quam ab hepate & c. Lege de his. 9. de compos. med. per loc. cap. 1. B. Nota tamen q̄ uelle ex colore tantum affectū sedem diuinare est malum ut Gale. refert. 5. de loc. aff. cap. cit. de Slesiano exemplum afferens & c. Lege etiam Aui. 15. Tra. 1. ca. de signis icteritiæ citrina nam omnia illa nuper a me recitata Signa habet quæ tu latius uidere poteris si. n. omnia in unum cōgerere longe a negotio res librum excederet, Vide de his Arcul. & Gord. Paul. & ceteros practiçantes. Similiter de



icteritia nigra lege Gale. 6. de loc. aff. cap. de affectibus lienis  
 & Aet. ser. 10. cap. 17. Vide etiam Auic. de signis opilationis  
 hepatis, ibi, signa opilationis sunt & c.

De cura morbi regii.

Morbus regius Indicatorie ex febribus perfecte solutis  
 eueniens, visibilis ad cutem translata, sit multū crassa balneis  
 uel rebus discussorijs facile curabitur, quale est balneum ex  
 aqua dulci, uel ablutio oculorum & totius corporis cum ace-  
 to albo calido et succo citri in quo bullierint flores camomil-  
 læ & c. Verum si crassa fuerit imprimis extenuantibus uti  
 oportet deinde discussorijs. Si a causis primitiuis fiat Auri-  
 go, tunc singule remoueatur, ut si morsus uiperarū sit in cau-  
 sa. i. curetur ad externas partes uirus deducendo & membra  
 principalia tuendo, Si cause sint per consensum a toto ut in  
 febribus, remoueatur febris cū euacuatione sectione uenæ et  
 soluentibus pharmacis, deinde infrigidantibus, ne sua calidita-  
 te sanguis in bilem conuertatur. Si uero fuerit caliditas hepa-  
 tis uel alterius membri, remoue per infrigidantia, cauendo  
 obstructionem & membra demum roborando.

Cura Arquati ex multitudine bilis quatuor habet intentio-  
 nes prima est euacuatio, ne dum superfluit bilis ipsa suæ multi-  
 plicationis sit causa, quæ fieri interdum debet cum sectione  
 uenæ interdum cum pharmaco ut casia māna Rheubarbaro,  
 electuario de suc. Ros. mes. Diaprunis sol. & c. secunda est hu-  
 moris preparatio et fit cū acetoso simp. syr. de endiuia, uiol.  
 de cicorea, de suc. acetosæ de Agresta, de limonibus de acetos.  
 citri cum aquis & decoctis similibus. tertia intentio est dis-  
 crasie membri derelictæ remotio unde in causa calida conue-  
 nit tale Epithema, Recipe Aquæ endiuie li. i. ros. un. ij. sanda-  
 lorum spodijana. drac. i. aceti un. i. spicæ scrup. i. Misc. & cum  
 syndone applicetur hepati uel fiat ceratum sandalinum. Ele-



fluaria sunt tria sandali diarhodon. Troc. de camphora. quarta intentio erit sex rerum non naturalium ad frigidum et humidum declinantium, de quibus satis alias diximus etc. Cura icteritiae ex obstructione quatuor etiā intentiones requirit, prima humoris obstruentis incisio extenuatio atq; reformatio & fit cum syr. bisantino cum aceto, de duabus rad. rhodomelle oxymelle syru. de eupatorio de cicorea & c. cum aquis foeniculi Apij cuscute & eupatorii, Consulerē tamen in hoc ut prius stomachus cum cassia uel pillulis aleophanginis purgaretur antequam ista exhibeantur. secunda erit euacuatio quae perficitur cum ijs quae bilem crassam & pituitae admixtā purgant ut puta cum rheub. Agarico Diaphinicone Diaturbit & enemate acri quod ad intestina superiora pertingeret tertia intentio est palliditatis uel foedi coloris ablatio et occlusarū uiarum apertio, & fit cum rebus aperientibus & urinā prolificentibus, ut cum decocto Apij foeniculi Asparagi brusci petroselinii aqua raphani, uel decocto marubij prasi cicerum rub. absinthij Centauri minoris cuscute uel cum infusione cartami in lacte morae Auic. uel cum dialacca Diacurcuma dialcamento troc. de rheub. de eupatorio etc. quarta intentio sit circa regimen quod calidum & aperiens, & extenuans instituat. Curatur Aurigo si a facultatum siue Iecoris siue folliculi fel continentis imbecillitate fiat, prout de hepatis imbecillitate iam dictum est, & c.

#### Loci consentientes de cura morbi regij.

Gal. 9. de compos. med. per loc. cap. 1. IctERICI qui ratione Indicationis febrium sunt, curantur balneis aquarum potabilium, & olei discussorij affricu, omniumq; rare facientium cunctem, quale Anethinum oleum et chamemillum, Qui uero regium morbum ex obturatione incurrunt. per omnia quaecunq; strenue extergēt, etiam si medicamentariam substantiam habeāt  
& calide



& calide sint facultatis, curantur. Conueniunt ictericis ex in-  
 flammatione hepatis quæcunq; inflammationes sanant. Si ue-  
 ro inflammatio & obturatio simul conincidant, laxantibus  
 simulq; extergentibus opus erit, fugienda tamen quæcunq; me-  
 dicamentaria substantia & calide facultatis existunt &c.  
 Auic. 15. trac. 1. cap. 6. scias quod intentio in curatione icteri-  
 tiæ ad duas res tendit, quarum una est ut remoueatur icteritia  
 cum eo quod resoluit ipsam a cute et ab oculo cum medicinis  
 lauatiuis & solutione educantibus materiam facientem icte-  
 ritiam, Secunda uertitur ad causam & abscindit eam, & est  
 aut rectificatio complexionis, aut confortatio uirtutis, aut re-  
 gimen apostematis, aut apertio apostematis, aut apertio opi-  
 lationis, aut euacuatio per phlebotomiam basilicæ &c. Aet.  
 ser. 10. cap. 18. secatur uena quibus copia sanguinis una cum  
 bile in toto corpore abundat, aut quibus dolor uel distensio  
 circa præcordia fuerit. Et de purgatione loquens dixit. Qua-  
 re in principio purgare non oportet priusquã per deopilan-  
 tia bilis attenuetur, Namq; mali causam purgationes in prin-  
 cipio datæ præbuerunt &c. Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. Quibus  
 morbus regius citra febrem accidit, urgente in dextra præ-  
 cordiorum parte grauitatis cuiusdam sensu, ijs omnibus ob-  
 structiones aperiens & cibis & potibus & medicamētis ex-  
 tenuantibus, deinde medicamentum quod bilem ducere pos-  
 sit exhibens eorū plurimos una die sanitati restituiimus &c.  
 Lege de his oībus intentionibus. Arc. Gor. Mar. cat. et ceteros  
 practicātes. De cibo & potu, et de alijs sex rebus nō naturali-  
 bus, lege Aui. 15. c. 6. ibi & cibus quidē ictericorum et c. 7. ibi,  
 cibi in oībus illis sint cibi leues, uide eū fusiū, uide et alios sibi  
 præscriptos authores.

Observationes in cura.

Auic. 15. cap. 6. omnes qui habent ictericiam ex causa cali-  
 da deuitent iram & motum primum & balneum &c.



## Conferentia morbo regio.

Conferunt icteritiæ Absinthium cum apio uel adiantho, A-  
cetosa, Acorus Aphodillus, Agaricum, Aloes, Alchechengi  
Assarum, Attriplex, Berbena Betonica, ciclamen. calametum,  
chamedrys, chamepitis, Camomilla Cassia filiqua, Centau-  
rium, cartamum, curcuma, cuscute, Elleborus Endiuiia, Eupa-  
torium, Epatica, feniculus lactuca asini, lumbrici, lupulus,  
Marubium, Menta Multipedes aseliue Nepita, origanus, Peo-  
nia perdix peucedanum, aqua raphani, Rheubarbarum, Ros-  
marinus, Rubea tinctorum, aqua salicis, sulphur cum ouo, Sca-  
riola, scolopendria sine citrach, stercus asini pulli bibitum,  
Tamarindi Tamariscus, Vrina, Vrtica, hissopus, Composita  
sunt, confectio de rauedseni de eupatorio mes. Decoctum fu-  
miterræ et coltulæ Diarhodon nic. electuarium de psyllo, Ro-  
satum mes. Diaphinicon, oleum de cartamo de absinthio,  
syrup. bisantinus de fumoterræ de Absinthio, de cicorea cum  
rheub. Oxymel scilliticum Sotira nicolai, Theriaca, Triasan-  
dali, Triphera persica mes. Triphera saracenica nic. Tro. de  
rheu. de rosis de eupatorio de camphora uinum scilliticum  
pilulæ inde de fumoterræ &c.

## De pronosticis morbi regij.

Hip. apho. 4. apho. 62. Quibus in febribus morbus regius  
ante diem septimum acciderit, malum, Et apho. 64. eiusdem  
lib. Quibus in febribus morbus regius septimo uel nono uel  
undecimo uel quarto decimo superuenerit, bonum, nisi dex-  
trum hypocondrium obduruerit, si uero non, bonum. B. Mor-  
bum regium in febribus accidere ante septimum, malum ex  
eo est, quia uel ab inflammatione uel a duro hepatis tumore  
uel ab ipsa obstructione oriri indicat, post septimum uero,  
bonum, nisi ex dictis quispiam affectus hepati acciderit. Vide  
tamen pro apho. isto hip. 4. de uic. in morbo ac. com. 81. Hip.



aphor. 6. apho. 42. Morbo regio laborantibus, si fiat hepar durum, Malum est. Et apho. 5. Qui morbo regio laborant non admodum uentosus sunt, B. quum nec uentris imbecillitate nec pituitoso humore a quibus fieri solet ipse, flatus, icterici laborant, idcirco flatuosi non esse possunt.

Auic. 15. cap. de icter. In omni opilatione in meatu hepatis ad fel, aut in meatu fellis ad intestina quæ est ex incarnatione, aut porro non speratur sanitas. Et in eo qui habet icteritiam frigidam qui non curatur nec resoluitur eius materia est timor, Et pluribus eorum associatur mors subita. Et quando multiplicatur remanentia urinae albæ cum ictericia, aut parum tincta est deterius & magis timendum ne cadat habens eam in hydropem, Et ad sumum dum non remouetur apostema & rectificatur dispositio, nō habeas spem in curatione ipsius icteritiæ &c.

Authores dissentientes circa morbum regium.

1. Adserere, icteritiam ante septimum apparentem semper esse malum indicium.
2. Adserere icteritiam post septimum apparentem absque tumore hepatis esse bonum signum simpliciter.

Confutatio dissentientium circa morbum regium.

Ad primum. Respondetur esse uerum, nisi icteritia cum alia euacuatione coniungatur utputa cum sudore uel uentris fluxu nam tunc est bona & hoc uoluit Gale. in fine commen. 62. 4. apho. Ad secundum. Respondetur q. icteritia proueniens in 7. 9. & 11. non est iudicanda bona nisi materie concoctio præcesserit & hoc uoluit Auic. Vbi de signis icteritiæ determinat unde inquit si icteritia accadat in septimo aut nono, cum signis laudabilibus sine hepatis læsione tunc erit bona, si minus neutiquam. Igitur non simpliciter bona &c.



## De splenis affectibus.

Scias q̄ omnia morborum genera huic membro accidere possunt, sicuti Intemperies calida frigida humida sicca, siue nuda siue cum aliquali materia qualis est imbecillitas splenis aut mala compositio aut obstructio quæ nihil aliud est quam morbus in uis lienis prohibens naturalium aut superfluarum humiditatum transitum quæ per ipsum transire naturaliter consueuerunt, aut solutio continui qualis est dolor qui est splenis quædam tristis sensatio non per carnem ipsam splenis sed potius per paniculum eam contegentem facta, Hinc etiã abscessus plures enumerantur species ut dura mollis biliosa sanguinea.

## Loci consentientes de splenis affectibus.

Auic. 15. tra. 2. cap. i. spleni accidunt omnes species ægritudinum, quæ sunt mala complexio compositio sicuti opilationes & solutio continuitatis & similia, & apostemata cum speciebus suis & c. Gal. 6. de loc. aff. cap. i. Quum itaque splen multa habeat accidentia cum hepate communia, illa nulla re differre uidentur nisi quod quædam magis quædam uero minus alterutri euenire solet & c. Lege de alijs Arcul.

## De causis affectuum lienis.

Cause imbecillitatis splenis est ipsa intemperies calida frigida sicca & c. Cause obstructionis sunt uel cibi crassi et atrabilarij, aut aliquod apostema uel flatus crassi obstruentes, Cause doloris est soluta continuitas siue a mala intemperie, siue ab apostemate siue a flatu crasso facta. Cause apostematum splenis procatarticae sunt aer crassus uinum crassum & cibi atrabiles. Cause antecedentes & coniunctæ nonnullæ per se existunt, aliæ per consensum, per se sunt uel expultricis imbecillitas uel attractoriæ fortitudo aut alteratrici debilitas, aut obstructio illius uenæ per quam atrabilis ad os stomachi defertur, Materia uero efficiens apostema uel est san-



guis niger, uel alij humores quamuis raro pituita. Per consensum sunt totius ut in febribus uel partis, ut in hepatis intemperie aut in uteri mensrua retinentis, &c.

Loci consentientes de causis affectuum lienis.

Quod intemperies sit causa imbecillitatis lege Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. ibi omnium facultatum essentia &c. & 6. de sympt. cau. cap. 2. Auic. 15. Tr. 2. ca. 9. opilatio quandoq; fit ex uentositate quandoq; ex apostemate & ab humoribus secundum quod sciisti &c. Gal. 9. de compos. med. per loc. cap. 2. splen. & natura celerrime indurari solet sanguine nimirum in uenis obturato, & ob crassitiem, neq; excerni neq; discuti facile potente Auic. 15. cap. 13. Dolor splenus aut fit propter uentositatem & inflationem aut propter apostema magnum aut propter solutionem continuitatis aut propter malitiam complexionis &c. De causis apostematum lege fusius Arcul. 9. almans. Alexan. lib. 3. cap. 25. oboriuntur in liene non raro ut dictum est inflammationes quarum uniuscuiusq; singuli humores possunt existere cause ut sanguis bilis etc. Similiter Auic. loc. cit. ubi inquit sed phlegmaticum accidit raro, Lege neotericos omnes præsertim Arcul. & Gord.

De signis affectuum lienis.

Signa temperaturæ calidæ sunt sitis inflatio lienis, corruptio attractoriæ facultatis, Signa frigidæ sunt, casus appetitus, fastidiosa facietas, Rugitus ac ructus copia imbecillitasq; attractoriæ facultatis, Signa siccæ sunt durities corporis imbecillitas, crassities sanguinis, & color nigerrimus, Signa humidæ sunt, corporis molities nigredo ad albedinem decliuis, & cet. Signa obstructionis sunt grauitas lateris sinistri, distentio & dolor, nec adsunt signa alicuius abscessus. Signa attractoriæ facultatis sunt totius corporis ex sanguine impuro nigrities & obstructio, Signa retentricis



affectede sunt, uomitus sine febre uel alia occasione. Signa Inflammationum lienis cognoscimus ex dolore feruore distentione febre & ex eo q. ad tumidam duritiem quæ scirrhus dicitur Paulo post desinit, ijs etiam os fatet gingivæ exeduntur ulcera in cruribus cicatricem non recipiunt, deinde affecto Iecore hydropici fiunt &c.

Loci consentientes de signis affectuum lienis.

Auic. 15. Trac. 2. cap. 2. calidam significant complexionem sitis & inflatio in sinistro & corruptio uirtutis attractivæ, Frigidam significant debilitas attractiones & casus appetitus & iteratio fastidiosa sacietatis &c. lege eum ulterius, De signis obstructionis lege Paul. lib. 3. ca. 49. ibi. At si lienem grauatas & distentio & etiam dolor exerceat, meatus obstructio ostenditur &c. De signis facultatum lienis loquitur Gale. 6. de loc. aff. cap. 1. ibi, si alteratrix facultas imbecillis sit sanguis ex iecore in uniuersum corpus impurus transmittitur, quo circa color nigrior euadit, Si uomitione uero sanguis melancholicus excernatur qui per inferiora interdum decedere uidetur, Indicium est q. retentrix facultas imbecillis sit, At si euacuatione suppressa mæstitia melancholica superueniat & cibi auarissime concupiscantur acida maxime existente quæ ad uentriculum transfertur melancholia, expultricem laborare Indicium est.

De signis apostematum lienis loquitur Paul. loc. cit. ibi Inflammationis notæ sunt feruor dolor distentio & Paulo post induritiem occalescit, hoc pressis uitio os fatet, gingivæ exeduntur &c. B. quæ gingivæ corrodantur ratio est quia uaporis corruptio ad partes gingivarum ascendens eas exedit. Lege de his Aui. de signis apostematum splenis, ibi, communicant apostemata splenis in grauedine magnitudine &c. Lege etiam Alexan. tral. lib. 3. cap. 25. Item Arcul. & Gord.



## De cura affectuum splenis.

Cura complexionis simplicis est alteratio & regimen contrarium ita ut causa remoueat, Si uero fuerit mala intemperies calida cum humoribus tunc tres opus erunt intentiones prima alteratio sine humoris digestio quæ fit cum syrup acetoso simp syrup. uiol. de endiuiâ de fumo terræ de lupulis cum aquis endiuiæ fumiterræ lupulorum cicorij & c. secunda erit euacuatio quæ fit cum rheubarbaro, manna casia pillulis Aureis aggregatiuis electuario de suc ros. & c. tertia est resolutio debilis cum roboratione membri, ita ut mala intemperies remoueat & fit cum zucchero ros. uiol. triandalis Diarhodone uel per ea quæ extrinsecus adhibentur inungendo cum oleo rosaceo uiolaceo & c. Temperies uero frigida curatur cum his quæ humorem pituitosum præparant quale est oxymel simp. & compos. scilliticumque rhodomel syrup. de duabus rad. bisantinus, Euacuatio cum agarico, hiera Gale. diaphinicone & c. Remouetur mala intemperies derelicta cum electuario diamusc. dul. de baccis lauri, unguendo extrinsecus cum oleo de spica de ruta de capparibus & c. Cura materiæ uentosæ similiter digeritur euacuatur ac resoluitur, & pro resolutione conueniunt, diaciminum Diatrionpipereon Thyriaca. Extrinsecus resoluunt fortius ex anetho ruta pulegio calamento. s. anisforum cimini fœniculi, similiter oleum rutaceum de capparibus & c. Cura inflammationum quatenus ad causam antecedentem attinet, euacuatione & reuulsione indiget, quatenus uero ad causam coniunctam tunc sicuti in alijs abscessibus in primis repellendum, in morbi incremento repellentibus cum aliquali resolutione utendum, in statu et declinatione resoluendum nisi abscessus in suppurationem uertatur, quia tunc suppurantia opus sunt, Euacuatio igitur in causa antecedente, si humoris



copia cum sanguine abūdet tum uena cōmuni, tum ab ea quæ inter anularem & minimū digitum collocatur sectio fieri debet uel retentis menstruis uel hæmorrhoidibus a uena in talo pedis. Euacuantur alij humores præparata prius cum cōfectione eorum materia per ea quæ millies dicta sunt. Reuulsio fiet cum enemate splen respiciente aut hæmorrhoidarum & menstruorum prouocatione &c Cura apostematis duri tres similiter requirit intentiones, prima præparatio humorum cum syrup. de epithimo fumoterræ oxymelle &c. secūda euacuatio quæ fit cum cōfectione Hamech casia Myrobalanis in dis epithimo &c. pilulis indis de fumoterræ de lapide lazuli &c. tertia est mollicatio & resolutio quæ perficitur cum unguentis ceratis cataplasmate fotu &c. de quibus plura habes iuxta Arcul. & Gord. Cura facultatum affectarū his metremedijs perficitur si modo quidpiam austerum adiungatur, &c. Cura doloris est ut eius causa remoueatur, quæ si fuerit mala intemperies calid. frig. per contraria remouebis, si flatuosa materia curam habuisti, si ex inflammatione cura earum cura & utere anodinis prout alias in alijs doloribus dictum est, Cura obstructionis splenis sit perinde ac de icteritia dictum est, &c.

#### Loci consentientes de cura affectuum splenis.

Gal. 13. meth. cap. 2. Vbi lien phlegmone inuadit, in sinistra manu secanda est uena, siquidem quod euacuandum sit, cōmunis est indicatio. Et. 9. de comp. med. per loc. cap. 2. deinde attenuantibus opus est pharmacis citra manifestam caliditatē, ut ne uehementē incrassescat succus crassus in ipso obturatus, Quo uero actiones ipse conseruentur ex austeris aliquid his admiscetur quale etiam adstringentium genus, ea gratia igitur amara ualde medicamenta ipsi offerimus, & quædam ex austeris ipsis admiscemus, Et. 13. meth. cap. 16. Quotiens ob-



structio quæ in eum incidit aut phlegmone potissimū ad scir-  
rhum perueniunt, tum ea quæ obstructiones eximant, tumq;  
dissecant ualentiora exigit. Nam quale medicamentum Ieco-  
ri est absinthium, tale est lieni capparidis cortex & quale est ie-  
cori eupatorium tale est spleni scolopendrium & c. Alex. lib.  
3. cap. 23. calidiori & sicca lienis intemperaturæ cōtrarij me-  
dicamentorum auxilijs frigorificis & humectantibus subue-  
niendum est, frigida uero & humida caloricis, & arefa-  
cientibus præsijs succurrere expedit, & c. lege eum fusius  
nam, ibi, plura ad curam facientia intelleges, & demum om-  
ne genus eduliorum in morbis splenis congruentium, etiam  
percipies, Lege in super Arcul. Mar. cat. & Pau. lib. 3. ca. 49.  
& Auic. 15. Tract. 2. cap. de cura splen. Item Aet. & Gord. et  
omnia a me recitata intelliges.

#### Observationes in cura splenis.

Gale. 13. meth. cap. 16. Valentiora tanto magis lieni con-  
gruunt quanto crassiori utitur alimento & c.

Auic. 15. tra. 2. cap. 3. est proxima curationibus hepatis &  
indiget ut sint medicinae fortiores & penetrabiliores, pene-  
trare uero faciunt ea quæ obseruant uirtutem super eos quous-  
que perficiunt operationes suas, & c.

#### Observationes de phlebotomia.

Auic. loc. cit. cap. 5. Et phlebotomia plurima apostemat  
splenem euacuando subtile, & remanendo crassum, idcirco  
Razes dixit non multum referre de uena secanda, dummodo  
uulnus illatum longe pateat.

#### Observationes circa localia in cura splenis.

Auic. loc. cit. cap. 6. Applicanda in curatione, seruet latus  
stipticitatis, sed cum cautella calefactionis uehementis, ne ma-  
teria ad crassitiem et duritiem festinet, nam ambo uiscera ad  
duritiem opportuna sunt, sed misceantur cum eis medicinae,



in quibus sit incisio aliqua cum caliditate equali. Et cap. 7. & scias q, res calide ualde nō sunt multum conuenientes spleni propterea q, indurant & exiccant & prohibent a resolutione & c. Itidem fatetur Paul. & Gale.

#### Observatio circa medicamenta.

Gale. 13. meth. cap. 17. Sane duplex ratio est eius medicamentorum usus quum partes superiores posite laborant per ea quæ eduntur & bibuntur, inferiores per id quod fit per clysterem infusum & c. Paul. lib. 3. cap. 49. cibus competit tenuis acris siccus potio paucissima.

Auice. 15. tra. 2. cap. 7. omne lac præter lac camelarum est malum spleni. Et in administratione ciborum melius est ut administrentur ante eos balneationes longe deinde assumat incisua subtiliatiua & facientia sitim & sumat in potu uinum mixtum cum aqua marina & subtili & regimen per tres dies. Lege Gal. 13. meth. cap. 17. ibi scirrho laborantibus conuenientia medicamenta & c. lege etiam Alex. tra. lib. 3. ca. 23. nam fusissime de omnibus cibus ibi pertractat & c.

#### Nocentia spleni.

Nocent spleni, lagana, bouinæ carnes, dactili, ficus, lac, lentes, uinum dulce crassum nouum, aqua cruda frigida, omnia unctiuosa, legumina, olera, caseus antiquus salitus, aues aquaticæ omnes fructus aquosi omne splen, & omnis aer crassus paludosus autumnalis & c.

#### Conferentia spleni.

Conferunt splenis affectibus frigidis, absinthium, acorus, agaricus apium ammoniacum, agrimonium, assarum, aristologia betonica camedrys capparis, caules, cyclamē, cyperus, costus, ebulus hederæ helleborus epithimum lapatium, lapis lazuli, lapis armenus, lentiscus, lilium, mel, menta mercurialis, nasturtium, nux mosch. oua origanum, passula, pastinaca,



peonia politricum, pulegium, prassium, pulmo uulpis raphanus, ruta, radix capparorum, radix genestræ, salvia sandaraca sena serpillum, stechas scolopendrium spica squilla tamarius, urina hominis, urtica, hisopos, iris uinum extinctio nis auri &c. Composita calida sunt diacurcuma diatrion pipe reon syro. de calameto de stachados de absinthio de fumoter ræ. troc. de absinthio de capparibus, hiera &c. Frigida sunt simpl. acetū scilliticū aqua calibeata blea, corallus, cornuceri uī ustu, lactuca asini morus mirobalani oēs uitis uiola &c.

#### De pronosticis affectum spleni.

Auic. is. tra. 2. ca. 4. si spleneticus inuenit dolorem interiorē rem est magis saluus quia in ipso adhuc speratur sensus, 2. Quando accidit fluxus uentris cum sanguine est melius quia speratur cum ipso resolutio materiei splenis, si autem perseuerauerit aduenit ei lubricitas hydropica & morietur. 3. Qui catharrhum habet non ei accidit splen. B. quia humiditatis copia, humidam intemperiem arguit, ex qua raro atrabilis contingere solet. 4. Qui habet dolorem in splene suo, et currit ex eo sanguis rubeus, & apparent in corpore eius ulcera alba non lædētia morietur in die secundo & si non cadit appetitus. 5. Quandoq; terminantur apostemata splenis fluxu sanguinis narium, & proprie ex latere sinistro, & apostematibus apud aures difficilis suppurationis, & apertionis propter grossitiem materiei. 6. Et laudabilior urina eorum est crassa sanguinea, & urina in qua est fex uiscosa, quandoq; significat sanitatem splenis & destructionem eius. Vltimo inquit apostemata splenis conuerti ad iecur, malum econtra uero bonum. Hip. aphor. 6. aphor. 43. Quicunq; lienosi difficultate intestinorum capiuntur, ijs superueniente longa difficultate intestinorum aqua intercutis aut leuitas intestinorum aduenit & moriuntur. Et aphor. 6. aph. 48. lienosis difficultas



tas intestinorum superueniens, bonum. Lege etiam de hac re aphor. 22. tertij lib. ibi autumnno uero &c. lege etiam Arcul.

Authores dissentientes circa morbos splenis.

1 Adserere, materiam in splene posse educi conuenienter per uias urinae.

2 Adserere, omne genus lactis in splenis duritie conferre.

Confutatio dissentientium circa morbos splenis.

Ad primum impugnat Gal. 13. meth. cap. 17. ubi inquit gibbum hepatis expurgari per renes sed lien per intestina, quoniam per renes euacuari, nulla lieni uacuando uia pateat.

Ad secundum respondetur quod lac ex eo quod obstructione inducit nequaquam conceditur, uerum quum lac camelarum a proprietate lieni conferat idcirco laudatur ab Auic. et hac ob causam non omne genus lactis conceditur &c.

De malo habitu.

Malus habitus quem Graeci καχεξία, dicunt, est prauius quaedam ad hydropem dispositio ex mala hepatis concoctione proueniens, &c.

Loci consentientes de malo habitu.

Paul. lib. 3. cap. 47. Principia aquarum cutem subeuntium uocare graeci καχεξία latini malum corporis habitum consueuerunt. Aet. ser. 10. cap. 19. Quum corporis habitus in aquo sitatem diffunditur καχεξία a graecis appellatur. Auic. 14. tra. 2. cap. 3. Quum corrumpitur digestio hepatis et communicat uer per ipsum debilitas, in primis accidit dispositio ad hydrospem antecedens & uocatur chachexia &c.

De causis mali habitus.

Cause ipsas chachexiae sunt longitudo alicuius morbi, durities splenis uel hepatis, consuetarum excretionum prohibitio, deprauata hepatis siue stomachi alteratio quae si omnino corrumpatur non amplius cachexiam, sed aliquam hydro-



pis speciem efficiet, deniq; quæcunq; causæ hydropis esse possunt, dum leues existant, omnino cachexiam inducunt, &c.

### Loci consentientes de causis mali habitus.

Aet. sermone decimo, cap. decimonono. Hæc affectio ut plurimum ex longo morbo congregatur, aut ex uiscere quopiam in scirrhum indurato, maxime hepate splene, aut a consueta & cohibita excretionem aliqua. Auic. 14. tract. 4. cap. tertio fit a corruptione digestionis uel ab hepatis imbecillitate, & quandoque accidit propter congregationem aquæ in pulmone, &c. B. hanc met sententiam habes ex ipso cap. de signis peripneumonix ibi, & quando prolongatur tempus cum peripneumonia facit incurrere ægrum in inflammationem pedum, &c.

### De signis mali habitus.

Primum corpus albicat uel flauescit ob totius malam interiorem, concoctiones impediuntur ob hepatis uel uentriculi imbecillitatem, remanet tamen ciborum appetentia a frigido elicitæ, deinde fastidium & effectus animi accidit ob uenensam materiam ad cor exhalantem, respiratio rara ob consensum pulmonis uel diaphragmatis, extrema corporis inflantur, præsertim si anasarcham chachexia præcedat. Urina & sudor paucus ob aquosam humiditatem retentam, quæ per consueta loca expurgari nequit, testiculi inflantur, dummodo asciten cachexia præcesserit, ulcera adsunt incurabilia ob sanguinis sinceri defectum &c.

### Loci consentientes de signis mali habitus.

Aet. ser. 10. cap. 19. In hac affectione uniuersa corporis miscella laxior fit ac emollescit, corpusq; totum cum uirore albicat, ac inualidum est, nam inter eundem crura uacillant, concoctiones in primis, manente etiam appetitu, impediuntur fastidium accidit,



respiratio fit rara ac debilis quæ motibus ac actionibus condensatur. Lege Auice. loc. cit. cap. 3. ibi, in primis permutatur color corporis & faciei ad albedinem & citrinitatē, & apparet inflatio in palpebris & facie & extremitatibus manuum ac pedum &c. & intelliges cætera à me dicta &c.

#### De cura mali habitus.

Cura requirit quatuor intentiones. Prima erit circa regimen ita ut ager in cibo & potu parcus sit, non comedat ad satietatem, nec nisi celebrata digestionē sitire ac famescere in hoc casu utile, fugienda est ciborum multiplicitas aqua interdatur, nisi alia cogeret necessitas. Cibaria igitur in hoc casu sint calida tenuia & exiccantia præsertim in causa frigida, in calida uero e conuerso. Secunda, est euacuatio unde si a menstruis uel hemorrhoidibus suppressis morbus proueniat uel ab alia excretionē prohibita, fiat sectio uenæ, si uero a uitiatis humoribus, tunc purgatio ex hiera utilis est uel ex agarico pillulis de rheub. hieralogodione electuario indo diaphniconē prout materia exigerit. Tertia intentio est humorum præparatio, unde si fuerit bilis mixta cōuenit syr. bisantinus de endiuia cum aquis absinthij cicorij, & in materia non ualde frigida ualet syr. de eupatorio acetosus simpl. & in materia crassa ac uiscosa oxymel scilliticum syr. de absinthio, et in materia melancholica syr. de epithimo de hissopo &c. Conueniunt etiam in hac intentione diacurcuma dialacca triasandali, diarhodon, troc. de ros. de absinthio &c. Quarta, intentio est diuersio quæ fieri potest per uomitum, quia extrahit ab hepate per uenas meseraicas tum quia ex infimo loco materias eradicat, tum quia a stomacho & ab adiacentibus partibus optime auertit, clysteres etiam laudantur eo quia a stomachi fundo euacuat, tum quiaeductio per uentrem naturalis magis est, quam per uomitum &c.



## Loci consentientes de cura mali habitus.

Aet. serm. 10. cap. 19. Cibi eorū sint simplices qui facile concoqui possint, & c. lege eum fusius. Auic. loc. cit. ca. 4. cibus habentium cachexiam sit ex eis in quibus est suauitas & confortatio naturæ sicut alcubungi. i. perdices & sint uina eorū odorificata cum eis quæ sunt gariophilli cinnamomum crocus, & c. & ex fructibus granata dulcia, & de citonijs parū non nocet, & misceantur cum cibis ea quæ sunt sicut sinapis porum allea, & c. Paul. lib. 3. ca. 47. uictus sit tenuis siccus & c. De euacuatione loquitur. Aet. loc. cit. ibi si hæc affectio ex cōsuetæ excretionis cohibitione contingat, excretionem irritare expedit, aut uenam incidere si nihil præpediat, si minus uena incidenda sit conuenienti purgante pharmaco, & maxime ex hiera oportet & c. Auic. loc. cit. considera an humores sint cholericici & educantur solutione uentris cum hiera picra, nam educit superfluitates absq; humiditatibus innatis etc. lege eum fusius. De humorum præparatione lege Arcul. & neotericos lege etiam Auic. ibi, & ex eis quæ conferūt eis ualde sunt sy. de absinthio in ieiuno, mitridatum & diacurcuma & dialacca & diaspermation & c. De ultima intentione lege etiā Aui. ibi, & utatur uomitu ante cibum, est enim regimen bonum eis in principio rei cum raphano infuso in syr. acetoso & in fine cum helleboro, & c.

## Obseruatio in regimine.

Auic. 14. tra. 4. cap. 4. oportet quod regimen eorum sit, superfluitates prohibens, & c.

## Obseruatio in sectione uenæ.

Paul. lib. 3. cap. 47. ijs qui copia uitiosorum humorum laborant uacuatio sanguinis per uenam noxia est, purgatio autem ex hiera per multum utilis. Auic. loc. cit. ante uenæ sectionem præcedant quæ sanguinem purificant qualis est hiera.



## Observationes de solutione uentris.

Auic. loc. cit. primum humorum qualitates considerentur & purgentur, q. si nouissime materia aggregetur figi eam non permittas, sed reiterata purgatione educes. Secundo, cauendum ne eorum stomachi a solutiuis ledantur quare cum soluentibus aromatica sunt admiscenda. Tertio, sex purgationum modos enumerat. Primus, per ea quæ uentrem soluant & obstructions aperiunt. Secundus, per clisteria attenuantia & resoluentia. Tertius, per moderatum exercitium & per paucitatem potus. Quartus, per balnea cum aquis, nā calidis. Quintus, per uomitum ante cibum. Sextus, per cibos exiccantes aperientes & attenuantes cum aromaticis, &c.

## Conferentia malo habitui.

Conferunt cachexiæ, spica, cinnamomum, absinthium, eupatorium, semen urticæ, chamæpitis urina, hominis, helleborus, sanfucus, cricius handacocha. Confectio alchegeni, de raue d'seni, conditum de buglossa diacurcuma dialaça, diacostum mes. empl. Alex. mes. omorussia Auicen. theodoricon magnum hali, theriaca diatefferon triphera minor, pilulæ de rheub. de alchechengi mes. troc. de diarhodon, de rosis, de rheub. de eupatorio, syr. acetosus de diarhodon de absinthio de fumoterræ, de eupatorio, de squinanto uiatic. s. etc.

## De pronosticis mali habitus.

Aet. ser. 10. cap. 19. Senes facile hac affectione capiuntur, maximeq; liberantur, pueri uero facile pereunt ob uitalis roboris imbecillitatem, aut ex succis ob cutis raritatem facile transpirantibus, Qui in uigore sunt raro incidunt, facileq; inde se extricant, quum uero malum diutius durat in aquam intercutem transit &c.

## De hydropæ.

Hydrops est morbus a materia intra peritoneum contenta quæ



quæ ab hepatis imbecillitate provenit factus, ex quo uenter intumescit & interdum reliqua membra. Huius tres sunt species prima ἀσκίτης, i. utricularis, secunda est τυμπανίτης, i. Tympania tertia ὑποσάρκα καὶ ἀνασάρκα uel λευκοφλεγματία, i. pituita alba dicitur, Ascites est morbus in quo uenter, & crura intumescunt, Superiores autem partes gracilescent ac marcescunt, Tympanias autem est morbus in quo plus flatuosi spiritus inuenitur, & minus humoris ita ut si uenter percutiatur tympani modo crepitum elidit, Anasarca uero est morbus quo totum corpus albidum redditur atq; humore circumluitur, ex quo aegris pudenda peruertuntur & febres accidunt, &c.

#### Loci consentientes de hydropo.

Auic. 14. tr. 4. ca. 5. Hydropicis est ægritudo materialis, cuius causa est materia exuberans frigida & ingrediens membra &c. Aet. ser. 10. cap. 20. Hydropis differentie tres sunt alius enim ascites ab utro dicitur, alius tympanitis a tympano, tertius sarcites iuxta carnem a grecis leucophlegmatias nominatus &c. hoc idem sentit. Paul. lib. 3. cap. 48. & Alex. lib. 3. cap. 29. ibi, hic morbus &c. Gal. lib. finit. med. Hydrops. quæ anasarca, i. per carnem dicitur, est quum totum corpus intumuit ademat atq; humore corpus circumluitur &c. Ascites, i. utricularius est in quo uenter & serotum cruraq; intumescunt, superiores autem partes extenuantur, &c. Similiter, Tympanias est quum in uentre spiritus plus inuenitur humoris minus, & si quis pulsauerit sonus exauditur, &c. lege etiam Gal. de hac re aphor. 4. com. ii. Obiectio.

Quur tres tantum species facis quum Theodorus libr. 5. quatuor enumeret. s. anasarcam hyposarcam Tympanitem et ascitem. Præterea hyp. 4. de uic. in mor. ac. tex. 3. duas tantum species esse declarat, una quidem hyposarca, altera cum in-

R. BLANCHARD  
PROF. FAC. MÉD. PARIS

FF



flationibus.

Responsio.

Distinctiones interdum dantur penes nomina rerum, Interdum uero penes causam efficientem, Interdum penes locum lesum, Erunt igitur quatuor ratione nominis ut Theodorus, Erunt duæ ratione loci, nam aut in omnibus membris continentur, aut tantum in concavitate uentris, & sic erunt duæ species, ut hip. erunt tamen tres ut diximus quia cause tres sunt, & c.

## De causis hydropis.

Cause efficientes, & primitivæ sunt omnis causa exterior nocumentum in digestionem imprimens & imbecillitatem maiorem quam in cachexia inducens, Regimen inordinatum in sex rebus non naturalibus percussio casus & offensio super hepar & c. Cause antecedentes sunt mala dispositio hepatis uel aliorum membrorum quæ provenit, uel a mala intemperie nuda uel humorali uel a soluta continuitate, uel ab aliquo abscessu digestionem impediens. Cause per consensum erunt uel a toto ut in febribus quæ calorem hepatis innatum imbecillant & digestionem præpediunt, uel euacuationes superflue calorem innatum extinguentes sicuti euacuationes per uentrem per uomitum per sudorem per mēstrua, per sanguinis fluxum, & c. uel erunt a membris particularibus, utputa a pulmone diaphragmate abscessum uel aquā patiente, uel a stomacho ob malam eius intemperiem uel a splene ob eius magnitudinem & duritiem & c. Causa coniuncta est materia ipsa frigida membra alterans & in tumorem attollens cum imbecillitate hepatis & digestionis eius assidue illam materiam regenerantis & c. In anasarca igitur erit materia pituitosa penetrans cum sanguine per membra, In ascite erit materia aquosa citra peritonium contenta, In tympanite est materie uentosa in illas partes diffusa & c.



## Loci consentientes de causis hydropis.

De causis primitiuis lege neotericos præcipue Arcul. & Sauonarolam Gordonium platearium & reliquos De causis antecedentibus lege Auic. 4. Tra. 4. cap. 4. ibi cause uero antecedentes sunt omnes agritudines hepatis cõplexionales instrumentales sicut paruitas & opilationes & apostemata calida frigida mollia & dura & c. lege eum fusius Gal. 5. de lo. aff. cap. 7. In omnibus corporis partibus tum supernis tũ inferioribus pituitosus sanguis contineri conspicitur in ijs morbus quos græci anasarcas & leucophlegmatias nomināt, perinde consentaneum est ut ob visceris refrigerationem cibus iam redditus in sanguinem transmutari non possit, & c. & inuenies per consensum etiam affici, ibi laborans aqua intercutem molestari uidetur uitio existente in liene uel in Ieiuno uel pulmone, uel renibus aut tenui intestino aut mesenterio aut ubi sanguis plurimus per hemorrhoidas excernitur, aut ob muliebri profluuium aut quum retinentur menstrua, aut aliam ingentem uteri dispositionem & c. De causis particularibus loquitur Aet. ser. 10 cap. 20. ibi. Ascites fit quum inter pelliculam peritoneum appellatam, & intestina plurima aquosi humoris collectio fiat Tympanias quum flatus aeris repleti ac superflui plurimam collectionem facit & c. Sarcites uero ab aquosa pituita ortum habet & c. Hoc idem sentit Au. 24. Traet 4. cap. 4. ibi Ascites causa est materia aquosa effusa in spatium uentris inferioris & c. Vide Gal. de causis hydropis. 2. de naturali facul. cap. 7. Item. 4. apho. com. 11. ibi quibus tormina. & c. Item. 4. de præ sag. expulsibus capite de meningæ affecta, Item pronost. 1 text. 1. ibi, cuiusuis aquæ intercutis genitura est ubi sanguificationis officiũ intercidat & c. Hip. apho 7. apho. 71. a pituita alba aqua intercus superuenit, Vide Gal. in com. Vide etiam Paul. & Alex lib. 3. cap. 29.



## De signis hydropis.

Signa hydropis in genere octo sunt primū est uitiatus color iuxta hepatis intemperiem, ut in frigida albus & liuidus in calida flauus uel rubeus secundum est inflatio oculorum et pedum ut in anasarca, excipitur tympanias in quo nullus tumor nisi in uentre cernitur tertium sitis inexhausta, quia humor in his locis retentus salsus est & putrefactus. quartum ciborum fastidium. s. in calida hydrope, nam in frigida appetitus inualefcit. quintum urinae paucitas rubae praesertim in ascite & anasarca ubi nulla fit separatio sanguinis & bilis, sextum febres mites ac tepidae septimum accidunt ulcera, octauum nihil cruentum secerni solet maxime in ascite et tympania, & cæt.

Signa particularia Ascitis sunt grauitas sensibilis in uentre, etsi percutitur nullum sonū emittit, sed aqua a latere ad latus commota cernitur, Tactus est utris aquae pleni, Nulla adest membrorum magnitudo, cutis tensio, paucitas urinae pulsus paruus frequens, & ad duritiem decliuis. Signa hyposarcae sunt Inflatio totius corporis uelut in defuncto corpore, Impinguntur membra & proprie facies & cum premitur digito remanet fouea, Nulla adest suminis inflatio aut commotio ut in ascite & tympanite, fluxus interdum sanguinolentus, Pulsus undosus latus et lenis, Signa tympanitis, Egre dicitur sumem plurimo exitu nulla adest grauitas, sed tensio plurima, membra ad ariditatem tendunt, & percussio uentre sentitur sonus utris flatu non aqua pleni, adest ructationis uoluntas ex qua leuius se habet, pulsus ut plurimum uelox & frequens ad duritiem decliuis, nulla adest inflatio pedum, & c. Signa distinguuntia hydropem a praegnanate sunt quia ab umbilico infra praegnantis uenter extenditur in hydrope uero infra & supra, & c.



## Loci consentientes de signis hydropis.

De signis in genere hydropis lege Auic. 14. tract. 4. ca. 8. ibi omnes species hydropis sequitur corruptio coloris & c. lege hunc locū fusiū Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. In anasarca per aluum nihil cruentum, neq; in ascite neq; in tympania secer= ni solet, sed spatium quod est inter peritoneum, & partes ei subiacentes aquoso humore impletur his uero qui ex frigida aqua potu hydropes facti sunt, uehementes ciborum appeti= tus fiunt, & c. De signis particularibus mentionē facit Alex. lib. 3. cap. 29. ibi quum in uētre circa abdomen humores aquo si collecti fuerint & c. Lege etiam de hac re Auic. 14. cap. 9. ibi cum ascite est grauitas sensibilis in uentre & c. & cap. 10. loquens de anasarca inquit apparet inflatio in corpore toto sicut accidit corpori mortuo & c. & cap. 11. In tympanite e= greditur sumen plurimo exitu, & c. Vide fusiū Arcul. & Sa= uon irolam. Hip. pronost. 2. text. 2. ibi, si quibus ex inani parte consistit hydrops, & c. lege etiam fusiū Gal. in hoc cōm. & c.

## De curatione hydropis.

In Ascitis cura tres tantum intentiones insurgunt, quarū prima uersatur circa uitæ regimen, ita ut sex res non natura les ad caliditatem & siccitatem uergant quum causa ascitis sit frigida & humida, Nam hepar et si, a causa calida primū molestetur, nihilo minus ex imbecillitate & spirituum reso lutione tandem frigescit, Dieta igitur sit tenuis si uires pa= tiantur. Cibaria parentur cum pipere Garyophillis & c. Vi= num sit subtile album, pauca quantitatis, Aquam uitent.

Altera intentio est in remouenda causa coniūcta quæ per ficitur cum pharmacis hydragogis, uel cum urinam prolicien tibus, uel cum his quæ insensibiliter aquam resoluunt, ut sunt fomenta emplastra saculi, cerata, & cæt. Solutiua fiunt cum Rheub. Agarico, cum succo rad. iridis, ebuli, & sambucci cū



soldanella uel eius succo cum elasterio, & Mezereō quæ lau-  
 reola dicitur, cum pillulis de serapino de euphorbio etc. Dius  
 rectica sunt syrup. bisantinus de duabus radicibus oxymelle  
 syr. de absinthio, Fomenta fiunt cum rebus calidis resoluen-  
 tibus ut salvia, maiorana, rosmarino, menta, absinthio pu-  
 legio camomilla, origano, folijs lauri, Alumine sulphure sa-  
 le & c. Emplastra quale est de granis lauri de stercore capri-  
 no & c. Saculi parantur ex milio sale fursure, Vngueta qua-  
 le est illud Agrippæ & mille alia quæ parari possunt, Conue-  
 niunt etiam Diacurcuma dialacca Troc de Rheub. Tertia in-  
 tentio malam hepatis dispositionem remouet cum his quæ he-  
 par roborant aperiunt ac obstructiones dirimunt extrinse-  
 cus cum ceratis & linimentis ex oleo rutæ camomillino pa-  
 ratis. Intrinsecus cum confectionibus iam memoratis, & c.  
 Quod si per hæc ascites non cessauerit cute puncta aqua  
 extrahatur & c. Anasarca siue hyposarca hisdem met inten-  
 tionibus indiget, Nam præter regimen calidum & siccum,  
 etiam causa coniuncta remoueri debet cum medicinis solu-  
 entibus & alijs ut dictum est, Verum hoc plus habet, ut sectio-  
 nem uenæ suppressis hæmorrhoidibus menstruis, uel si ab ali-  
 quo apostemate fieret & humorum præparationem requi-  
 rit, quod in ascite minime dictum est, & hoc fit cum rhodo-  
 melle syro. de duabus rad. de bisantijs oxymelle simp. & c. Ad-  
 uerte tamen q. syrupos in hoc casu simpliciter sine aquis &  
 decoctis exhiberem, quum aquæ apud me suspectæ sint, Lau-  
 datur in hoc casu hiera simplex rheub. agaricus, pillulæ de  
 rheub. Mala autem dispositio hepatis, si ab apostemate, uel ab  
 obstructione eius proueniat, quo pacto curanda sit supra ha-  
 buisti, quæ si a mala intemperie oriatur frigida, tunc damus  
 electuarium. diacurcumæ dialacæ rheubar. hepar lupi absin-  
 thium eupatorium, in calida diarhodon ab. triasand. In causa



mixta troc. de rheub. cū speciebus diarhodonis abbatis. Tympanias uero perinde ac dictum est curanda erit, dummodo soluentia pharmaca iam dicta flatuosum uentum una cum aquoso humore resoluant, unde laudatur diaciminum diagalinga diamusculus, elementum de baccis lauri, item fotus ex rebus calidis & siccis & c.

### Loci consentientes de cura hydropum.

De regimine uictus loquitur Paul. lib. 3. c. 48. ibi, cibus erit falsamentum sinapi & allia, ex auibus syluestres et siccae magis. Inter olera asparagus porrum synapi, uinum sit uetus & tenue, potio liberalis uitanda est & aqua in totum, a calidioribus acrioribusq; cibis & auxilijs, ubi fabris cum hydrope fieret, abstineatur & c. Auic. 14. c. 13. oportet comedere cum mensura & dimittere aquam ita ut prohibeatur a uisione aquae ne dicam a potu quantum possibile sit & c. Lege Alex. de omnibus oleribus piscibus, uolucris, leguminibus siue bellarijs fusius cap. 30. De curatione per hydragoga loquitur Gal. 7. aphor. com. 56. ibi curatio hydropis fit per medicamenta aquositatem soluentia per epithemata ac per ea quae ciedi urinam & in uapores talem humorem soluendi facultatem habent.

Item. 14. meth. Triplicem inuit curandi rationem, Prima ut tumorem in uiscere contentum sanemus. 2. ut humiditatem soluiamus. 3. ut per medicamenta urina citemus habet etiam quod calidior & siccior temperies exile corpus reddat quod sit ex acuta exercitatione & medicamentis attenuantibus & uictus & animi cogitatione & c. Paul. libro tertio. cap. 48. curatio communis ab euacuatione incipit, uerum ascites & tympanias medicamentum aquam educens requirit, anasarca sanguinis detractionem, modo affectus ex hemorrhoides uel menstruis retentis oriatur & c. Gal. 4. de uic. in mor. ac. tex. 3. ibi



hydropum duæ sunt naturæ in comm. anasarca inquit interdum sanguinis detractionem dum incipit expostulat, si ex retentione hemorrhoidarum uel muliebriū, uel ex quapiā quæ ita sit plethorica causa inceperit, tympaniam uero & ascitē nullus per sanguinis missionem sanare ausus est, &c. Lege Auic. 14. tract. 4. cap. 13. similiter Mar. Cat. & Arcul. Gord. & Alex. de cura hydropum in particulari. Gal. 3. de tempera. ca. 3. Medicamen id quod cantharides recipit hydropicis, prodest tametsi cantharis ipsa uescam omnino ulcerat, uerum ubi per ea quæ admiscuntur castigata corpori plurimo humore grauato offertur & illum & per urinas expellit, &c. Et. 14. meth. cap. 13. Harum euacuationem medicamentis quæ digerant molimur, uel chirurgia in ascite, adhibita punctione, quam paracentesis uocant &c. lege quomodo hæc fiat punctio ex Arcul. & Gulielmo plac. & ab alijs omnibus qui chirurgiam pertractarunt &c.

#### Observationes de euacuatione.

Auic. 14. tract. 4. cap. 13. Primum in ascite, aqua in anasarca pituita, in tympanite flatus euacuetur. 2. Soluentia ita soluant, ut nihil hepatis & uentriculo mali inferant, sed sint leuia. 3. Reiteretur euacuatio ne materia multum congregetur, cauendo ne pro uice ita copiosa sit ut uirtutem deiciat. 4. A soluentibus, statim hepar & uenter cum stypticitate moderate aromatica. 5. Prouocetur uomitus ut materia in uentriculo contenta euacuetur. 6. Enemata conueniunt dummodo causam antecedentem & coniunctam euacuare possent.

#### Observationes de sectione uenæ.

Gal. 4. de uic in mor. ac. comm. 3. primū si expedit in principio fiat. secundum non est fienda nisi sui causa fuerit retentio sanguinis uel aliqua plethorica causa uel inflammatio hepatis &c. & hoc in anasarca Auic. loc. cit. sectio uenæ uitan-



da est quatenus sit possibile, & si tuum sit consilium de phlebotomando minue prius materias dominantes, &c.

Observationes in attenuantibus, & incidentibus medicinis.

Auic. loc. cit. quatuor habet annotatu digna, Primo quod misceantur cum rebus hepar & uentericulum roborantibus. 2. q. uarianda sunt & mutanda eo q. natura ab eo quod est consuetum non patitur. 3. q. in puluerem redigantur, ut citius ad partem hepatis gibbam perueniant. 4. quod post eorum usum iura pingua exhibeamus, ne urinarij meatus excoerentur. B. caue tamen ex hoc textu ne decipiaris quum in omni specie hydropis iura sint suspecta, in puluerem intellige ut Gal. crassiculū. de observationibus circa uictū lege fusius Alex. li. 3. c. 30.

Nocentia ac conferentia hydropi.

Nocent hydropi, usus aceti assiduus, bouinae carnes, lentes cum corticibus mezereon, aloes, & quicquid hepatis temperiem molestant. ac corrumpunt. Conferunt hydropi absinthium, agaricus, anisum, apium, betonica calamentum, calamus aromaticus chamepitis chamedris, cantarides, elacteriū, cuscute, cicorium, succus rad. ebuli, helleborus eupatoriū, foeniculus, carica, fumus terrae chebuli, lac asininum, caprinū, lactuca limaciae, meu, mezereon, myrobalani, myrtus, origanum, pastinaca, perdices, petroselinum, prassium, rheubarbarum rosmarinus, ruta, sanfucus, sambucus, sinapis, scilla, scaenanthos, urina hypericon, hyssopus, iris. Composita sunt unguentum agrippae confectio alchechenge, dialaca, diacurcuma. diatrionpipereon, emplastrum aristarchi et andromacim. pillulae de rheub. de agarico, tyriaca, tryphera feruginea, troc. de lacca de rheu. de ligno aloes, unguentum artanitiae mag. confectio de mezereon de eupatorio mes. oleum de cherua de mezereō, pillulae de mezereon, tyriaca diatefferon &c.



## De pronosticis hydropum.

Hip. apho. 3. aph. 22. Autumno & plurimi æstiu morbi febres quartanæ & erraticæ & aquæ intercutē & c. Vide Gal. in com. Et aph. 4. aphor. 11. Quibus tormina & circa umbilicum dolores et lomborum dolor qui neq; a medicamēto neq; aliter soluitur in hydropem siccam firmatur. Et apho. 6. aph. 8. Aqua intercute laborantibus ulcera in corpore facta difficulter sanantur. B. quia exiccari expostulant sed hoc difficillimum ob humiditatis immoderantiam. Et aph. 6. aph. 27. Quicumq; suppurati aut aquam intercutem patientes, uruntur aut secantur si pus aut aqua uniuersum effluxerit, omnes moriuntur. B. eo q; natura subitaneas mutationes non tollerat. Et aph. 6. aph. 35. Aqua intercutem laborantibus tussis superueniens malum. B. intellige nisi a materia a capite in subiectas partes stillante tussis oriatur, nam si aquosa humiditas adeo excreuerit ut asperas arterias occupet, periculum de suffocatione imminet. Et aphor. 6. apho. 43. Quicumque lienosi difficultatem intestinorum capiuntur, superueniente aqua intercute moriuntur. Et apho. 7. aphor. 5. In mania dysenteria aut hydrops uel mentis alienatio malum. Et aph. 48. eiusdem lib. aqua intercute laborans si a tussi habeatur desperatus est. Et aph. 56. eiusdem, Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, his uenter aqua repletur & moriuntur. B. quia effluere ad omentum aqua non potest, nisi aliquo modo excedatur, unde mors sequitur etc. Et aph. 6. aph. 12. A diuturnis sanato hemorrhoidibus, si una non seruetur periculum est, aquam intercutem uel tabem aduenire. Et aph. 14. eiusdem lib. ab aqua intercute habito, si aqua e uenis in uentrem defluxerit, soluitur, morbus. Et pronost. 2. cap. 1. aqua intercus omnis si ex acuto morbo existit, mali est, non enim sedat febrem, sed dolorem admodum infert ad mortē. B. eo quod inuenire remedia quæ



utriq; affectioni ualida respondeant difficillimum est. Auic. 14. tra. 4. cap. 3. multa habet pronostica, Primo ascites malignior omnibus deinde hyposarca, deinde tympanitis. 2. Deterior hydrops illa est quæ fit cum ægritudine acuta & uehementius timenda quæ homini temperaturæ calidæ & siccæ aduenit, non enim sine causa maxima per contrarium suæ cōplexioni ægrotat. 3. Hydrops ex duritie splenis magis salua est quam quæ a duritie hepatis prouenit. 4. si ex hydrope dyspnia & constrictio anhelitus contingat & solutio uētris, propinquam mortem in tribus diebus sig. 5. Et dicitur quod quando hydropico descendit sicut caro pronuntiat mortem eius. 6. Et habenti melancholiam resoluitur melancholia eo quod hydrops eā humefat. 7. Et scias quod fluxus uentris in hydrope est mortalis. 8. Dictum est q̄ quando in facie hominis aut in manu eius sinistra mollities, et in naso pruritus accidit in principio quod moritur in secunda uel tertia die. 9. Et si fuerit apostema durum, tunc non speretur in sanatione hydropis quæ sequitur ipsum, nam & si aqua euacuetur qualibet euacuatione reddit tamen & replet & c.

Authores dissentientes circa hydropem.

- 1 Adserere, cachexiam non præcedere hydropem quæ paulatine facta sit.
- 2 Adserere, tympaniam ita a frigiditate fieri sicuti ascitem.
- 3 Adserere, hyposarcam esse ascite deteriore.
- 4 Adserere, in ascite hydrope semp incisionē esse oportunā.
- 5 Adserere, omne genus lactis ī ascite nullo modo cōpetere.
- 6 Adserere, tuſsim in hydrope semper esse signum malum.

Confutatio dissentientium circa hydropem.

Ad primū Auic. 14. c. 3. quādo corrūpitur digestio hepatis & antecedit eius debilitas in primis accidit dispositio ad hydropē antecedens quæ uocatur cachexia sed semper digestio



hepatis in qualibet species hydropis corrumpitur, & antecedit eius debilitas igitur semper etiam præcedit cachexia, & hæc opinio etiam confirmatur a Dino, unde maxime decipiuntur qui contrarium adfirmant.

Ad secundum Gal. aph. 4. com. 11. Videtur autem a maiori frigidityte generari aquosus hydrops quem ascitem uocant, a minore tympanias, nam humida substantia inflatusum aerem sine calore aliquo transmutari non potest, & sic isti decipiuntur, qui oppositum asstruunt, & c.

Ad tertium Auic. 14. cap. 3. Ascites est malignior omnibus & c. Præterea illa species est deterior quæ causas & symptomata seuissima habet, sed ascites est huiuscemodi quum adsit sitis uehemens grauitas suffocatio & syncopis igitur erit hyposarca deterior & c.

Ad quartum, conciliator diff. 199. Refert ex Gal. neminem uidisse ex incisione liberatum, præterea Auic. loc. cit. de incisione myrach, scias inquit quod parum proficit nisi in corpore forti ualde quando potens est tollerare sitim & minora rationem cibi non oportet ut audeat fieri dum possibilis est alia cura & c. immo ut refert conciliator plerique ex hac incisione moriuntur.

Ad quintum, Auic. loc. cit. non respicias ad illud quod dicitur in ipso, ex hoc quod decipiuntur sophistæ quod natura lactis est contraria hydropisi, immo scias quod hoc medicamentum est iuuatiuum per illud quod est in eo de abstersione, & est conueniens per id quod est in eo de proprietate & paulo infra & scias quod lac camellarum & caprarum arabicarum est uehementis iuuamenti, & c.

Ad sextum, Gal. aph. 6. com. 35. Neque enim quum ex alia fit occasione in homine aquam intercutem patiente, tussis est signum exitiale, sed quando ex ipsius morbi ratione, & sic



non est perniciosum signum.

De leuitate intestinorum. i. lienteria.

Leuitas intestinorum quæ *λειτερπία* a Græcis dicitur est celerrima ciborum expulsio in qua nulla alteratricis facultatis actio cernitur, sed tales cibi quales deuorati sunt secernuntur.

Loci consentientes de leuitate intestinorum.

Gal. aphor. 6. com. 1. leuitas intestinorum est uelox exitus eorum quæ comeduntur ac bibuntur, quæ talia deiiciuntur qualia deuorata fuere, quibus egredientibus nulla mutatio alteratricis facultatis inuenitur siue in qualitate siue consistencia colore & odore &c. Lege de hac re Gordonij definitio- nem & aliorum neotericorum.

De causis leuitatis intestinorum.

Causæ procatartice ipsius lienterie sunt cibi potus, & pharmaca secundum qualitatem quantitatem & ordinem uentriculum infestantia inter quæ aer quoque humidus connume- ratur. Causæ antecedentes & coniunctæ sunt mala stomaci intemperies, humores uel nimium frigidi uel mordaces, fla- tus quoque non sinens stomacho cibum inherere, unde putrescit & expellitur. Item ulcera abscessus & similia dolorem sto- macho inferentia, siue per se, siue per aliorum morborum consensum, ita quod nec uentriculus ciborum contactum tol- leret, unde facultas expultrix ad id expellendum irritatur. Item stomaci ac intestinorum imbecillitas, ex qua retinere cō- tenta, ne exiguo quidem tempore possunt, sed illico perinde ac si graue aliquod onus deponerent, ea secernunt &c.

Loci de causis.

Gal. aph. 6. com. 1. Causa leuitatis intestinorum est triplex quarum prima est mala retētricis facultatis stomachi intem- peries, secunda fit ab humorum mordacitate superficiem uen- triculi exulcerante, quare cibi & potus, quum ad locum ul-



ceratum perueniūt, membrum illos continere non potēs absque coctiones illos deiecit. Tertia est, quum pituita in uentriculo continetur, quæ cibum & potum extra uentriculum & intestina lubricare facit & c. Itidem adserit aph. 4. com. 12. Auic. 16. tra. 1. cap. 2. præter causas assignatas enumerat etiam solutiuarum medicinarum impresionem in superficie intestinorum & stomachi. Item imbecillitatem digestionis, qua deficiente cibus corrumpitur & expellitur. Item catharrum cibum corrumpentem item ciborum malam qualitatem quantitatem, malitiam sui ordinis artificium & deniq; uentositatem & inflationem lege etiam Auic. 13. cap. de lubricitate stomachi. Item Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1. Item. 1. de loc. aff. cap. 3. Item. 6. de sympt. cau. cap. 2. ubi de nausea loquitur. Itē. 6. de loc. aff. cap. 1. ibi sunt quedā accidentia quæ haud absurde intestinis & uentriculo simul affectis euenire creduntur ut lien-teria. Vide etiam Paul. lib. 3. cap. 4. Item Marcum Cat. qui omnes causas ad octogenarium numerū reducit, cap. de liēteria.

#### De signis leuitatis intestinorum.

Signa in genere sunt exitus cibi & potus indigesti, dolor in regione stomachi & ægritudo eius præcedēs sicut nausea subuersio uomitus & hic fluxus ordinē non habet, sed quandoq; cibus sumitur egreditur, & c. Signa si a medicamine fiat sunt dolor & mordacitas stomachi præcessit pharmacū, & statim sequutus est fluxus, sapor etiam testatur pharmacum & c. Signa intemperiei frigide & humide sunt albedo faciei & lingue, paucitas sitis, tarda digestio, multitudo spūti non adest grauitas uel nausea stomachi, & existente pituita adest dolor stomachi acetosa eructuatio leditur a frigidis nausea adest et uomitus. Signa intemperiei calide, sunt oris amaritudo, sitis, uomitus frequens, bilis, sapor amarus & humores calidi per secessum emittuntur & c. Signa ulcerū sunt



uomitibus saniei, eructatio pus redolens dolor &c. Signa apostematis sunt tumor durities grauitas assiduus dolor febris continua &c. Signa flatu sunt quum sentitur flatuosus motus dolor modo unam modo alteram stomachi partem molestat, iuuantur si crepitum uel ructum emittant. Signa imbecillitatis facultatum sunt si imbecillis sit digestiua egreditur cibus sine digestionem, si retentrix uel expultrix egreditur uelociter. Signa interstinguentia lienteriam stomachi & intestinorum sunt, quia lienteria intestinorum. i. coeliaca passio habet cibum satis bene educum, dolor est in intestinis, & precessit aegritudo intestinorum, & econuerso si fuerit stomachi, &c.

Loci consentientes de signis leuitatis intestinorum.

Paul. lib. 3. cap. 40. Verum in utroque leuitatis genere celerius quam in celiacis quae assumpta egeruntur, tamque intensa est cruditas ut alimenti assumpti genus cognoscatur &c. Lege de his signis Auic. 16. tra. 1. cap. 3. ibi, fluxus stomachichus non habet ordinem neque horas in quibus per seipsum crescat, immo est secundum regimen, nam si digestiua est debilis egreditur sine digestionem, si retentiuu & expulsiuu debilis egreditur uelociter &c lege eum fusius de alijs signis. Item Arcu. & Gord. & Mar. Cat. qui breuiter omnia lienteriae signa exponit, lege etiam alios neotericos.

De cura leuitatis intestinorum.

Consideranda est in primis a qua causa hic morbus proueniat, nam si ex parte cibi corrupti, tunc uentrem soluere, uel uomitum prouocare utile est. Si uero ex nimia cibi quantitate assumpta fiat, tunc facta euacuatione paucus cibus exhibeatur, deinde mala stomachi complexio corrigatur, si autem causa fuerit nimia humiditas in uentriculo contenta, tunc medendi insurgunt quatuor intentiones, Prima erit circa uictum, nam cibandi sunt ex chondro oriza et pane cum aliquibus adstringentibus



ut malis punicis piris malis cydonijs uel diacitonite, conueniunt etiam testes gallinacei & pisces saxatiles & c. 2. Intentio est humoris frigidi preparatio cum rhodomelle sy. de mēta de absinthio cum decoctis uel aquis mentæ absinthij. 3. Intentio est euacuatio, quæ fit per solutionem uentris ac per uomitum maxime materia in suprema parte uentriculi contenta, cum pillulis aleophanginis masticinis & de hiera simpl. diaphinicone & diacitonite solutiuo 4. Intentio est uentriculi roboratio ac discrasie derelictæ ablatio. Et perficitur cum exterioribus unguentis calefacientibus ac stipticitatem in se habentibus quale est oleum de spica de absinthio de mastiche de menta de citonijs, item cum emplastris & ceratis eandem uim seruantibus ex menta absinthio rosis scænoātho spica balustijs galanga cipro & c. Roboramus etiam cum interioribus electuarijs adhibitis quale est aromaticum ros. diaciminū diagalanga diacitoniten cum spetiebus & zucharo. Si uero causa fuerit materia calida, uictus & regimen declinet ad frigidum, Digestio fiat cum syr. ros. de granatis de cydonijs de mirto. Euacuatio, cum rheub. aloë lota hiera simpl. Robur deniq; indimos ac malam derelictam intemperiem remouemus cum zucharo ros. Diarhodone abb. confectiōe de tribus sandalis & c. Si uero causa fuerit ulcus, primo oportet abstergere, deinde consolidare ut puta cum rhodomelle abstergere & conglutinare cum bolo armeno & c. Si causa fuerit uentositas, primum fiat euacuatio ac digestio præsertim si materia fouens sit, deinde resoluatur cum electuario de bacis lauri uel fomento uel unguentis et emplastris ex rebus calidis stomacho conferentibus, & c.

Loci consentientes de cura leuitatis intestinorum.

Mar. Cat. Cura uariatur secundum uarietatem causarum, & c. Gal. 8. meth. cap. 5. Cibandi sunt fluente adhuc uentre ex polenta



polenta & pane quem græci oxylipe uocant qui minimum aceti habeat, inspergere tamen polentam debebis ubi. s. ueter adhuc plus iusto excernit uel mali punici uel pirorū uel malorum succo citoniorum, si amplius uenter nō excernit, sufficit alica ad modum ptisanæ preparata hoc est aceti habēs paulillum, similiter gallinacei testiculi, saxatiles ex albo iure pisces & fructuum aliquis ex his qui adstringunt. Lege de his cibus Paul. Aeg. lib. 3. c. 40. ibi, si biliosa sit deiectio &c.

Lege etiam Auic. 13. tra. 5. cap. 7. ibi, & sit cibus &c. Vide etiam Gal. in lib. de san. tuenda &c. De cura male cōplexionis plura habes etiā ex ipso Auic. in loc. cit. ibi. Quod si causa fuerit ex frigore cum calefactiuis curentur ebibitis & si illic fuerit materia euacuetur et administretur uomitus in omni septimana, & si fuerit malitia complexionis calidæ cum materia oportet ut educatur humor cum facilitate, &c. lege fusius & omnem curam intelliges, lege etiam Arcul. 9. alm. & ipsum Aet. lib. 9. cap. 51. Item Auic. 16. tract. 2. cap. 2. de fluxu stomachi lubricatio &c.

#### Observationes in cura.

Mare. Cat. cap. de lien. Medicinæ soluentes sint quæ a longinquo non attrahant. Auic. 16. tract. 2. cap. 2. In quibus nō sunt ulcera fac ut permisceas styptica fortis stypticis cum medicinis calefactiuis naturam iuuantibus et confortantibus spiritum ut tyriaca magna, &c.

#### Conferentia leuitati intestinorum.

Conferunt lienteria, fots ex balaustijs, radix bedeguar, castanea cupressus, aqua uel uinum extinctionis ferri, sex uini cum aqua myrti cataplasmatetur fraxinus, charabe, licium, lini semen, margarita, osifraga auis polygonum hypocistis, zingiber. Comp. athanasia nic. diacitoniten nic. mitridatum nic. cum decocto balaustiarum, miua, michleta, pillula styptica.



ca nic. electuarius inuentionis nostrae mes. electuariū de mirto, mes. susuf de mirto mes. Confectio de seminibus mes. pedes constringere, manus in feruentem aquam mittere.

De pronosticis leuitatis intestinorum.

Hip. aph. 4. aph. 12. Quorum alui intestinorum leuitate laborant hyberno tempore supra purgari malum, &c.

Et aphor. 6. apho. 1. In longis leuitatibus intestinorum, si ructus acidus fiat, qui prius non erat signum bonum.

Auic. 16. tract. 1. cap. de causis fluxus, Lienteria quae fit propter complexionem frigidam & humidam est ducēs sua longitudine ad hydropem & est in summo difficilis curationis quum confirmatur. 2. Facta a uirtute medicinarum soluentium interdum perducit ad dysenteriam & ulcera intestinorum. 3. Inquit Hip. quod omnis fluxus uentris post aegritudinem subito est malus significans mortem propinquam. 4. Et singultus cum accidit habentibus fluxum uentris est significatio mala sig. siccitatem facientem arefactionem. 5. Et Hipp. dixit q. habentibus lubricitatem intestinorum uomitus est malus, & iudicium occultam habet causam &c. Arculanus ca. de lien. succedens fluxibus antiquis & ad cronicas aegritudines mortalis. Et perseuerans ex debilitate contētiuae perducit ad hydropem siccam & tandem ad mortem, &c.

Authores dissentientes circa leuitatē intestinorum.

1. Adserere, cum Erasistrato muscosa & sanguinolenta cum crudis excrementis excerni.
2. Adserere, Non posse inueniri lienter iam speciem in qua semper adsint acidi ructus.

Confutatio dissentientium circa leuitatem intestinorum.

Ad primum Gal. aph. 6. com. 1. Hæc Erasistratus inquit, ne scio qua ductus opinione, adiiciens crudis excrementis mu-



scofa ac sanguinolenta, hoc enim nullus apposuit, neque eorum qui eius etate claruerunt medicorum, neque eorum qui posterius fuerunt, &c. Ad secundum Gale. eodem comment. Quaecunq; a pituita uentriculum refrigerante, fiunt leuitates intestinorum semper cum ipsis sunt acidi ructus ut casus quidam, & sic species lienteriae inuenitur in qua adsunt isti ructus acidi.

## De Dysinteria.

Quae a Graecis δυσεντερία dicitur, latini difficultatē intestinorū seu tormina uocāt. Est autē dysenteria fluxus uētris sanguinolentus cum excoriatione, & ulcere infestinatorū, &c.

## Loci consentientes de dysenteria.

Gal. lib. fin. med. Dysenteria est intestinorum ulceratio cū phlegmone & cruentorum faeciū; similium strigmentorum secretionē, non sine alui intestinorumq; morfu ac cruciatu, Lege etiam Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. ibi, sane in praesentia nomen dysenteriae &c. Paul. lib. 3. ca. 42. δυσεντερία ελκωσις εστιν τῶν εντέρων. Lege etiam Aet. ser. 9. cap. 43. ibi est etc.

## De causis dysenteriae.

Hic affectus uel per se, uel per consensum fieri potest, Per se uel ab externa uel ab interna causa orietur, Ab externa sicut a frigidityte, ardore, uenenatorum pharmacorū potu & ab acribus cibis &c. Ab interna sicut ab humoribus acribus paulatine erodentibus sicut a bile pituita salsa, ab atrabile exusta uel ab aliquo abscessu abrupto, Per consensum fit totius ut in fine febrium, uel partis sicut a crassioribus intestinis a meseraicis a gracilioribus hepate, &c.

## Loci consentientes de causis dysenteriae.

Auic. 16. tract. 1. cap. 2. Et excoriatio est dolor abrasionis ex superficie intestinorum quae aut est a materia cholericā uel sanguinea acuta aut uirulenta aut saniosa &c. lege fusius hunc locum Gal. aphor. 6. com. 3. Difficultates intestinorum



fiunt ex humoribus acris intestinorū summa primum in-  
festantibus, deinde progressu temporis se profundantibus  
ita ut ulcera putrilagini obnoxia, uentriculo etiam compa-  
tiente efficiantur &c. Vide etiam Gal. 5. de loc. aff. ca. ult. Itē  
2. de loc. aff. cap. 2. Vbi demonstrat q̄ affectus a quapiam cau-  
sa ortus, non semper remota causa remoueat, sed perma-  
nentem habeat dispositionem afferēs de dysenteria exemplū.  
Hip. aph. 4. aph. ii. Quibus tormina & circa umbilicum do-  
lores &c. Galen. Tormina fieri inquit uel propter morsum  
uehementem, uel spirituum flatuosum qui non habet exitum.  
B. Nota tamen q̄ tormina siue *σπασμοί* non semper pro dy-  
senteria accipiuntur, sed pro intestinorum torminibus qui  
a mordacitate humorum, uel a spiritu flatuoso fieri solent,  
ut testatur Gal. aph. 5. com. 4. 1.

#### De signis dysenteria.

Signa dysenteria sunt dolor uentris punctio & frequens  
assellatio, in qua frustra intestinorum cernuntur. Signa ulceris  
sunt sanies exiens excoariatio & foetidus odor, Locus ulceris  
pluribus modis cognoscitur, primum ex dolore supra uel in-  
fra umbilicum existente, nam in superioribus dolor magis ue-  
hemens est quam in inferioribus, praeterea uomitus nausea et  
singultus interdum uentriculo ex consensu patiente fiunt. Co-  
gnoscitur etiam ex corticibus intestinorum exeuntibus, nam  
tenuēs & parui ex gracilibus, crassi uero & lati ex crassis  
intestinis descendunt. Cognoscitur etiam ex tempore, nam  
quum inter colorem & assellationem prolixum est tempus,  
tunc ex gracilibus, si breue ex crassis. Cognoscitur etiam ex  
qualitate eius quod egreditur, nam a superioribus proueniēs  
est magis foetidum, & saepe numero loturae carnis simile, At  
quod ab inferioribus intestinis prouenit, ex dolore infra  
umbilicum, & ex sanguine & sanie ante faces exeunte co-



gnoskitur. Vlcus plurimæ sordis esse deprehenditur a longa ægritudine & a quantitate eius quod egeritur & ex dolore non sensato. Vlcus sordidum a corrosiuo secernitur ex uirulentia aquositate albida odore graui, at corrosiuum est uehementis doloris foetorisq; color ad nigredinem uergente. Signa ulceris profundi sunt sanguis plurimus exiens post abrasionem intestinorum, item ægritudo uehemens & c.

Loci consentientes de signis dysenteriae.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. Dysenteria non statim fieri solet, sed protinus ab ipsius initio bilis mordax secernitur, quum deinde interaneorum abrasiones sequuntur postea paululum cruoris simul excerni uidetur, quando affectus ipse iam dysenteria esse censetur, Considerandum insuper num per se sole abrasiones exeant aut simul cum quopiã pingui excernantur, quia tunc indicium est in crassis intestinis ulcus consistere, & c. lege hunc locum fusius, & omnia signa intelliges, Lege etiam primo de loc. aff. cap. 1. ubi pro exemplo inquit quum intestini tunicam per dysenteriam deiectam cõspexeris, & c. Vide etiam Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. Item lege Auic. 16. cap. 3. ibi, communia signa sunt dolor punctura et alchurati et quod ulcera cognoscuntur per excoriationem odorem foetidum et per alchurati. i. abrasiones intestinorum & c. Lege fusius hunc locum, & inuenies quæcunque a me sub breuitate recitata sunt lege etiam Arcul. & Aet. ser. 9. cap. 43. ibi si circa intestino crassa ulceratio contingat & c.

De cura dysenteriae.

Requiruntur in cura dysenteriae quatuor intentiones, prima circa regimen, unde si ulceratio intestinorum a causa calida pendeat, cibaria & aer ad frigidum alteranda erunt, unde conceduntur, oua sorbilia, hepar gallinarum, sorbitiones frumentaceæ & permittentibus febribus etiam lac, oriza



dulciarij panes, Amylum & quaecunq; humores obducunt & inspissant & quae corpora laxata & rarefacta adstringunt, & siccant ut pulres ex halica ex oriza milio, & c. conceditur interdum ob stomachi imbecillitatem, uinum, ceterum aqua pluuialis frigida alias conuenit: secunda intentio uersatur circa causam excoriationis quae si fuerit a biliosa materia primum humores, deinde abrasiones demum sanguinem educente, statim non expectata digestionem, euacuanda erit cum Myrobalanis citrinis & rheubarbaro, non usto ut aliqui, & facta aliquali euacuatione, tunc materiam praeparamus cum syr. ros. de citonijs de endiuiia Myrtino cum aquis endiuiæ plantaginis acetosæ rosaceæ & c. & facta digestionem iterum euacuamus cum Rheub. Et pro roborando hepate epithema praeparamus cum sandalis rosis aqua endiuiæ Rosarum spodio etc. Deinde styptica exhibenda sunt. Si uero causa fuerit sanguis ultra iam praedicta, uena secetur, tertia intentio est circa excoriationem quae si fuerit sine ulcere, tunc lauare & conglutinare opus est, Lauamus cum aqua hordei, uitellis ouorum & zacharo rubeo per clysterem infusis, Conglutinamus quotienscunq; in profundo non est immersa excoriatio, sed tantum superiores partes attingit et hoc fit cum albumine ouorum gumi arabico adipe renum caprarum oleo rosaceo cum bolo armenio dragaganto brodio pingui, uel cum aqua hordei si lauare simul ac conglutinare querimus omnia per clysterem infusa. Si uero excoriatio cum ulcere iuncta sit, tunc duplex erit intentio quarum prima erit abstergere ac mundificare, secunda consolidare, Mundificamus cum decocto furfurum frumenti, uel aqua mellis iure cicerum rub. aqua lactis, urina lixiuio dulci uino rub. Rhodomelle, uel decocto piscium salitorum & oliuarum demum cum decocto Troc. de Arsenico & c. Consolidamus postea cum rebus stypticis, quale est



decoctum lentium Rosarum balauftiarum cor, granatorum, sumach coriandrorum, & addimus boli armenij sanguinis draconis terræ sigillatæ Thuris an. 3. 1. ouorum binos uitellos, ut clystere magis intestinis adhæreat. quarta intentio est fluxus cohibitio ne ex superfluo fluxu uirtus prosternatur, Idcirco intrinsecus conueniunt syru. ros. de citonijs de granatis Troc. de spodio cum. s. acetosa zacharum ros. Triasandali, Myua citoniorum cum corallis spodio sandalis & c. quæ nisi profuerint ad narcotica procedendum ut cum athanasia phylonio romano, uel cum suppositorio ex litio, quod filo complicandum est, ut cum lubeat, possit extrahi, Extrinsecus autem prosunt linimenta ex oleo myrteo Masticino uel de citonijs cum aliquo puluere styptico uel emplastro de diaphinico ne mes. Proderit etiam suffumigium siue lauacrum ex uino rub. in quo styptica aliqua incocta sint, lauando manus & pedes uel fumum inferre recipiendo, ferro continue in dicto uino excandescendo, & c.

#### Loci consentientes de cura dysenteria.

Paul. lib. 3. cap. 42. Alimentum erit per initia oua ex lacte, sorbitiones frumentaceæ per se & cum lacte, lac mediocriter coctum holera non sunt necessaria, gustare tamen possunt endiuia coctam intybum & arnaglossum & c. poma adstringentia dummodo carnes reijciantur cruda æ sui danda, & aqua potioni frigida sitq; coelestis & laeso stomacho uinū propinandum & c. B. lege Auic. 16. Tra. 1. cap. 4. ibi ex cibarijs eligat frigida & facientia conglutinationem & c. & 16. Trac. 2. cap. 7. ibi & cum uolueris cibare & c. Lege etiam fufius Aet. ser. 9 cap. 43. & intelliges sigillatim quæcunq; ad uictum pertinent & c. De secunda intentione loquitur Auic. 16. Trac. 2. cap. 7. ibi, oportet te considerare quæ sit dispositio causæ facientis excoriationem & ulcera intestinorum, & an fiat uel



facta sit a ruptura a repletionem ab apostemate, & si fiat praeparata in abscindendo eam & constringendo ipsam, & si fuerit necessaria euacuatio propter malitiam humoris fluentis fac eam cum timore & cautella & c. Gal. 12. meth. cap. 2. At sanguinis missio quae. s. vires non deicit symptoma spectantis medici opus non est, sed eius qui totum affectum adimere studet. B. intellige si in toto fuerit repletio, aut si in causa fuerit recur sanguinem multiplicans uel sanguis hemorrhoidarum uel menstruum retentus & c. Auic. loc. cit. Et rheubarbaro inest proprietas mirabilis in ulceribus intestinorum & fluxu excoriativo, & proprie quando datur in potu cum aqua Arnaglosse & pauco uino & c. Lege Auic. loc. cit. cap. 3. de cura ulcerosi ibi, & multotiens sanat & c. et habebis multa pro secunda intentione, Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. Si in superioribus intestinis fuerit ulcus ab epotis medicamentis petendum est praesidium, si uero in humilioribus clysterem submittere magis conuenit. B. hoc idem sentit Auic. loc. cit. ibi, oportet ut cures id quod est in superioribus intestinis & c. De tertia intentione loquitur fusius Auic. 16. Tra. 2. cap. 7. ibi, & non cures in corosione nisi de medicinis conferentibus corosioni et sunt mundificatiua abstergiua cum exiccatione & stypticitate, & quum sciueris quod ulcera sunt sordida mundifica cum eis quae sunt aqua mellis & fortior aqua salis aqua oliuarum salita, etsi necesse fuerit administra Tro. de Arsenico & c. Lege Gal. 5. meth. cap. 1. ubi methodum sanandi ulcera demonstrat, quam non inutile foret, si ad hunc locum transferes, Vide etiam 12. meth. cap. 1. ubi, habet duplicem curandi uiam, altera quarum uacat symptomati altera penitus morbo, lege locum fusius, lege etiam de hac re Arcul. & Sauo.

De. 4. intentione loquitur Auic. eodem in loc. ibi, Et quando non cessat dolor, tunc sedeat infirmus in tinna, in cuius



aqua decocta sint styptica cum aliquanto anethi fenu graci  
 & altea, & si adeo gortis fiat ut appropinquet syncopis,  
 non erit excusatio narcoticorum &c. lege de his Marc. Cat.  
 Gord. & Mattheum de grado &c.

Observationes circa uictum.

Auic. 16. tra. 1. cap. 4. In cibis eorum oportet ut nō sit mor-  
 dicatio, nec falsedo plurima, nec acetositas plurima nociua  
 quæ uirtutem expulsiuam moueant, quantitas cibi sit pauca,  
 secūdo cibaria sint actu frigida ibi, non sumat in potu nisi in-  
 frigidatum, Nam frigidum cōstringit, tepidum uero resoluit.  
 tertio. Et rectius est ut non comedant cibos plurium spetie-  
 rum, quarto & scias quod dormire est ex rebus magis iuuu-  
 tiuis; quinto. Et si cum fluxu fuerit tuſſis dimittat, id in quo  
 est acetositas uehemens & stypticitas &c.

Observationes circa pharmaca & syrupos.

Marcus Cat. Non exhibeantur solutiua quæ noceant loco  
 ulcerato ut scamoniata. Auic. loc cit. Cūq; administras medi-  
 cinas tunc incipe cum singularibus, si uero non ualent, tūc ten-  
 de ad composita, Et sint restrictiua aut exiccatiua aut consti-  
 patiua aut infrigidatiua aut conglutinatiua &c. Et nō oport-  
 tet ut sit superfluitas in assatione eorum ne liqueſiat eorū uir-  
 tus. B ex his intellige quod noua non sit opinio de non urendo  
 rheubarbaro, sicuti plures existimarunt, sed Auicennæ &c.

Observationes circa Narcotica.

Aui. loc. ci. In narcoticis est timor, licet quandoq; accidat,  
 ut sint necessaria, & non oportet ut administrent, quandiu ab  
 eis excusatio esse potest, Et quando necessaria est administra-  
 tio, non exhibeantur eis quorum infrigidatur corpus & de-  
 bilitatur uirtus, & id apparet in pulsu &c. Hoc idē adserit  
 Alex. libr. 3. cap. 10. ubi de prepostero medicorum imperito-  
 rum iudicio facit, Auic. & ex regimine clysteriorum est ut



clyster fiat paulatim per uices, & pingua clysteria sedant dolorem ulceris corrosiui, sed non sanant.

Observationes circa curationem.

Auic. 14. cap. 15. Nullus creticus fluxus cohibendus est, nisi superfluius fuerit, quia tunc a natura non regulatur, sed a multitudine humorum uel ab eorum acredine prouenit. Item nullus fluxus est constringendus, ni primum materiam peccantem euacuaueris uel saltem minoraueris. Item fluxus diuersorum colorum nunquam cohibendus quia multitudinem humorum ac diuersitatem significat, si uirtus tollerauerit, Item infirmus non a deat sedem quoties molestatur, sed retineat etc.

Conferentia dysenterie.

Simplicia frigida ac dysenteriam conferentia sunt, acatia hypocystis balaustia, galla, gumi arab. lutum armenum, spodium, granata, sumach, berberis, acetosa, portulacæ semen, coriandrum, plantago rosa, myrtus, mora, immatura, citonium, glans, aqua calibeata camphora lithargirium, panicum, milium, phlomos, nenuphar, cornu ceruiustum, pira pontica, papauer, lapis ematitis, sanguis draconis, charabæ, agresta, bleta nigra, corallus, corrigiola, dragagatum, lactuca, liciū, lentes, nespila, hordeum, opium, partes animalium, semperuiua &c. Composita frigida sunt rhob de ribes de berberis de citonijs, troc. de charabe de terra sigillata de spodio, emplastrum Diaphiniconis mes. electuarium de sorbis michletæ diacitonites diarhodon nic. zacharum ros. triasandali manuschristi parlatum &c. implicia calida sunt uinum nigrum stypticum calibeatum, thus, ciminum anisum cortex, citri, colophonia, laudanum, caseus, coagula, nuclei dactilorum oriza, acorus, althea, aqua piscium salforum, Butyrum bitumen iudaicū caro leporis, charta combusta in clysteri cypressus foenugræcū, lignum aloes mastix rheubarbarum adeps caprina, hircina,



arietina, composita sunt theriaca antiqua et phylonium atha-  
nasia magna Mes. & nic. troc. de eupatorio & c.

De pronosticis dysenteriae.

Hip. apho. 4. aph. 24. Difficultas intestinorum si ab atra-  
bile inceperit lethalis est. B. quia nihil ab ulcerato cācro dif-  
fert, uel quia nullum pharmacum illi continuo adherere po-  
test pro expositione apho. huius lege. 22. apho. ibi deiectiones  
nigrae & c. usq; ad 24. Et aph. 4. aph. 26. a difficultate intesti-  
norum habito si ueluti carūculae exeant lethale est. B. quia car-  
nem in his concreescere uel cicatricem induci non speramus,  
nota tamen quod dysenteriam habet triplicem differentiam.  
Prima quum pinguia quaedam corpora excernuntur. 2. quum  
ex superficie intestinorum interiore, quaedam ramenta ex-  
eunt. 3. quum intestinorum substantia abraditur, & haec est  
incurabilis, & c.

Hip. aphor. 6 aph. 3. In longis difficultatibus intestinorum  
inedia ex fastidio malum, & cum febre peius. B. intellige si  
accidat in processu morbi, nam dictum est aph. 7. aphor. 6. In  
morbo diuturno fastidium cibi malū. Et aph. 6. aph. 43. Qui-  
cunq; lienosi difficultate intestinorum capiuntur, ijs superue-  
niente longa difficultate intestinorum aut aqua intercute, aut  
leuitate intestinorum moriuntur. Et aph. 2. aph. 14. In proflu-  
uijs alui mutationes excrementorum iuuant, nisi ad mala mu-  
tatio fiat & c. Et aph. 5. aph. 34. mulieri utero gerenti si aluius  
plurimum profluat, periculum est ne abortiatur. Et aphor. 6.  
aph. 48. lienosis difficultas intestinorū aut dysenteria super-  
ueniens, bonum. Et aph. 7. aph. 5. A furore difficultas intesti-  
norum bonum. B. ratione transmutationis quum a capite ad  
inferiora humores noxij transferantur. Et aph. 7. apho. 24. A  
deiectione sincera difficultas intestinorum malum, lege etiā  
aph. 30. li. 7. ibi quibus in alui profluuijs excrementa spumosa



sunt & c. Aet. ser. 9. cap. 43. dysenteria in colo aut recto consistens facile curatur, quæ uero in tenuibus intestinis maxime in ieiuno difficulter, secundo quæ post abscessum eruptiones fiunt, graues sunt, & quæ cum inflammatione oboriuntur, & quæ cum febre & appetitus perditione, pessimæ quæ pori aspectum habent, suntq; nigra plurima graueolentia, & quæ una cum excrementis pelliculas cum sordibus mixtas emittunt, tertio magis in his deficiunt mulieres quam uiri, magis senes & pueri quam iuuenes & c. Auic. 16. tract. 1. cap. 2. Primum magna effusio sanguinis puri post dysenteriam, ualde mala, quia ad intima adeo penetrarunt ulcera ut uenæ scindantur, Secundum ulcera intestinorum perducunt ad hydroperem, Tertium conuulsio uomitus singultus & cõturbatio rationis post dysenteriam, mortem significant, Quartum in libr. Hip. qui habet dysenteriam, & appareat post eius aurem sinistram ueluti res nigra similis orobo cum uehementi siti moritur in decima & non tardatur nec euadit, & c.

Authores dissentientes circa dysenteriam.

- 1 Adserere, omnem uehementem fluxum in principio morbi factum esse compescendum.
  - 2 Adserere, dysenteriam a sanguine deterius esse curæ, quam a bile.
  - 3 Adserere, dysenteriam ab atrabile semper esse lethalem.
- Confutatio dissentientium circa dysenteriam.

Ad primum, Damascenus in aphor. si quis per multum tempus neq; uomitum neq; solutionem uentris habuit, & ei subito eueniet, uidendū ne restringere festines quia huic corpus a prauis expurgatur humoribus, unde Aui. 16. tertij, dixit fluxum fluxu curari uerum si imbecillitas uirium ex fluxu fieret esse restringendus. uide concil. differentia. 200.

Ad secundum, dicimus quod deterius curæ est dysenteria



ab atrabile, nam Gal. 4. aphor. com. 24. quæ ab atrabile fit in-  
sanabilis est deinde quæ a bile & a pituita salsa, deinde quæ a  
sanguine.

## Obiectio.

Auic. ponit deteriolem esse quæ est per adustionem chole-  
ræ amaræ quam nigræ, itidem Halyabb. in sua praxi, quo-  
modo igitur deteriolem dicis quæ ab atrabile fit.

## Responsio.

Dico q. ratione subitæ impressiõis deterior est quæ a bi-  
le adusta fit, sed ratione eradicationis deterior est quæ fit  
ab atrabile. De hac re lege concil. differentia. 101.

Ad tertium, respondet Gal. aph. 6. com. 43. q. qui durū ha-  
bent lienem, ijs superueniens dysenteria soluit dispositionem,  
quare si atrabilis aliunde prouenerit, nec fixam ac perma-  
nentem causam in intestinis habuerit, salubris est & non le-  
thalis & hanc solutionem habes ab Auic. 3. can. cap. de solu-  
tione uentris omniū modorū, & sic non est semper lethalis.

## De fluxibus hepaticis.

Omnis fluxus qui uitio hepatis accidit hepaticus solet ap-  
pellari, & eius species sunt nouem, ut chylosa, pituitosa, bilio-  
sa, atrabilaris, sanguinea lotiua foetida uirulenta, & ultima  
quando caro hepatis nigra & crassa expellitur chylosa est  
quando pars chyli uel totus chylus egreditur & hoc uitio he-  
patis & non uentriculi. Pituitosa duplex altera a crassiori pi-  
tuita altera ab aquosa.

Biliosa uero etiam uaria & multiplex est iuxta bilis spe-  
cies sicut flaua uitellina præsina eruginosa, &c. Atrabilaris  
similiter fluxus niger est sicuti sanguis niger, aut nigri uini  
fex aut melancholiæ per adustionem bilis genitæ, aut melan-  
choliæ naturalis uel per adustionem præter naturam genitæ,  
Sanguinea quam cruentam uocat Gal. interdum retinet pro-  
prium colorem, interdum niger est sanguis, interdū paucus



aut multis interdum continuus & interpolatus. Lotiua uero est fluxus rei aquosæ quæ tendit ad colorem rubeum, et est sicuti carnis recentis lotura. Fœtida est fluxus rei fœtentis siue sit humor siue sanies siue hepatis substantia corrupta, Virulenta est fluxus rei subtilis tendentis ad citrinitatē aut rubedinem admodum uirulentie. Vlt. est fluxus ex quo res nigra non facile diuisibilis egreditur, & est substantia hepatis per putrefactionem uel adustionem separata.

Loci consentientes de fluxibus hepaticis.

Quod tot sint species fluxuum hepatis quot nuper recitauimus lege Arcul. & Sauonarolam & maximæ Auic. ubi facit de solutione uentris omnium modorum, & de expulsionibus rerum ex hepate & splene. Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. Nonnulli antiquorum præter hanc quæ ab ulceratione intestinorū fit dysenteriam, aliam quoq; cruuentam ob excretorum speciem nominarunt, in qua syncerus interdū & plurimus sanguis, interdum ueluti limus & feces ipsius non parue quantitatis excernitur & c lege etiam Gal. 2. de loc. aff. cap. 5.

De causis fluxuum hepaticorum.

Causæ chylosi fluxus sunt quinque. Prima quum chylus est pluris quantitatis, quam pro nutriendo corpore deceat. 2. est paruitas hepatis copiā chyli continere non ualentis. 3. est abscessus, in meseraicis uel in concauo hepatis. 4. est obstructio attenuatoria aut carnosæ aut coarctatoria harum partium. 5. est imbecillitas attractricis siue retentricis facultatis etc. Causæ pituitosi fluxus est mala cōplexio frigida hepatis destruēs alteratricem siue digestiuam facultatem, causa aquosi fluxus est corruptio alteratricis facultatis & fortitudo expulsoariæ facultatis, Causa biliosi fluxus est copia bilis genita ab intemperie hepatis calida, uel regimen calidum, qualis est usus ciborum acrium amarorum & salforum, Item ira, & motus



in Sole, febres ardentes, abscessus calidi, obstructions chylifellei, & quaecunque possunt sanguinem adurere, & bilem gignere, &c.

Causæ fluxus melancholici, sunt sex mala intemperies hepatis calida adurens aut frigida congelans, secunda ulcus in substantia hepatis emittens pus nigrum, tertia obstructio hepatis qua patefacta exeunt denigratæ materiæ, iandiu retetæ, quarta fortitudo uirtutis tales feces seperantis ac expellentes, quinta imbecillitas facultatis retentoriæ & alteratricis fecalem fluxum inducentes &c. Causæ sanguinei fluxus uel est scissura uenæ, uel copiosa eius multitudo, aut obstructio uenæ chylis, aut abscessus aut imbecillitas attractricis facultatis, Causæ lotiui fluxus, uel est imbecillitas concoctricis facultatis aut retentoriæ, quæ non adeo usq; chylum retinet, ut perfecte digeri possit, aut est imbecillitas secernentis facultatis non seperans aquositatem a sanguine ob hepatis imbecillitatem, Causa harum imbecillitatum sunt interdum mala intemperies aut abscessus aut obstructio, Causæ foetidi fluxus sunt longa mora humoris retenti in loco præter naturali, uel ulcus uel apostema a quibus sanies male omnes secernitur, interdum ipsius hepatis putrefactio, Causæ fluxus uirulentis est facultas expulsores humores cretice uel symptomatice expellens, uel sanguinis ex aliquo apostemate in hepate aut meseraicis rupto resudatio, Causæ fluxus substantiæ hepatis sunt putredines adustiones ulcera corradetia substantiam hepatis.

Loci consentientes de causis fluxuum.

Vide inter alios neotericos Arcul. de his fusiſſime differentem, Gal. in art. med. cap. 88. de signis hepatis patientis. Itē de diff. eorum quæ excernuntur, multa habet quæ ad hunc locum adduci possunt, Paul. lib. 3. cap. 42. Iecoraria dysenteria fieri solet qui iecur alimentum distributum non probe con-



ficit & retentrix eius facultas uel alteratrix imbecillis est, Gal. 1. de na. hum. text. 41. fieri inquit frequentissime a multa sanguinis copia in uenis contenta quæ a natura per uenas, perinde excernitur ac in mulieribus per uterum & alijs per nares uel mariscas: Vide etiam Gal. 9. de comp. med. per loc. cap. 5. Item. 2. de loc. aff. cap. 5. Vide insuper Alex. lib. 3. de leco-  
raria dysenteria. Item Gord. & alios neotericos.

#### De signis fluxuum hepaticorum.

Signa fluxus chylosi sunt nota, illis, qui chylū cognoscunt, & est albus subtilis, ut ptisana hordeacea, signa quū fit a paruitate hepatis sunt, quia a generatione contractus est hepar, & quod iuuatur a paucitate cibi. Signa quod fiant ab apostemate siue ab obstructione, sunt satis nota per ea quæ dicta sunt de imbecillitate hepatis, Signa fluxus biliosi cognoscuntur per colorem & substantiam eius quod egreditur, Signa fluxus pituitosi aquosi cognoscuntur ex præcedenti regimine ut ex comestione fructuū, ex potu aquæ superfluo, Signa male complexionis hepatis & apostematis, & obstructionis patent ex supradictis. Signa fluxus humoris melancholici cognoscuntur ex colore nigro tendente in rubeum & interdū est ueluti fex uini uel sanguinis nigri congelati, Si est a caliditate humor magis lucet magisq; foetet & præcedit liquefactio humorum & fluxus uentris uirulentus & febres, & c. Quando fit a frigiditate ad sunt signa in contrarium, & c. Si proueniat ab apostemate rupto primo præcesserint signa apostematis sicuti grauitas dolor & febris continua. Si ab obstructione præcesserunt signa obstructionis. Signa sanguinei fluxus ex hepate, sunt hepatis nocumenta præcedentia, si a ruptura uenæ præcessit casus uel percussio hepatis, sanguinisq; copia egreditur, quæ nec facile nec statim superprimi potest, sanguis acutus cognoscitur ex ciborum acridine,



dine, & ex eo quod per loca dum transit, mordicat, Obstru-  
ctio hepatis cognoscitur ex grauitate tumore & c. Signa lo-  
tium fluxus cognoscuntur a chylo non probe digesto exeunte  
simili loturæ carnis, Cognoscitur ab imbecillitate retentricis  
uel digestiue ex caliditate & frigiditate in hepate contenta,  
Nam a frigiditate debilitatur digestiua siue alteratrix a cali-  
ditate retetrix uirtus. Signa fluxus foetidi sunt ipsæ foetor ret-  
egredientis. Signa uirulenti, sunt signa hepatis calidi sub cu-  
te subtili & signa inflammationis hepatis liquefacientis. Si-  
gna substantiæ hepatis exeuntis sunt nota, quoties Res exiēs  
similis est hepati qui nil aliud est quam sanguinis coagulum,  
nec diuidi potest, nec in aqua solui sicut frustum sanguinis  
concreti, & cæt. Loci consentientes de signis.

Arcul. omnia hæc signa habet & multo plura quam di-  
xerim. 9. alman. cap. proprio Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. Discer-  
nitur hæc a uera dysenteria, quia ab initio tenuis sanies san-  
guinis ab hepate reijcitur deinde aucto malo crassus humor  
fecibus uini haud absimilis, Præterea in locineris excremen-  
tis nihil abrasum expellitur et interim per duos uel tres dies  
euacuatio supprimitur, sed rursus reddente malo excremen-  
ta prioribus multo peiora excernuntur, quod in intestinorū  
ulceribus haudquaquam apparet & c. Paul. lib. 3. cap. 42. si re-  
tentrix uel alteratrix imbecillis est sæpe eiusmodi descen-  
dunt ut recens ineis caro lota esse uideatur, Lege. Aet. de hac  
re et Alex. Gord. & alios neotericos.

#### De cura fluxuum hepaticorum.

Fluxus chylosus si a nimia quantitate chyli proueniat, ci-  
bus detur in minori quantitate, Si fuerit nimium crassus uel  
uiscosus dentur attenuantia & incidentia, sicuti ius cicerum  
& decoctiones aperitiue cum rad. fœniculi petroselini & c.  
Si fiat ab hepatis paruitate cibari debet frequētius cum cibis

HH



tenuibus, boni nutrimenti & paucarum superfluitatum, sed parum pro uice. Si fiat ab apostemate, tunc fiat diuersio & euacuatio cum sectione uenæ. Deinde topica suis temporibus congruentia adhibeantur, Si uero fiat ab obstructione uel ex debilitate attractoriæ facultatis, tunc tres opus sunt intentiones, prima digestio quæ fit cum syr. de duabus radicibus bisantino oxymelle simp. sy. de eupatorio de cicorea cū rheub. cum aquis aperientibus qualis est aqua absinthij, fœniculi cuscute cicorij quibus etiam interdum adhibemus syr. de endiuia. ros. & c. Secunda est euacuatio quæ fieri poterit cū rheu. Agarico pillulis de rheub. de eupatorio. Tertia est malæ complexionis derelictæ, in hepate ablatio, quæ perficitur cū confectionibus & electuarijs qualia sunt Diacalamentum, Diacinnamomū, Theriaca, Diacurcuma Troc. de laca de Rheubarbaro, de eupatorio. Et in causa calida Diarhodō Triasandali cum seminibus frigidis aperientibus & c. Omnis præterea fluxus hepaticus siue a caliditate, siue a frigiditate productus, quatuor intentionibus curari debet. Primo Regimine uitæ, secunda remouendo causam ipsius fluxus, tertia roborando omnes hepatis facultates, quarta corrigendo symptomata. Regimen in fluxu chyloso erit ex calidis uel frigidis prout hepatis discrasia requiret, ut plurimum tamen ad siccum cum stypticitate aliqua temperata uictus tendat, In fluxu bilioso regimen sit frigidum & humidum cum temperata stypticitate. In fluxu melancholico interdum ad frigidum interdum ad calidum, interdum ad tenuitatem, interdum ad crassitatem, iuxta longitudinem et breuitatem morbi uictus ordinetur, cum uirtutis robore. In fluxu lotiuo sit ex his uictus qui nutrimentum bonum paucarum superfluitatum inferat facilisq; digestionis, spargaturq; per uices. Causa fluxus remouetur in pituitosa fluxu, euacuando primum humorem



pituitosum cum decocto Iridis & myro balanorum chebulorum, & educendo per urinam cum dialaca et uino albo, etc. In fluxu cholericus euacuetur per cholagoga cum decocto prunorum tamarindorum myrobalanarum cit. rheub. etc. In fluxu melancholico cum myrobalanis indis epithimo sena in sero decoctis cum confectione hamec. Et si multitudo sanguinis adfuerit fiat sectio uenæ, & aperiantur hemorrhoides, & menstrua prouocentur, in fluxu lotiuo educatur aquositas multiplicata, per secessum, per urinam, per sudorem. In fluxu foetido procedatur. Primum cum mundificantibus, & solutiuis, prout humor corruptus exigerit, ut puta cum decocto hordei aut hydromelle oxymelle & c. Similiter in uirulento mundificetur uirus cum decocto prunorum tamarindorum myrobalanorum cit. & c. Roborantur facultates hepatis & discrasia frigida aufertur cum calidis temperatis quales sunt passulæ phistici auellanae, cinnamomum, hepar lupi, carolinatiarum crocum & c. In causa calida cum endiuiâ cicerio. s. sandalis uino granatorum aqua plantaginis portulacæ cum camphora & c. In melancholico cum syr. de absinthio de eupatorio, de epithimo cum diagalanga diacalamiento theriaca metridato etc. In lotiuo cum electuario de passulis Aui. & quibuscunq; in capite debilitatis hepatis dictis. Corriguntur accidentia ut si adsit excoriatio cum mundificantibus ac abstergentibus, ut puta cum aqua hordei adipe renum capræ albumine oui & uitello oleo uiolaceo & c. Dolor auferatur cum clysterijs modo abstergetibus, modo anodinis, modo supesfacientibus, prout opportunum uidebitur, & c.

Loci consentientes de cura fluxuum hepaticorum.

Auic. 16. tra. 2. cap. 1. Iam sciisti causas fluxus hepatici, et sciisti curam cuiuscunq; causæ, oportet igitur ut redeas ad id, & cures malitiam complexionis eius & apostemata &



et debilitatem et opilationem, et repletionem eius. sunt quodque cum eo quod dicitur in capitulo suo, et cum hæc feceris iam curasti. Lege Arcul. Gord. Marcum Cat. Aet. et Paul. Aegin. et intelliges omnia.

#### Observationes in euacuatione.

Marcus Catin. oportet cauere ne euacuemus cum rebus nocentibus hepati, ideo utimur rheubarbaro, in infusione.

#### Observationes in topicis agendis.

Auic. 16. tra. 2. cap. de cur. fluxus hepatici, et multotiens linit insipiens hepar in hac asselatione cum inspissantibus sanguinem et extinguentibus hepar per hoc quod sunt frigida, et in hoc est mors et preparatio ad putrefactionem, et c.

#### Conferentia fluxui hepatico.

Conferunt fluxui hepatico bolum cipricum potum uel per clistere impositum emplastrum diaphiniconis mes. et quæcunque supra recitauimus, et c.

#### De pronosticis fluxuum hepaticorum.

De fluxu chyloso loquitur Arcul. sic fluxus chylosus nisi pendeat ab apostemate ut plurimum curatur.

Hippo. aph. 7. apho. 56. Quibus hepar aqua plenum in os mentum eruperit, ijs uenter aqua repletur et moriuntur.

Arcul. fluxus cholericus perducit ad excoriationem et ulcera intestinorum, prout cholera erit magis uel minus acuta ac adusta, et curatur nisi ab apostemate ortum habuerit. De fluxu melancholico lege aph. 4. aph. 21. ibi deiectiones nigrae qualis est sanguis niger sponte uenientes siue cum febre, siue sine febre pessime, et c.

Et aph. 4. aph. 22. Morbis quibuscumque incipientibus si atrabilis uel supra uel infra exierit lethale. Et apho. 4. apho. 23. Quibuscumque ex morbis acutis aut diuturnis uel ex uulneribus siue quouis alio modo extenuatis, nigrabilis siue uti sanguis



niger defubter exierit, poſtridie moriūtur. Et aph. 4. aph. 24. Difficultas inteſtinorum ſi ab atrabile inceperit lethalis. Et aph. 4. aph. 25. Sanguis quidam ſupra, qualiſcunq; fuerit ma-  
lus, infra autem bonus eſt. Arcul. fluxus ſanguinis nigri foe-  
tentis & ſanguinis rubei eſt deterior quam fluxus nigri, alij  
uero fluxus ſi ab humoribus ortum habeant ut plurimum cu-  
rantur, ſi ab apoſtemate uel ulcere nōnunquam aut difficul-  
ter ſanantur.

Authores diſſentientes circa fluxum hepaticum.

1. Adſerere, in omni fluxu hepatico conuenire ſtyptica.
2. Adſerere, in fluxu hepatico tenuē uictū nō eſſe exhibendū.
3. Adſerere, fluxum hepaticum eſſe facilis curationis.

Confutatio diſſentientiū circa fluxum hepaticum.

Impugnat primum Auic. 16. tertij, de cura eius ubi inquit  
illud quod cadit de errore in hoc eſt ut dentur illi qui habet  
fluxum hepaticum opilatium, medicinae conſtipatiuæ, ad-  
dentes in opilationem, ipſam confortantes ut ſtringant ma-  
teriam, & id ad errorem maximum perducit.

Ad ſecundum, reſpondet conciliator differentia, 202. dicēs  
ſunt quidam modernorum qui in hac paſſione præcipiunt  
non eſſe dietam tenuem exhibendam, cuius contrarium indi-  
cat Auic. dicens in aſſumptione aſelationis hepaticæ plurimū  
eſt ut non appropinquet panis, quia hepar non recipit ip-  
ſum immo, rectius eſt, ut ſit contentus aqua ſauic bis in die.  
&c. Igitur iuxta conciliatorem & Auicem. tenuis uictus con-  
uenit, & non econtra, &c.

Ad tertium, Halyabbas. 7. præctica Dyſenteriae hepaticæ  
medella per difficilis eſt, & per pauci liberantur ab ea, &  
ſubdit, multi enim parum cognoscunt hepatis debilitatem et  
eius cauſam. Gal. 5. de loc. aff. quosdam cognouiſſe ait, quibus  
fluxus hepaticus acciderat ex debilitate hepatis et periſſe ex



pauca curatione. Præterea authores succintam huius morbi causam idcirco scribunt quia parum fidunt de eius salute & sic potius est incurabilis quam curabilis & c.

De tinesmo. i. intestinali fluxu.

Tinesmus est mala recti intestini dispositio, in qua egerendi prompta quædā cupiditas cum gemitu ac conatu ægri adest, paucis admodum sequentibus excrementis muscosis ac sanguineis. Hic duplex est uerus & mendosus. Verus quum causam sui recto intestino affixam tenet, Mendosus quum causa non est fixa, sed aliunde ueniens eum producit sicuti materia fluens per intestina ad anum & c.

Loci consentientes de tinesmo.

Gale. lib. fin. med. Tinesmus est dispositio recti intestini ad partes inferiores pertinens, in qua impetus cupiditatesq; desidendi plures, sed paucae excretionis sequuntur & c. Aet. ser. 9. cap. 43. Tinesmus est egerendi promptitudo quæ differri ac deuitari non potest, nihil tamen præterquam pauca cruuentum aspectum habentia propellens & c. Cat. Lege de hac re Paul. lib. 3. cap. 4. Et Gale. 6. de loc. aff. ca. 1. ibi, at ulcera quæ recto intestino oriuntur & c. lege etiam Mar. Cat. & Arcul Auic 19. tra. 2. cap. 16. Primum oportet te scire in dispositione tinesmi, an sit tinesmus uerus an tinesmus mendosus, & c.

De causis tinesmi.

In genere considerandum, num causa in lōganone existat uel a supernis partibus descendat, Si causa erit fixa in recto intestino tunc erit uel inflammatio uel ulcus corrodens, uel fistula uel occultæ hemorrhoides uel ragadiæ uel abscessus durus, Si uero a supernis partibus defluat, uel erit humor impactus pungens ac stimulans ut pituitosus salsus biliosus aut atrabilaris adustus, uel erunt cibi acuti salsi uiscoli, uel pharmacum acutum mordax, aut suppositorium acre, uel



*mala intemperies frigida absq; alio complexu, &c.*

*Loci consentientes de causis tinesmi.*

*Paul lib. 3. cap. 41. Causa tinesmi est inflammatio in longanone facta cum molli ac laxo tumore, quod edema uocāt, quæ stercoris insidentis suspicionem præbet, quod exitū quærat. Auicē. 16. tract. 1. Et causa zair. i. tinesmi, aut est apostema calidum aut durum, aut mollificatio lacerti, aut tensio ex qua lacertus impeditur, ab operatione sua, aut superfluitas salsa aut baurachia aut chylus grossus, aut cholera ingrediēs, aut frigus adueniens, aut longitudo sēssionis super durum, aut crassities fecis aut eius durities aut hemorrhoides aut fistula, aut ragadiæ, aut rugitus, aut corrosio, aut grauitas sensata &c. lege Arcul. & alios, &c.*

*De signis tinesmi.*

*Signa quod adsit tinesmus sunt desidendi cupiditas cum conatu ad excernendum, ubi primū pingue deinde muscosum, & cruuentum egeritur. Signa inflammationis uel abscessus sunt grauitas dolorq; continuus, qui nec emissionē stercoris, remouetur, excrementaq; difficulter excernuntur, mollientia & anodina ualde conferunt alijs in contrarium ledentibus. Signa ulceris sumuntur a præcedentibus rebus, ut ab humoribus ulcerantibus sicut in dysenteria aut a fluxu flauo præfino & nigro præcedente, aut ex abscessu ad uomicam deueniente, aut ex pharmaco exulcerante iam assumpto. Signa fistulæ & hemorrhoidarum uel ragadiarum cognoscuntur ex his quæ suis in locis dicuntur. Signa humorum sunt quia si a bile efficiatur tinesmus cognoscetur ex uictu præcedente bilem multiplicante, & ex alijs bilem indicantibus sicut ex punctione in recto intestino, ex flauis excrementis, & quod a calidis leditur &c. Si pituita, cognoscitur a pituitosis excrementis a pruritu in intestino recto & ab alijs pituitam in-*



dicantibus, si ab intemperie frigida absq; alio complexu, aderit desidendi uoluntas & conatus ad excernendum, sed nihil egreditur a calidis deinceps iuuatur. Si a flatu incluso, tunc indicium erit quod emissio flatu statim tinesmus cessat & re= tento augetur & c.

#### Loci consentientes de signis tinesmi.

Aet. ser. 9. cap. 43. In principio si grauis distentionis sensus circa imum uentrem fiat, & maxime circa partem dextram coniectare oportet stercorum multitudinem in cæco intestino insitam esse & c. Gal. nulla alia signa ponit præter quedam communia, quæ sunt desidendi cupiditas cum conatu ad excernendum ubi primo, pingue deinde cruentum egeritur, & c. Auic. 16. cap. 3. multa signa affert, ibi, tinesmi autem diuisiones significant id quod egreditur & c. Vide in hoc Razen. 8. cont. & Arc. 9. alm. De curatione tinesmi.

Si causa tinesmi fuerit bilis uel pituita salsa tunc clysterijs lauatiuis indiget, sed primum prohibeatur causa antecedens cum diuersionibus & euacuationibus deinde causa coniuncta remoueatur cum clystere ex aqua hordeacea Zuch. & uittellis ouorum in causa calida parato, aut in frigida cum rhodomelle aqua cicerum sero caprino, & c. Quod si ab inflammatione uel alio abscessu fieret tinesmus, considerandum num per uiam defluxus fiat, & tunc fluxus causam euacuatione et diuersione si opus fuerit, amputabimus. Euacuatio fiet per sectionem uenæ uel cum pharmaco leniente. Diuersio fiet cum urinam uel sudorem prouocantibus cum cucurbitulis frictionibus & c. In causa coniuncta si fuerit calida in principio repellendum cum anodinis ut cum oleo rosaceo myrtino, & in causa frigida cum oleo camomillino anethino fsysamino. In augmento repellentibus, calida resoluentia & emollientia addantur, quale est oleum liliorum alborum adeps renum capræ



bdellium butyrum. Quod si ab ulcere fiat tinesmus, tunc eductis primum si quæ fuerint fecibus, ulcus abstergetur cum hydromelle, uel rhodomelle, uel si putredo cogat, addatur aqua salsa, uel decoctio aluminis quibus interdum addi potest unguenti Aegyptiaci unctia una, quo deinde repurgato, tunc his quæ ad cicatricem perducunt, opus erit. Si uero fiat a fecibus siccis curetur cum emollientibus sæpe reiteratis. Si a mala intemperie frigida cum calefacientibus tam in uictu quam in medicamento exhibitis. Si ab intemperie calida, cum refrigerantibus anodinis. Si a flatu per ea quæ flatum resoluunt. Quod si dolor magis urgeat, nec per anodina cessare uelit, tunc urgente necessitate ad soporifera ueniendum, inter quæ laudatur, suppositorium de licio fillo tamē appensum, ut ad libitum possit remoueri, item Athanasie Nicolai. 3. 1. & c.

Loci consentientes de cura tinesmi.

Aet. fer. 8. c. 43. Si impacta fuerit stercoreum multitudo in cæco intestino, tollenda erit cum emollientibus clysteribus, ut fursurum decocto fœnigræci melle oleo etc. lege eum fusius. Aui. 16. t. 2. c. 16. Si fuerit fex sicca cura cum clysteribus lenitiuis. Si fuerit caliditas indigebis eis quæ sunt casia fistula & sy. uiolaceus. Si fuerit causa frigus adueniens cum potionibus & clysteribus calidis & c. Et si fuerit causa apostema calidum, stude in retinendo id quod currit ad apostema et curetur in principio sui cum phlebotomia et cum minoratione cibi & c. lege eum fusius, lege etiam Arcul. 9. alman. & Mar. Cat. & reliquos practitantes, Serapio, cura tenasmonis uertitur ad causam & ad morbum ad causam triplex intentio, Prima prohibitio materię imbibite in intestino. 2. eius resolutio. 3. est sedatio acuitatis materię & æquatio malę cõplexionis eius etc. Razes lib. diuis. c. 7. In fine, inquit, iuuantur habentes tenasmonē suppositione colyrij plusquā reliquis curationibus etc.



## Observationes in curatione.

Arcul. 9. almans. clysteria communiter debent esse paucae quantitatis ut decem uel 12. untijs non enim oportet ut transeant ultra intestinum rectum, & cum hoc melius retinentur, Item colyria sint usq; ad digitos septem. Auic. 16. tra. 2. cap. 16. Et scias quod frigus facit tenasmon in pluribus horis. B. quia materiam frigidam siue calidam impingi illic cogit.

Arcul. sint omnia cibaria humida insipida paucae dulcedinis uidentur sicca amara acria salsa acetosa, & quaecunq; fecem exiccant & exasperant. Vide Aui. ibi, & cum eum cibus, etc.

## Inducentia ac conferentia tinesmo.

Inducunt tinesmum, colocynthis, euphorbium, sarcocola, scamonium, conferunt tinesmo adeps porci caprae clysterizatus balaustia bdellium brasia cauda equina, colophonice suffumigium foenugraecum, ferruginis cum aceto suffumigiū, gumi arab. ius galli ueteris, piscium, charabe lac asini, litui lini semen coctum cum oleo ros. Malua, meu encatisma, factum, nasturtium myrrha cum olibano et croco, oleum persicorum origanum pini cortex porrum psyllium sauina spica, storacis suffumigium, phlomos, Therebentina Ruta, confectio de storace mes. electuarium nigrum haly. 16. ant. Michleta Auicen. 4. 5. Troc. de Almezereon, de balaustijs Aui. 8. quinti, & cæt.

## De pronosticis tinesmi.

Razes. 8. cont. tenasmus plurimum fit post dysenteriam, et quod non fit post dysenteriam est leuioris curae, idem adserit Auic. dicens facilius est id quod non succedit dysenteriae Hyp. aph. aph. γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσιν ἐπιγεμονὸς ἐν τρεῶσι τοῖς. i. Mulieri in utero habenti tinesmus innatus abortire facit, qui aphor. tantum in translatione Constantini inuenitur, nulla nec a Theodoro, nec a Leoniceno facta men-



tione Auic. 16. Tra. i. cap. 2. Et singultus cum accidit habentibus fluxum uentris, & proprie habentibus tinesmum est significatio mala significans siccitatē facientē arefactionē, etc.

De doloribus in genere.

Altius nunc exordiar, de doloribus in genere aliquid demonstrans, deinde ad morbum colicum me conferam. Dolor est tristis sensatio a subita ac uiolenta mutatione facta, et tantummodo ad tactum & non ad alium sensum pertinet, Dolorum igitur differentie sumuntur a loco, ut si dolor sit in omnibus intestinis, uel in eorum parte, Si uero sit in omnibus, tunc erit uel cum motu, uel cum quiete, Si cum motu, erit tertio, si cum quiete uocabitur nomine generis, dolor, At si in parte uel erit, remissus & uocatur ab Auic. punctio, uel intensus & in crassis intestinis, & erit colica dispositio. Si in gracilibus erit ileus siue uoluolus, Rursus dolorum species sunt sex. s. punctoria, Grauis stimulans, extensiuu, pulsatilis, & ulcerosa, Punctorius dolor circa membranas potissimum consistit, Grauis circa hepar lien renes, Stimulans circa partem ossibus uicinam & in cute fieri potest. Extensiuus pertinet ad partes quibus nullae sunt arteriae, ut membranae cutis, Adenes quibus nullae insunt arteriae nam inflammatae extensiuo tantum dolore uexantur Pulsatilis circa ipsas arterias uel in partibus ipsas continentibus & in inflammationibus consistit, Ulcerosus non solum ad cutem sed ad imas quoque partes uelut ad ossa extenditur.

Causae horum sunt, quia punctorius ulcerosus & stimulans fiunt a bilioso uel a pituitoso humore falso aut a corrupto sanguine aut a uermibus suis aculeis pungentibus, aut a quopiam ulcere, Grauis uero extensiuus ac pulsatorius a materia pituitosa crassa, uel ab atrabile grauante & extendente uel a flatu incluso aut a copia alicuius materiae extendētis etc.



## Loci consentientes de doloribus in genere.

De diff. doloris lege Gal. 12. meth. cap. 7. Item de elemētis primo. Item in lib. de placitis hip. & platonis. Quod ad sensum pertineat lege Gal. in libro de consti. art. med. ca. 8. Item de Inæquali intemperie cap. 3. Item. 3. de sympt. diff. cap. 3. uide de diff. Dolorum Auic. Arcul. & plerosq; alios practitantes. De speciebus dolorum lege Gal. 2. de loc. aff. cap. 3. 7. & 8. ubi loquitur de morbo colico.

## De dolore colico.

Morbus intestini plenioris quem Græci colicon uocant, nihil aliud est quam dolor satis intensus in intestinis crassus, maximeq; in colo uocato, cum quo ea quæ a natura ad inferiora expelluntur, difficulter exeunt ut sunt humores excrementa uermes flatus.

## Loci consentientes de dolore colico.

Gal. lib. finit. med. Colica dispositio est constitutio plenioris intestini diuturna in qua spatijs temporis interiectis cruciatus intollerabiles, difficultates spirandi sudores perfrictionesq; adoriuntur Auic. 16. Tra. 3. cap. 6. Colica est passio integralis intestinalis dolorosa cum qua fit difficilis exitus eius quod egreditur per naturam, &c.

## De causis doloris colici.

Causæ uel per se uel per consensum fiunt, per se binæ sunt, altera a mala intemperie cal. frig. sicca, non autem humida quæ per se dolorem non efficiat, Altera a soluta continuitate, Intemperies calida dupliciter colicam efficit, uel nimis calefaciendo uel nimis resoluendo & feces exiccando, Frigida uel obstruendo, uel facultatem expulsoariam imbecillem reddendo. Soluta continuitas fit ab incisione exesione fractione tentione, & tunc uel ab humore acri uel multo uel flatu uermibus & abscessu. Causæ per consensum fiunt uel a uentriculo



humores uel flatus aggregante, uel ab hepate uel liene, materias ad intestina expellente, uel a renibus lapidem patientibus, uel a uesica, aut utero abscessum patiente aut a toto sisti in febribus, quum ex uenis ad intestina humores extrudantur, &c.

Loci consentientes de causis doloris colici.

Gal. 12. meth. cap. 7. Porro naturalis notitia nos docet uisum id corporis ex quo sit doliturum aut continuitatis diuisionem esse aut alterationem aliquam, primum illud speculabimur, cuiusnam naturæ esse debeat quod continuitatem soluit, Neesse igitur est quod sit uel ruptio uel contusio uel erosio &c. Et in art. med. cap. de sig. Thorac. Dolor quemcunque obsederit locum, aut continuitatis solutionem, aut subitam alterationem ostendit, soluitur continuitas incisione exesione fractione tentione, Alteratur substantia a caliditate frigiditate &c. lege etiam Gal. 2. de loc. aff. cap. 5.

Pau. lib. 3. cap. 47. Dolores grauissimi fiunt plures ob causas uel enim a crasso & pituitoso humore intra uenas subsistente, uel a spiritu crassiori flatuosoque exitum non habente, aut ab intestini inflammatione uel ab ulceribus ac mordacibus succis infestantibus &c. Lege de his Gal. 4. de loc. aff. ca. 7. ibi, plures sunt dispositiones, quas per uehementes motus dolor comitatur etc. Et Auic. 16. Tra. 3. cap. 8. has causas etiam enumerat & multifacit obstructionem ex qua fieri colicam asserit, Vide illud fusius, Vide etiam de causis spiritus flatuosi Gale. 12. meth. cap. ult. ubi a duplici causa fieri inquit &c.

De signis doloris colici.

Indicia incipientis colicæ sunt, quia primum minimum quid excernitur, consuetudoque excernendi uariatur, appetitus minuitur, quum uero ad incrementum tendit, dolores crescunt, aluus siccior euadit, ita ut flatus ne quid egredi possit. Vigiliæ sitisque



multiplicantur etiam si quid excernitur simile bubulo ster-  
 cori cernitur, quum uero ad salutem tendit excrementa ac  
 flatus exire incipiunt, dolor de loco ad locum mutatur, nec  
 adeo frequēs est, sed per enemata remittitur, Si uero ad mor-  
 tem tendat dolor est intensissimus non minuitur non remit-  
 titur, nil excernitur, uomitus ad uomitum succedit, sudor fri-  
 gidus apparet, &c. Signa distinguētia colicam a nephritico  
 sumuntur a quantitate, a loco, a motu, ab exeuntibus, a causis  
 præcedentibus, a quantitate quoniam nephriticus dolor par-  
 uum occupat spatium, colicus quam maximum, nam totum  
 uentrem & stomachum obtinet, A loco quoniam nephri-  
 ticus in renibus, Colicus Paulo altiori loco cōtinetur, A mo-  
 tu quoniam colicus ad plures partes mouetur, Nephriticus  
 fixus ac immobilis permanet, Ab exeuntibus, quoniā in co-  
 lico feces retinentur, sed non in nephritico, uerum Arenos-  
 a materia in urinis apparet, A causis præcedentibus, quia  
 in colico deijcitur appetitus, Nausea & uomitus fiunt gra-  
 uiores, sed in nephritico non ita, sed præcessit urina arenos-  
 a uel crassa, Signa interstinguentia, colicum a dolore uteri,  
 sunt, quia ad inferiora uelut ad pubem & coxas dolor ute-  
 ri, sed colicus ad superiora magis tendit. Item in dolore ute-  
 ri præcesserunt mensum suppressiones et si alius leniatur ac  
 feces educantur, non cessat, At colicus habita sede placatur,  
 Item in dolore uteri mulieres suffocari uidentur ex uapori-  
 bus eleuatis, quod colicæ non accidit &c. Signa humorū co-  
 licæ sumuntur ab ætate regione tempore uictu præcedente  
 & similibus, Signa pituitosæ colicæ habentur, si uictus pitui-  
 tam generans, si senilis uel puerilis ætas si hyems, si regio fri-  
 gida & humida præcesserunt, si satietas cruditas otium, si  
 adsit grauitas, si obtusus dolor, si longioris moræ absq; du-  
 bio colicam pituitosam esse conijcies, Caue tamen ne inter=



dum ex siti & inflammatione & urina rubea decipiaris tanquam colicam calidam putans ut inquit Auic. quoniam illud commune est omnibus colicis. Signa flatuose colicæ sunt, quia præcesserunt causæ flatus sicut potus aquæ frigide holera fructus, ructus extensio, nulla adest gravitas sicut in pituitosa. Interdum etiam inflatio manu percipitur, nec egrediētibus humoribus dolor mitescit eo quod in tunicis crassus flatus retinetur, Signa colicæ ab inflāmatione sunt tumor durities ten- sua, dolor continuus extendens grauis permanens ac pulsās, febris acuta, sitis uigilia, & interdum urinae retentio similiter cum stercore ob abscessum uias comprimente.

Loci consentientes de signis doloris colici.

Gal. 2. de loc. aff. c. 5 protinus affecto colo inflatio quædam & extensio & flatus complures & tormina & excrementa flatibus plena uidebuntur, quæ stercorei bubulo silentur, quin etiā cibi tū cupiditates tum cōcoctio deterior euadit etc.

Lege Auic. 16. Tra. 3. cap. 7. ubi de signis colicæ absolute agit, & inuenies quæcunq; a me sub breuitate enarrata sunt, Lege etiam Razen. in. 9. almans. cap. de doloribus uentris, et ibi etiam Arcul. Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. & 2. ponit signa interstinguentia colicum a nephiritico, ibi primum uomitus & nausea urgent, sed grauiore & magis assidui dolente colo & c. Lege etiam Aui. 16. Tra. 3. c. 10. Paul. lib. 3. cap. 43. Qui ex humore pituitoso laborāt per totum abdomen, ac si per- tunderetur colon, in alto excruciantur, Adsunt tormina, ructus, Nausea, uomitus potissimum pituitæ, aluus retinetur, Præcessit continuus ciborum frigidorum crassiq; succi usus, satietas cruditas otium & c. Lege Auic. 16. Tra. 3. cap. 11. ibi quandoq; significat colicam phlegma antecessio causarū phlegmatis ex satietate nauseatiua, & ex speciebus ciborum & ætas & regio & hora & c. Lege Gal. 12. meth. cap. ult. nam



multa indicia declarat dum curam aggreditur.

De cura doloris colici.

Omnis dolor in genere curam admittit dupliciter, primo remouendo eius causam, quæ ablata dolor euanesceat, sed quia in ablatione causæ plura requiruntur ut sunt humorum præparatio, Reuulsio, Resolutio, & euacuatio quæ morâ ad longum tempus trahunt, Idcirco alia insurgit curandi intentio, quæ est doloris remotio cum anodinis ex caliditate ac humiditate temperata constantibus, ex quibus plerumque mala interperies illius membri aufertur, quibus etiam non proficientibus. 3. medendi intentio oritur, quæ dolorem cum narcoticis membra stupefaciendo remouet alijs præsertim non iuuantibus. Si igitur inducias dederit dolor ab ablatione causæ incipiemus, Si minus, sed intensissime ægrum cruciet cum secunda intentione, procedemus. s. cum anodinis dolorem mitigantibus, quæ tum intrinsecus cum extrinsecus applicari possunt in quorum numero laudantur enemata anodinia et lenitiua sicut ex decocto camomillæ anethi melliloti. s. lini fœnugræci Maluæ alteæ cum ontia casie extractæ & tantundem Zuchari cum oleo de. s. lini butyro & c. Conueniunt etiam iura pingua cum croco aqua decoctionis camomillæ & c. Extrinsecus conueniunt inunctiones cataplasmata foetus balnea quæ parari possunt ex oleis camomillæ anethi & c. cataplasmata ex rebus anodinis & c. quæ omnia nisi contulerint ad narcotica transeundum, inter quæ debilior est egethea quæ stupefacit & resoluit, parum ualidior athanasia, Valentius est philonium, A proprietate curant colicam, sterqus lupi, ossa mespillorum castoreum, lumbrici terrestres puluerizati. Cura colicæ pituitosæ quinque intentiones requirit, prima est uentris lenitio, secunda est humorum digestio tertia est euacuatio, quarta residui resolutio ac membrorum roboratio, quæ inten=



tiones non solum in pituitosa sed etiam in biliosa & melan-  
cholica conducunt, Ventris igitur lenitio perficitur per le-  
nientia, qualia sunt clysteria cum cassia zucharo hieræ simp.  
&c. Digestio fieri potest cum syr. de duabus rad. bisantino  
oxymelle simpl. & rhodomelle, modo materia sit uiscosa ac  
crassa, Euacuatio perficitur cum hiera simpl. cum diaphini-  
cone, &c. Et nota quod materia in uis ductuum existēs, abs-  
que alia preparatione euacuari debet iuxta duo carmina a  
Iacobo Forliuensi posita quæ sunt, Synocha cum colica fre-  
nesij squinantis & antrax, Materias crudas euacuare iubet,  
Resolutio residui fit cum oleis rutæ liliorum alborum camo-  
millæ in quibus concocta sint cuminum fœniculum Abrota-  
num pulegium anisum etc. uel fiat cum electuarijs calidis, ut  
cum diamusco electuarij de baccis lauri, Aromatico ros. Dia-  
galanga diacimino &c. Cibaria sint in colica lenientia ac ro-  
borantia ob appetitus imbecillitatem, sintq; calidiora & sic-  
ciora in frigidis doloribus qualia sunt porra & Allia, sed ab  
initio morbi ieiunare oportet, In sequentibus diebus cibaria  
sint boni succi, Vitentur cruditas & satietas, In doloribus a  
materia acri, Victus sit humidior & frigidior uitetur acria  
tam in cibo quam in potu, Vitentur etiam in genere omnia  
holera legumina graueolentia &c. Conueniunt aqua carnis,  
uitelli ouorum, medulla panis in uino carica & passulæ &c.  
Cura fecum siccarum perficitur cum lubricantibus ac mol-  
lientibus ut cum clysteris ex camomilla anetho althea Vio-  
lis fœnugræco cum oleo amyg. dulcium butyro &c. uel cū luo-  
re galli in quo coquantur Tamarindi sebesten &c. Cura inflā-  
mationis in colica, est ut primū sanguis mittatur a uena cubi-  
ti, secūdo considerandū, num inflāmatio ad suppurationē, uel  
ad resolutionē tēdat, Si ad resolutionē in primis repercutien-  
tia, In incremento resoluētia cū reperiūsiuis et molliētibus,



In statu discutientia cum mollientibus conueniunt. Si ad sup-  
purationem, tunc suppuratio adiuuanda deinde ad uomitum  
irritanda quæ rupta abstergentibus primo, & lenientibus,  
deinde conglutinatione indiget.

Cura flatuosæ colicæ consistit tantum in resoluentibus fla-  
tum qui si habeat materiam fouentem frigidam obstruentē,  
primo abstergentibus lenientibusq; clysterijs, deinde inciden-  
tibus ac attenuantibus & de obstruentibus indiget, quibus pa-  
tis educatur materia fouens deinde resoluatur flatus.

Loci consentientes de cura doloris colici.

De cura in genere lege Arcu. & Mar. Cat. De cura pitui-  
tose colicæ, lege Gal. 12. meth. cap. 8. ibi, Dolores igitur quos  
humor crassus excitauit & c. Et de cura biliosæ, ibi, sin mor-  
dens humor sit qui affligit & c. Et de cura ex inflammatione  
facta, ibi in eodem loco, si sanguinis abundantia sit quod di-  
stendat ueluti in phlegmone fieri solet protinus ubi uires æ-  
gri, ualentes fuerint, sanguis mittendus est, & c. Et de cura  
flatuosæ etiam ibi, mentionē agit, ibi pari ratione qui ex fla-  
tuoso spiritu & c. Auicen. 16. tra. 4. cap. 2. etiam curam habet,  
ibi curatio uera est incisio causæ & c. lege Paul. & Aet. fusius  
de hac re. De cibarijs loquitur Auicen. 16. tra. 4. cap. 28. et 27.  
ibi colici indigent cibo leniente & roborante ob imbecillita-  
tem appetitus & c. Lege etiam Paul. lib. 3. cap. 43. ibi, In dolo-  
ribus frigidis uictus sit calidior & siccior & per initia mor-  
bi a cibo abstinendum, deinde acria assumantur ut porra &  
alia in sequentibus sint boni succi concoctu facilia & c. lege  
Aet. ser. 9. cap. 30 particularem de uictu mentionem facien-  
tem. Lege etiam Razen in diuis. ibi, quum sedatur dolor etc.

Observationes in uictu.

Auicen. 16. tract. 4. cap. i. In regimine colicæ interdicator  
repletio, & si qua sit per uomitum expellatur, item sitis tol-



leretur, aut si abstinere nequeat, bibat parum &c.

Observationes in curatione.

Marc. Cat. oportet advertere ne differatur cura colicæ, quia est dolor intensissimus cito uirtutem prosternens &c.

Observationes de soluentibus pharmachis.

Auic. loc. cit. Cauendum ne in principio pharmacum ualde solutium exhibeatur, nam humores & schibala sunt plures & forte penetrare non possunt, sed incipiendum a lenientibus ac lubricantibus & c. 2. In tribus casibus medicamenta ualde soluentia exhiberi debent. Primus si materia antecedens inconiunctam causam transeat ut si a uenis ad intestina. 2. si humores adeo crassi existant qui nec clysterijs uel leui pharmaco educi possint. 3. si usq; adeo uehemēs sit obstructio ut nullo pacto per prædicta aperiri possit, itē nullo modo hie ræ addatur agaricus, nā facit eā retineri & profundari &c.

Observationes in clysteribus.

Auic. loc. cit. debemus esse contenti de clysteribus, quoniam a longinquis partibus non attrahunt, nec humores commouent, nec febrem excitant sicut pharmaca solutiuia præterea clysteres absq; nocumento reiterari possunt. 2. Si clysteres acuti non soluant super sedendum, donec concocta sit materia, quandoq; enim hepatis cordi & capiti sua acredine nocent. 3. Non fiant clysteres si quid crudi fuerit in uentriculo ne ad inferiora trahatur, & hoc aduerte propter eos qui in omni colica, & in omnibus horis enemata imponi iubent. Marc. Cat. si in intestinis causetur excoriatio non debemus fortia & acuta clysteria administrare. Sed loco eorum lauatiua & dolorem sedantia. 2. quod æger se taliter debet situare ut clysteria declinent ad locum doloris. 3. q. reiteranda sunt pluries. 4. q. suppositoria debent esse longa ad mensuram septem digitorū ut uirtus eorum possit lōgius cōmunicari etc.



Mar. Cat. Non debemus narcotica a principio appropinquare, sed quando alia non sufficiunt quia ex his materia in-  
frigidatur ac incrassatur, si fuerit frigida, si opilatiua magis  
opilabitur, si uentositas magis incrassabitur. Hoc idem sensit  
Gal. 12. meth. cap. 8. ibi cauendus est magnopere in affectibus  
qui a crasis & glutinosis humoribus fiunt &c. Item dicitur  
quod extrinsecus hæc adhibentur, & si intrinsecus præbeantur  
sint bene retificata, &c.

## Observationes de balneis &amp; fomentis.

Auic. 16. tra. 4. cap. 1. Cauendū ne caput uapores balneo-  
rum & fomentationum suscipiat & hoc cum frigidis appli-  
citis. Mar. Cat. Non debemus uti fortibus calefactiuis, neque  
applicentur alia fortia resoluentia ubi stet repletio materie-  
rum, nam augent dolorem & materias crassas subtiliant &  
in uentositatem conuertunt, nec competit remedium de alio  
& Gale. 7. meth. cap. 15. de scriptum nisi sit minorata materia.

## Nocentia &amp; conferentia dolori colico.

Inducunt colicam aqua aluminosa, capita animalium, ca-  
seus, usus citri, citonia pontica cucurbita, faba, fungi, grana-  
tum syluestre, lac omne, melones, menta, hordeum, pira, tube-  
ra, &c. Conferunt ad colicam amygdale amaræ & dulces  
apium, betonica, calamentum chamaleonta cartamus catapu-  
tia cassia fistula, centaurea colocynthis, enula, esula, euphor-  
bium, galanga galerita auis, cardellus, gith, ius galli decrepi-  
ti, hyosciamus laurus limacie matricaria myrobalani chebu-  
li, nasturtium, ozimum, cyclamen, polypodium, radix pipe-  
ris, ruta, sagapenum, sisamus, stercus canis capræ columbi  
lupi porci, urtica, aqua mellis, ferrea, diaphinicon, electua-  
rium de baccis lauri diaprasium nic. diacitoniten laxatiuum,  
diaciminum, electuarium indum elefscoph, phylonium rom.



oleum de carthamo, laurinum, rutaceum, de piperibus, nardinum, liliorum, pillule iliace almans. foetidae maiores mes. sagenea Auic. theodoricon magnum Auicen. thyriaca magna troc. de uiolis troc. de epithimo.

De pronosticis doloris colicis.

Hippoc. pronost. 2. ca. 13. Dolores qui cum febre affligunt circa lumbos & inferas sedes, si praecordia attigerint, inferas sedes reliquētes exitiales admodū sunt, sed considerata sunt alia signa, nā si quod horum prauū fuerit desperandus est aeger. B. Intellige de his quae symptomatice mouētur ab una parte ad aliā. Hip. aph. 2. aph. 6. Quicūq; dolentes parte aliqua corporis dolorē non sentiūt, ijs mēs agrotat. B. i. quicūq; dolet et doloris qualitātē non sentit hic sensu agrotat, nō refert si sensum uel *ψυχῆν* uel animā dixeris. Et aph. 6. aph. 7. dolores uētris sublimes leuiore, qui uero nō sublimes, fortiores. B. Nota non secundū corporis longitudinē intelligi Hip. sed secundū profunditatē. i. non secundū infimam & supremam corporis partē, sed secundū exteriorē & interiorē, etc. Et aph. 6. aph. 40. quibus dolor circa praecordia fit absq; inflammatione, ijs febris supueniens morbū soluit. Et aph. 7. aph. 26. In forti dolore uētris partiū extremarū frigiditas malū. B. Frigiditas fit uel ab inflammatione, uel ob caloris innati defectū. (Deficit calor uel quia extinguitur uel a multitudine suffocatur) uel ob dolorē uehementē medias corporis ptes occupantē ad quē natura cōtracta cū sāguine partes extremas tāq; exāgues relinquit. Et aph. 7. aph. 22. A uētris dolore diuturno suppuratio. Et aph. 4. aph. 11. Quibus tormina et circa umbilicū labores et lumborū dolores, q neq; medicamēto, neq; aliter soluitur in aquā intercutē siccā firmatur, siue *ἰδρῶται*. Gale. 12. meth. cap. ultim. Colica quae a siccitate contingit, insanabilis est, cuius rationem postea ipse reddit, lege eum



Auic. 16. tract. 3. cap. 8. & 9. Si colica erit incolumis retentio non erit uehemens & dolor mutabitur, & patiens ex administratione clysteriorum, ob exitum flatus & excrementi quietem inueniet, Si uero fuerit mortalis aderunt fortitudo doloris, uomitus ad uomitum, sudor frigidus, extremitatum frigus, rationis turbatio, spasmus & retentio excrementorum, & si uestigium nigrum, uel bothor apparuerint, postridie moriuntur, &c.

#### De ileos.

Ileos, quem latini uoluulum uocant, est tenuium intestinorum dolor uehementissimus cum quo excrementorum per secessum difficilis sit exitus &c.

#### Loci consentientes de ileos.

Gal. aph. 6. com. 44. Ileos est intestinorum tenuium passio, in qua ob interclusam inferiorem uiam nulla excrementa inferius excernuntur Aet. ser. 9. Voluulus est intestinorum affectio lethalem dolorem inferens. Gale. 6. de loc. aff. cap. 1. Hunc ileon. i. uoluulum uocant, nonnulli etiam chordapson quum. s. tumor aliquis eminat in tenuium intestinorum parte, ut uideatur intestinum chordarum similitudinem conuolutum. B. chordapson ab Aet. exponitur intestinorum emollitio quæ fieri dicitur quoties admota manu, durities tactui succumbit, sed quomodo emollitio, si durities adsit, intelligere nequeo, quare Galeni expositio mihi magis placet, Vocatur etiam hic morbus acelfo chordios.

#### De causa ileos.

Causa ileos est intestinorum uel obstructio, uel retentricis facultatis fortitudo & attrahens, uel potio frigida, uel intestinorum descensus in scrotum, Obstructio deinde fit uel ab inflammatione uel a tumore duro, uel ab alio quopiam abscessu uel ab excrementis siccis uel ab aliam intestinorum



compressione facta, aut a ueneni cuiuspiam potione &c.

Loci consentientes de causis ileos.

Gal. aph. 6. com. 44. uisum est antiquioribus medicis, uel ab inflationibus uel ab aridi stercoris obstructione huiusce= modi tenuium intestinorum affectus oriri. Itidem ait. 6. de loc. aff. cap. 1. Vide etiam Gal. 9. de sympt. cau. cap. 2. ibi, fit etiā ab humoribus præter naturam adeo intestina obstipantibus &c. Paul. lib. 3. cap. 44. & Aet. ser. 9. cap. 28. fieri uoluulū dicunt intestinīs una cum stercore in scrotum descendenti= bus, Item ex plagis quibusdam ex frigore uehementi & ex aceruata frigide potione, Auic. i. 6. tract. 4. cap. 29. & quan= doque accidit propter potionem uenenorum facientiu ileos. Interdum fit ex fortitudine uirtutis retentricis, nam graci= lia intestina ob suam gracilitatem magis ad retinendū sunt parata quam crassa. Vide Gal. 6. de sympt. cau. c. 2. ibi, quem= admodum stercus per lethales uoluulos &c. Et Auic. loc. cit. uult quod ileos ab hisdem met causis fiat ac dictum est in co= lica. Halyabbas lib. 9. cap. de col. enumerat. Primum apostema calidum, obstructionem ex fimo sicco uel ex humore crasso, rupturam abdominis, priuationem ciborum & potum le= thiferi medicamenti. &c.

De signis ilei.

Signa ilei sunt dolor supra umbilicum, nihil ex fœcibus ad inferiora descendit, Vomitus interdum fœcum humorum & uermium, Ructus inanes, fœtor oris & totius corporis. Sequuntur etiam mala symptomata, qualis est tremor cordis uigiliae, animi defectus, frigus extremarum partium, sudor frigidus, urinae difficultas. Signa ueneni sunt imbecillitas ui= rium mollicatio & tremor cordis, nec ab alia causa ista fiant. Signa inflammationis sunt dolor durities fœcis tumor febris &c. Signa interstinguentia ileum a colica sunt i. do=



lor uehementior quam in colica. 2. locus ilei supremam umbilici partem occupat, colicæ infimam. 3. ileus magis tendit ad uomitum quam colica quum sit stomacho propinquior. 4. Ileus non iuuatur a clysteribus & suppositorijs sicuti colica. 5. In ileo maiora sunt & grauiora symptomata quam in colica, sicuti syncopis tristitia &c.

Loci consentientes de signis ilei.

Gal. aph. 7. com. 10. primū nihil in ileis ad inferiora descendit & hoc est propriū & inseperabile indicium, uomitus non semper adest, nisi quādo exitiales sunt si uehemētius distorqueatur ascendit eis stercus et singultiūt, quidam desipiūt & conuellūtur compatiēte neruorū principio passione uentriculi. Et. 6. de loc. aff. c. 1. Dolores uehemētissimi in sublimioribus intestinorum partibus eueniūt grauiter uomitionibus cruciātes etc. Aet. ser. 9. c. 28. In principio adest dolor circūuolutus uētriculi humiditas multa, exolutio ructus inanes et nihil alleuiātes, murmura intestinorū, stercoris & flatus perfecta cohibitio, In uigore morbi, omnia sursum ferūtur, adest uomitus bilis & pituita, totius corporis frigiditas, spirandi difficultas etc. De signis distinguētibus inter colicā et ileū lege Aui. 16. t. 4. c. 30. ibi, Amplius signa distinctionū colicæ cū signis ileos sumūtur etc. Lege et de signis apostematū, ibi, Et factū ex apostemate &c. Et nota hic in Aui. q. dicit. Et illic febris nō erit et tamē Gal. apho. 6. com. 44. inquit quāto magis maior ac grauior euadit tāto maiore febrē effici cōtingit etc.

De curatione ileos.

Cura perficitur ac dictum est in colica per quatuor intentiones. Prima cum regimine uitæ. 2. cū eius causæ ablatione. 3. cum euacuatione. 4. cum resolutione et roboratione. Victus igitur sit tenuior quam qui dictus est in colica sitq; boni succi &c. Ablatio causæ ita erit ut si uenenum sit, danda erit opera



uu uomitus prouocetur propinato calente oleo uel aliquo iure pingui demum thyriaca exhibeatur, uel quidpiam aliud prout species ueneni magis requirit. Si uero in causa fuerit obstructio procedatur tunc cū disseccantibus ac attenuantibus pharmacis, deinde purgāte, pharmaco alius soluatur. Si fuerit inflāmatio, eadē erit cura ac dictū est in colica, Si causa sit descēsus intestinorū in scrotū tunc intestina ad suū locū compellantur & resupinato patiente fascia constringatur, Interim sectione uenæ opus est tum ob uenarū meseraicarum copiam, tum ob uehementissimum dolorem cætera fiant ac dictum est supra. Loci consentientes de cura ilei.

De prima intentione loquitur Aet. ser 8. cap. 28. ibi, Cibi sint boni succi & c. De secunda intentione loquitur Paulus lib. 3. ca. 44. ibi, Qui ueneni causa ileon patiūtur, compellendi sunt ut aquæ calidæ potu euomant, deinde oleo calente propinato uel iure aliquo pingui, deinde interpositis aliquibus diebus Thyriaca exhibeatur. Quod si obstructio discutiatur purgante aliquo pharmaco aluum inanire confert, Si ex intestini in scrotum descensu ileus accidat in inguina intestinū compelletur & fascia supinato patiente ligabitur. Aui. 16. t. 4. c. 31. tria notat, primum q̄ ileos est colica fortior, idcirco in cura properandū iuxta illud Hip. extremis morbis extrema sunt opportuna remedia. 2. q̄ id quod bibitur magis iuuat in ileo quam in colica, nec multum referre, an; a bibitis uel a suppositis inchoetur. 3. quod in ileo magis sectio uenæ conuenitur quam in colica & c.

#### Nocentia ac conferentia ileo.

Inducūt ileō argentū uiuū et caro porcina. Conferūt ileo absinthiū acorus, agaricus, alleū, betonica, chamedrys, chamēpitis, camomilla, cetaurea, cyperus, eupat oriū, pastinaca, ruta, sauina, stechas thurbit. Cōposita sūt ung. alabastr. aragō,



aureum ung. nic. ung. laxatiuum nic. Marciaton' nic. oleum li-  
lij bibitum, oleum de cherua, confectio phor. Auicen. 1. lib.  
5. Confectio hermetis Auic. Diacitoniten nic. electuarium du-  
cis nic. phylonium chatarcticum imperiale nic. stomaticū ca-  
lidum nic. theriaca magna, pillulæ sine quibus & foetida etc.

#### De pronosticis ilei.

Hip. aphor. 6. apho 44. Quibus ex stillicidio urinae ileos  
superuenerit in septem diebus pereōt nisi febre superuenien-  
te satis urina fluxerit. B. quoniam adulterinum ac spurium uo-  
cavit apho. Gal. idcirco damnatur ab Auic. eo q̄ causam aph.  
ignoraret, quasi id non legerit Auicen. quod in fine commēti  
inquit Gale. q̄. s. si ueritatem debet habere aphor. oportet mul-  
titudinem humorū crudorum una cum multa frigiditate cau-  
sam arbitrari, quam febris superueniens liquefaciat ac dissol-  
uat, & per uiam urinae dissolutā natura emittat & c. Et aph.  
7. aph. 10. ab ileo uomitus singultus desipientia uel conuulsio  
malum. B. quia intestina coguntur tandem ex fecū molestia  
contra naturam uiolenter materiam molestantem extrudere  
unde singultus uomitus & c. proueniunt. Aet. ser. 9. cap. 28. fa-  
miliaris ileos est puerulis, sed naturalis beneficio humidi-  
tatis euadunt. senibus uero si accidit nunquam conualescunt,  
in chordopso uocato subitum instat periculum ut plerunq; 3.  
uel. 4. horam non excedat. In inflammatione uero si suppur-  
atio uel longa mora contingat periculo non uacat quanquam  
sint ex eis qui seruati sint. Auic. 16. c. 29. & deterior ileos est  
in quo expellitur per superiora stercus, deinde in quo est su-  
dor foetidus habens foetorem stercoris, deinde in quo est ha-  
nelitus foetidus & eructatio foetida & c.

#### Authores dissentientes circa ileon & colicam.

- 1 Adferere, in colicæ principio conuenire narcotica.
- 2 Adferere theriacā nouā esse uenenosā et nō esse exhibendā.



- 3 Adferere, ileon cum Auic posse generari ex stranguria.  
4 Adferere, ileon curari non posse per fluxum urina mediante febre.

Confutatio dissentientium circa colicam & ileon.

Ad primum, respondet conciliator differentia. 204. per plures diff. 1. sumitur a morbo uel ab accidente, uel a uirium robore, unde nisi symptoma superet morbum stante uirium robore q. nullo modo conueniunt. 2. diff. sumitur a causa morbi uel a complexionem morbi, unde permanente uirium robore & causa existente frigida cum dolore remisso non conueniunt narcotica, sed adhibenda sunt anodina, uerum si symptoma esset uehementissimum, & causa esset calida ubi esset timor de casu uirtutis, tunc posset sed magna cū cautella exhiberi. Ad secundum, Gal. 5. meth. cap. 13. mulieri cum dormitura esset dedi theriacem quatuor menses ante confectam, habet enim id ætatis adhuc præualentē papaueris succum, qui in antiquitatis ignauus redditur, igitur non est uenenosa, & potest exhiberi. Ad 3. Gal. aph. 6. comm. 44. aiunt enim quod uesica inflammata angustia loci facta ex cōpressionem in intestinis passionem affert quæ ileos nominatur, ego uero multos me puto in tota uidisse uita, nonnullos tantum periclitātes, non paucos etiam mortuos non potentes mingere quorū nullus factus est ileosus & sic tenet quod ileos nō generetur ex stranguria. Ad quartum, respondetur per id quod dictum est ex Gal. in eodem aphor. supra contra Auicem. ibi, multitudinem humorum &c.

De rerum & uesicæ calculo.

Morbus calculosus qui a græcis λίθιαστις dicitur, est lapidis generatio ex humoribus uiscidis & immenso calore orta, in qua urina excretio retinetur, Id tamen notum est quod plerique medici attestati sunt, quod non solum in uesica & re-



nibus sed & in colo, pulmone, fellis, folliculo, iuncturis stomacho & inguinibus lapides oriantur, unde lapides inter se differunt magnitudine duritie asperitate colore numero loco & materia agente, de quibus satis copiose infra mentionem faciemus.

Loci consentientes de renum & uesicæ calculo.

Gal. lib. finit. med. lithiasis. i. calcularis morbus est calculi generatio in renibus & uesica ex qua urinae excretio prohibetur. Quod calculi in partibus enumeratis gignentur, lege Gal. 6. de loc. c. i. ibi, nonnulli a forti excernendi conatu & c. Et 4. de loc. aff. c. ult. ibi, Quidam diuturna tussi uexatus frustrum quoddam paruo gradinis grano etc. Deinde se uidisse lapidem in fellis folliculo attestatur Gētilis, & in iuncturis & stomacho quidam Gilbertus & in inguinibus Arcul. Aet. ser. 2. c. 4. Consistunt lapides in renibus iuxta ipsorum uentriculos aut parui aut maiores interdum plures et pauciores magnitudine, forma, colore, asperitate, & multitudine inter se differentes, & c.

De causis renum & uesicæ calculorum.

Causæ initiatrices sunt cibus potusque crassus ac uiscidus, causæ coniunctæ sunt binæ quarum altera erit materialis altera efficiens. Materialis a crasso terreoque humore conficitur. Efficiens est ignea renum aut uesicæ caliditas quæ tum naturalis tum aduentitia esse potest, ut quæ ab aliqua re calida renibus adnota proueniat. Causæ uero humores in renibus tardantes, erunt, uel expultricis imbecillitas, uel obstructio quæ tum attenuatoria a superflua frigiditate tum coarctatoria a superflua ac uiscosa materia, tum carnosæ ab aliqua carne innata, uel ab apostemate proueniens, & cæ.

Loci de causis renum & uesicæ calculorum.

Gal. 2. de natura humana tex. 13. Plerique pueri qui plurimum uoraces sunt humorem non modicum aggregant quem crudum pro-



prie uocamus qui calculo gignēdo in primis opportunus est, accedēte calore tanq̃ causa effectrice. Itidē asserit. 3. aph. com. 26. ibi, lapis est propria passio puerorū qui ob edacitatē non paucos humores crudos coaceruant &c. Auic. 18. cap. 16. tres causas calculi assignat, materiā. s. quæ est humiditas uiscosa et crassa, uirtutē agentē sicut est caliditas ab æqualitate egres-  
sa, & materiæ retentorē qui est expultricis imbecillitas quæ ab intemperie uel ab inflammatione & ulceribus oritur, &c.

Gal. 14. met. ca. 4. Similiter & calculi generātur in renibus asso. s. in his crasso glutinosoq; succo, prouenit. n. hæc affectio ex ciborum crassorum succo si quis liberalius his utatur, etc.

#### Obiectio.

Quur non omnibus hoc uitium contingit, quem utraq; causa sit omnibus parata.

#### Responsio.

Dilucidatur hæc tua dubitatio a Gal. 14. meth. cap. 16. ibi siquidē credendum est quibusdam esse densos admodū renes uel p̃ angusta, in iocinore ora etc. lege eū & rē intelliges, etc.

#### De signis renum & uesicæ calculorum.

Signa generationis calculi sunt urina exiēs pura et aquosa, in qua non excernūtur arenosa iam prius uisa, sed retinentur. Signa iam generati lapidis sunt dolor grauitas urinæ suppressio, maxime si in utrisq; renibus lapis extiterit.

Signa motus lapidis sunt dolor uehemens usq; ad inguina cōmunicans ad scrotum et testes. Vehemēs inquā ob loci angustiam & sensibilitatem, sed quū iam in uesica lapis fuerit, dolor mitigatur & tandē mingitur. Signa lapidis in uesica sunt prius pudēdi ex cuius cōtractione penis intēditur, urina suppressitur, nec nisi magna cū difficultate & conamine emittitur, sunt qui duos lōgiore digitos ano intromittāt eleuatis prius sursum uersus cruribus et aluo ab excrementis purgata ut lapidē manifeste adesse sentiāt, arena insup̃ q̃ subsidet



si rubra uel flaua fuerit, e renibus descendit, si alba & cineritia ex uesica. Egreditur autem harena dū confirmari & dissolui lapidem contingit, quo confirmato, & obstructione completa non amplius arena exit &c. Item lapis renum est rotundus uesica est oblongus &c.

#### Loci consentientes de signis calculorum.

De his signis lege Auic. 18. tract. 2. cap. 17. ibi, signorum lapidis in renibus, primum est urina crassa quæ deinde incipit conuerti ad tenuitatem propter retentionem turbidi &c. lege locum fusius. Gal. 1. de loc. aff. cap. 1. Indicia lapidis in uesica sunt aquæ similis urina, in qua subsident fabulosa quædā, laborantes assidue pudendum scalpunt, idq; uel laxum uel intentum præter modum, postea de repente urina supprimitur. Vide Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. ibi nephritici dolores eodem in loco stabiles permanent &c. Lege fusius Aet. ser. 2. cap. 4. ibi adest loci color absq; tumore foris apparente, & plura de signis annotatu digna inuenies, Lege etiam Arcul. 9. alm. plura enarrantem. Item Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. ubi Hip. damnat in illo aphor. Quibus in urinis arenosa subsistunt, ijs uesica laborat calculo. uide in super Alex. tract. lib. 3. cap. 34. Item Gord. & alios.

#### De cura calculorum renum & uesicæ.

Corpora quæ parata sunt ad calculum præseruatiuam curationem expostulant, atq; actu ægrotant curatiua indigent, præseruatio has igitur in se intentiones requirit, prima ut materia quæ lapidem generat, nullo pacto efficiatur, secunda ut si quæ facta sit, ne ad renes uel uesicam fluat, sed ad intestina mittatur, superest, tertia ut si quid ex hac materia ad renes casu euenerit, ne illic figi ac retineri permittit, quarta calorem renum qui est causa efficiens remissionem efficit. Prima igitur intentio prohibet omnia crassa & uiscosa tam in



cibo quam in potu, unde panes azimi caseus & animalium  
extremities & lacticia procul absint, similiter uitentur  
satietates & cruditates, sed attenuatoria sit dieta urinam  
ciens, uitentur etiam dulcia & c. Secunda qua ex renibus ad  
intestina materiam diducimus, completur per pharma le-  
nientia. s. cum casia uel decocto glyzyryzæ. s. alchechengi uel  
per enemata lubricantia uentrem uel per terebintum assum-  
ptum, nam ualde iuuat, tertia non permittit figi materiam  
in renibus, sed eam expellit cum diureticis ut cum brodio ci-  
cerum rub. cum decocto glyrizæ in iure galli decrepiti, cum  
paritaria in sero lactis decocta uel cum eius succo etc. Quar-  
ta remouet ac calorem intensum mitigat cum oleo uiolaceo  
nenupharino amygdalino dulci uitando ea quæ euidenter ad-  
stringunt & c. Curatiua uero ratio concretum in uesica, uel  
renibus lapidem auferre intendit, primo lubricando uias cū  
casia & minuendo materiam per ea quæ frangunt lapidem  
& urinam proritant & ora uenarum reserant, facta in pri-  
mis sectione uenæ si sanguinis multitudo ob acutos dolores  
ad partem læsam se contulerit. Comminuunt igitur lapidem  
quædam a proprietate occulta, quædam uero a manifesta qua-  
litate, quæ igitur hoc a manifesta qualitate efficiunt, sunt pu-  
legium calamenum origanum saxifragia radix graminis  
amygd. amar. Item radices petroselini asparagi brusci foeni-  
culi apij decoctum cicerum rub. cort. fabarum & rad. mal-  
uarum & c. Frangunt a proprietate occulta lapis iudaicus  
pulis leporis combusti, utrum multoties in aqua saxifra-  
giæ extinctum, pulvis lapidum cancrorum limatiarum, &  
mandibularum lutij piscis. Item sanguis hircinus cortex lau-  
ri, & inter composita laudatur iustinianum liontripon dia-  
laca, & c. Competunt etiam clysteres ex decocto maluarum  
paritaria camomilla melliloti foenugræci cum butyro, oleo



de scorpionibus &c. Similiter & brodia pingua exhibean-  
tur &c. Ad roborationem stomachi, qui plerunq; imbecilli-  
tatem in hoc morbo suscipit ista conferunt. s. oleum de absin-  
thio de menta ung. de absinthio &c. Si qua uero opus fuerit  
digestione perficietur cum oxymelle simp. uel composito cū  
aquis saxifragiæ paritariæ granorum iuniperi &c. Quod si  
delatus ex renibus lapis circa collum uesicæ detineatur, tunc  
supinatus ager eleuatisq; sursum coxis, adeo concutiatur, do-  
nec ex ipso meatu lapis excidat, deinde si minus per uri-  
nam exierit, tunc per catheterem instrum. uel per ea quæ calcu-  
los confringunt, amoueatur, quod si minus per hæc, curatio  
aduota successerit, tunc per incisionem inter anum & testes  
in uesicæ collofactum adunco ferreo euelletur lapis.

Loci de cura calculorum renum & uesicæ.

De primis intentionibus lege Auic. 18 tra. 2. ca. 18 ibi in-  
tentiones in curatione sunt, abscissio materiæ & prohibitio  
generationis ipsius cum abscissione causæ & retificatio eius,  
deinde mundificatio & comminutio & fractio & cōpres-  
sio & eradicatio eius quæ omnia longo satis sermone expli-  
cat. De uictus ratione lege Aet. ser. 11. cap. 6. ibi deligāt cibos  
e quibus neq; satietates neq; cruditates contingunt &c. Gale.  
10. de comp. med. per loc. cap. 1. Quæ calculosis auxiliant uni-  
ca facultate indigent quæ seccare & extergere cum manife-  
sta caliditate potest, sunt autem talia fere omnia amara etc.  
Paul. lib. 3. cap. 45. Medicamentis uti oportet quæ confringe-  
re siue seccare calculos possunt absq; manifesta caliditate: sic  
enim græce habet αἷα τοῦ σερμαίνεϊν ἐπιφανῶς: unde ue-  
reor ne menda sit in Paulo, nam quæcunq; ab eo in hoc affe-  
ctu recitantur sunt manifeste calida sicut & in Gal. qui uti-  
tur pipere myrrha aniso dauco apio &c. Aet. ser. 11. cap. 5.  
Si timor adsit ne multitudo sanguinis ob acutos dolores, ma-  
terias



terias ad affectam partem aduocet, secunda est uena cubiti a latere affecto, nec copia extrahenda quum ex hoc futurum non sit, ut a renibus lapis excidat, & c. Gal. 1. de loc. aff. cap. 1. Itaque supinato agro ut crura reliquo corpore sint sublimiora, multifariam ipsum concuties ut lapis ex meatu recedat, deinde iube ut ager urinam reddere tentet, quod si urina supprimitur rursus uehementius concute, & si sic permanserit demissa fistula aenea lapidem a ceruice uesicae repelles, & c.

#### Generantia ac curantia calculos.

Inducunt ac efficiunt lapidem Amylum, caseus, camphora condrus, farina cum lacte, lac coctum, lagana, porcinae carnes, triticum coctum. Curant lapidem radix acetosae, acorus, amygd. amar. anisum, urina porci, apium montanum abrotanum, aqua mellis & cicerum rub. batheca, cap. uen. betonica camaleonta cancer fluuiialis cum myrrha carui agreste, cinis rad. caulis, cicada, ciminum, cinis testarum choclearum cyperus, codisi, cordumeni, cotula, cubebe, daucus, sion. i. cresconi foeniculum syluestre, lac ficus genista, guma cerasorum priorum cum uino graminis, semen & radix, lapatium, lauri cortex & radix, renes leporis lumbrici terreni, Malua, Matricaria, semen mellonum, mille pedum, stercus muris cum aqua mellis, nigella, polium montanum, porri semen, succus raphani, rubus, saxifragia, sauina, senation, segapenum, serpillum, scolopendria cinis scorpionum scenoathos, fimus turturis et ius, tribulus, uitis aqua candes, uitrinum uisum tritum succus urticae, iringi, usnea, hypericon, Agaricus composita sunt Adrianum confectio nic. Antidotum emagogum, Camerina confectio hali confectio conabaris Aui. 1. s. Dialaca magna mes. dial sulphur mes. Diapiretrum nic. Diaprasium nic. elm. Ducis nic. electuarium cabadij haly, phylonium rom. Iustinianum confectio nic. Imperialis confectio Auic. 1. s. liontripon nic. milium

KK



solis cum myrto syluestri, Nephrocatacticum nic oleum benedictum nic. oleum de granis citri, oleum de cerasis mes. de piperibus de scorpionibus, oleum alchechengi de sauina petroleum sy. maior nic. Theodoricum magnum Theriaca magna ungu. laxatiuum nic. Zeneliten confectio Auic. præseruat a generatione lapidis aqua mellis casia syringa, genista grana pini maioris comesta.

#### De pronosticis calculorum renum & uesicæ.

Auic. 18 tr. 2. c. 16. In illo in quo est sedimen arenosum non aggregatur lapis, quoniã materia non est coarctata, Et scias q̃ parum accidit puellis & mulieribus, quoniam meatus uesicæ earum ad exteriora, breuior ac latior est & paucorum anfractuum, & c. Et scias q̃ lapis renum & uesicæ est ex ijs quæ hereditantur, & c. B. quod dicit, mulieribus non accidere lapidem mihi non placet, Nam sua ratio potius ad facile expulsionem quam ad lapidis generationem pertinet, sed forte ratio potior est, quia mulieres calorem non usque adeo uehementem habent ut materia in lapidem uerti possit, uel quia ex menstruis omnia superflua expurgantur & c. Hip. aph. 6. aph. 6. Renum & uesicæ uitia in senioribus difficulter sanantur. B. quia in motu semper sunt dum contrahuntur & dilatantur uel quia in senibus ob calorem innatum imbecillem, nec aliæ egritudines longæ curantur & c.

#### Authores dissentientes circa morbum calculum.

- 1 Adserere, calculum generari posse a calido temperato.
- 2 Adserere, calculosis dormire super dorsum ualde nocere.
- 3 Adserere, lapidem renum curari posse per incisionem.
- 4 Adserere, Diuretica in principio calculi conuenire, nulla facta euacuatione.

#### Confutatio dissentientium circa morbum calculi.

Primum impugnat Gal. aph. 3. com. 26. dicens quod mate-



ria crassa cui uehementia caliditatis, accedit est causa generationis lapidum, & Auic. inquit uirtus uero augens est caliditas quum egressa est ab æqualitate, ubi inquit Gentilis nō nisi ab excellenti caliditate lapidem posse generari. Ad. 2. Auic. 18. c. 16. Et dormire super dorsum est ex eis quæ lapidi conferunt nam ad resolutionem materiæ confert, & sic non semper nocet, imo plerunq; iuuat & c. Ad. 3. Auic. loc. cit. Et sunt quidā qui laborant extrahere ipsum per incisionē ilij & dorsum, sed est timor magnus in eo qui rationem non habet, quoniā oportet penetrare per musculos per dorsum per ossa magna per neruos & arterias & uenas magnas in quo casu accidit syncopis & mors & sic cura est potius impossibilis quam fieri posse putetur. Ad. 4. Respondet Conciliator diff. 205. q. diuretica non conueniunt in corpore chachochimo uel plethorico nisi facta euacuatione & digestionē, Item nec conueniunt in ulcere recenti, nec ubi fuerit obstructio, nam ut ipsa calida resoluunt ac petrificant, Præterea in ardore urinæ nō sunt adhibenda, eo q. ad locum læsum materiæ ducūt, & plus ad mingendum stimulant, ex quo dolor augetur & c.

#### De inflammatione & abscessu & ulceratione renum.

Dictum est sæpius quid inflammatio quidue abscessus & ulceratio, quare non est ut toties a nobis repetatur. Continet in se omnes hos affectus nomen nephritis iuxta Gale. 10. de compos. med. per. loc. cap. 1. Vnde Nephritis lib. fin. med. ita describitur Nephritis est renum phlegmone cum dolore uehementi interdum cum meiendi difficultate ac fibrosis uel arenosis excrementis cum modico sanguine & c. Variāt deinde abscessus tum ab efficiente materia, tum ex parte locorum pro quibus uide Auicem. 18. cap. 1.

#### De causis horum affectuum.

Causæ inflammationum renum extrinsecæ sunt equitatio



nes. percussiones, attritiones. plagæ, pharmacorum potiones &c. Cause intrinsecæ sunt, uel repletio totius corporis, uel membrorum consentientium, uel sanguinis mala qualitas, uel excoriatio lapidis, uel urinae retentio renes extendens, causa coniuncta est sanguinis calidi influxus. Cause aliorum abscessuum sunt aliorum humorum influxus, uel multitudo uaporosorum spirituum. Cause ulcerum sunt quæcunq; sunt cause solutionis continui sicuti apostema disruptum, uel humores erodentes biliosi acres uel lapis egrediens, & quicquid scindere uel aperire uel erodere has partes possunt, &c.

Loci consentientes de causis horum affectuum.

Aet. ser. 2. cap. 16. Renum inflammationes non solum humores corrupti, sed & plagæ & pharmacorum potiones et attritiones, & præsertim continuæ aquilonares. Auic. 18. c. 1. Cause apostematis renū sunt repletio in toto corpore, aut in membris communicantibus aut qualitas & quantitas sanguinis aut excoriatio lapidis aut retentio urinae apud renes extendens, Gal. aph. 4. comm. 75. fit magna ex parte a lapide acuto uel admodum aspero aut a disrupto aliquo abscessu. Et in lib. de tumorib. c. 2. causa. inflammationis est sanguinis calidi influxus &c. Et. 2. de glauc. c. 6. Abscessus fiunt ab aliorum humorum influxu, & a multitudine uaporosorum spirituum &c. Auic. loc. cit. Cause ulcerum sunt cause continuitatis solutæ & apertionis, &c.

De signis nephritidum.

Inflammationis renum & uesicæ indicia sunt loci affecti ardor, & cum grauitate dolor, febris continua, Mentis alienatio, bilis syncera uomitus, Mingendi impotentia præsertim existente in uesica inflammatione. At si circa ilia dolores fuerint & horror inequalis et febris inordinata abscessum in renibus cum loci cruciatu testantur. Signa ulcerum renum



uel uesicae sunt urina crassa cum exiguis carunculis, Dolor in affecto rene, interdum exiguum pus mingitur, interdum sanguis et ramenta, Item furfuracea urina squamulae et grauis odor cum mictu sanguinis et puris ulcerationem uesicae denotat. Cognoscitur affectus esse in renibus uel in uesica per dolorem qui in differentibus locis accidit. Nam si ulcus sit in uesica dolor erit in pube, si in ilijs et dorso erit in renibus, si in urinae meatibus, erit in media regione, et c.

Loci consentientes de signis.

Hip. aph. 3. aph. 36. Quibus autem morbo renali laborantibus praedicta accidunt signa, doloresque circa spine musculos fiunt, siquidem circa exteriora fient, abscessus quoque exterius futuros expecta, si uero dolores magis circa interiora loca fiant etiam abscessus interius futuros expecta. I. lege Gale. 6. de loc. aff. cap. 2. ibi, renem affectum esse cognosces, si dolores cum horrore interpellato uarioque infestare uideantur. Hip. apho. 4. aph. 76. Quibus in urina crassa existente, carunculae paruae aut ueluti capilli una exeunt his a renibus excernitur etc. Et aph. 4. aph. 77. Quibus in urina crassa furfurea quaedam simul exeunt, ijs uesica scabie laborat. Et aph. 4. aph. 75. Si sanguinem aut pus mingat aut renem, aut uesicae, exulcerationem significat. B. disce in com. Gal. quo renem affectus et uesica inter se distinguatur. Vide etiam Aui. 18. tra. 2. c. 2. ibi, signa ulcerum. Et Hip. ap. 4. aph. 81. si sanguinem aut pus minxerit aut squamulas et grauis dolor adsit uesicae exulcerationem sign. uide de his signis Arc. 9. almans. De curatione nephritidum.

Cura inflammationis renum et uesicae consistit in ablatione causae, causa autem est influxus sanguinis qui si adhuc influit prohibendum est, ne infuat diuertendo cum sectione uenarum quae in cruribus circa poplite consistunt et cum cucurbitulis frictionibus etc. Quod si quidpiam iam fluxum est per euacuationem sanguinis



in cubito, deinde inflammationi ipsi per cataplasmata et fomentus medendum, ita tamen ut si ad resolutionem tendat cum his quæ pluries dicta sunt, sicut in principio cum reprimentibus, in uigore cum mixtis, in decremento cum resoluentibus etc. Cura ulcerum etiam in abstergentibus ac mundificantibus consistit, deinde cum his quæ cicatricem inducunt ac consolidant, etc.

Locis consentientes de cura nephritidum.

Aet. ser. 1. cap. 16. Si inflammationis acumen non remittatur sed uehementior exurgat dolor, uena cubiti seccanda est sanguinis detractione repetita, et si quid inflammationis relinquitur ad cataplasmata procedendum etc. lege eum fusius Auic. 18. tract. 2. cap. 3. Initio curationis est abscissio causæ per phlebotomiam ex basilica si sanguis est uicens, interdum fit incuruatura poplitis uel ea non apparente in saphena et si sint cum sanguine humores acuti calidi, per solutionem uentris cum casia fistula, et aqua casei. Et de cura ulcerum lege eum fusius. 18. cap. 12. ibi, In curatione ulcerum renum, etc. Lege de hac re Gord. et Arcul. ibi causæ antecedenti hæc conueniunt, digestio, euacuatio, et diuersio, sed coniunctæ quæcunque a me dicta sunt.

Observationes circa uictum in inflammatione.

Auic. loc. cit. oportet ut detur in potu aqua dulcis frigida, sed non ita frigida ut prohibeas maturationem. 2. Abstineat a carne et dulcibus aqua calida et omne calidum nocet eis, et aqua plurima, non euacuetur quin laborare faciat renes suo incessu et motu. 3. Et non est ulceribus et apostematibus aliquid magis congruum quam quies. 4. Et balnea non conueniunt eis nisi in declinatione apostematum calidorum etc.

Observationes circa medicamenta.

Gal. 10. de comp. med. per loc. cap. 1. Quæ ad inflammatas et ulceratas affectiones medicamenta componuntur, medi-



camentis mitigatorijs opus habent, Quum uero impossibile sit hac cito ad regiones renum peruenire, ob id ipsis phar-  
maca urinam cientia miscemus &c. Itidem ait. 4. meth. cap.  
7. ibi quoties in uesica &c. Gal. 12. meth. cap. 6. Nec quum cir-  
ca sedem uel aliam huic uicinam partem initium phlegmo-  
nes incidit, aluum deiciens neq; cum in uesica uel cole uel reni-  
bus est coepta, pharmaqua urinam prouocent bibenda da-  
bis. Itidem ait. 13. meth. cap. 11. ibi, si quum in renibus &c. Et  
13. meth. cap. 16. Calida quoq; uitanda sunt quum renes facil-  
lime in duritiem occalescant &c.

Aet. ser. 2. cap. 16. Notat non esse exhibendum pharma-  
cum purgatiuum, sed per clysterē aluum esse leniendam, nec  
multam clysteris copiam infundendam, ne repleta intestina  
renes comprimant, &c.

#### Observationes circa topica.

Auic. 19. tract. 1. cap. 10. Reprimentia frigida non longo  
tempore applicanda, nam illud nociuum est & indurant apo-  
stemata uelociter. 2. statim si fieri potest sedandus est dolor,  
quum uesica sit membrum neruosum. 3. quod scimus solliciti  
in prouocanda urina quum frequentius retineatur in aposte-  
mate uesicae, &c.

#### De pronosticis nephriticorum.

Hip. aph. 6. aph. 2. Atrabile uexatis & renum passionibus  
hemorrhoides superuenientes bonū. B. ob id quod mala qua-  
litas humorum euacuatur &c. Auic. 18. tract. 2. cap. 1. Omnia  
renum apostemata uelocia sunt ad hoc ut in lapidem conuer-  
tantur. Et quando apostema calidum est in rene, & nō sit ua-  
cium a febre, deinde accidat cōmixtio rationis, tūc est mor-  
tale. Et cap. 10. loquens de ulceribus inquit q; multoties ex ula-  
ceribus renum proueniunt fistulae quae nullo modo sanantur,  
& ille cuius ren dirumpitur moritur secundum plurimum,



quod si scindatur non incarnatur nisi in parte carnosa, &c.

### De Diabete.

Hunc affectum uocant quidam hydropem matellæ, alij urinae fluorem, alij dipsacon ab inexplibili siti, alij diabete qui nihil aliud est q̄ renū affectio, in qua potio statim qualis assumpta est per urinam reijcitur, & raro accidere solet &c.

### Loci consentientes de diabete.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 2. Diabetes est proprius renum affectus, qui canina in ore uentriculi cupiditati proportionē respondet accedente, præterea retentricis facultatis imbecillitate. Paul. lib. 3. cap. 43. ὁ διαβῦτις ταχεῖα τοῦ πινόμενων ἐστὶ διεξοδος οὐρουμένων τοιοῦτων. τοῖα περ ἐπὶ οὗ δια καὶ διψῶσιν ἀμέτρος, ὅθεν καὶ διακκος ἐκλήθη τὸ πάθος, &c. Auic. 19. tract. 1. cap. 17. est ut egrediatur aqua sicuti bibitur tempore breui & proportionē respondet ad lubricitatem stomachi.

### De causis Diabetis.

Causæ sunt uel retentricis facultatis imbecillitas, uel facultatis attractorie uehementia, Prima fit a mala intemperie frigida intrinsecus uel extrinsecus adueniente, Secunda fit a uehementi renum calore nudo uel complexo attrahens a uenis emulgentibus, & ex eis ad hepar extenditur & ex hepate ad stomachum et ad omnia mēbra, unde humiditates membra irrorantes attrahit & fit sitis uehemens, quæ potu non sedatur, unde διακκος dictus est. i. siticulus morbus &c. Fit etiam a resolutione lacertorum colli uesicæ &c.

### Loci consentientes de caulis Diabetis.

Auic. 19. ca. 17. Causa diabetis est dispositio renum ob imbecillitatem accidentem & dilatantem orificia meatuum, quare fit ut aquositas non figatur in renibus. Et quandoque fit ex frigore, toto corpori uel renibus dominante, aut a potu aquæ frigide, aut propter uehementiam attractiue etc. Le



ge eum diffusius Galen. 6. de loc. aff. cap. 2. fit hic affectus a retentricis facultatis imbecillitate & c. Vide eum fusius, & plura intelliges.

### De signis Diabetis.

Signa quando fit ex caliditate sunt lumborum caliditas, urina multa in principio, sicut lotura carnis recentis minus tam infecta et rubea, ac si deffectu hepatis id proveniret, deinde processu temporis in qualitate & colore potus egreditur. Si fuerit a frigiditate, tunc circa lumbos percipitur frigus, & urina in principio est quantitatis consuetæ, deinde multiplicatur, & erit sicuti lotura carnis, sed minus tincta, quam in fortitudine attractricis facultatis, Adest semper sitis, nec ex bibitis satiatur, Sed quo plus sunt pota plus sitiuntur aquæ, & cat.

### Loci consentientes de signis Diabetis.

Aet. ferm. 11. cap. i. Comitatur sitis pertinax ex qua nulla ex potu satietas contingit, quare assidue bibere coguntur, & c. Vide de hac re Gal. 6. de loc. aff. cap. 2. Avic. nullam de signis Diabetis mentionem facit. lege tamen fusius Marc. Cat. cap. de Inuoluntario exitu urinæ, ibi adest sitis intensissima, & cat.

### De curatione Diabetis.

Cura in duabus intentionibus consistit, quarum altera ad ablationem causæ studet, Altera ad membrorum urinæ roborationem. Si causa igitur fuerit acritudo humorum euacuatione demitur, Deinde renes intrinsece & extrinsece cum succo granatorum & limonum infrigidentur. Si causa fuerit frigiditas ex qua retentrix imbecillis sit, roboranda erit cum calidis stypticis sicut cum decocto myrti, sumach, balaustiarum absinthij cum uino calibeato, aut cum puluere tali, recipe cupularum glandium. 3. i. Thuris myrrhæ ana. 3. quinque pelliculæ stomachorum gallinarum. 3. iij. Misce &



fiat puluis. Conueniunt etiam Troch. de spod. cum. s. acetosæ T. de terra sigillata de balaustijs cum uino uel aqua absinthij. Si causa fuerit uehemētia attractoriæ facultatis a superflua caliditate innata, tunc expedit infrigidare & stypticare qua ratione conueniunt, sy. de agresta de acetositate citri cū aquis portulacæ lactucæ, & ung. sandalinum comitissæ infrig. Gale ni, si causa esset relaxatio musculorum colli uesticæ, conueniūt quæcunq; de paralitide scripta sunt qualis est diacorus, Acorus conditus & c. Sitis remouetur si dato potu euomatur, & rursus frigidior dato, iterum reuomatur, donec sitis extinguatur & aquositas a renibus diuertatur. Somnus etiā hac in re commendatur. Quod si prædicta morbum omnino nō abstulerint, non erit præter rem si stuporem inducentibus utamur sicuti lactuca papauere uel cerata ex succo papauere cōfecta & renibus adnota.

#### Locī consentientes de cura Diabetis.

Auic. 19. Trac. 2. cap. 18. Diabetes ut plurimum accidit ex caliditate ignea, quapropter plurimum curationis eius est infrigidatio & humectatio & c. lege eum fusius.

Aet. ser. ii cap. i. Scopus medendi est ut humorum acredinem auferamus sanguinemq; ac cum eo permixtum humorē serosum, ad tardiorē motum reddamus, & renum intemperiem reuocemus. Vide etiam Aet. ibi, uictus sit boni suci mordacitate carens, ut sunt oua sorbilia, halica, carnes porcinæ, uinum ruffum crassius frigidum dilutum. Item caseus recens sine sale, Vide etiam Paul. & Marc. Cat.

#### Observationes in cura diabetis.

Auic. 19. Tract. 2. cap. 18. Quæ oportet ipsum agrum uitare est labor dorsī & assumptio diureticorum & c.

#### Observationes in euacuatione.

Gal. 7. meth. cap. 13. inquit quod euacuatio est renum tho-



racis arteriarum & uenarum & cordis, & utriusq; uesticæ commune quoddam opus, fit tamē euacuatio leniens ut Auic.

### Conferentia Diabeti.

Infrigidant renes ac diabete conferunt, Camphora illinita uel bibita cassia syliqua, cucurbitæ conditæ, oleum cucurbitæ, Plumbum &c.

### De pronosticis Diabetis.

Aet. ser. II. cap. I. Si amplius mordens caliditas in uisceribus augeatur Venter superior corrugatur & uenæ in ipso eleuantur, uniuersumq; habent gracilem habitum & tabes totius corporis accedit, qui uero non mingunt nec ex eis potus transpirat ob potus satietatem & humoris inundationem et uesticæ circumtensionem, acruatim uentre rumpuntur B. si quis Aet. intelligere uoluerit supponere habet duas diabetis differentias, Alteram in qua talis potio qualis assumpta est per urinam reijcitur, Alteram in qua nihil penitus mingitur, nec potus per alia loca transpirat, Qui igitur primo diabete, laborant, incurrunt marasimum uel tabem, consumpta. s. omni uenarum humiditate unde gracilis habitus oritur, & tandem mors, Qui uero non mingunt, nec per alia loca potum excernunt, dum bibere non desinant, uentre rumpuntur, Vide Gal. 6. de loc aff. c. 2. ad finem, Et Auic. 19. cap. 17. quandoq; perducit ad liquefactionem & ad ethicam &c.

### De urinæ stillicidio & eius difficultate.

Mingendi actio bifariam leditur in emittendo. s. urinam & in retinendo, Actio emittendi urinam, uel abolita est uel imbecillis, uel deprauata, si abolita tunc *ἰσχυροπρία* dicitur, & est quum nullo pacto ager mingere potest. Si uero imbecillis fuerit tunc *δυσουρία* a Græcis dicitur, a Latinis difficultas urinæ, quæ nil aliud est quam meiendi desiderium cum urinæ difficultate & trifariam consideratur, primo quum



tenuiter mingitur secundo quum in mingendo patiens longā moram occupat, tertio quum mingere incipit & in mingendo perseverare non potest sed plerunq; intercipitur, Si uero actio mingendi fuerit deprauata tunc excretio urinae non nisi guttatim destillabit & uocatur σταγυρική a Græcis a Latinis uero urinae stillicidium & est & excretio urinae guttatim stillantis & c. unde uersus.

Aegrum guttatim stranguria mingere cogit  
 Supprimit urinam, sed non disuria semper  
 Urinae quicquam nec uult ischuria reddi.

Loci consentientes de stillicidio urinae & diff.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2. At huiusmodi ambo uesicae morbi unum commune symptoma, iscuriam. i. urinae suppressionem, Est & aliud symptoma quum nihil penitus urinae in uesicam delabitur, abolita nimirum renū actione & c. Et aph 5. com. 58. Quando aliquis parum & frequenter mingit hac passio urinae stillicidium nominatur & c. Vide hac de re Alexand. lib. 3. cap. 38. Item Arcul. 9. almanf.

De causis stillicidii & difficultatis urinae.

Causae primitivae uel sunt extrinsecae qualis est casus percussio et lesio instrumentorum urinae, uel non extrinsecae sicut sex res non naturales assumptae & c. Causa antecedens est triplex, uel ex parte uesicae, aut a lesione facultatum eius, aut a dispositione urinae, Si ex parte uesicae, tunc lesio aut est in meatu colli uesicae, aut uirga, & tunc uel est aliquis abscessus uel ulcus uel scabies ex quibus dolens natura timet extrahere urinam, uel erit quedam obstructio obstruens urinae meatum, Si uero a lesione eius facultatum, tunc uel erit uirtus sensibilis lesa quae nec mordacitatem aut grauitatem urinae percipit, uel motiua uis uoluntaria lesa, dum muscoli relaxantur, & incontinentia urinae accidit, uel retentricis &



*expulsoriae facultatis imbecillitas quæ a mala intemperie, aut à defectu spirituum provenit. Si a dispositione urinæ, tunc urina quantitate, aut qualitate, peccat, quantitate quum ipsa uel nimis sit pauca, uel nimis copiosa, unde expelli non potest, qualitate quum nimis calida mordicans ulcerans, &c. Causa etiam potest esse imbecillitas renum non ualens aquositate attrahere uel expellere ob malam intemperiem frigidam aut calidam aut ob earum obstructionem, Causa per consensum erit ex parte membrorum principalium, sicuti hepatis in sequestratione aquæ deficientis, uel ex parte cerebri spiritum animale retrahentis, &c.*

*Loci consentientes de causis.*

*Auic. 19. tract. 2. cap. 6. Et fortasse causa est frigus, aut calor de foris aut percussio aut retentio urinæ plurimæ &c. Aut sit propter causam in meatu colli uesicæ & capitis uirgæ. Aut propter causam in uirtute, aut propter causam in instrumento, Aut propter causam membri mittentis, Aut propter causam in urina &c. Gal. aph. 3. com. 16. & aph. com. 58. causam esse inquit imbecillitatem retentricis facultatis, quæ ab intemperie et aliquo præter naturam tumore fieri solet, uel acrimoniam urinæ quæ etiam a renum passione uel a superfluitate serosa ex uenis ad ipsas percolata provenit, Et stillicidium urinæ fieri inquit recto intestino & utero inflammationem patiente, & hoc per compatiendi rationem aut a pure ex renibus ad uesicam euacuato.*

*Obiectio.*

*Gal stranguriam esse quoddam retentricis potentie symptoma hic inquit. Et tamen 6. de sympt. cau. reposuit eam inter expultricis potentie symptomata.*

*Responsio.*

*Soluit dubium Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. dum inquit humores mordaces omnia intestina & uesicam ad excretionem excitant, qui uero mordaces non sunt imbecillitatem intestinorum.*



sequi consueuerunt, quia retinere contenta nec exiguo quidē tempore possunt, ac si dicat. Si a mordacitate humorū strangu-  
ria fiat ad expultricem pertinebit facultatem, si uero ab imbecillitate ad retentoria, lege de his causis Aet. ser. 11. cap. 19. & Paul. & c.

De signis stillicidii ac difficultatis urinæ.

Stillicidium urinæ, & eius difficultas ex se manifesta sunt, Signa eius causarum erunt (si prouenit a frigore) urinæ tenuitas uel crassities cum albore & frigus sentietur. Signa ab humorum acrimonia habentur ex urina acri bilem attestante, uel ab habitu ipso uel a colore & ab his quæ intemperiem calidam denotant. Signa apostematis sumuntur ex febre, uel quia paulatine fit affectus et ex dolore loci et eius extensione & tumore. Signa lapidis & obstructionis per syringam intromissam habebuntur. Signa humoris crassi cognoscuntur ex grauitate sensata & pondere. Signa flatuosi spiritus est tensio sine grauitate loci, quæ interdum permutat. Signa mollificationis musculi uesicæ sunt egressiones urinæ absq; uoluntate. Signa contracti musculi uesicæ sunt, quia urina retinetur, nec potest educi nisi cum ualida compressione, Signa debilitatis sensus sunt quod æger mordacitatem urinæ non sentit, Signa expultricis facultatis læsæ sunt, si ex compressione facilis fiat urinæeductio. Signa difficultatis urinæ per consensum hepatis & cerebri, sunt eorum ægri-  
tudines præcedentes, & quod non apparent læsiones aliæ in instrumentis urinæ.

Loci consentientes de signis.

De his signis lege Auic. 19. Tract. 2. cap. 7. ibi, Signa eius cuius causa est frigus, est albedo urinæ cū crassitie & tenuitate, & multitudo surgendi ad mingendum, & sensibilitas frigoris, & c. lege diffusius librum & plura inuenies, Paul. li.



3. cap. 45 si neq; ab inflammatione, neq; a calculo, sed ab urinae acrimonia dependeat cognosces per signa bilem attestantia, Si uero a frigido fiant, aderit urinae tenuitas alborq; & præter alborem crassities quæ humorem pituitosum denotat, lege Arcul. Alex. & Gord. &c.

De cura stillicidii & diff. urinæ.

Cura huius morbi consistit tantummodo in eius causarum ablatione, ac in urinæ prouocatione, Inquiratur ergo omni studio eius causa, nam si fuerit a frigore tunc calefaciendo et regimen calefaciens instituendo facile curabitur, proderunt interim clysteres ex rebus calidis, inunctiones & fodus calidi prout sermo erit. Si causa erit obstructio coli uesicæ, uel fiat ab apostemate cura erit apostematis prout millies dictum est, si a materia lapidea recurratur ad caput calculi, Si a materia pituitosa saniosa uel sanguinis coagulatione, tunc intentio erit materiam attenuare cum incidentibus attenuantibus ac apertiuis. s. cū syr. bisantino de duabus rad. oxymelle simp. cum aquis foeniculi apij etc. deinde urinam prouocare, Prouocatio urinæ multifariam fieri potest, primo leuiter uesicā comprimendo uel cum suppositorio ex sale gemenio, uel cum titillatione in capite uirgæ cū fricatione in collo uesicæ prope anum, Proritant urinā ualidius in unctiones ex oleo scorpionum & liliorum alborum. nam præter quod calefaciunt etiam resoluunt ac relaxant, Similiter fodus ex pari taria ex senetione cum dictis oleis in sartagine fixis & pubi admotis, uel ex rebus magis calidis ut cum calamento pulegio sabina, Intrinsecus conueniunt clysteres ex hiera picra benedicta cassia zacharo & oleis scorpionum, Conueniunt etiam Decocta foeniculi asparagi brusci apij petroselini, uel decoctum Iuniperi sabinae. Item puluis corticis oui, a quo pullus egressus sit a suo cortice depurati ad quantitatem drac. unius.



Item rubea tinctorū cantarides amotis pedibus et alis, Pro-  
uocant etiam urinam Dialaca diacurcuma Iustinianum, &  
confectio de cineribus scorpionum, &c.

Loci consentientes de cura stillicidii, &  
difficultatis urinæ.

Paul. lib. 3 c. 45. Si ab acrimonia humorum dependeat cō-  
uenit ptisanæ cremor pisces, balnea uictusq; idoneus, Acridia  
uitanda sunt uinum exercitium & tarda comestio. Si uero  
a frigida intemperie conuenit uinum calidum & cibi qui uri-  
nam prouocent, & hæc de regimine, Aet. ser. 11 c. 19. Conside-  
rande sunt præcedentes causæ, nam si fuerit frigiditas cum ca-  
lescentibus & urinam prouocantibus tollenda est, addit o-  
etiam ad pectinem fotu, Si uero caliditas præcessit sicut uri-  
na acris & biliosa attestatur, tunc sane exuberantem humo-  
rem uitiosum quam celerrime purgare oportet, uitatis inte-  
rim omnibus salsis & acribus, Quod si nec acrimonia ad-  
huc auferatur lac ipsum cum amylo in uesicâ deijciatur, &c.  
Auic. 19. tr. 2. cap. 8. Si causa est humor uel sanies opus ut cu-  
ratur cum apertius ac diureticis & c. lege eum fusiis, lege  
etiam Arcul. 9. almans. Item Mar. Cat. & rem aptius ac di-  
xerim, intelliges.

#### Conferentia stranguria.

Conferunt stranguriæ decoctio Acori. cap. uen. Altheæ Al-  
lei, Amygdala amara, Apium, casia lignea, cicera, cyperus,  
Semina cucurbitæ, Gladiolus, gramen, chamedrys assarum,  
phu, cardamomū, locustæ suffumigium, maiorana, mel, meu,  
mezereon, millefolium, ruta, serpillum, sisimbrium aspara-  
gus, scilla, terebinthus, porcelliones, uirga pastoris, usnea, ra-  
pa satiua, raphanus, milium panicum. Composita sunt confe-  
ctio alchechengi Auic. Egezea conf. mes. philonium roma-  
num, mitridatum, oleum amygdal. de sabina, de osibus per-  
sicorum,



sicorum, oxymel scilliticum, socrita conf. haly. Theriaca. T. de absinthio.

De pronosticis stranguriæ & disuriæ.

Hip. aph. 6. aph. 6. Renum & uesicæ uitia in senibus difficulter sanantur. B. & hoc aut propter inquietudinem renū, aut humorum acrimoniam aut uirtutem senum imbecillem, Nam qui morbi senibus accidunt longi plerunq; ad mortem ipsos concomittantur. Auicē. 19. tract. 2. cap. 6. Expertum est in pluribus hominibus & dictum est, qui habet difficultatem urinæ et aduenit ei postea tenasmon, moritur in septimo nisi accadat febris & plurimam prouocationē urinæ faciat, etc.

Aet. ser. 2. cap. 19. Si acris humor diutius in uesica moretur partes ipsas corrodit & exulcerat & c. Hip. apho. 3. aph. 16. in fine, in siccitatibus lippitudines articularum dolores, urinæ stillicidia disuriæ & c. Lege etiā. 22. aph. 3. & 31. eiusdem, ibi, senibus spirandi diff. urinæ stillicidium disuriæ siue urinæ difficultates. Et aph. 5. aph. 58. Recto intestino aut utero inflammationem patiente, urinæ stillicidium accidit & renibus purulentis urinæ aduenit stillicidiū. Et aph. 49. li. 7. Urinæ stillicidiū & mingēdi difficultatē. seu disuriā, uini potio & uenæ sectio soluit, incidere autem interiores intalo est bonum, & c.

De urinæ retentione.

Quæ a græcis ἰσχυρία dicitur est exacta prorsus urinæ retentio periculum afferens & c. Et hoc attestatur Gal. li. fin. med. ibi, Ischuria est exacta prorsus etc. uide ēt Gord. etc.

De causis retentionis urinæ.

Causæ huius affectus sunt octo, inflammatio, durities, sanguinis grumus expultricis resolutio, lapidis procidentia, membrorum compressio, ulceratio, & lithiasis uel alia obstructio, Retinetur etiam urina ob negotiorum importunitatem uel per somnum & c.



Loci consentientes de causis retentionis urinæ.

Gale. 6. de loc. aff. cap. 3. Ischuria prouenit quum circa id quod continetur contrahi non potest ut ipsum exprimat, interdum obstructio inferioris meatus, aut a crassis humoribus, aut impacto lapide, nonnunquam ab inflammatione, uel alio tumore efficitur ut angustior meatus reddatur, uel omnino obstruatur, lege locum hunc fusius & antedictas causas inuenies & c. Lege etiam Aet. ser. 2. cap. 21. ibi accidit & sanis sæpe urinam ipsorum cohiberi ob negotiorum importunitatem, ac si diutius in cōcionibus foro iudiciario somnisq; mictionem retinuerint & c. Lege Galen. loc. cit. & Auic. & Arcul. & alios modernos.

De indiciis retentionis urinæ.

Ischuria ex compressione urinæ statim cognoscitur, sed causarum suppressionis indicia, non tamen usquequaq; sunt nota. Signa igitur q̄ ex facultate excretoria hæc fiat cognoscitur ex compressione uehementi ex qua urina excernitur. Signa obstructionis erunt si minus per compressionem urina excernatur, & tunc obstructio erit agrumo sanguinis, si nulla adsit lapidis nota, & sanguis effluat, uel erit ab abscessu si pus excernatur, uel inflammationis notæ nō aderint, uel erit a caruncula si ulcus & ulceris indicia præcesserint, uel erit a lapide si intromissa fistula anea lapidem remouendo urina euacuetur. Similiter si a crassis humoribus fiat obstructio, cognosces ex uictu præcedente, si in otio educatus, si multis cibis crassis ac uiscidos humores generantibus usus fuerit etc.

Loci consentientes de signis retentionis utinæ.

Gal. 1. de loc. aff. ca. 1. Intueri oportet præterita & præsentia, nam si a resoluta facultate uesicæ ischura proueniat, tunc hominem ita figurato, ut decliuus sit ceruicis uesicæ positus, ac tumorem præter naturam comprime, ut urina expellatur,



quod si minus profeceris tunc facultatem non resolutam, sed potius urinæ fistulam obstructam cōijce. Si igitur obstructio a lapide fiat &c. lege totum hunc locum et inuenies quæcunque a me supra posita sunt. Lege etiam Gale. 6. de loc. aff. ca. 3. ibi, non fungente suo naturali munere uesica &c.

B. Nota quod in omnibus corporis partibus est naturalis quædam uis excretoria quæ excrementa secernuntur, naturalis dicta eo quod uoluntati non obediat, sed naturaliter agit, unde musculus ceruicem uesicæ circundans, tanquam uoluntati ipse obediens uolentibus nobis eo usq; ab actione quiescit, donec uesica suo munere fungatur &c.

De cura retentionis urinæ.

Quam primum ischuriæ causam agnoueris facilis erit cura, nam suppressionis urinæ causas ammouere est curatio. Si igitur inflammatio causa sit retentionis urinæ, curetur, inflammationum curatione, quod si pus uel humor, uel sanguinis grumus in causa sit per dissoluentia pubi admotæ (uitatis urinam cientibus ne maior uel obstructio uel extensio circa uesicam fiat) statim curabis, uel his non conducentibus, ea imittenda sunt in uesicam quæ dissoluunt per syringam. Si uero propter obtusum uesicæ sensum urina supprimatur, irritando excitare eius actionem expedit cum infestationibus aut cimicibus capiti uirgæ admotis. Si causa sit lapis, tunc admotæ syringa lapis excutiendus est, & sic de singulis, prout supra de distillationis urinæ cura dictum est, &c. Aduertendo etiam quæcunq; a Paul. superius de regimine dicta sunt, &c.

Loci consentientes de cura retentionis urinæ.

Aet. ser. 2. ca. 21. Si ex inflammatione urina supprimitur, sectione uenæ curabitur adhibitis etiam fomentis et cataplasmatibus quæ sæpius adinflammata, dicta sunt, si uero supprimitur a sanguinis grumo, tunc grumus eo pacto dissoluen-  
L L 2



quo de eruptione sanguinis dictum est, si uero lapis urinam supprimat, a loco excutiendus est & c. lege Arcul. 9. almās. ubi de sectione agitur quæ alijs non iuuantibus in collo uesticæ fieri solet, & c.

Stranguriæ & ischuriæ conferentia.

Conferunt Stranguriæ & ischuriæ abrotanum, acorus, agaricus, alleum, althea, ameos, amygd. amar. anethum, apium, arthemisia, bacca lauri, balsamum, baucia, chamedrys chamepithys, carpobalsamum, castoreum, centauream, ciminum, cimices, cinnamomū, cyperus, cypressus, cuscuta, crocus, daucus, elenium, epithimum, fœniculus, fex uini usta, filipendula, auis, furfur tritici, galbanum, genestra, melanthion, iuniperus, cassia, therebinthus, lapatiū, lithospermō, locustarū, suffumigium, lūbrici terreni, maiorana, matricaria, mirtus, nasturtium, organū, ocimum, paritaria, peonia, peucedanū, cauen. portulaca, raphanus, rapa, satiua, siser, ruta, rosmarinus, salvia, sabina, saxifragia, senation, sepia, serpillum, siler, syimbriū, sinapis, scordeon, asparagus, scenoāthos, stechas, tamariscus, trifolium, betonica, uinum scilliticū, hypericō, hyringus, iris, porrū, cæpæ, asphodellus, petroselinū, iuncus odoratus, calamus odoratus, resina mulei pini, lentiscus, hordeū, mel, eruū, pepo, piper, capparis, centauriū. Composita sunt aureū, ung. nic. diaprasium, diapiretrū, nic. Iustinū, conf. nic. etiā mucos mingētibus pillule diacastoreæ, nic. ung. mellinū, dio c. antidotum emagogum, nic. & cæt.

De pronosticis retentionis urinæ.

Hip. aph. 4. aph. 80. Si sanguinem mingant & grumos & stillicidium urinæ habeant, & dolor in imum incidat uentrem & pectinem & fœmen, circa uesticam labor est. B. intelligit pro labore morbum, nam non refert siue πονεῖ, siue νοσεί quis dixerit & intelligitur de omnibus urinæ instru-



mentis, nam partem pro toto. i. pro uestica totum quod uestica annectitur, hic accipit &c. Et aph. 4. aph. 82. Quibus in urinaria fistula tubercula nascuntur, ijs suppuratione facta & eruptione, solutio, B. hic subauditur quod ex his tuberculis ischuria fiat, quibus disruptis proculdubio sanatur, Nota tamen q̄ in antiqua translatione Gal. pro ischuria legitur male straguria etc. Aet. ser. 2. c. 24. quā non eijciāt locium, subiecta membra mortificantur, neq; ita longe post moriuntur.

#### De urinæ incontinentia.

Quum urina inuoluntarie excernitur tunc resolutione uesticam laborare dicimus, &c.

#### Loci consentientes de urinæ incontinentia.

Aet. ser. 2. cap. 24. Quibus resoluta est uestica ijs uel præter uoluntatem urina excernitur uel supprimitur, Lege Aui. 19. cap. 13. de Inuoluntario exitu urinæ. Et Pau lib. 3. de urinæ incontinentia, Lege etiam cap. 18. ubi de resolutione, quæ unamquamque particulam obsedit, mentionem facit, Lege etiā Arcul. 9. almans. & Sauonarolam, &c.

#### De causis incontinentiæ urinæ.

In causa est ut plurimum resolutio musculi, qui ceruicem uesticæ ambit, Item facultatis retentoriæ imbecillitas, Item nimius potus, hepatis imbecillitas, segregare aquositatem non ualens, item nimia renum caliditas & superfluum frigus, acuitas urinæ, & luxatio uertebrae spinæ.

#### Loci consentientes de causis incontinentiæ urinæ.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 3. si musculus qui uesticam claudit resoluatur tunc inuoluntaria urinæ excretio prouenit &c. Aui. 19. tract. 2. cap. 13. fit ut plurimum propter superfluitatem frigoris & mollificationē lacerti, & debilitatem uirtutis attractiue in uestica & renibus et propter caliditatē plurimā attrahentē ad uesticam resudationē a corpore, et propter



coarctationem stercoris comprimentem & propter acuitatem urinae &c. Lege Aet. ser. 2. cap. 24. Et Gale. 6. de loc. aff. ca. 3. ibi, Alter luxatis ad extremas partes spinæ uertebra inuitus urinam profudit, nullo infestante uesicam dolore, cōiecimus eius musculi neruum qui uesicam claudit esse affectum, proinde spinam curare uoluimus, &c.

#### De signis incontinentiæ urinae.

Nota esse possunt signa tum ex relatione infirmi, tum ex his quæ dicta sunt, nam quotienscunq; copia urinae frequenter emittitur, & in minctione ardor non sentitur, nec sitim ager patitur, nec corporis extenuationem, tūc iudica musculum uesicæ esse resolutum a quo excretio inuoluntaria urinae procedit, &c.

#### Loci consentientes de signis.

Lege Razen. 9. almans. de fluxu urinae, & Auic. 19. cap. 13. ibi & scire facile fit ex eis quæ præterierunt &c.

#### De cura incontinentiæ urinae.

Cura talis sit qualem diximus in cura diabetis, pro quibus lege diffusius Aet. ser. 2. cap. 24. & ubi ad eos qui se in somno permungunt remedia scribit, & Auicen. ubi de mictu in lecto sermonem facit & est fen. 19. tract. 2. cap. 15. Item curam de inuoluntario exitu urinae &c.

#### Conferentia inuoluntario exitui urinae.

Conferunt inuoluntario exitu urinae & mollificationi uesicæ, Acetum. scilliticum, Acorus, calamus aromaticus, chamepythis, ciminum, cinis ungularum apri, cyperus cochleæ pulmo hedi, helenium, carnes eritij foeniculum agreste, chubebe, laurus alexādrina, cerebrum coagulum leporis, lignū aloes, mumia, ostraca granapini, cortices pupuli, sisimbrium. scolopendria, uesica apri, mures elixæ & commestæ. Composita confectio aristomachi Auic. Confectio philosophorū Auic.



ibi. i. s. Vinum extinctionis ferri, oleum nardinum oxymel scilliticum, electuarium piperis haly tamaricon conf. haly, tri fera magna, tri fera de scoria maior Auic. Tro. Alchechengi Auic. hiera Galeni.

De pronosticis incontinentiæ urinæ.

Aet. ser. 2 cap. 24. Qui præter uoluntatem urinam emittunt quâto plus eis cõtingit eo minus periculo sunt obnoxij.

De ramicum generibus. i. de hernijs.

Quod ramicen siue herniam latine dicimus græci κίλας omnes fere testium tumores uocant & sunt numero octo. primus hydrocele quæ est incocti humoris in parte scroti collectio. 2. Enteroccele est intestini in alterum locū paulatim uel semel delapsus. 3. Hidrenteroccele & est delapsus intestini aqueiq; humoris collectus in scroto. 4. Cirsocele & est quorundam uel omnium uasorum quæ testent alunt dilatatio. 5. hydrocirsocele & est dilatatio uasorum unde aluntur testes, & crudi humoris in scroti aliqua parte collectio. 6. Epiplocele & est omēti lapsus in partem scroti. 7. Enteroepiplocele, & est intestini, et omenti, & in scroti partem delapsus. 8. Sarcoccele. i. carnosus ramex, Inuenitur etiam exōphalos. i. procidens umbilicus & est umbilici prominētia diuersis de causis proueniens, sed nos de hernia aquosa & intestinali tantum & inguinali uerba faciemus, & c.

Loci consentientes de generibus ramicum.

Gal. lib. de Tum. præter naturam. c. 17. & 18. Induratis testibus σαρκώδην, nomen imposuere, quum uero in testium tunicis humor aquosus coligitur, υδρωδην, si uero omentum in testium tunicas descendat επιπλωδην si uero peritoneum in inguina profluat βουβωνώδην, si circa umbilicum εξομφαλον, & uide Gal. libr. finit. med. Auic. 2. cap. 2. enumerat etiam octo species herniarum quæ sunt uentosa,



aquosa, saniosa, carnososa, uaricosa, Zirbalis intestinalis & apostemosa, & hoc sub rupturæ nomine, caput deinde aliud facit de umbilici augmento quod alij de eminentia inscribunt et habet tot species quot de hernijs nuper diximus. Vnde uentosa a græcis dicitur πνευμονφαλον, carnososa σαρκοµφαλον, aquosa υδροµφαλον, Zirbalis επιπλοµφαλον et est omenti in umbilicum decursus, & sic de singulis, lege de his fusius iuxta Aet. ser. 14. cap. 22. 23. & 24. De causis ramicum.

Cause sunt intrinsecæ & extrinsecæ sicut casus percussio plaga saltus uel quicunq; alius motus uiolentus. Cause intrinsecæ sunt per se notæ, nã a flatu flatuosa in parte abdominis contenta dicitur, Varicosa a latitudine uenarum, & ab earum imbecillitate prouenit. Aquosa ab aqueo humore in scrotum delapso & sic de reliquis. Hec autem proueniunt peritoneo membrana aut nimium extenta aut rupta, &c.

Loci consentientes de causis ramicum.

Aet. ser. 14. ca. 22. Aquosa hernia interdum ex occulta interdum a manifesta causa contingit, ex occulta quum aquosus humor circa partes corpusculorum quæ scrotum continent ac implicant, sanguini admixtus, collectus fuerit, ex manifesta quum ex plaga collisis uel fractis uasis sanguis affluens in substantiam aquosam transmutatur. Gal. lib. de Tum. præter naturam. cap. 18. Interiori membrana quam græci περιτοναίον uocant, uulnerata ac rupta fiunt ramices &c. Lege hunc locum fusius lege etiam Auic. fen. 22. cap. 2 ibi Ruptura fit propter solutionem paniculi &c. lege etiam Arc. et Paul.

De signis ramicum.

Signum commune omnibus rupturis est tumor inter abdomen & peritoneum apparens. Signa herniæ apostemose sunt, signa abscessuum communia. s. tumor durities, grauitas, dolor, & q. paulatine augentur. Signa herniæ zirbalis sunt



quia paulatine aduenit, nō sentitur, rugitus, est parue quātita-  
tis nec multū ad profundū oseī se extēdit, nec resupinato æ-  
gro ita facile reuertitur ac intestinalis. Signa enteroceles. i.  
intestinalis sunt facilis reductio, quū resupinatur, rugit dum  
intromittitur, nisi uel flatus uel siccae feces in causa sint, nec  
tā cito introducatur, est præterea magnæ molis, accidūtq; do-  
lores uehemētissimi, dum oseū extendit & testiculum cōpri-  
mit. Signa aquosæ sunt qui a tactui cedit & extēditur oseum,  
cognoscitur etiā per eius splendorē, lenitatē, Itē quia cū mol-  
litie grauis est et paulatine fit, nec quomocunq; ager situe-  
tur interiora petat. Signa flatuosæ sūt quia redit absq; dolore  
statim facta cōpressionē, absq; q; ager resupinetur, etiā per-  
cussa resonat, nec adest grauitas, nec lubricitas sed cū lenita-  
te tēdit signa sarcocèles. i. carnosæ sunt quia cū duritie tumet  
& est absq; dolore nō augetur nec minuitur. Signa uaricosæ  
sunt qā ipsa est dura oblōga ueluti uirga, cuius crassities exce-  
dit quādo crassitiē digiti, cognoscitur ēt ex repletis uenis etc.

Loci consentientes de signis ramicum.

Auic. 22. c. 3. Signū aut cōe rupturis est additio apparēs et  
sentitur inter sifach & mirach. Signū herniæ intestinalis est  
redditio eius cū uelocitate cū resupinatur, & sensibilitas ru-  
gitus & proprie quū premitur, hernia uero ex zirbo & si-  
fach cognoscitur ex aduētū eius, paulatine & c. lege eū fusi-  
us lege ēt Arc. 9. alm. Item Aet. scr. 14. c. 22. & plura intelliges.

De curatione ramicum.

Scopus curandi hydrocelē & flatuosum ramicem, est cau-  
sā a qua humor aquosus uel flatuosus gignitur, amouere. Qd  
fiet primo, cū phlegmagogis uel aquosum humorē educenti-  
bus pharmacis siue clysteribus, deinde cū resoluentibus sicuti  
cū farina fabarū cimini, emplastro de baccis lauri & simi-  
libus deinceps prohibendum est ne noua eodem in loco aqua



uel flatus generetur. Prohibent nonnulli extrahendo aquam, alij cum cauterijs urendo usq; ad epidimin quem arabes didimum uocant, sed reuera in hoc casu uisionem ualde timeo, nam si epidimis totus uratur, uereor ne testes corrumpatur. Si minus, certum est quod per partem non uisam adhuc aqua descendet, quare satius mihi uidetur aquam resoluētibus extrahi quam urentibus. Cura enteroceles & epiploceles. i. hernie intestinalis & zirbalis in duplici intentione consistit in reductione. s. intestinorum ad suum situm, et in retentione in situ suo conuenienti & in constipatione seu consolidatione rupti ac laxati. Reducuntur ad suum situm intestina et omentum si resupinato patiente cum cruribus sursum uersus eleuatis, cum leui manu comprimantur & leuiter agitentur, quibus obuientum renitentibus primum cum resoluentibus ac discutientibus mollientibusq; flatum succurrimus, ut cum decocto altheæ camomillæ melliloti s. lini. fœnugræci, anisi, cimini, cum spongia applicato, uel cum oleis camomillæ, anethi, amygd. dulci, adhibita interim diligentia, ut emollientibus ac unctuosius clysteribus feces extrahantur. Retinentur etiam in suo situ intestina pluribus medijs, primo cum fotu ex aqua uino & aceto decoctionis gallarum nucum cupressi, & aluminis, secundo cum cerato depelle arietina, descriptione gentilis, stringendo locum in quo eminentia apparet cum cingulo quod uulgo bracherium dicunt, nō mutando id nisi ad 14. diem. 3. cum potionibus constipantibus, unde aliqui utuntur scrupulo uno limaturæ calibis cum uino, in quo hepatica terrestres gallæ uirides, & nuges cupressi incoctæ sint. 4. cū manuali operatione sicut cum incisione ac actuali siue potenciali uisione. Et modum incidendi docet Auic. & Albucasis & pleriq; alij, quos uidere poteris. Cura sarcocèles. i. carnosæ hernie, eo modo erit perficienda, ac si esset quidam scirrhus. Si



militer apostemosum ramicem curabis non aliter ac curari solent alij abscessus, eminentia uero umbilici eandem fere curationem requirit ac de hernijs dictum est &c.

Loci consentientes de cura ramicum.

Aet. ser. 14. cap. 22. Tutissima itaq; curatio herniarum chirurgia & uestione perficitur, si peritus artifex contingat, potest etiam medicamento scrotum inuri, & consumpto humore & cicatrice indurata firmari etc. Gal. meth. 14. cap. 13. quod humor qui in hydrocellis uisitur, alienus a corporis substantia tota natura sit, sicuti etiam quæ in ascitis hydropibus continetur aqua, dixisse sufficit, quarum certe euacuationem uel medicamentis quæ digerant molimur, uel chirurgia in hydrocele quidem immisso syphone, in asciti adhibita punctione quam paracentesis uocant &c. Vide hac de re Arc. 9. almans. Auic. & Marc. Cat. Auic. 22. cap. 5. Si ambo ad oseum descendat (.i. ad οσχέον .i. scrotum,) possibilis est reductio cum resupinatione, & qualibet compressione cum manu, quod si addatur ruptura incipiat in desiccando illud quod dilatatum est propter humiditatem, & adunando quod scissum est, & ingenietur in consolidatione eius quod si fiat inobediens ad redeundum sedeat æger in aqua calida & emplastrum rupturæ donec redeat, deinde constringatur &c. De cura sarcocoles lege Galen. 14. meth. cap. 17. nam cum scirrhis eum enumerat.

Observationes circa regimen.

Auic. 22. cap. 4. Regimen uniuersaliter habentibus rupturam est, dimittere repletionem & motum plurimum & saltus & incestum subitum & coitum, Item dimittere cibos iusiatiuos & non multum uti potu aquæ & dimittere omnes res mollicantes &c. B. considera quod cuiq; ramicis speciei uictus ratio sit in contrarium exhibenda.



## Conferentia enterocelis &amp; hydrocellis.

Conferunt enterocelis & hydrocellis barba hirci, bdelliū adeps canis cum alumine scisso, cupressi folia & nuces, glutin, de corijs, muscus herba, plantago, psylium, semen lini cū resina & myrrha, pentaphilon ruta siluestris symphitū, betonica, tritici palea, filix herba cum asungia, lenticula in modū emplastri, peucedanum, cerotum de pelle arietina, lege de his in consilijs montagnanae. Item Gord. Sauon. & Arcul.

## De pronosticis ramicum.

Auic. 12. cap. 2. Et scias q̄ ramex intestinorū & zirbi est aegritudo multum difficilis quātumuis sit parua, et ramex aqua est aegritudo facilis & si sit magna, ramex uero ramicosus ac carnosus difficulter aut nunquam sanatur, & tandē omnes ramices inueterati ac lōgo tempore facti, suspecti sunt ne testes corrumpāt. Aet. ser. 14. c. 24. ceterū nosse expedit intestinorū herniam qualiscunq; fuerit semper aquosa deterio-rem, Gord. & quū pertransit septem dies tunc labia fiunt dura & obturata quorum unio uidetur impossibilis, & c.

## De gonorrhea.

Quod seminis profluuium latine dicitur, græce γονορροια & πὸ τῆς γονῆς quod est genitale semen & πρὶ γ quod est fluere appellata est, quæ nil aliud est quam inuita ac præter uoluntatem & pudendi tensionem, seminis excretio, sunt tamē qui differentiam inter semen & genituram esse dicant, ut semen tantum in his esse uelint qui generare adhuc non possunt econtra uero genituram.

## Loci consentientes de gonorrhea.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 5. Gonorrhea est inuita ac præter uoluntatem seminis excretio. Et Paulo post significantius dices esse assiduam seminis excretionē haudquaquam cole extēso Aet. ser. 11. cap. 33. Gonorrhea est seminis excretio præter uo-



luntatem ac pudendi regimen. De causis gonorrhæ.

Cause sunt uel spermatis copia uel eius tenuitas & acrimonia, uel multitudo eorum quæ generant sperma, uel erunt imbecillitas retentricis, aut facultatis expulsoe fortitudo in seminarijs uasis, uel Gonorrhæa ex conuulsione contingere potest, aut ex renibus ob eorum adipis liquefactionem, quæ fieri potest a nimio coitus desiderio, aut a multitudine coitus aut eius cogitatione.

Loci consentientes de causis gonorrhæ.

Gal. 6. de simp. cau. cap. 4. Gonorrhæa si pudendo non intento euenerit retentricis facultatis in seminarijs uasis imbecillitatem sequitur, Si uero intento cole acciderit conuulsioni quoddammodo similis erit affectus & c. Vide Gale. 6. de loc. aff. cap. 5. ibi, Nam sicut retentio & c. Vide etiam Aet. 11. c. 33. ibi fit Gonorrhæa ex uasorum seminalium fluxione & c. Vide etiam Auic. 20. ca. 30. ibi causa aut est in spermate aut in uasis seminalibus aut in renibus & lacertis aut in principijs ex spermate uel ob eius copiam, & tenuitatem, & c.

De signis gonorrhæ.

Signa quando fit ex multitudine seminis sunt, quia ad copiam coitus nulla corporis imbecillitas siue diminutio sequitur, Signa tenuitatis seminis sunt manifesta inspicienti sperma. Signa mordacitatis seminis sunt, quia in exitu dolor percipitur, adest ardor urinæ & color eius ad flauitiem decliuis est. Signa imbecillitatis retentricis, sunt quia sine erectione uirgæ semen egreditur, si a conuulsione hoc malum proueniat aderit erectio & c.

Loci consentientes de signis gonorrhæ.

Auic. 20. c. 31. illa in qua causa est spermatis multitudo, nõ sequitur debilitas et diminutio cū multitudine coitus etc. Et illa q̄ fit a tenuitate eius cognoscitur cū turmis spermatis pñcia.



Et illa quæ fit propter acuitatem & mordicationem eius sentitur ipsa in egressione & c. lege Aet. ser. 11. cap. 33. & Ga. 6. de loc. aff. cap. 5. & c.

#### De cura gonorrhææ.

Similis erit huic cura qualis in omni fluxu parari solet, primo cum pauco cibo & potu & si a lesa retentrice gonorrhæa oriatur cataplasmatibus in seccionibus adstringentibus utendum ex lentisco rubo Myrto, acatia, hypocisthide paratis, Si fiat a multitudine seminis, euacuetur primum, deinde sperma exiccetur, Exiccant sperma rad. nenupharis. s. lactuce portulacæ rutæ Agni. i. casti, folia salicis ciminum, calamentum, Myrrha, euphorbium, item diacimum etc. Si fiat a tenuitate spermatis temperetur cum stypticis calefacientibus exiccando & crassitiem inducendo, Si a facultate expulso-ria, tunc utendum est frigidis, et pariter stupefacientibus etc.

#### Locī consentientes de cura gonorrhææ.

Avic. loc. cit. cap. 32, Minoretur cibus, fiat euacuatio, & administrentur ea quæ exiccant sperma & minorant ipsum, Equatio tenuitatis eius est cum eis quibus inest stypticitas & calefactio cum exiccantiis permixta & c. Vide illum fusius Aet. ser. 11. cap. 33. primum inquiete & pauco cibo, & aquæ potu affectos adseruare oportet, cibi non facile corrumpantur nec difficulter permulentur, & resiccandi uim habeant, & c. B. q. sint inquiete intelligendus est Aetius in primo morbi tempore, nam post hoc exercitijs egros esse committēdos ait Paul. quibus totum corpus & affectæ partes firmentur.

#### Observationes circa curam.

Cauendum est primum ne quum crassitiem tenuitatis genituræ inducere querās, aliquid in medicamentorū compositione addatur, quod genituram adaugeat & c.

#### Conferentia gonorrhææ.



Conferunt gonorrhœe agnus. i. castus, aqua frigida cala-  
mentum, camphora, lac capræ cum melle potatum, castoreū  
cum succo agni casti, corium, hematites lapis, eructa, lactuca  
semen, nymphaea, portulaca, plumbi lamina frutæ, ireos dia-  
prassium Nicolai electuarium Sauo.

### De pronosticis gonorrhœe.

Aet. ser. xi. cap. 33. non solum autem uiris sed & muliercu-  
lis hoc malum accidit, & in foeminis ægre tollitur, &c.

### De priapismo.

Priapismus est genitalis membri tentigo in longum & la-  
tum citra ueneris appetentiam aucta, et denominatur a pria-  
po qui talem membrum habuisse suapte natura finxerunt ho-  
mines sunt qui hanc affectionem satyriasm nominent a sati-  
ro etiam priapo dictam, sed quum Paul. distincta capita de  
satyriasi & priapismo habeat, describaturq; ab ipso ἡ σατυ-  
ρίασις ἐστὶ πάλμος τοῦ αἰδοῖο &c. fecit ut rem a pria-  
pismo distinctam aliquammodo esse dubitarem ob eorum cau-  
sam, de qua infra fusius dicitur.

### Loci consentientes de priapismo.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 5. Priapismus est quum coles & in  
longitudine & circulo totus augetur, nullo stimulante ad li-  
bidinem desiderio, aut acquisito calore ut quibusdam accidit  
qui supini decumbunt, lege similẽ descriptionem iuxta Gale.  
9. de compos. med. per loc. cap. 9. ibi, priapismus est auctio  
pudendi, &cet.

### De causis priapismi.

Causæ huius affectus sunt tres prima Arteriarum ora im-  
modice patientia secunda uaporosus spiritus infistuloso ner-  
uo ortus tertia est rei uenerie abstinentia, Ora arteriarum  
patent uel ob humorum uitia, uel ob flatuosum spiritum sine  
ordine & uiolenter euacuatum flatuosus uero spiritus fit ab



humore uiscofo crassoq; cum caloris paucitate, Abstinentia rei ueneræ accidit ob seminis retenti multitudinem & cæt. Satyriasis de qua superius mentionem fecimus est assidua colis palpitatio quæ uasorum seminis inflamatione interdum cum intensione accidere solet, quæ si tantum a flatuoso spiritu fiat nullo modo a priapismo differre potest.

Loci consentientes de causis priapismi.

Gal. 6. de loc. aff. cap. ult. fit priapismus uel ob arteriarum ora immodice patientia & c. lege etiam Gal. in li. de Tumo. præter naturam cap. 15. ibi pudendorum tensiones præter naturam quæ non desistant quidam στυριασμός quidā πριασμὸν nuncuparunt, uide horum differentiam postea. 6. de loc. aff. cap. ult. Vide etiam causas flatuosi spiritus. 14. meth. c. 7. Item. 6. de simpt. cau. cap. 2. De Satyriasi uide Paul. de prima palpitatione loquutum, De secunda fecit mentionem Aet. una cum priapismo, Auic. 20. cap. 37. causa propinqua tensionis est multitudo uetositatis crassæ in partibus membrorum coitus aut materiæ uentose in ipso neruo cõcauo aut superueniens eis ex arterijs aut uasis spermatis.

De indiciis priapismi.

Indicia per se sunt manifesta ex definitione data, & ex infirmi relatione lege tamen Gal. 14. meth. cap. 5. In ijs qui sic sunt affecti etiam inuitis pudendum arrigitur quod ubi uiderit quispiam statim intelliget esse ex Inflammationum genere, & c.

De cura priapismi.

Si causa fuerit materia flatum efficiens tunc tres medendi intentiones insurgunt prima regimen uictus, secunda est euacuatio. 3. manæ discussio & resolutio, Regimen sit attenuas absque manifesta caliditate, Euacuatio fiet uel per sanguinis missionem uel per purgationem, tum per uomitum, tum per ea quæ per inferiora soluant, Residuum materiæ discutitur per



frictiones crebras per exercitium & balnea ex aquis digerentibus, & per ea quæ unico uerbo calefaciunt & exiccant, sed interim per initia si calidior materia fuerit ea imponenda quæ caloris proportioni respondeant, ut cum cerato rosaceo, infrigidante Galeni, cum lamina plumbi, &c. Digesta materia tunc ad dissoluentia accedendum sine calefactione uehementi sicut cum camomilla agno. i. casto &c.

#### Loci consentientes de cura priapismi.

Aet. ser. 2. ca. 32. loquens de regimine inquit hac affectione prehenso in edia usq; ad tres dies adseruare cōuenit, utendumq; esse cibis qui leniter attenuare ualeant citra manifestā caliditatem, &c. Itidem ait Gale. 14. meth. Et cap. 8. & 9. de compos. med. per loc. cap. 9. ibi palam est non oportere membra ipsa calefacere sed refrigerare leniter per ceratum rosaceum &c. Lege etiam fusius in meth. cap. 8. ibi principiū curationis commune est ut totum corpus ea quam ferre potest euacuatione euacuetur, euacuatio fiet per remissionem sanguinis &c. lege eum fusius & plura à me recitata intelliges etc.

#### Observationes in cura.

Aet. ser. 2. cap. 32. ait cauenda esse quæcunq; urinam citare possunt, & omnia quæ uenerem prouocare ualeant. Auic. fen. 20. cap. 39. Dimittat coitum omnino & cogitationem in eo, & considerationem ad id quod mouet desiderium nisi acciderit priapismus propter emissionem coitus, Nam tūc coitus est curatio, &c.

#### Prohibitia satyriasm & Venerem.

Prohibent satyriasim et uenerem, ut ex, alleum, berbena, camphora, cicuta, cataplasmata, coriandrum, eruca, ruta, lactuca, menta, fimus muris et nymphaea salicis folia, portulaca, rosa, plumbum, stannum, nepita, faba, & diaolibanū nic.

#### De pronosticis priapismi.

MM



Aet. ser. 2. cap. 22. Caterum dolores eis contingunt quales tetanici habent & hi qui reliquis membris distendunt, & ex præcipiti hoc modo affecti pereunt nisi confestim eis auxilium feratur, quum uero moriuntur uentre inflantur & frigidum exudant & c. Auic. loc. cit. c. 37. Et hoc accidens quando non curatur peruenit ad tenanum uasorum spermatis & accidit apostema calidum cum eo, & interficit, & c.

Authores dissentientes circa Venerea.

1. Adserere, desiderium coitus esse tantum ex crebro ob uirtutem imaginatiuam.
2. Adserere, gonorrhæam esse passionem propriam pudendi & expultricis facultatis.
3. Adserere, coitum nec per se nec per accidens ualere in ægritudinibus cerebri pituitosis.
4. Adserere, satyriasmum esse morbum ridiculosum potius quam curandum.

Confutatio dissentientium circa Venerea.

Ad primum respondetur q. duplex est desiderium, alterum. s. animale quod inconcupiscentia inuenitur, alterum naturale ex repletionem spermatis quam euacuare tentat natura, primum ac quedam concupiscentia a corde oritur, licet per cerebrum postea perficiatur secundum prouenit a iecore, unde Auic. & desiderium coitus est ab hepate & c. igitur non tantum ex crebro, sed ex alijs etiam membris principalibus. Ad 2. dicitur q. iuxta Galeni placitum gonorrhæa sit passio per se retentorie facultatis & propria uasorum seminalium, sed per accidens expulsoe & secundum apparentiam ipsius pudendi, & hoc affirmant & Auic. & Sera. Nō erit igitur proprius expultricis nec pudendi affectus, sed per accidens. Ad 3. inq. Auic. coitum maxime præstare ad euacuationem & diuersionem superfluitatum, unde in ilisci morbo, præsertim iuuat



quoniam causam ægritudinis, quæ fit ob amorem, remouet & paratos cadere in ægritudines phlegmaticas ex eius multitudine liberat si moderatus præcipue fuerit & c. Ad. 4. Aui. perducit hominē ad spasmodum et tetanū uasorū spermatis & interficit, unde morbus hic ualde timendus est & nō ridendus ut aliqui adserūt, etc. De suppressione menstruorum.

Menses sunt mulierum profluvia a uitiato humore dependētia, eoq; dicti sunt quod singulo mense accidant, tempus durationis menstruorum multis mulieribus est a primo usq; ad 3. diem, nō paucis a primo usq; ad 5. alijs ad septimū & raro ad 12. accedit profluēdo, Incipitq; fluere a 14. anno, paucis ante 13. aut. 12. nec ultra quinquagesimū fieri solet, imo a triginta quinq; annis præsertim obæsis mulieribus solet cessare etc.

Loci consentientes de suppressione menstruorum.

Gal. 6. de sympt. causis. c. 4. Menses sunt deprauatæ per uterum fluxiones quæ expurgato per hanc partem uniuerso corpore fiunt. Paul. lib. 3. c. 60. Mulierū plurimis menses quatordecimo anno fluere incipiunt, paucis ante 13. aut 12. plerique post. 14. erumpunt. Haly abb. 9. de pass. matri latitudinem inceptionis menstruorum esse inquit a 4. anno cōpleto usq; ad 14. Et latitudinem desinentiæ a 36. usq; ad 50. & hoc idē affirmant Auic. & Arist. 9. de animalibus & hoc intelligitur de uniuersali durationis tempore, Particulare uero incipit a duobus diebus & se extendit usq; ad septem, Guai 5. aph. tempus menstruationis durat a 3. die usq; ad 8. q. si ultra citraq; fluxerit, talem fluxum præter naturam dicimus & c.

De causis suppressionis menstruorum.

Menstrua supprimūtur uel per se affecto utero uel p cōsensum. Per se efficitur uterus uel ex duritie cōtracta uel ex uenarum angustia uel ratione facultatis expulsoiæ quæ ob malam intemperiem oriri solet. Supprimūtur rursus obstructis



uasīs quæ ad uterum descendunt & hoc uel ratione caloris desiccantis uel ob copiam humorū crassorum uel ob abscessum uel carnem additam, sistuntur etiam menses si ad alia loca sanguis transferatur, uel ob uaria excretionū genera, etc. Per consensum etiam supprimuntur, uel ratione hepatis sanguinem nō discernentis uel ratione obstructionis totius corporis uel aliorum membrorum particularium, &c.

Loci consentientes de causis suppressionis  
menstruorum.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 4 suppressionis causa menstruorum uel est durities uteri, quæ uel illico ab origine contrahitur, uel post generationem et hoc ratione uteri affecti, qui ex uenarum angustia aut ex uasorum uteri compressionē, quum immodice corpus crassescit, aut ex intemperie uteri procedi, Detinentur etiam menses ob materiam ipsam, quū crassum fuerit uel uiscosum quod euacuatur. Supprimuntur rursus obstructis ob huiusmodi humores, uasīs, quæ ad uterum descendunt uel ratione uniuersi corporis &c. lege tu fusius. Aet. ser. 16. cap. 51. Sistuntur menses quibus sanguis crassus est & uiscosus, & quibus ad alia loca transfertur uelut per nares & sedem, Quin & sanguinem ex thorace reieciuntibus, uel quibus per uenæ sectionem multus extrahitur &c. Lege de his causis Galen. aphor. 5. comment. 57. Item Auicen. fen. 21. c. 25. ibi, Menstrua retinentur aut propter causam propriam, aut communem, &c.

De signis suppressionis menstruorum.

Suppressio menstruorum quæ fit à frigore cognoscitur grauitate, somno, coloris albedine, pulsus raritate, copia urinae & excretionē pituitosa, quæ uero fit a caliditate demonstratur ex inflatione ac exiccatione uteri, uel ex his quæ uterum radunt ac mordent, quæ uero fit a siccitate manifestatur ex



his quæ præterierunt, præsertim ex extenuatione corporis et uenarum tenuitate, quæ autem fit ab abscessibus uel carne addita per obstetricem cum signis abscessuum cognoscitur. Similiter quæ fit a duritie uel a conceptione per obstetricem uteri ceruicem tangentem, cognoscetur &c.

Loci consentientes de signis suppressionis  
menstruorum.

De signis lege Auic. 21. cap. 27. Illius quæ pendet a frigore, signum est grauitas somni & profundatio in ipso & albedo coloris, uiriditas uenarum, & raritas pulsus & multitudo urine & phlegmatica ægestio, & reliqua lege eum uberius. Gal. 6. de loc. aff. cap. de uteri aff. citat aph. 39. lib. 5. ibi, si mulier quæ neq; grauida neq; peperit lac habet mēstrua huic defecerunt. & ibi alia indicia suppressionis ponit, nam inquit grauitas totum corpus molestat, Item fastidium ut nullo adsit cibi cupiditas, horror inæqualis, quod si inæqualitas sine horrore euenerit, alienaq; cupiat iube q; obstetrix uteri ceruicem tangat, nam dictum est ab Hip. apho. 5. aph. 34. Quibus os uteri durum est, his uteri os comprimi est necessarium, quod si citra duritiem clausum sit eam prægnantē esse conijcies, quod si clausum sit cum duritie affectum esse uterū pro tendit &c. lege tu fusius, lege etiam Aet. serm. 16. cap. 54. ibi supprimuntur ex frigidiore temperatura etc. Quod per excrementa corporis signa habere possimus elice ex Gale. 6. de sympt. cau. cap. 4. ibi talem semper refert speciem id quod excernitur, quale est id quod inanimante redundat &c.

De cura suppressionis menstruorum.

Cura retentionis menstruorum duobus scopis indiget primum in remouenda causa alterum in prouocandis mēstruis. Si causa igitur fuerit uehementissimus calor mēstrua cohibens, tunc prouocare ea non licet quum sat sit ab hoc calore

R. BLANCHARD

MM 3

PROF. FAC. MĒD. PARIS



superfluitates absumi. Si uero in causa fuerint longæ ægritudines præcedentes cum imbecillitate uirium, tunc nec prouocanda sunt, quum corpus potius reficientibus quam euacuantibus indigeat. Si uero causa fuerit materia pituitosa tunc in medendo opus est materiam a qua menstrua corrumpuntur, & a suo naturali ordine mutantur, præparare, & præparatam euacuare. præparatur crassa attenuando & obstruenda aperiendo cum oxymelle sy. bisantino de duabus rad. cum aquis fœniculi apij cuscute. Euacuatur cum his quæ humorẽ superfluum educunt ut cum agarico, electuario indo, diaphinicone & c. & si qua mala fuerit intemperies relictã tunc his remoueri debet quæ stomachum & hepar roborant quales sunt multæ confectiones & c. Quod si menses retineantur ab aliquo abscessu curatur cura apostematum ut pluries dictum est. Si causa fuerit pinguedo tunc adhibitis resoluentibus curabitur cum exercitijs et ieiunijs & c. Si causa fuerit aliquod ulcus tunc cura erit impossibilis, & si quid curæ fuerit, tunc per regimen & frequentem uenæ sectionem fiet, ut sanguis per tenuem uisum & sanguinis missionẽ, qui fluere per intestina consueuerat, discutiatur ac euacuetur. Prouocant deinceps menstrua decoctũ quinq; rad. cum sabina, pulegio, calaminto, mentastro, origano cum sy. de duabus, uel quinq; rad. prouocant ualenter troc. de Razes, cassia lignea, crocus, cinamomum, borax aurificum, Item balnea frictiones & cucurbitulæ poplitibus ac coxarum parti domesticæ applicitis, item saphenæ uenæ incisio & pessaria ex mercuriali & melanthio cum musco in rara syndone & c.

Loci consentientes de cura suppressionis menstr.

De cura lege Aet. ser. 16 cap. 53. ibi, Quæ ob nimiam caliditatem non purgatur quam maxime humectare oportet cū balneis & uberiore ac humidiorẽ cibo & potu, quæ ob ni-



miam frigiditatem oppositam curationem exposcunt, &c.

Gal. aph 5. com. 36. Intentio sanationis est primum ora venarum adaperire quæ ad uterū pertingunt sanguinemq; extenuare deinde purgationem adhibere, nam quando crassi euacuantur humores tales sanantur dispositiones etc. De prouocandis menstruis lege aph. 28. lib. 5. ibi suffitus aromatum muliebria ducit, sepius uero & ad alia utilis esset nisi capitis facerent grauitatem &c. B. Veritatem non continet apho. in omni menstruorum suppressione, nam si detinentur mēstrua ob uteri inflammationem, aut tensionem, aut ob alias similes causas nihil suffitus aromatum prodesset, sed si sistuntur ratione sanguinis crassi uel obstructionis uasorum aut substantiæ densitatis uerum est quod per aromatum suffitus menses euocantur, quum crassa extenuat obstructa incidēdo reserat, & obserata aperit, quæ uero sint aromata docet Gale. esse animum cassiam costum cinnamomum &c. Vide Auic. 21. tr. 3. cap. 28. Vide etiam Arcul. & Marc. Cat.

#### Prouocantia menstrua.

Prouocant menstrua absinthium, acorus, agaricus, agnus, castus alleum, aloes, amaracum, amygdala amara, abrotanū, artemisia, assa, ciclamen, calamentum, chamedrys, chamepithys camomilla, cantarides, castoreum, centaurium, cinnamomum, cupressus, cyperus, cucumer agrestis, daucus, helenium, eupatorium, faseoli rub. lens syluestris, galbanum, ammoniacum, iris lupini, maiorana, cuscute laurus, laudanum, marubium, melissa, mentastrum, matricaria, mercurialis, myrrha nasturtium, ouum anatis, origanum, ozimum, papauer rub. pastinaca, peonia, peucedanum, pulegium, raphanus, rosmarinus, rubea tinctorum, ruta, sambucus, saluia, saturegia, sauina serpillum, sinapis, scamonium, scilla, spica, urtica, usnea. Composita sunt diacalamentum



diatrionpipereon, diaprassium troc. de myrrha theriaca magna, triphera magna, pillule foetide de serapino.

De pronosticis suppressionis menstruorum.

Aet. ser. 16. cap. 52. Suppresis menstruis sanguinis reiectionis ac syderationis periculum imminet & c. Lege nonnulla etiam iuxta Gal. 6. de loc aff. cap. 4. quæ intelligi tam possunt de menstruis quam de retento semine.

Auic. 21. tract. 3. cap. 26. Suppresis mensibus ei cui uirtus ad excernendum est potens assimilatur uiris, & multiplicatur capilli, & nascitur ei ueluti barba, Quare frangitur forma eius & incrassatur, deinde moritur & interdum prouenit ante mortem ad dispositionem, cum qua non est possibile ut prouocentur menstrua.

Hip. aph. 5. aph. 34. Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum. Et aph. 57. eiusdem, si menstrua plura fiant accidunt morbi, & si non fiant ex utero morbi contingunt. B. quasi dixerit si menstrua detinentur necesse est processu temporis ipsum uterum pati, lege Gal. in com. Et aph. 5. aph. 61. Si mulieri cessent purgationes, neq; febris neq; rigor superueniat & fastidia accidunt, iudica ipsam in utero hære.

De mentium profluuio & eius causis.

Duplicem hic affectus habet causam, uel ab utero unde emanat, uel ab ipso humore fluente, prima fit aut ab uteri imbecillitate, aut ab eius uenarum apertione, aut a quopiam ulcere corrodent, uel scissura. 2. bifariam fieri contingit, uel ab ipsius sanguinis quantitate uel qualitate, quantitate uel causa repletionis nimium corpus aggrauantis, unde fit euacuatio quæ uel naturalis uel non naturalis erit, Naturalis quæ a natura ita fiat ut superfluum tantummodo expellatur, non naturalis quum ob suam multitudinem, & dominium immodice prouat, qualitate, uel causa caliditatis sanguinis, uel



tenuitatis, interdum etiam superfluunt menstrua causa abortiui foetus uel ob partus grandiores, &c.

Loci consentientes de causis profluuij menstruorū.

Gal. aphor. 5. comm. 57. fit immodica menstruorum euacuatio, si ora uasorum quæ ad uterum pertingunt ultra modum aperiātur, aut si sanguis uel calidior uel tenuior fiat, aut sua multitudine modum naturæ conuenientem excedat, aut totum corpus aggrauet &c. Lege etiam Auic. 21. tract. 3. cap. 2. ibi superfluitates quandoq; fiunt secundum semitam ægritudinis, aut propter dispositionem in matrice, aut propter eius debilitatem, aut malitiam complexionis, aut propter ulcera, & corrosiores, &c. Lege etiam Paul. lib. 3. ibi fit etiā ob partus grandiores & crebro ob abortiui foetus causam &c.

De signis profluuij menstruorum.

Signa menstrui ab imbecillitate uteri, aut ab apertione uenarum prouenientis erunt, si sanguis exierit purus nullū dolorem inferens, si uero ab ulcere profluat tunc paulatim & maximo cum dolore prodeat, Considerentur tamen & quantitas ipsius fluentis sanguinis, & modus delationis, nam amplioribus uasis ruptis magna sanguinis copia statim profluit minoribus uero non itidem, signa ex quantitate sanguinis nimium corpus replentis sunt signa repletionis ut uenarum latitudo exuberans, faciei & corporis repletio, quæ interdum cum dolore est. Signa quando fit a mala qualitate sunt caliditas, tenuitas, acrimonia, & color prauus. Signa immoderate euacuationis sunt color fœdus pedes tumescunt, concoctio uitiat, & prosternitur corporis robur &c.

Loci consentientes de signis profluuii menstruorū.

Auic. 21. tract. 3. cap. 3. factam a debilitate matricis & apertione uenarum significat exitus sanguinis puri nō dolorem faciens etc. lege eum fusius. Gal. 6. de loc. aff. cap. 4. quum im-



immodice euacuantur, sequitur color fœdus, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prosternitur, ciborum tum concoctio tum cupiditas uitiatur, atq; in totum omnia quotquot immoderatam sanguinis euacuationem siue ex hemorrhoides siue alio quopiam sanguinis fluore euenientem sequi consueuerunt, accidentia huiuscemodi fœminas infestant, & c. lege Arcul. & Aet.

### De cura profluij menstruorum.

In superfluo mensium fluxu binæ requiruntur intentiones quarum altera in remouenda fluxus causa consistit, altera in retinendo fluxum, uerum in praxi ultimum quod est in intentione primum esse debet in executione. Si igitur causa multitudinis sanguinis menstrua superfluxerint, tunc sectione uenæ & uictu tenui qui sanguinem non adaugeat succurrendum. Si uero contenuis ac calidi sanguinis fluxus accadat, tunc sanguis cum syr. ros. de granatis de suc. acet. cum aquis acetosæ portulacæ plantaginis alteretur, & si quid bilis secū admixtum sit euacuetur cum myrobalanis casia & rheub. Deinde sanguinis discrasia cum diarhodone triasandalis, uel cum epithemate ex aqua ros. plantaginis & unctionibus frigidis remoueat. Si uasorum apertio in causa sit per obturationem & ruptura per conglutinationem, et erosio per renutritionem curabuntur. Si causa fuerit uteri imbecillitas per aromata styptica quæ sua proprietate roborant, curabitur, si causa fuerit ulcus tunc opus sunt duæ intentiones abstersio. s. & cōglutinatione & c. Et hæc de prima intentione. 2. intentio est sanguinis cohibitio quæ duobus medijs perfici potest, primo diuersione ut sanguinem ad alias partes reuocemus. 2. cohibitione restringendo et uiam interceptando per quam sanguis debet fluere, diuersio igitur fiet per sectionem uenæ hepaticæ uel basilicæ aut per impositionem cucurbitularū sub manis



ante cibum, uel sub brachijs cum uehementi frictione, Interceptio uiarum per quas sanguis fluit tum intrinsece tū extrinsece fieri potest, intrinsece cum sy. frigidis stypticis, qualis est sy. ros. mirtinus de portulaca cū aquis plantaginis. solatri, acetosæ, quibus adijci possunt troc. de charabe de terra sigillata, de spodio cū semine acetosæ, Itē puluis corall. rub. lapidis hematitis, el. de scoria ferri, et triphera ex arte phenonise etc. Valēt et in hoc casu nascalia ex coto in suc. plāg. immerso cū bolo armenio sāguine draconis etc. Itē balnea et i. untiones ex rebus stypticis ut ex rosis cort. granatorū gallis, balustijs, acatia, hypocystide etc. Quæ oīa quū nihil pfecerint ad narcotica, cōsiderata primū uirtutē, refugendum, qualis est athanasia nic. & phylonium. Loci consentientes de cura.

De cura lege Auic. 21. tr. 3. ca. 4. ibi facta a multitudine aggrauate corpus & c. si fiat a bile euacuetur cū myrobalanis in quibus est uirtus styptica, si ab uteri imbecillitate dentur aromata etc. Gal. 7. de cōpos. med. p. loc. ca. 4. osculi uasorū apertio per obturationē & ruptura per conglutinationē & erosio per renutritionem curatur & c. Et meth. 5. cap. 4 et 5. existimanda est profusionis quantitatis, nā si per ruptū uas aliqd' magnū est aut uehemēter reclusum hiat, utiq; adstringētibus medicinis opus est, ueluti balastio hypocystide Rhoe omphacio, acatia, gallis immaturis, & malicorio, sin uel exiguum uas est per ruptum & non multus profluit sanguis tūc aloe & manna & pini cortex & lemnium sigillum lapis hematites & alia similia ex austero uino nigro utilia medicamenta, uide etiam de cucurbitulis ad mamillas applicandis meth. 13. cap. 19. ibi, sic nanque ad mamillas cucurbitulas imponimus, quum sanguis ex utero profluit. Itidem meth. 5. cap. 3. Hip. aph. 5. aphor. 50. mulieri si uis menstrua cohibere cucurbitulam quā maximam ad mammas appone & cete.



De regimine uictus, lege Aet. ser. 16. c. 64. ibi imperandū est unius aut alterius diei ieiunium & c. lege etiam Auic. fen. 21. cap. 4. ibi cibetur ipse cum eis quæ sunt uitelli ouorum & c.

#### Silentia ac supprementia menstrua.

Sistunt ac supprimunt menstrua acatia, acetosa, alumen, aizoon, aqua aluminosa, balauſtia, barbahyrci, bolus armenius, blastebisantie, suffumigium castanearum cortices, cauda equina, cornu cerui uſtum, cicuta, citonia, coagula, consolidida, coralli, coriandrum, lapis hematites, hepatica, uinum extinctionis ferri, fimus capræ, gallæ immaturæ, gypſum, gumiarab. glandes, granatorum cort. et flores, hyosciamus, charabe, lapis iaspis, lentes lentiscus, lycium, semen mædragoræ, margaritæ, mastix menta, millefolium, myrrha, mirtus, frondes mori, mumia nymphaea, olibanum, oliuæ, polygoniū, portulaca, cortices interiores quercus, & ulmi, rosa, rubri, sanguis draconis, sylvique ægyptiæ comestæ, solatrum, sumach scoria ferri, uernix, spodium, spicainda, uirga pastoris flores uitis agrestis, hypocysthidis succus, prunioli acerbi & agrestis. Comp. sunt conf. alchechengi Auic. 1. 5. confectio scorie. Auic. 3. 5. diaolibanum Nic. phylonium persicum Mes. syr. de mirto, de portulaca, Theodoricon magnum, triphera minor fenonis mes. Troc. de terra sigillata de charabæ, de spodio, michileta, athanasia haly. 6. ant. & c.

#### De pronosticis suppressionis menstruorum.

Hip. aph. 5. aph. 56. In fluxu muliebri si conuulso & animi defectus aduenerit malum. B. Nam ad omnem immodicam euacuationem, tanquam casus communis animi defectus accidere solet, unde Gal. meth. 5. cap. 5. profluere prohibetur ob animi deliquium, quod sæpius accidere solet & c. Et aphor. 5. aph. 57. Si menstrua plura fiant accidunt morbi, & si non fiant ex utero morbi contingunt, Auic. 21. cap. 2. Et illud est



deterius, quod ex complexionis malitia oritur. Et quum superfluit sanguinis fluxus sequitur debilitas appetitus & digestionis, aut extremitatum inflatio et coloris malitia et interdum perducit ad hydropem, &c.

De doloribus iuncturarum, siue articulari morbo, & podagra.

Dolor iuncturarum est tristis sensatio earum a mala intemperie, uel a soluta continuitate eis accidente proueniens, cuius species sunt arthritis, podagra, Ischias, gonagra & chiragra, Morbus igitur articularis quem graeci *αρθριτις* uocant est defluxus humorum ad artus siue iuncturas pedum ac manuum cum dolore & tumore, Podagra est pedum affectio ab humore calido uel frigido dolorem inferens etiam neruis patientibus, Ischias est coxarum dolor diuturnus ac difficilis a materia fluente ad uertebras sciae, & ligamenta usque ad poplites & suras, Gonagra est Inflammatio genuum cum intenso dolore, Chiragra est manuum dolor a materia in neruis & tendonibus manuum contenta.

Loci consentientes de dolo, &c.

Gal. lib. fin. med. Arthritis morbus est inflammatio articularis accidens, quae magnum dolorem neruis patientibus adfert. Et aph. 6. comm. 49. Podagra est inflammatio pedum a fluxione humorum causata, Paul. lib. 3. cap. 77. coxendix est dolor a natibus inguinibusq; ad genua usq; In plurimis autem ad summum pedem pertingens, Auic. cap. de dolor iunc. sciatica est dolor, qui incipit a iunctura anachae & descendit retro ad coxam, & quandoque extenditur usq; ad genu & ad calcaneum, &c.

De causis articularis morbi.

Cause efficientes uel sunt extrinsecae uel intrinsecae, Extrinsecae sunt casus percussio, propulsus, uel luxatio, labor



intempestiuus, potio frigida insueta, Nauseatiua satietas, nimia repletio, & omne quod bonam digestionem impedit et superfluitates multiplicat, Item consuetarum euacuationum retentio, Item, Merores, curæ, & reliqua animi pathemata. Cause intrinsecæ sunt uel ex parte membri suscipientis uel ex parte fluentis materiæ, Causa instrumentalis est dilatatio meatuum naturalium accidentalis, quæ fit uel propter membri imbecillitatem aut propter eius malam intemperiem, Rursus imbecillitas membri uel erit a sui origine uel propter caloris uehementiam, aut propter motum uel dolores uel causas extrinsecas, Causa materialis maiori ex parte erit pituita, sæpe sanguis, raro bilis, rarissime omnium atrabilis &c.

Loci consentientes de causis Arti. morbi.

Paul. lib. 3. cap. 78. Cæterum hoc mali frequenter antecedit improbus labor, uehemens ambulatio, equitatus creber, usus ueneris intempestiuus, insueta frigide potio &c. lege eum fusius & plura inuenies, Lege etiam Aui. 22 cap. de dol. iuncturarum ibi & de causis eius sunt cibi generantes &c. & paucitas digestionis quies et demissio exercitij coitus plurimus frequentia ebrietatis & retentio euacuationum &c. lege locum uberius, lege etiam Gal. 6. aph. com. 28. ubi causam enumerat q. multi idcirco laborant quia patres & auos habuere podagricos in quibus semen erat uitiatum atq; ideo natis uehementiorem fecerunt partium imbecillitatem ubi etiã inquit quod necesse est pedes esse natura imbecilliores si quis podagra corripitur debeat &c.

De signis Articularis morbi.

Signa cãrum extrinsecarũ habentur ex relatione infirmi, Signa intemperieri simplicis sunt q. dolor eius est sine grauitate inflatione et coloris alteratione, Signa intemperiei cũ materia, sunt grauitas tumor, quorum absentia non super si-



gnificat materie priuationem, quum fieri possit ut materia in profundo delitescat, Item permutatio caloris loci & doloris materiam indicant flatuosam uel humoralem, Signa particularis camæ sumuntur a iuuantibus, & nocentibus, Item ex calore loci & ex pulsu & ab egredientibus & ex hora doloris & ex additione eius & repletionem, Itē ex ætate consuetudine & ex regimine precedente, Signa sanguinis sunt quia rubescit locus nisi in profundo lateat, adest tensio, pulsatio, grauitas, regimen sanguinem adaugens & dispositio corporis sanguinea, Signabiles sunt calor intensus, nulla grauitas, paucitas rubedinis dolor est superficialis, mordicans, urina rubea, pulsus uelox, temperies biliosa, regimen bilem generans. Signa pituitæ, color albus, liuidus, dolor grauians, remissus, tumor magnus cum mollitie, non sentitur calor, urina alba, temperies pituitosa regimen pituitam generans & ætas senectutis, signa melancholiæ, sunt dolor remissus profundus, tumor paruus cum durtie, urina remissa, tenuis habitudo extenuata, regimen præcessit melancholium.

#### Loci consentientes de signis. 1

Aui. 22. T. 3. c. de sig. dolorum iun. 7. Cōplexio simplex fit parumper raro & fit in ea dolor sine grauedine absq; inflatione & non est alteratio coloris & c.

De signis humorum lege Paulus. lib. 3. c. 78. ubi deprehendi facile humorum, noxam inferentium discrimina posse, tū suis coloribus tumq; his quæ superueniunt & c. lege eū fusius etiam de particularibus causarum signis, lege etiam Razem in lib. de iuncturis & plura intelliges. & c.

#### De cura articularis morbi.

Pro cura articularis morbi siue, pdagræ quatuor opus sūt intentiones prima erit auersio quæ fiet sanguine peccante cū



sectione uenæ per rectam diametrum, aut cum euacuatione minuendo materiam sicuti cum pillulis de hermodatilis minoribus, cum rheub. aut cum uomitu. 2. est humoris siue calidi, siue frigidi digestio, quæ stypticis frigidis in causa calida, ut cum syr. ros. de granatis cum aquis plantaginis acetosæ, &c. & in causa frigida cum rhodomelle, deinde cum syr. de stechade cum aquis betonicæ absinthij & saluæ perficitur. 3. intentio est præparati humoris omnimoda euacuatio, unde in causa calida conueniunt pillulæ de hermo. min. cū rheu. in frigida pillulæ de hermamai. &c. 4. est doloris prohibitio quæ fieri potest in causa calida, cum repercutientibus anodinis, qualis est cassia cum oleo ross. dissoluta, uel cum aqua solatri & ros. uel cum medulla panis in lacte cum uitello oui, sed si fluxerit omnino materia tunc anodina simpliciter conueniunt, sicuti camomilla anethum mellilotum fœnugræcum &c. Vlt. cum his quæ resoluunt & emolliunt procedendum, sicut cum oleo camomillæ et stercore uacino aut cum balneo ex uino & rebus stypticis &c. Cibaria in causa calida sunt frigida & humida ut ptisana hordeacea cum zucharo cucurbita attriplies cucumeres & similia, uitentur dulcia acria & salsa, Item carnes & uina, In causa frigida uictus sit tenuis & pro potu sit hydromel, Itidē curatur ac dixi ischias uerum quum in profundo materia lateat, repellentibus in principio non utimur, &c.

Loci consentientes de cura articularis morbi.

De prima intentione loquitur Auicē. 22. cap. de cur. dolo. iunct. ibi, Cum autem causa in eis est cum materia tunc opus ut prohibeatur quod effundit per attractionē ad contrarium, & per minorationem &c. In causa sanguinea opus ut administres phlebotomiam ex parte contraria, deinde administra uomitum &c. Paul. in quibus sanguineus humor redundat protinus



protinus sanguis mitti debet, qui tamen in pituitosis uel at-  
 trahilijs non est detrahendus etc. Razes in lib. de iunct. in-  
 cipimus minuere ex latere opposito propter duo commoda  
 quorum unū est declinare materiam à suo loco, alterum est  
 retardare cursum materiæ ad locum doloris, et in lib. diuis.  
 opus ut non prolongetur phlebotomia in sanguinea, sed fiat  
 cum incipit dolor & pulsatio &c. Vide de his etiam Haly-  
 abbatem. Arcul. Mar. Cat. &c. Gal. aph. 6. com. 28. Nō influet  
 humor si omnino uacans superfluitatibus corpus extiterit,  
 Erit enim uacans si mediocri utatur exercitio, & bene cibū  
 concoxerit, unde & desidie & crapule eis nocent &c. Lege  
 de his cibis Razem loc. cit. ibi dieta sit frigida & humida si-  
 cut aqua hordei & cucurbita & cucumeres &c. Lege etiam  
 Alexan. ibi uitentur dulcia acuta unctiosa salsa &c.

#### Observationes in euacuatione.

Marc. Cat. inquit q. in euacuando pituitam non debemus  
 tantum phlegmagogis uti, sed etiam cholagogis, quum pitui-  
 ta semper bili admixta sit, alioquin ex se non fluere. 2. quod  
 euacuantibus debemus styptica admiscere, quia constringen-  
 do uias prohibent materiæ fluxum. 3. q. a principio cū uehe-  
 menti pharmaco non est euacuandum, quia tunc tenue egres-  
 deretur, & quod esset crassum remaneret &c.

#### Observationes circa digestionem.

Gera. super. 9. alm. digestiū materiæ frigide debet esse  
 calidum stypticū dum materia fluit, sed in materia fluxa de-  
 bet esse subtiliatium & incisuum Marc. Cat. Digestiua non  
 debent esse ualde aperientia, nec quæ neruis & iuncturis no-  
 ceant sicut oxymel.

#### Observationes circa repercussionem.

Gilbertus uti debemus repercussiuis donec cesset dolor et  
 apostematis pulsatio et tunc cessabimus ab eis quoniam si ul-

NN



terius usi fuerimus ingrossabitur materia & reddetur difficilis dissolutionis. Aui. Repercussio non oportet ut fiat materia existēte fortis effusionis plurimæ resumptionis, nam materiam inobedientem facit & dolor accidit magnus.

#### Observationes circa resolutia.

Halyabb. in sua praxi, Nō oportet uti medicaminibus calefacientibus & subtiliantibus nisi post digestionem & corporis purgationem, quoniam si aliter fiat tunc humor adurit & indurescit & difficilis fit sanationis. Avic. Non oportet ut approximent resolutiua fortia in principio rei, ante euacuationem, quoniam faciunt euenire materias plurimas, deinde resoluūt subtile earum & inspissant residuum & retinent ipsum, & hoc in materia uiscosa & melancholica.

#### Observationes circa motum.

Alex. tract. Non superabundantem sequantur motū quoniam nocet, sed utantur eo paulatine absq; labore quoniam motus generat bilem rubeam & eam attrahit ad articulos, Razes in lib. de iunct. caueant ab ambulatione equitatione balneis retentione urine & egestionis.

#### Conferentia doloribus iuncturarum.

Conferunt doloribus iuncturarum resoluendo quædā ac liquefaciendo materiam condensatam ut crocus mellilotum anisum, aloes, mastix, iris, stechas arab. Quædam crassitiem attenuando & ex profundo attrahendo, sicut carica mel lentiscus, abrotanum, apium, sylvestre calamentum, aristologia, ruta, cum melle, urtica, nasturtium. gumi rutæ sylvestris, ammoniacum, galbanum euphorbium resina terebenthina, costus, castoreum. Quædam attrahendo & uesicando ut cepæ alleum lac ficus anacardi, sapo, cortex nouum atramentum fermentum. Quædam urendo & ulcerando ut atramentum uirriolum staphisagria fermentū scilla, uernix pini, thapsia;



cantarides. Quædam penetrando in profundum ut aqua uite, oleum terebenthinæ, oleum philosophorum. Quædam leniendo & mollificando, ut adeps anatis anseris uulpis leonis ursi, medullæ crurium uituli, cerui asini, æsypus mucilago s. lini foenugræci altheæ, oleum uulpinum costinum, liliorum de castoreo de sinapi, de nuce romana cum storace & assa. Quædam euacuando ut pillulæ foetide aggregatiuæ de hermodactilis de serapino de oppoponaco mes. pillulæ arteticæ nic pillulæ magistrales confectio de thurbit & c.

De pronosticis articularis morbi.

Hip. aph. 2. aph. 46. duobus doloribus simul eundem locum infestantibus uehementior alterum obscurat. Et aph. 4. apho. 20. Non febricitantibus si tormina acciderint & genuum grauitas & lumborum dolor, purgari inferius oportere significatur. Et aph. 4. aph. 31. lassitudinem habentibus in febribus circa articulus & maxillas potissime sine abscessus fiunt. Et apho. 4. aphor. 33. sed si ante morbum aliqua parte doluerint hic morbus firmatur. Et aph. 4. aph. 44. quibus febres longæ, ijs tubercula uel dolores in articulis fiunt. Et aph. 4. aph. 45. quibus tubercula uel in articulis labores fiunt, ij pluribus utuntur cibis. Et aph. 6. aph. 22. quicunq; dolores ex dorso ad cubitum descendunt uenæ sectio soluit. Et aph. 6. aph. 28. eunuchi neq; podagra laborant neq; calui fiunt. Et apho. 29. eiusdem mulier podagra non laborat nisi menstrua defecerint. Et aph. 30. eiusdem, puer podagra non laborat antequam uenereorū. Et aph. 49. eiusdem quicunque morbi podagrici fiunt, hi sedata in quadraginta diebus inflammatione finiunt. Et apho. 55. eiusdem dolores podagrici uere & autumno magna ex parte mouentur. Et aph. 6. aph. 59. quibuscunq; a coxenticum dolore diuturno molestatis excidit coxa, & rursus incidit, his marcores superueniunt. Et aph. 66. eiusdem quibuscunque a



coxendicum dolore diuturno molestatis excidit coxa his crus  
 tabescit & claudicant si non urantur. Auic. loc. cit. & humo  
 res crudi quum retinentur in corpore, nec euacuatur per ege  
 stionem uel urinam nec per artem, non est longinquum quin  
 currere faciant dolores iuncturarum. 2. Et aptius ad hoc ut in  
 eis multiplicentur ista sunt senes, & habentes aegritudines cro  
 nicas & conualescentes quum nun reguntur cum retificatio  
 ne. 3. Et aptiora tempora ad dolores iuncturarum sunt uer  
 propter motum sanguinis & humorum & autumnus pro  
 pter malitiam humorum & digestionis. 4. Et cum securritur  
 doloribus iuncturarum in primis quando apparent, fit eorū  
 cura facilis. 5. Quod si confirmentur & consuescant proprie  
 illis qui generati sunt & humoribus diuersis non curantur. 6.  
 Et quando apparent narices in habentibus dolores iunctura  
 rum & podagrā est eorum sanatio per eas. 7. Et dicitur qui  
 habet dolorem anche & apparet in coxa eius rubedo uehe  
 mens trium digitorum non faciens ei dolorem, & accidit ei  
 in ea pruritus uehemens, & desiderat olera morietur in 25.  
 die. 8. et omne membrum, in quo est dolor iuncturarum ma  
 crescit, & extenuatur. Nono, Et dolores iuncturarum præ  
 ter sciaticam & podagram quum curantur & eradicantur  
 eorum materia non redeunt uelociter. Razes. 12. com. dete  
 rior iuncturarum dolor erit quando accidit ei cuius pater uel  
 auus illo laborauerit. Auic. sunt aegritudines quæ hereditan  
 tur. Razes in lib. pronost. dolor iuncturarum in iuuetute bre  
 uem fore uitam significat, & qui fiunt in superioribus sunt  
 satis deteriores, &c.

Authores erronei dissentientes circa artic. mor.

1. Adserere, in principio morbi articularis semper esse re  
 pellendum.
2. Adserere, articulares morbos ad saniem posse terminari.



3 Adferere. Venæ sectionem ex pede primum, & non ex manu esse committendam.

Confutatio dissentientium circa artic. mor.

Ad primum respondet Auic. cap. de cur. sciat q. repercus- sua & fortiter styptica sunt in hoc casu multum suspecta, quoniam materiam in loco profundo incutiunt, & nocet no- cumento uehementi & demum fit difficilis eius resolutio.

Ad secundum Razes in diuis. inquit hoc esse eis proprium quod per saniem non terminantur.

Ad tertium Auic. loc. cit. & non fiat primum phleboto- mia ex pede nisi post phlebotomiam in manu nisi materia sit ualde pauca, &c.

Finis libri tertij.

IOANNIS BACCANELLI,  
MEDICI REGIENSIS,  
De Consensu Medicorum,  
in curandis febribus.

Liber Quartus.

Febris quid sit, & unde dicatur.



EBRIS quæ a feritate, uel a feruore dicitur est calor præter naturalis accen- sus in corde & arterijs ad alia membra diffusus naturalibus actionibus incommo- dans, qui calor duplex est alter natiuus et genuinus, alter uero acquisitiuus ac stu- rius, qui si per totum corpus diffundatur febrem efficit, si mi- nus lassitudinem inducit.

NN 3



Loci consentientes de febre.

Alex. lib. 5. cap. 1. Febris nil aliud est quam immodice auctus feruor accensus præter naturam in corde & arterijs, qui secundum naturam ignis cor possidens corpori uniuerso damnatur.

Gal. 2. de mor. cau. cap. 2. πυρετός ἐστὶ τοῦ πάντος σώματος θερμότης τις ἀμέτρος οὐσα. i. febris est totius animantis immodicus calor. Et. 1. aph. febris est conuersio nativæ caliditatis ad igneam. Et. 3. de diff. mor. cap. 5. ubi calor totum corpus infestat febris nominatur. si uero per totum corpus non diffundatur lassitudo dicitur. Auicenn. 4. can. cap. 1. Febris est calor extraneus accensus in corde & procedens ab eo mediâte sanguine & spiritu per uenas & arterias ad totum corpus & inflammatur inflammatione quæ nocet operationibus naturalibus. Gal. de difficul. respi. cap. 21. duplex est caloris genus alterum genuinum & corpori innatum, alterum acquisitum ac spurium.

Obiectio.

Erunt ne bini calores distincti an unus & idem calor naturalis & extraneus quod bini distincti sint, uidetur, nam naturalis temperatus est, ut in. 2. de fac. nat. & in com. apho. Qui crescunt plurimū habent caloris innati, sed in. 1. aph. est mutatus ad ingenuum ut in definitione superius allata.

Responsio.

Dicimus unum & eundem calorem esse quo ad substantiam, sed esse diuersos calores quo ad fundamentum, nam aliter fundatur naturalis quam præter naturalis &c. Nota etiā quod febris est morbus calidus et siccus calidus ἐρεπυρία siccus uero potestate, nam febris si in superflua humiditate accendatur, non actu sicca dicetur sed facultate.

De febrium diuisione.

Febrium aliquæ sunt substantiales aliquæ accidentales,



Substantiales sumuntur a materia, a modo motus, a quantitate, materia uel erunt membra continentia ex quibus hæctica, aut humores, unde putrida, aut *ορμωτα*. i. agitantia siue impellētia ut spiritus a quibus ephemera prouenit, A modo motus quū *τροπος κινήσεως* sit ratio motus quo calor mouetur, A quantitate. i. a remissione & intentione illius caloris. Febres accidentales dicuntur quæcunq; opilationes, & inflammationes siue alios abscessus sequuntur, et non sunt per se ægritudines sicut aliæ, Sumuntur etiā accidentales a calore ut mordaces, mites aut a colore ut pallide liuide. Februm aliæ sunt breues aliæ lōgæ, aliquæ salubres aliquæ insalubres aliæ interpolatæ, aliæ continuæ, & harum aliquæ sunt simplices aliquæ cōpositæ. Rursus interpolatarum tres sunt quotidianæ, tertiana, quartana. Continuarum quæ a flaua bile proueniunt duæ sunt species altera synoche dicta, altera sortito generis nomine cōtinua dicitur. Rursus synochæ tres sunt, quædam a principio usque ad finem æquales perdurant quædam augentur, quædam decrescunt, primæ homoteneæ & ac masticeæ. 2. anabasticeæ & epacmasticeæ. 3. peracmasticeæ dicuntur. Continuarum rursus nonnullæ singulis tertijs diebus inualescunt, nonnullæ in quotidianarum figura progrediuntur, & aliæ in quartanarum forma.

#### Loci consentientes de diuisione februm.

Gal. i. de diff. feb. Principales ac proprie februm differentie sumuntur ab earum substantia, aliæ uero ab aliquo accidente & c. Aet. ser. s. cap. 58. differentie huius caloris maioris aut minoris ratione distinguuntur & iuxta subiectum, siue materiam aut ipsum cordis corpus calore occupante, aut humores aut aeriam substantiam & c. Alex. lib. 5. trifariam in summa febres ingruunt in spiritibus humoribus & membris solidioribus in spiritibus *εφ' αέρια*, in humoribus bifariam



aut in uenis ut  $\kappa\alpha\upsilon\sigma\omicron\varsigma$  si humores cum sanguine computruerint, & quas  $\sigma\upsilon\nu\chi\epsilon\iota\varsigma$ . i. continuas uocant, aut extra uenas per diuersas corporis partes putridi humores discurrunt, et febres fiunt quas Græci  $\tau\upsilon\pi\iota\kappa\acute{\alpha}\varsigma$  uocant, in membris fiunt febres heclicæ.

Auice. Dicamus q̄ febres apostematum & opilationum sunt febres accidentales & aliæ febres sunt ægri tudines, lege Gal. 1. ad glauconem cap. 4. de hac re. Auic. ibi. Diuiduntur etiam febres ut nonnullæ sint acutæ non acutæ cronicæ nō cronicæ, nocturnæ diurnæ salubres & horribilia accidentia habentes aliæ dimittentes aliæ inseperabiles & c. Gal. 2. de diff. feb cap. 2. intermittentiū tres sunt omnes numero quotidiana tertiana quartana, quotidiana à pituitæ putredine, tertiana à flaua bile, quartana à nigra, continuarum quæ à flaua bile proueniūt duæ sunt species altera synoche dicta, altera sortito generis nomine continua. B. Itidem ait. 2. de cris cap. 9. & nota q̄  $\sigma\upsilon\nu\chi\epsilon\iota\varsigma$  a continuo feruore dicitur, de qua Gale. 9. meth. cap. 4. mentionem facit, & harum aniuersum tempus in una acceſsione consumitur, & c.

#### De caulis febrium in genere.

Causa febrium duplex est extrinseca & intrinseca. Extrinseca fit ab aere calido uel frigido, a mala qualitate, a corruptione, a motu et ab otio. Intrinseca diuiditur in causas  $\pi\rho\sigma\kappa\alpha\tau\alpha\rho\chi\omicron\upsilon\tau\alpha\varsigma$ . i. præincipientes, & in  $\pi\rho\sigma\gamma\omicron\mu\epsilon\nu\alpha\varsigma$ . i. antecedentes & in contentiuas siue coniunctas. Procatartica est quæ quum peractum est opus, recedit ut exustio solis uel ictus scorpion. Coniuncta est quæ quum adest præsentem seruat morbum, sublata tollit, ut calculus in uesica. Antecedens uero a cōiuncta prorsus constituitur, nam hac præſente adest affectus & aucta augetur & minuta minuitur & sublata remouetur. Nota tamen q̄ hæ causæ. s. præincipiens coniuncta & antecē



dens referuntur ad causam efficientem, nam causa materialis in febribus, erunt membra ut in hectica, humores in putrida, spiritus in ephamera. Causa formalis erit calefacere & adurere corpus, & causa finalis cuius gratia hæc aguntur, erit sensibilis læsio operationum, &c.

Loci consentientes de causis febrium.

Gal. 1. de diff. feb. cap. 5. Quum febris sit in corde quædam præter naturalis caliditas eius causas nunc ostendere intendimus, nam non unus est tantum generationis caliditatis modus, sed aut propter motum, aut propter putrefactionem, uel propter adhaesum alterius caloris, aut propter retentionem calidi effluxus aut propter mixtionem calidæ substantiæ fiunt &c. De alijs causis lege Gal. in li. de cau. procatarcti. et 1. met. cap. 8. Vide etiam de causis caliditatis. Gal. 2. de morb. cau. c. 2. Et nota q. Gal. 4. meth. c. 3. inquit externæ causæ cognitionem non nisi ad noscendos affectus, qui nostram notitiam faciunt utilem esse &c.

De febrium temporibus.

Tempora febrium bifariam considerantur, aut quatenus uniuersalia aut quatenus particularia. Uniuersalia sunt quæ totius morbi, siue febris circuitum absoluunt.

Particularia sunt quæ paroxysmi siue exacerbationis partem metiuntur, rursus uniuersalia non solum penes morbi essentiam, sed & penes symptomata & materiæ alterationem distinguuntur, nam sicut morbi principium tempus dicitur, in quo morbus apparet, sic etiam principium erit quum materia cruda nullum coctionis uestigiū demonstrat, aut quum symptomata incipiunt. Si r. augmentum dicetur, quum morbus augetur uel accidētia intenduntur, uel aliquod indicatiū appareat, Status erit quum morbus et symptomata, non se mutando in sua dispositione maneant, aut quum signa cōcoctionis manifesta uideantur. Declinatio erit quum non solum febris declinet sed et accidētia et



materia iam digesta expellitur, tempora uero particularia distinguuntur circa caloris modum, nam si calor a materia submergatur in membro erit principium quum uero calor excitatur, erit augmentum, at quum intensiori gradum calefacit, erit status & quum remittitur declinatio seu remissio morbi dicitur, nonnulli inter initium & incrementum, in æqualitatis nomen connumerarunt, sicut interuallum ac quietem in declinationis fine & c. Nota quod principium morbi interdum uidetur absconditum, & hoc quum morbi principium adeo breue sit ut cognosci non possit sicuti in synocha epilepsia & apoplexia aut quum morbus est paucorum accidentium, aut quum in prima die morbi concoctionis indicia appareant, & c.

Loci consentientes de febrium temporibus.

Gal. lib. de totius morb. temporibus. cap. 1. Equiparat morbi tempora ad animantium ætates unum quidem principium generationi eorum tribuens, alterum incremento. 3. uigori. 4. declinationi quum ægri salui futuri sunt. Auic. 4. can. cap. 3. febrium horæ sunt sicut reliquarum ægritudinum, principium, augmentum status apud ultimum & dedinatio, & sunt quinque particulares causæ cuiusque paroxysmi & c. Aet. serm. 5. cap. 2. Principium febrilis exacerbationis est contractio extremarum partium omnium & maxime nasi, augmentum habet accidentium incrementum & cessat frigiditas, uigor erit ubi calor æqualiter per totum corpus diffunditur & c. uide illum fusius. Gal. in lib. de morb. temporibus. sex tempora enumerat, initij nomen, in æqualitatis, incrementi, status siue uigoris, declinationis & integritatis interuallum ac quietem nominans & c. De his plura in hoc lib. iuxta Gal. inuenies, nam secatur etiam periodum in duas partes in accessionem & remissionem siue interuallum. Et nota pro iunioribus quod pe-



riodus idem importat ac si diceretur circuitus, & est tempus in morbis ex intensione & remissione consistens. Typus uero est intensiōum remissionūq; ordine succedens redemptio. Paroxysmus & exacerbatio idem important & sunt ut inquit Aet. motus morbi particularis a remissione ad deterius. De principijs morbi absconditi lege Aui. latius. 4. can. c. 3.

Quomodo status morbi præcognoscatur.

Cognosces morbos fore breues uel prolixos, ab ipso morbi paroxysmo, nam paroxysmi longi longum, breues breuem morbum prænuntiant. Item ab ipso genere morbi nam apoplexia, tertiana, breui, paralysis & quartana longo tempore terminantur. Ab ipsa uirtute debili uel ualida, unde ex debili, breuis ex ualida longus erit. Ab ipsa ætate & tempore, nam in senio & hyeme, longus, in iuuentute et æstate breuis, Ab ipsis accidentibus breuiter uel longo tempore durantibus, Ab ipsis excrementis exeuntibus mutatis, nam in urina nullum apparens cōcoctionis indicium longum morbum. et econtra breuem sig. Nota quod peracuti morbi quartum diē non transcendunt, Acuti uero plerunq; 14. Vocandi erunt morbi acuti, si cum seuis symptomatibus terminantur. Quare febres ephemerae non erunt morbi acuti & c.

Loci consentientes de præcognitione status.

Hip. aph. 1. aph. 12. Accessiones & constitutiones morbi indicabunt, & anni tempora & circuituum, ad inuicem incrementa siue quotidie siue alternis diebus siue per maiora interualla fiant. Gale. non solum in hoc com. sed etiam in. 1. de crisi. 6. libro quomodo, quispiam futurum morbi uigorem possit primo cognoscere facile ostēdit quem legere poteris. Aui. c. 4. can. cap. 4. Docet cognoscere statum ex tempore & motu morbi, ex ipsa uirtute, ætate, tempore, pulsu, rigore, a paroxysmo ab accidentibus ipsis & ex euacuatione & di-



gestione &c. Vide illum latius de his. Hip. aph. 2. aph. 23. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. Et Auic. 4. can. cap. 3. status diuersus est in morbis, morborum enim ualde acutorum status quartum diem non transcendit, nec febres ephemeræ morbi acuti dicuntur, & si propinquus sit earum status, quum hoc non satis sit, sed oportet insuper quod timorem inducant, acuti uero absolute morbi sunt quorum status. 14. attingunt, &c.

#### Authores dissentientes circa febrem.

- 1 Adserere, febrem esse complexionem calidam & siccam.
- 2 Adserere, febrem non posse diuidi in morbum & accidēs.
- 3 Adserere, in omni morbo esse assignanda quatuor tēpora.

#### Confutatio dissentientium circa febrem.

Ad primum, respondetur q, si complexio calida & sicca esset febris tunc sequeretur q, complexio biliosa esset febris, quod falsum est, nam febrientes siue pituitosi siue sanguinei sint, remanent semper in eadem complexione ac præditi erant, Præterea idem homo plurus in complexione mutaretur nam febriens esset biliosus non febriens pituitosus quod falsum esse omnes asseuerant.

Ad secundum Auic. & concil. differentia. 87. tenent quod febres sunt accidentales quū mediate uel immediate a morbo dependant, sunt autē morbi quum nullū morbum sequuntur.

Ad tertium respondet Arcu. morbos qui nullam uarietatem medico sensibilem de se præbent, & qui in principio generationis contrahuntur, & qui ad mortem terminantur, non habere quatuor tempora, & sic falsum est quod in omni morbo sint quatuor tempora.

#### De febre ephemera.

Febris ephemera, nil aliud est quam calor accensus in spiritibus, & dicitur ephemera siue diaria, non ex eo q, duret



tantum per unam diem, sed quia plerunq; accidit, ut in uno die desinat, per durare tamen potest usq; ad quartum diē, sed raro tertium diem progreditur.

Loci consentientes de febre ephamera.

Gal. aph. 4. com. 55. febres diariæ omnes ab ipso Hip. uocantur quicunq; sui ratione una die durant, tales uel a tumoribus inguinum uel a causis manifestis fiūt. De reliquis a medicis lege Gal. 10. meth. cap. 2. ibi sane dicuntur id genus febres omnes diariæ quia solui una die sunt aptæ &c. Item. 9. meth. cap. 1.

Obiectio.

Anceps sum an tantum in spiritibus calor accendatur, quum sanguis & spiritus una promisceantur, ut uoluit Gale. 6. de usu partium, immo & 2. de diff. febrium cap. 9. tenet a sanguine calefactio fieri ephemeram, quare non solum in spiritibus, sed etiam in sanguine calor accendetur.

Responsio.

Dicimus utrunq; a calore febrili calefieri, sed si aduertamus quod primo non in sanguine, sed in spiritibus calor fundatur, dubitatio nulla erit.

De causis febris ephemeræ.

Quum duplex sit ephamera, uera. s. & spuria. Vera fit tantum a causis procatarepticis, spuria uero fit per accidens uel ex obstructione, uel per ἀντιπεριστάσει, sicut ex cohibitione &c. Cause ephemerarum totidem ac sue species sunt, quæ teste Auic. enumerantur. 21. Nam aliquæ ad animam magis quàm ad corpus pertinent ut angustia tristitia cogitatio, ira, uigilia, somnus, quies, timor, & gaudium, aliquæ magis spectant ad corpus quàm ad animam, ut motus quies euacuatio dolor syncopis fames sitis obstructio, satietas nauseatiua inflammatio soliditas, aliquæ uero extrinsece ueniunt, sicut ab adustione frigore soliditate balneis &c.



## Loci consentientes de causis febris ephemeræ.

Auic. 4. can. cap. 5. omnes febres diariæ fiunt aut a causis præincipientibus per se calefacientibus, aut per accidens ut opilando aut per antiparistasin ut cohibendo, & cæt. lege eum fusius. Gal. 2. de cris. cap. 13. sunt autem hæc tantummodo spiritus passionibus absq; humorum putredine aut membri inflammatione nisi inflammatis inguinibus accidant, earum uero generationis occasiones sunt uigiliæ cruditas tristitia timor ira curæ deustio refrigeratio lassitudo ebrietas, et quæcunq; similia & c. Vide Aet. ser. 5. cap. 58. ibi, auspicientes ac externæ laceßentes causæ, & c.

## De signis febris ephemeræ.

Signa febrium ephemarum sumuntur a iocunditate caloris, non incipiunt cum frigore rigore somno uelut putride, nec in principio calor concentratur. Concoctio in urina primo die apparet, fiunt a primitiuis tantum causis, pulsus non est diuersus, nec systoles magis se accelerat quam naturalis, principium paroxysmi leue est ac facile, augmentum nõ ultra duas horas se extendit, in statu nullum uehemens symptoma uidetur. Declinatio fit cum sudore ad integritatem desinit & adhibito balneo nullus horror sentitur. Signa trāsmutationis ephemeræ in alias febres sumuntur ab ipsa declinatione febris, nam si absq; sudore fiat, uel cum sudore per quē integra reconualescentia non sequatur iam in alias febres transit, item si declinatio ultra 24. horas cum symptomatibus & pulsus non naturali se extenderit, aut si remanserit aliqua symptomata in sui recessu. Cognoscitur etiam quum in hecticam transmutatur ex signis hecticæ, de quibus infra latius, aut in synocham ex uenarum repletionem ex caliditate inflammatione rubore faciei & c. aut in putridas ex horrore, pulsus diuersitate & coarctatione ex mordaci calore &



a uehementia symptomatum, &c.

Loci consentientes de signis. 1

Gal. 1. de diff. feb. cap. 7. Indicia sunt ut si fiant a procatarcti-  
cicis causis, & est signum inseperabile sed non proprium, si  
concoctio in urinis, si pulsus frequentia a proprietate defi-  
ciat, si nullo modo systoles ad celeritatem tendat, si caliditatis  
ad sit suauitas, si cum sudore aut rore, uel optimo aliquo ua-  
pore declinatio ad integritatem sequatur hæc omnia pro-  
pria & inseperabilia signa sunt &c. De reliquis lege Auic.  
4. can. cap. 6. Item Aet. serm. 5. cap. 58. & Paul. lib. 2. c. 15. Item  
Gal. 2. de cris. cap. 12. & 1. art. cur. ad glauc. c. 2. & 3. lege etiã  
Arcul. & alios neotericos &c. De signis transmutationis le-  
ge Auic. 4. can. cap. 8. Item Gal. 1. de diff. feb. cap. 7.

De cura febris ephemeræ.

Si a causis procatarcticis febres ephemeræ fiant, tunc al-  
teratione sola curantur, si uero a causis corporeis oriantur,  
tunc triplex erit intentio. Prima circa causæ ablationem &  
febris alterationem ita ut calida frigidis curentur, ut exustio  
solis cum umbra, & sic duo efficies causam remouebis &  
malam febris discrasiam per alterationem expelles. 2. prohi-  
bet ne fiat transitus ab hac febre ad alias, meatus aperiendo,  
uapores resoluendo, cum balneis in febris declinatione adhi-  
bitis, uel cum oleo quopiam perfricando. 3. est quæ sympto-  
matibus occurrit & regimen instituit, ad febrem enim se-  
quitur dolor sitis uigiliæ, & ad eius causam syncopis epile-  
psia &c. quibus occurritur, opportunis præsijs. Regimen  
uero non solum febrem sed eius quoque causam respicit. Vi-  
ctus igitur ratio humida ac boni succi in declinatione febris  
exhibeatur, ijs unum interdicitur qui ex inflammatione uel  
furore febricitant, in uigilijs tamen concedendum, at in reli-  
quis rebus non naturalibus semper contrarium est offeren-



dum, sicuti in labore quietem iubemus, in uigilijs somnum in ira & furore animi iocunditatem, &c. Interdum cibus modo quodam coacto & irregulari in principio febris est exhibendus, ijs præsertim qui ex labore angustia fame & superflua bile febricitant &c. Ad species ephemerarum particulares scribendo non descendam: si quidem rarissime opus medici desideratur, ni prius morbus in putridam aut hecticam febrem mutetur &c.

#### Loci consentientes de cura ephemerarum.

Aet. ser. 5 ca. 59. usq; ad cap. 69. de omnibus febribus ephemeris particularem curam pertractat. Similiter Auic. 4. can. à cap. 10. usq; ad 44. de singulis particularibus mentionem facit signa demonstrando causas & curationem. Alexand. iridem agit lib. 5. cap. 1. Paul. unicum tantum caput de diarijs habet lib. 2. cap. 15. Galen. 1. art. cur. ad glauc. cap. 3. omnes hasce febres balneis curare oportet, & ad consuetam uictus rationem eos perducere, &c. Et paulo post loquens de uictu, interdicitur inquit uinum qui inflammatione inguinum laborant, similiter & furore percitis cibo insuper humido ac boni succi reficiendi sunt etc. q. aliquos cibare oporteat in principio paroxysmi lege Auic. 4. can. cap. 9. ibi necesse est in principio febris cibare qui patiuntur ephemeram ex labore & angustia, Itidem ait Gal. 10. meth. cap. 5. ibi quum adhuc inuasura sit febris uel quum incipit &c.

#### Observationes circa balneum & euacuationem.

Auic. 4. can. cap. 9. balneum non conuenit in quattuor casibus. primo quum timetur de casu putredinis. 2. quum adest obstructio ab humoribus crassis. 3. quum adest satietas nauseatina. 4. quum adest catharrhus &c. Item dixit q. in ephemeris nulla euacuatio conuenit, nisi adsit materia abstruens aut satietas nauseatina, aut totius corporis repletio &c.

De



## De pronosticis ephemerarum.

Galen. 1. ad glauc. cap. 2. cura harum febrium in promptu est, at earum cognitio maiorem exigit diligentiam, & qua nemo ante nos quantum oportuerit scriptum reliquit & c. itidem ait Auic. 4. can. cap. 5.

## Obiectio.

Gal. 1. de diff. feb. ca. 7. uidetur contrarium innuere quum dicat nec earum cognitio est difficilis.

## Responsio.

Dicimus hanc esse difficilis cognitionis quum ipsum ad huc perseuerat principium, sed facilis quum iam ad declinationem uenit manifestam. Hip. aph. 4. aph. 55. ex inguinū tumoribus omnes febres male præter diarias. uide in hac re Oribasij com. fusius. Auic. 4. can. cap. 5. homines quibus maxime nocent febres ephemeræ, sunt calidi & sicci quia ad hecticam cito perueniunt, aut calidi & humidi, quia in febrē putridam incidunt, & c.

Authores dissentientes circa febrem ephemeram.

1. Adserere, omnem ephemeram esse febrem accidentalem.
2. Adserere, ephemeram coniungi posse cum putrida.

Confutatio dissentientium circa febrem ephemeram.

Ad primum, Respondetur quod si ephemeræ sequerentur calorem aut dolorē alicuius apostematis, q̄ hoc uerum esset, sed non omnes huiusmodi sunt, igitur non accidentales.

Ad secundum dicit Arcul. q̄ tenenda est eorum pars, quæ negant has febres coniungi posse, nam quotiens calor ad humorum putredinem transit non amplius ephemeram efficere potest sed tantum putridam.

## De febre hectica.

Febris hectica est calor præter naturalis accensus in membris radicalibus siue solidioribus quæ græci μεροτέρεα uocāt, cōsumptis tamē in ipsis humiditatibus, cuius species sunt tres iuxta quatuor humiditates secundas, quarū prima uocatur



nomen non habens. 2. ros. 3. cambium. 4. glutem, ita tamen ut quoties humiditas prima definit & 2. quæ est ros incipit accendi, tunc prima species hectica dicitur, quæ si ad cambium. 3. humiditatem peruenerit, tunc erit 2. species, & uocatur ab Auic. dubalen. i. arefactio siue μαρμαρός. i. tabes, si uero ad gluten deuenerit, tunc erit. 3. species & uocatur ab Auicen. al. muchasif, siue curuatura, nam fere eadem forma uidetur, ac est in decrepitis curua, &c.

#### Loci consentientes de febre hectica.

Auic. 4. can. ca 1. tract. 3. Cum inflammantur membra radicalia & proprie cor, est illud ipsa ægrotudo quæ est hectica secundum quod sciisti etc. Gal præd. 2. com. 60. quum partes ipsæ corporis solidiores ignitiores euadunt febres hecticas nominamus. Quod sint tres species hecticae lege etiã Aui. loc. cit. ubi etiam enumerat humiditates secundas. Lege etiã Gal. 1. de diff. feb. cap. 9. tabida febris incipit quum natua humiditas in unoquoq; corpore inpersa in medijs spatijs partium similarium, ex qua primum partes nutriuntur & circa cordis corpus periclitatur, quum uero iam res eo periculi uenerit, ut nihil iam ex tali humiditate supersit, tunc exquisita tabes consistit &c. Et cap. 8. eiusdem tabida febris non tantum sicca, sed etiam calida est passio, &c.

#### De causis febris hecticae.

Causæ febris hecticae uel sunt febres ephemeræ aut putride aut febres ex partium nobilium, inflammationibus ortæ, sicuti ex pulmonis aut thoracis affectibus, præsertim ex empiemate & ptisi, aut febres ardentes cum totius animalis & cordis præsertim siccitate. Interdum causæ sunt errores medicorum qui uictum nimis tenuem instituunt, aut aquam frigidam in inflammatione diaphragmatis prohibet, aut quum ob defectum animi uinum & aquam carnis & diamuscum



iubent, quæ omnia ob sui caliditatem ad hæcticam agrū perducunt & raro hæctica per se incipit.

Loci consentientes de causis febris hæcticæ.

Auic. 4. can. tract. 3. cap. 1. Cause hæcticæ sunt febres ephemere, aut putride, aut febre inflammationum, quia raro hæctica incipiendo accidit nisi sit causa ualde fortis, &c.

Gal. 1. de diff. feb. c. 1. 9. exoritur hæc passio ipsi cordi non nunquam per se ipsam sicuti excandentijs tristicijs nonnunquam ex ardentibus febribus, aliquando ex pulmonis et thoracis affectibus præsertim ex empiemate & ptisi, & ex omnibus diuturnis inflammationibus nobiliores partes occupantibus &c. lege locum fufius. De reliquis lege Auic. 4. can. tra. 3. cap. 1. ibi, fiunt etiam ab alijs &c.

De indicatijs febris hæcticæ.

Februm hæcticarum duo sunt propria indicia, primum quod a principio usque ad finem sunt æquales, nec accessionem nec augmentum nec uigorem, nec remissionem habent. 2. quod æger non se febricitare percipit. Reliqua signa sumuntur partim a calore, si quidem a comestione calor crescit, item in primo tactu cæteris ardentibus febribus est suauior sed in processu fortior & magis erodens, item pulsus est durus frequens debilis fixus partim ab ipso corpore mutato, nam oculi sunt concaui flos uitalis coloris extinctus adsunt uigiliæ corpus extenuatur, in urina apparet quedam supernatans unctuositas cutis fit arida squalida, hæc febris si aliqua a læsione membrorum incipiat, ab eorum arida intemperie ex qua siccitas notabilis prouenit, facile deprehendes &c.

Loci consentientes de indicatijs febris hæcticæ.

Gal. lib. 3. de præfag. puls. cap. de arteria cordis, Febriū hæcticarum duo hæc sunt propria signa ut si perpetuo sibi illæ similes sint, nec inuasionem ullam accessionis nec incremen-



mentum nec uigorem nec remissionem habeant, nec se febricitare percipiat aeger & c. lege Gal. 1. de diff. feb. cap. 9. abunde enim de his signis pertractat, ibi adest oculi concavitas amisso eorum liquore, flos uitalis coloris extinctus, in tota cute squalitas immoderata palpebrae dormitantiis similes etc. lege tu fusius. Auic. 4. can. cap. 2. tract. 3. sumit indicia a pulsu a tactu a cibis, nam pulsus inquit est durus frequens debilis fixus & sic de reliquis. Alex. lib. 5. cap. 22. seorsum de omnibus signis pertractat, quomodo. s. hectica a diaria putrida; distet, & quomodo hectica in marasimū transeat, lege eum si lubeat uide etiam Auicem. de signis adubul & c.

#### De curatione hecticae.

Duplici scopo hecticam curabis quorum alter sit ad sex res non naturales, Alter ad medicinalia primus fiet, si aer in aestate declinet ad frigidum, si uictus sit humidus & frigidus plus tamen humectans quam infrigidans, qualis est ptisana hordei, carnes hœdi perdicum caponū qui ex amylo & frumento nutriti sint, pisces petrosi, cancri fluuiatiles, testudines nemorales, limaciae & ranæ oua sorbilia caseus recens, potus sit aqua hordeacea uel uinum album olygophoron, absint motus uigiliae superflua repletio & ieiunium, sit uictus ratio paulo plenior quam tenuior ob morbi longitudinē gaudeat aeger & letetur. Circa medicinalia quattuor opus sunt intentiones, prima sit in remouenda causa hectica, unde si fuerit causa ulcus in pulmone primo remoueatul ulcus non neglecta tamen hectica cura. Si causa fuerit tristitia inducendo letitiam auferetur. 2. intentio respicit febrem quatenus febrē hecticam & tūc infrigidatio & humectatio tam per interiora q̄ per exteriora competunt, sicuti est aqua hordeacea cum cancris fluuiialibus decocta syr. uiol. de papauere de Iuiubis, Item electuaria resumptiua ueluti quodam a Gordonio & a



Francisco Pedemontio extat descriptum. Valet etiam lac asinum & muliebre, modo asina & mulier ex rebus frigidis & humidis nutriantur & dosi erit iuxta Auicennae placitum a. 3. 10. usq; ad. 23. & communiter ab omnijs tribus usq; ad quatuor, uerum lac præbendum non est, quoniam post eius assumptionem sitis & difficultas spirandi et caloris recepti, augeri uideantur, uel ubi febris putrida hectica coniuncta sit. Extrinsecus uero conueniunt unguenta ex oleo uiolaceo nenupharino, ceratum a Francisco Pedemontio descriptum & epithema facultate frigidum sed actu tepidum. 3. Intentio est eorum remotio quæ cum febre hectica copulatur, in quorum numero quæ febris putrida adsit, tunc euacuatio non ratione hectica quæ est immaterialis, sed ratione putridæ ex qua superflua plurima aggregantur, conuenit, sit tamen pharmacum non ualde soluens tum propter uirtutis imbecillitatem, tum quia periculum esset de maxima exiccatione quæ proculdubio fugienda sunt, sed eius loco pharmaco leni ac lenitiuo utamur. Ultima intentio est symptomatum correctio et sunt syncopis tussis et fluxus uentris, syncopis tollitur cum aqua carnis, uino granatorum uitellis ouorum et uino odorifero, irroretur etiam facies ex aqua ros. mosch. Fluxus uentris ac ipsa tussis emendantur ac dictum est supra pro quibus recurre ad sua capita.

Loci consentientes de cura hectica.

De prima intentione loquitur Gal. 10. meth. cap. 2. ibi, nutrimentum oportet esse humidum & frigidum quod hectici febribus sit conducturum ut ptisanæ cremor frigidus etc. Vide Paul. li. 2. cap. 22. Auerois. 2. collig. inquit quod magis humectatio ne indiget æger quam refrigeratione & c. De secunda intentione Gal. in art. par. inquit uniuscuiusque causam prius abscondere oportet deinde ad eam quæ ex ea facta est ægritudinem deuenire. Auic. 4. can. tract. 3. cap. 4. intentio curandi febrem



hecticam est in frigidatio & humectatio & c. Itidem ait Aet. ser. 5. cap. 93. ibi scopus curationis in humectantibus & refrigerantibus consistit.

De exhibendo lacte lege Gale. 10. meth. cap. 2. Item Pau. li. 2. cap. 22. & inuenies modum exhibendi & c. De balneo similiter lege Gal. 10. meth. c. 10. & Auic. loc. cit. & Aet. ser. 5. c. 93.

#### Observationes circa curam.

Auic. loc. cit. caue tamen in his frigidis ob caloris eorum imbecillitatem, ne multum in gradu extollantur, alioqui calor eorum suffocaretur.

#### De pronosticis hecticæ.

Hip. aph. 2. aphor. 28. Febricitantium non omnino leuiter permanere corpus, & non minui, uel etiam plus quam ratio exposulat contabescere malum, hoc enim morbi longitudinem, hoc uero imbecillitatem significat. Gal. 1. de diff. feb. ca. 8. ubi iam febris hectica exquisitè consistit, & iam dudum incepit, non modo eandem curare est difficile, sed etiam impossibile. Auic. 4. can. tract. 3. ca. 1. hectica est in principio rei difficilis cognitionis & facilis curationis, & finis aduul non penitus recipit curationem. B. difficilis est cognitionis quia parum uel nihil à sua naturali dispositione corpus permutatur, idcirco postea curatur quoniam uirtutis robur uehementem tollat refrigerationem, at quum  $\mu\alpha\rho\alpha\sigma\mu\omicron\delta\eta$  efficitur, in eius curatione frustantur medici, tum ob nimiam consumptionem tum ob eorum imbecillimam uirtutem.

#### Authores dissentientes circa hecticam febrem.

1. Adserere, hecticam febrem posse absq; alia febre per se incipere.
2. Adserere, in hectica febre fieri mutationem ex spetie in aliam spetiem.
3. Adserere, cibum non esse causam quur in hectica magis



calor appareat, &c.

Confutatio dissentientium circa febrem  
hecticam.

Ad primum, inquit Auic. 4. can. tract. 3. cap. 1. q. longinquū est ut accidat hectica incipiendo, & posse membra radicalia inflammari, quin prius humores & spiritus non inflammentur, & sic non posse per se incipere nisi ab alia urgente causa dependeat &c. Ad secundum Arcul. inquit non esse dicendum eundem calorem numero, & æque intensum migrare de spetie in spetiem sicuti patet in exemplo Auic. Nam flamma accensa in lychnio primum absomit oleum in lucerna positum, deinde oleum lychnio imbibitum, demum humiditatē coti & sic non migrat de spetie in spetiem. Ad tertiū, respondet Gal. 1. de diff. feb. quod caliditas arida, humido irrorata magis manifestatur eo q. aliquam partem cibi tenuem in vapores conuertat, uel si magis placet opinio Auerois, eo quod caliditas febrilis quæ non sentiebatur per cibum assumptum, mutatur ex non sensu ad sensum apparentem & sic causa efficitur ut calor magis appareat, &c.

De febrium putridarum diuisione & numero.

Recitat Gal. 2. meth. cap. 7. q. tres sunt febrium diuisiones ex humorū putredine ortæ. prima ex eo q. causæ ipsius putredinis adsunt, uel non adsunt. 2. ex eo q. per totum animal aut eius partem aliquam est diffusa putredo. 3. quatenus cū phlegmone est aut citra hanc. Enumerat deinde in lib. contra lycum has esse febres putridas quæ numero sunt nouem, ut ardens lypiria, hepiala, typhodes pestilentes semitertiana quotidiana tertiana quartana, de quibus seorsum tractabimus &c.

De putredinis definitione.

Putredo iuxta medicorum opinionem, est corruptio humoribus contingens propter ebullitionē extranei caloris etc.



Loci consentientes de putredinis definitione.

Gal. 2. meth. cap. 8. putredo est mutatio totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptellam a calido externo.

Arist. 4. meth. putredo est corruptio propriæ caliditatis ab aliena caliditate in unoquoque humido. B. non mirum quum familiaris & nativa caliditas concoctionem adiuuat, externa uero corrumpit lege Aet. ser. 5. cap. 74.

De causis putredinis.

Duplex est causa putredinis, altera ipsam complens, altera præparans. Complens si intrinseca fuerit tunc est respirationis priuatio, quæ a multo crasso ac uiscido humore meatus conspiciuntur, fiet. Si extrinseca tunc erit ab aeris mutatione. Causa præparatoria erit ueluti cibus, qui male per suam substantiam, qualitatem, tempus, ordinem & artificium disponitur, nam substantia eius uel est nimis uiscosa ut anguilla, aut nimis humida ut fructus aut renuitur a natura, aut corruptibilis per se est ut lac. Qualitas in causa erit ubi cibus plurimæ humiditatis erit particeps. Tempus erit etiam causa præparatoria si cibus in tempore non opportuno sumatur. Ordo etiam erit causa ubi crassa & dura tenuibus in comedendo præponantur. Artificium si cibaria male parantur, at in genere loquendo, omnis putredo a calido et humido fieri potest etc.

Loci consentientes de causis putredinis.

De causis putredinis lege Auic. 4. can. tract. 2. cap. 1. ibi putredo fit a cibo ab obstructione, aere humore, ubi de cibo tanquam de causa præparatoria loquitur, lege eum fusius. Simile Aet. ser. 5. cap. 74. Et Gal. 2. de cau. morb. cap. 8. ibi putredinem inducunt aut medicamenta quæ suapte natura putrefacere possunt, aut excrementa in ipso animali genita, aut ea quæ transpirationem impediunt. Hip. 3. epidim. a calido & humido putredinem fieri dixit, nam si annus inquit calidus & hu-



midus fuerit necesse est ut magna pestilentia succedat. Vide de hac re Gale. 1. de temper. cap. 4. Item de inaequali intemperie c. 4. & 7. ibi non tantum quae inculcata sunt & prospiratu prohibita, sed & putrescunt alia multa & c. Vide etiam Gale. 2. meth. cap. 8. & c. De ratione diuersitatis februm.

Putredo est aut in uno solo membro tantum, unde aliquis abscessus orietur, & hoc uel ratione imbecillitatis membri, uel eius uehementis caloris, uel eius doloris & c. Aut erit in totius corporis ambitu diffusa, quae si a maximis uenis ad minimas transierit fiet febris continua, si uero extra uenas in omnes corporis meatus distribuatur, tunc erit interpollata. Causa interpollationis est triplex, prima quia humor uelociter uel tarde putrescit. 2. quia humor uelociter uel tarde in loco putredinis colligitur. 3. quia humor uelociter uel tarde a putredine expurgatur. Pituita igitur quotidianam facit ex eo quod uelocius ob sui humiditatem ad putredinem mouetur, aut citius ob sui quantitatem colligitur, cuius accessio durat horas. 17. Quartana ratione suae siccitatis duos dies interponens tarde putrescit & ratione suae paucitatis tarde colligitur. Tertianam uero inter has seruat medium, unde si fuerit pura durat. 12. horis, sicuti quartana si fuerit a naturali melancholia durat horas. 19. Et pro eius quiete assignantur horae. 48. Et in quotidiana sex, & in tertiana. 24.

Loci consentientes de ratione diuersitatis februm.

Auicenna. 4. can. 2. tract. capitulo primo dupliciter uariatur putredo, uel ratione humorum putrescentium aut ratione loci, quia quandoque est in uno solum membro, quod quadriariam contingit, uel ratione suae imbecillitatis, uel ratione uehementis eius loci caliditatis, uel ratione acuitatis & doloris, & c.

Gal. 2. de diff. feb. c. 2. Rationem reddit quare febres inter-



pollatæ quæ ue conclusæ sint, quam quum in longam orationem protrahat ad illud caput te conferes. Vide etiã. 2. de crisisibus cap. 3. quanquam uberius de his pertractet Auic. & c.

De signis febrium putridarum in genere.

Indicia febrium putridarum propria sunt quia nulla antecedit causa procatactica, incipiunt cum rigore horrore, sed non omnes, adest inæqualitas pulsuum, calor mordax atque tactui molestus. Sed proprium ac inseperabile est indicium pulsuum systole uelocitas & urinarum cruditas debilisq; concoctio, præcedit etiam primum morbi insultum lassitudo pigritia somnolentia, uigiliæ, spirandi difficultas, uenarum tensio, sitis, dolor capitis, inquietudo, periodus cum sudore terminatur, & c.

Loci consentientes de signis febrium putridarum.

De his indicijs loquutus est Galen. satis uberius primo de diff. febr. cap. 7. ibi indicia febrium quæ humorum ratione accenduntur, hæc sunt, primum non inseperabile sed proprium est q. nulla ex causis procatacticis ipsas antecedit, initiũ sumere a rigore proprium est putridarum sed non inseperabile signum & c. lege locum fusius, & plura ad hanc rem facientia inuenies lege insuper Paul. li. 2. cap. 2. Et Auic. 4. can. c. 2. ibi, ut plurimum antecedit al mellilotu cui associatur lassitudo pigritia alices saltus commotio somni uigiliæ anhelitus constrictio uenarum tensio & c.

De cura febrium putridarum in genere.

Morbus quatenus morbus per sui cōtrarium auferri exposcit febris est morbus igitur per sui contrarium tollenda erit, sed hæc febris minime tolli potest, ni prius putredo a qua dependet, inhibeatur, quæ nec causa manente inhiberi potest, igitur primum erit remouenda putredinis causa, mox ipsa febris sanabitur. Causa putredinis erat transpirationis



prohibitio quæ uario modo oriri solet, nam aut a densatis exiguis meatibus & constrictis corporibus fiet, aut ab humorum abundantia aut a crassitie et lentore, quæ singulæ affectiones per sua contraria remouebuntur, ut densitas per rarefacientia, constrictio per dilatantia, crassities per incidentia, lentor per detergentia, & si totum corpus iam singula dictorum occupauerint etiam toti corpori per contraria est occurrendum. Sed quia febris est morbus de repletionem, idcirco etiam euacuari desiderat, euacuabitur manu & pharmaco, manu per sectionem uenæ, cucurbitulas hirudines et frictiones, pharmaco expurgante per inferiora aut superiora per urinam & sudorem. Demum symptomatibus complicitis succurrendum, & norma uiuendi instruenda erit & c.

Loci consentientes de cura febrium putridarum in genere.

Gal. 2. meth. cap. 4. & 5. febris sanari non potest, nisi inhibita prius putredo sit, porro ea inhiberi, causa manente non potest, quare submouenda eius causa erit si modo & c. lege eū fusius, & habebis quæcunque dicta sunt licet sub alijs uerbis & c. lege etiam Auic. 4. can. 2. tra. cap. 7. ibi, scias quod intentio in medicando has febres, quandoq; uertitur ad partem febris, quare est in frigidare & humedare, interdum ad materie partem & c. De uictu lege fusius in lib. 1. ubi omnes aph. fere ad propositum accommodauimus.

De febre tertiana pura.

Febris tertiana pura, est interpollata febris, a flaua bile pura ac tenui putrescente orta, cuius est de tertio in tertium agrum affligere, secundum naturam humoris propriam, & in 7. periodis uel ante iudicatur.

Loci consentientes de febre tertiana pura.

Gal. 2. de diff. febr. cap. 3. febris tertiana exquisita est quæ



per sensibiles corporis partes delata oritur, cum rigore inuadens atq; ardentis febris similitudinem gerens & bilis uomitibus aut deiectionibus, aut sudoribus, uel ex horum quibusdā uel omnibus soluitur, cuius accessio duodecim ad summū horarum æquinoctialium spatium finitur. Hip. aph. 4. aph. 59. Tertianā exquisita in septenis circuitibus quod tempus longissimum est, iudicatur. De causis febris tertianæ puræ.

Febres tertianæ puræ fiunt a flaua bile putrefacta ac mota & ex uasa lata præsertim in consistentium ætate biliosissima, tempore æstiuo, in regione calida & sicca, & in ijs præcipue qui laboribus uigilijs & solis ardore, & cibis calidis & siccis aut immodico pharmacorum calidorū ac exiccantium usu, curis, & similibus usi fuerunt, & c.

Loci consentientes de causis febris tertianæ puræ.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 3. febris hæc a flaua bile per sensibiles corporis partes delata oritur. Et in. 1. cap. eiusdem libr. tertianæ fiunt ab amara bile, & plerunq; in corporibus quorum naturalis habitus ad bilem accedit, in consistentiū ætate biliosissima tempore æstiuo & cæ. B. Nota q; tres sunt febres biliosæ iuxta Auic. placitum tertiana s. continua, tertiana periodica & causon. periodica rursus diuiditur. nam aut est pura, aut spuria, pura quæ a pura bile cui nullus alter humor admiscetur, oriri solet, lege de his causis Aet. ser. 5. cap. 79. Itē Gal. 2. de cris. cap. 3. Item oribas. apho. 4. com. 59. & intelliges febrem interpollatam extra uasa putrefieri, lege etiam Aui. 4. can. cap. 35. Et Gal. 4. aph. com. 59. & c.

De signis febris tertianæ.

Sex sunt ex quibus indicia febris tertianæ sumuntur, primum a modo rigoris ut incipiat cum horrore et rigore difficili ita ut pungi ac uulnerari cutis uideatur. 2. ab urina & sudore, nam sudor per totum corpus apparet in paroxysmi re-



cessu, urinaq; fit rubra ac ueluti ignea. 3. a caloris qualitate, ut sit caufonis calore suauior ac minus mordens æqualis tamen quaq; uersus, qui primo acris uideatur, sed paulo post a manu remanente uincitur. 4. ab ipsis symptomatibus unde sitis quæ hominem exurit, & uigiliæ adsunt sine capitis grauitate. 5. a pulsu, qui est uelox magnus non æqualis in diastoli & systoli. 6. sumitur ab ætate regione tempore, & a multitudine euentus tertianarum, & ad infebricitationem desinit. Signa quibus tertiana exquisita a spuria differat, sunt quatuor, primum q; eius accessio non transcendit duodecim horas. 2. exquisita tertiana in septenis circuitibus iudicatur. 3. incipit cum rigore breui & intenso & terminatur cum sudore exuberante. 4. quia in prima uel. 4. uel. 7. uidetur urinae coctio, quod in spuria nequaquam.

Loci consentientes de signis febris tertianæ.

Gal. 2. de cris. cap. 3. febris tertiana cognoscitur quia æqualem & liberam celebritatem habet, neq; ullum adest inflamationis signum, sitim muehit, hominem exurit, in uigore consistit calor æqualis est quaq; uersus, post potū plurimus uapor per cutē exhalat sudoris nūtiū, uomitus bilis adest, uēter soluitur, & biliosum mingunt. sudor apparet uaporosus calidus per totum corpus æqualiter sudans, pulsus uelox magnus ad infebricitationem desinit & accessionis tempus ultra. 12. horas non se extendit, sæpius septem horas interdum citius & tardius, incipit cū rigore etc. De indicatijs p quæ distinguitur a spuria tertiana lege Aui. 4. can. ca. 37. tra. 2. Oribas. aph. 4. cō. 59. Sex modis cognoscitur exquisita tertiana, nēpe, materia, natura, tempore, regione, copia ciborum & temperie, &c. Gale. 2. de diff. feb. enumerat de tertio in tertium accessionem breue tempus cum rigore inuadens & per sudores & bilis uomitum & excrementa biliosa &c. lege Paul. lib. 2. cap. 13.



## De cura febris tertianæ puræ.

In cura febris tertianæ puræ sex opus sunt intentiones, quarum prima uersatur circa regimen sex rerum non naturalium 2. erit lenitio uentris ac materiæ in contrarium alteratio. 3. erit euacuatio. 4. urinæ uel sudoris prouocatio. 5. caloris remanentis alteratio & membrorum roboratio. 6. accidentium correctio. Regimen contrarias omnino qualitates requirit, unde aer sit frigidus & humidus, sicuti & cibi humectare & refrigerare habent. ut ex oleribus attriplex blitum lapathum lactuca endiuiā cucurbita cremor ptisanæ & sorbitiones alicæ aqua hordeacea. Caueant a melle sinapi salitis & omnibus acris, item a uinis præcipue uetustis, ubi uero morbus concoqui coeperit dandum est uinū tenue aquosum, quum uero morbus soluitur liberius exhibendū. 2. intentio est uentris lubricatio et materiæ alteratio, prima fiet cum clysteribus ex casia rhodomelle & oleo uiolato, uel cū casia simplicis bolo & c. Alteratio materiæ per refrigerantia & humectantia ut cum syr. de endiuiā ros. uiol. de agresta de suc. acet. Acetoso simplici cum aquis endiuiā uiol. etc. 3. f. euacuatio fiet per sectionem uenæ si sub forma antecedentis causæ materia fuerit sāguini admixta, aut in futuro de admiscenda timeatur, quæ si a sanguine fuerit seperata, tunc fiet per pharmaca soluentia sicuti cum rheub cum casia diacatholicon electuario de suc. ros. & c. 4. eliciet sudorem & urinam non rebus calidis, sed potius id ualentibus frigidis sicuti cum acetoso simp. cum emulsione. f. communium frig. in aquis endiuiæ acetosæ, aut cum balneis temperatis boni odoris. 5. erit caloris derelicti alteratio ac laxorum membrorum roboratio. Relaxantur enim membra tum ob imbecillitatem ex resolutione spirituum acquisitam, tum ex calore febrili & euacuationibus tam naturalis, quam artificialiter factis, his igitur



tur succurritur cum rebus frigidis roborantibus sicut cū tro.  
de camphora sy. ros. aut cum triasandalis, diarhodone abb.  
zucharo ros. uel cum epithematetum cordi tum hepati appli-  
cito. & remouet accidentia quæ huic feбри contingere solent  
sicut sunt sitis, uigilia, dolor capitis & asperitas linguæ. Sitis  
tollitur cum collutione oris multifariam parata sicuti cum a-  
quis endiuia acetosæ cum uino granatorum, & omphacio  
addito zucharo uel cum electuarijs de uino granatorum aut  
cum mucilagine psyllij in syndone rara inuoluto ac in aqua  
immerso. Vigilia remouentur cum ung. populeone addita ca-  
sia odorata opio, & croco aut cum lotionibus ex rebus so-  
mniferis etc. Dolor capitis tollitur cum cucurbitulis frictio-  
nibus cum oxyrhodino & puluere capituli frig. &c.

Loci consentientes de cura febris tertianæ puræ.

De prima intentione loquitur Gal. 1. ad glauc. c. 9. ibi, sem-  
per oportet contrarias qualitates illis, quæ præternaturam  
inuauerint, opponere, quum hoc multo plus iuuat q̄ quomo-  
dolibet euacuare, & paulo post cibi humectantes & refrige-  
rantes omnes exquisitis tertianis sunt utiles, quantitas tanta  
sit ut concoqui possit, ex oleribus sint attriplex blitum lapa-  
thum malua lactuca & cucurbita, & ex alijs ptisanæ succus  
& alicæ sorbitiones ex piscibus saxatiles, ex uolatilibus quæ  
mollibus constant carnibus. Item testiculi gallorum & suum  
pedes & cerebella. Item ouorum sorbiliun uitelli, quia hi fa-  
cilius q̄ pars alba concoquuntur &c. lege locum fusius & no-  
ta prædictam uictus rationem tantum delitiosis esse exhiben-  
dam, robustis uero, qualem nobis monstrauit Hip. s. tenuē &c.  
lege Paul. lib. 2. cap. 19. Et Auic. 4. can. cap. 39. De secunda in-  
tentione loquitur Gal. & similiter de tertia, primo ad glauc.  
cap. 9. ibi, exquisitam tertianam quæ ex flaua bile commota  
inualescit quam maxime fieri potest refrigerare oportet &



humefcare etc. De cæteris uero intentionibus lege iuxta Aui. loc. cit. ubi enumerat lenientia pharmaca, & commendat fieri phlebotomiam quando est possibile, deinde materie adæquationem cum syr. acetoso, & euacuationem, demum resoluentia & c. lege eum fusius.

#### Observationes circa uictum.

Aui. loc. cit. Et non cibus nisi apud has cōditiones prima nisi alius primum soluta sit. 2. q̄ prior cibus sit concoctus ante paroxysmi aduentum. 3. non exhibeatur cibus nisi in tempore quietis sicut in declinatione si possibile est. 4. quotiēs ad statum properatur tunc uictū magis attenuare oportet, & c.

#### De pronosticis febris tertianæ.

Gal. 1. ad glauc. cap. 8. Exquisita tertiana septem circuitibus iudicatur, & præter id etiam minime periculosa. B. Nota quod in febribus intermittentibus annumerantur tantum accessiones & non dies, unde in tertiana septem circuitus, 24. dies referunt, in quibus etiam alij acuti morbi finiuntur, uide apho. 4. comm. 59.

Hip. apho. 4. aph. 36. sudores febricitanti si inceperint, boni tertio die. 5. 7. 9. 11. 12. 17. 20. 27. 34. hi enim sudores indicant morbos qui uero non ita fiunt, laborem significant & morbi longitudinem & recidiuam. Gal. 3. de cris. cap. 3. Tertiana uomitibus & excrementis biliosis & sudoribus toto corpore fluentibus finiri debet, quia tumor tenuissimus, si modo ascendit uomitum irritat, si descendit aluum mouet. si ad meatum cutis sudorem copiosum ob sui tenuitatem elicit & c.

Aui. 4. can. cap. 37. Et quandoque consumitur in uno paroxysmo ob sue materie tenuitatem & c. B. Gal. 2. de dif. feb. cap. 3. quatuor causas breuitatis enumerat quæ sunt humoris quantitas, qualitas, laborantis uigor, & corporis dispositio, ut exempli gratia si cum pauca quantitate humoris & tenui  
eius



eius qualitate, uigor cum rara dispositione corporis maior fuerit, tunc morbus erit brevis, sed si multa bilis crassa uigoris imbecillitas & densa corporis dispositio simul fuerint, tunc morbus erit ualde longus &c.

#### De febre tertiana notha siue spuria.

Gal. 2. de diff feb. cap. 8. Enumerans signa exquisitæ tertianæ inquit, quibus uero aliquid horum deficit, hæc nō amplius exquisitæ, sed simpliciter tertianæ nuncupantur, maxime si intermissionem *μικροτεραν*. i. breuiorem habuerint, accessione uidelicet in longius tempus protracta, et notat quatuor huius febris differentias, prima uocatur simpliciter extensa, quæ ad 24. horas extenditur. 2. paululum extensa, & durat usq; ad horas 30. Tertia dicitur amplius extensa, & durat usque ad horas 36. Quarta uocatur plurimum extensa & durat usq; ad 40. & plures horas, ita ut quotiens magis a pura siue exquisita distabit, toties magis notha siue spuria siue extensa nuncupabitur &c. Similis sensus est. 1. ad glauc. ca. 8.

#### De causis febris tertianæ nothæ.

Causa ut plurimum est crassabilis putrefacta, interdum bilis cum pituita admixta & unita &c.

#### Loci consentientes de causis tertianæ nothæ.

De causis lege Auic. 4. can. 2. tract. cap. 35. ibi, Tertiana nō pura fit à putredine bilis crassæ substantiæ, ob commixtionē bilis cum phlegmate commixtione complexionali unita etc. B. Intellege ita humores misceri, ac si ab utroq; una forma perueniret, & in hoc ab emitriteo differt, qui a duabus inuicem distinctis formis efficitur. Et nota q. Gal. facit differentiam inter duas tertianas et duplicem tertianam, nam duplicis tertianæ causa, ab una tantum minera provenit, sed duarum tertianarum causa a duabus mineris loco distinctis efficitur. De signis febris tertianæ nothæ.



Signa sunt sex grauitas capitis cum dolore tensiuo. 2. Accessio durat ob humoris crassitiem usq; ad 24. uel 30. horas, & tepor eius usq; ad 48. Tertium non apparet concoctionis uestigium sed urina est cruda. Quartum non extenuatur corpus sicuti in tertiana simplici. Quintum nec cum sudore desinit, nec rigorem interdum habet, nec adest caliditas acris & mordax. 6. Nulla adsunt seua accidentia ac dictum est in simplici tertiana, & idem accessionis tempus semper est.

Loci consentientes de signis tertianæ.

De his signis lege Auic. 4. can. 2. tract. cap 37. ibi, in nō pra tertiana adest grauitas capitis cum dolore extensiuo duratq; paroxysmus usq; ad 24. horas uel 30. usq; ad declinationem, & tunc tepescit donec compleantur. 48. horæ & c. lege eum fusuus. Gale. 1. ad glauc. cap 8. ex historia adolescentis omnia signa huius febris monstrauit inquiens urina cruda admodum, febris incidit cum horrore, quæ neq; in caliditate, neq; in pulsibus exquisitæ tertianæ est similis, accessio durat ab aurora tertiæ diei usq; ad auroram quartæ & semper idem accessionis tempus, lege hunc locum uberius. Et nota quod non idem accessionis tempus semper est, nisi materia crassa bili dominetur & c.

De cura febris tertianæ nothæ.

Curandi intēctiones tot erunt quot dictæ sunt in febre tertiana simplici. uersatur igitur prima circa regimen sex rerū non naturalium, unde uicinus in primis non quotidie sed alternis diebus in tempore quietis exhibendus erit, qui non adeo infrigidet et humectet, ut in tertiana simplici, sed aliquatenus calefaciat incidat & abstergat, sitq; nō tenuis adeo sed paulo crassior quam dictum est. Cæteræ uero res nō naturales eadem fere qualitate fac ut polleant. 2. quæ est uentris lenitio ac materiæ preparatio efficietur primo clysteribus ex cassia hic



ra picra oleo camomillino & sale paratis. Similiter præparatio materiæ cum syr. acet. simp. rhodomelle syr. de duabus rad. bisianthino cum aquis & decoctis cicorij boraginis fœniculi & c. 3. erit euacuatio quæ peccante materia cum sanguine fiet per sectionem uenæ aut corpore existente plethorico, quod ubi a sanguine sepe ratam cognoueris, tunc uomitu uel pharmaco solutiue euacuabis ut puta cū infusione rheu. agarici, aut cum diaphinicone & casia & c. 4. erit urinæ & sudoris prouocatio, quæ cum hordei decocto uel petrosilini apij cicorij & c. perficietur. 5. erit membrorum quæ laxa sunt roboratio & fit cum troc. de ros. de eupatorio aut aromatico ros. Extrinsecus cum oleo de mastice de spica de menta de absinthio aut cum fotu ex camomilla absinthio menta, addendo semper aliquid uini odoriferi & c. Vltima intentio est quorundam symptomatum remotio, quæ sunt in appetentia & somnus profundus, incitatur appetitus cum capparibus conditis in aceto aut cum diacitonite cum zuccharo aut in unctionibus superscriptis & c. Somnus etiam remouetur cum aceto calido ut refert Auic. cap. de subet aut cum lotionibus, & cum his similibus quæ ægrum expergisci possunt.

Loci consentientes de cura febris tertianæ nothæ.

Gal. 1. ad glauc. cap. 10. Non oportet cibum quotidie exhiberi sed alternis diebus, uictus ratio non sit quæ humectet & refrigeret uniuersum corpus qualis in exquisitis tertianis exhibetur, sed aliquem modum sumat ad calefaciendū & incendiendū & c. Post uictum, sectionem uenæ commendat, ibi, q̄ si sanguinem mittere oporteat, neq; hoc omittendum, sed ab initio statim faciendum. laudat etiam humorum præparationem ex hissopo origano spica nardi cum mulsâ decoctis, & post septimum coma absinthij danda est cum oxymelle, solutionem deinde cum his quæ molliter uentrem subducūt & c.



Paul. lib. 2. cap. 20. uomitus post cibum, ijs utilissimus est, quibus hæc febris in uetustatem incidit, similiter Auic. & Razes. 17. conti. Auic. 4. can. 2. tract. cap. 40. Et quum uideris urinas eorum crassas tunc phlebotoma & post hæc adiuuantia ad digestionem sunt syr acetosus & c. quæcunq; a me dicta sunt de alijs intentionibus, ipse uberius pertractat. Notamen ex Halyabb. non concedi in principio huius morbi pharmacum electiuum, nisi materia turgeat, quanquam iuxta Manardum in epistola ad Charandinum uideatur legi cōtrarium, immo uix inuenies Gal. in omni febre absq; concoctione humorum pharmacum solutiuum exhibere, sed in alijs a febre morbis, paucos inuenies quos per pharmacum non expurget, & c.

#### Observationes de humorum concoctione.

Gal. 1. ad glauc. cap. 10. ab initio statim uitanda quæ nimis exiccant & calefaciunt & c.

#### Observationes circa pharmaca solutiua.

Auic. 4. can. & Arcul. raro & tarde solutiuum exhibendum est, alioqui si importuna fuerit euacuatio, tunc tenues tantum exoluentur & crassæ partes remanebunt & c.

#### De pronosticis febris tertianæ nothæ.

Auic. 4. can. cap. 35. Hæc quidem non pura quandoq; prolongatur tempore longo & circiter medietatem anni, et quandoq; perducit ad mollitiem & magnitudinem splenis Gale. 1. ad glauc. c. 8. uidi quandoq; quum in autumno incepisset in uere desisse, tum quia ager medici præceptis non paruisset, tum quia lusus ex hyeme esset, lien intumuit, præcordia flatibus fuerat oppleta, & iam sub tumida quædã aderat in facie decoloratio, & præsertim circa crura adeo ut de adolescente dubitare nobis cōtigerit etc. B. Prorogationis febrium causa Gal. teste. 2. pronost. com. 25. est triplex, prima fit propter ali



quam partē affectam curatu difficilē. 2. fit propter humores crassos crudos incoctosq; 3. propter aliquod circa agrū commissum, idcirco dicebat Aui. in morbo lōgo resupinetur ager & crura curuentur, & tangantur eius uiscera et uideatur si qua parte corpus tumuerit etc. Hip aph. 4. apho. 29. Quibuscunq; in febribus sexto die rigores fiūt difficile iudicium sequitur. Et aph. 4. aph. 43. febres quacunq; non intermittentes tertia die fortiores fiūt magis periculose, quocunq; modo intermisserint periculū abesse significatur. Et aph. 4. aph. 44. quibus febres lōgæ his tubercula uel labores in articulis fiūt. Et aph. 4. aph. 45. quibus tubercula uel in articulis labores ex longis febribus fiunt, ij pluribus utuntur cibis. Et aphor. 46. eiusdem si rigor incidat febre non deficiente, agro iam debili, lethale & c. lege Galen. commen.

Authores dissentientes circa febres tertianas.

1. Adserere, tertianam febrem cognosci posse per accessionem tantum de tertio in tertium.
2. Adserere, solum humori putrido digestionem conuenire.
3. Adserere, omnes fructus nocere febricitantibus cum Auic.
4. Adserere, nullum in febribus uinum esse concedendum.

Confutatio dissentientium circa febres tertianas.

Ad primū, rīdet Auic. 4. can. 2. t. c. 36. q. qui considerat tertianā per paroxysmū errat in ea, sed oportet ut attendat ad significationes alias. Hac etiā de re à Gal. irridetur thessallus, qui diatritū in cognoscēdo tertianā expectabat, & hoc. 2. de cris c. 3. Ad 2. dicit Gal. 1. de uic. in mor. ac ubi loquitur de ptisana hordeacea, q. nullo modo humori putrido cōuenit digestio, quū nec ad benignitatē humor reduci possit, sed cōtinuo euaporans humidū, quoddā cineritiū permaneat, nisi hoc forte acciderit in continuis febribus, quia tunc humor putridus digeri debet, quū tota materia putrescere incipiat. Ad tertius



dicimus propositionem esse ueram, modo de his omnibus fructibus intelligatur, qui sua humiditate ad corruptionem sunt proni, sed quum multi sint qui sua humiditate corruptioni resistent, ut granata mala citria prunæ &c. Idcirco in febribus conceduntur, quum magis per suam frigiditatem inuent quam per humiditatem putrescibilem noceant. Ad quartum, Gal. 3. de uic. in mor. ac com. 8. uinū inquit aquosum maxime febrientibus est idoneum, & id est quod album est colore & substantia tenui nullam eorum quæ in cæteris uinis insunt, habens qualitatem, nec austeritatem nec adstringentiam nec dulcedinem, nec acrimoniam, nec odorem, & quod in Italia imbecillum est sabinum, quod febrientibus administrant, & quod reperiri potest tale uinum in asia cilicia phenicia Palestina scyro & creta, unde si multa reperiuntur in Italia Asia bethinia nil mirum, immo quod plus est miratur quur nihil tactum sit de hoc uino ab Hip. quum febrientibus plus quàm cætera omnia sit iocundius &c.

#### De febre quotidiana simplici.

Quotidiana est febris intermittens a pituita extra uenas putrefacta proueniens cuius est ægrum quotidie per sex horas cum falsa quiete dimittere, uocatur etiam alio nomine amphimerina.

#### Loci consentientes de febre quotidiana.

Gal. 2. de diff. feb. ca. 4. febris quotidiana exquisita est quæ ex pituitæ putredine ortum habet, per sentientes corporis partes a natura detrusa &c. lege etiam cap. 7. huius lib.

#### De causis febris quotidianæ simpl.

Causæ præcedentes sunt temperaturæ humidiores anniq; tempora, quies, otium, repletio balnea statim a cibo. Causæ antecedentes & coniunctæ sunt ipsa pituita, quæ quū sit quadruplex acida, dulcis, salsa & uirrea quæ est acidæ qualitatis



particeps ita quatuor species siue differentias febriū efficiet.  
Loci contentientes de causis febris quotidianæ.

Gal. 1. ad glauc. cap. 7. fiunt hæc febres etatibus naturis anniq; statibus & temperaturis humidioribus &c. uide latius textum. Item Auic. ibi. fit febris humidis quietis senibus infantibus nauseatiua satietatem patientibus & balneatibus se super repletionem &c. Gal. 2. de diff. feb. ca. 1. sicut tertianæ a flaua bile ita quotidianæ a pituita fiunt. Et in lib. de plenit. tres species pituitæ enumerat, & 2. de diff. feb. cap. 64. esse dixit ut salsa acida dulcis uitrea quæ acide etiam qualitatis particeps dicitur. unde Auic. 4. can. 1. tract. cap. 47. quatuor species enumerat ibi & phlegma putridum, quandoque est uitreum quandoq; acetosum quandoq; dulce, quandoq; salsum. B. nota tamen si quæ sint aliæ species pituitæ per has quatuor intelligi, nam crudum & mucilaginose sub uitreo comprehenditur, sicut insipidum & aquosum sub dulci & ponticum sub acetoso. gypseum uero febrem non accendit, lege de his fusius lib. 1. cap. de humoribus.

#### De signis febris quotidianæ simpl.

Febris quotidiana cognoscitur, quia in primis diebus nullum habet uigorem, sed potius in progressu temporis refrigerationem quandam, ob humoris crassitiem. Pulsus fit inæqualis submersus debilis rarus, in principiis uero particularibus fit frequens, sed non adeo uelox nec uehemens nec magnus ut in tertiana sed rarus. Urina alba tenuis deinde fit rubra, nulla adest sitis, ni a pituita salsa aut ualde putrida fiant, sudor non apparet materia existente crassa. Os uentriculi et hepar male afficiuntur ob uim concoctoriam imbecilem. Præcordia ultra naturalem habitum intumescunt ob caloris imbecillitatem. Color etiam albus accidit hyberno tempore, & fit principium accessionis circa uesperam febris incipit fere



cum syncope & principium uniuersale durat. 18. diebus, & declinationem. 64. Calor huius febris in primo tactu est debilis uaporosus, sed dum mora fit in tangendo sentitur acris & mordax, si uero febris fiat a uitreo & acetoso phlegmate, multiplicatur ualde frigus & in uitreo rigor est uehementior, quæ uero fit a salsa pituita sequitur horror, & nõ fit uehemens frigus, quæ uero a dulci raro aduenit frigus uel rigor.

Loci consentientes de signis.

De his signis fusissime loquutus est Gal. 2. de cris. ca. 5. ibi febris quotidiana cognoscitur, quia non primo statim die cū rigore inuadit, sed processu temporis refrigerationes potius quàm rigores ipsis adueniunt, neq; in pulsibus seruatur ordo uel æqualitas dum accessiones fiunt, & c. lege locum hunc fusius, & intelliges iam a me pridem dicta.

Lege etiam Paul. lib. 2. cap. 23. Item Razen. 10. alm. Item Auic. 4. can. cap. 48. Item Gale. 2. de diff. feb. cap. 10. Et primo ad glauc. cap. 7. Vniuscuiusq; humoris pituitosi signa etiam diffuse habes ex Auic. loc. cit. Vide etiam Aet. ser. 5. cap. 85.

De cura febris quotidianæ.

Quibus intentionibus febrem pituitosam curabis, primo cum regimine sex rerum non naturalium. 2. cum humoris crassi incisione. 3. euacuatione. 4. cum urinæ prouocatione. 5. cū symptomatum remotione & membrorum roboratione. Prima intentio perficitur cum attenuantibus cibis & incisorijs ita ut in primis diebus tenuem exhibeamus uictū, sed in processu temporis crassiorem, et hoc in cura tentatiua. Sint itaq; cibi temperati ad aliqualem calorem uergentes ut panis contritus caro pulli borago fœniculus. Vinum interdum conceditur album & lymphatū, in alijs rebus non naturalibus non uniformis regula dari potest, quum inter salsam & crudam pituitam inter dulcem & acidam magna quippe adsit diffe-



rentia. 2. Intentio fiet. si primum aluum cum clysteri lenimus  
 deinde humorē crassum incidamus cum oxymelle simp. rho=  
 domelle, uel syr. de duabus rad. uel bisauthino cum aquis uel  
 decoctis cap. uen. fœniculi petrosellini apij. 3. intentio prapa=  
 rari poterit cum agarico troch. rheub. confectiōe de thurbit  
 diaphinicone el. indo & c. 4. intentio est quæ urinæ prorita=  
 tio multifariam fieri poterit tum cum puluere ex semine ur=  
 tice cuscute, tum cum decocto apij fœniculi, tum cum topicis  
 quæ adhiberi possunt. 5. intentio duo mala symptomata quæ  
 huic febrī coniungi solent, remouet, sicut est somnolētia quæ=  
 dam profunda in principio paroxysmi, et rigor ualde inten=  
 sus. Somnus remouetur cum aceto manibus admoto uel in an=  
 gulis oculorum posito. Rigor tollitur cum oleo rutæ, in quo  
 tandiu uinum creticum bullierit, donec consumptum uinum  
 amoueatur, facta in unctiōe ante rigoris aduentum circa to=  
 tam dorsi spinam. Roboratur etiam stomachus cum oleo ma=  
 stichino de spica de absinthio, aut intrinsecus cum aromatico  
 ros. diarhodone abb. & c.

#### Loci consentientes de cura febris quotidianæ.

De prima intentione loquitur Gal. 1. ad glauc. c. 12. ibi &  
 uniuersum totius uiclus caput sit ad iucidendum efficacius.

Auic. 4. can. c. 58. & fortasse contentus erit aqua hordei in  
 primis diebus dum speratur status propinquior, & nota q  
 instituitur uiclus tenuis, dum in cognitionē febris peruenire  
 uolumus, uel tenuis ratione quartanæ, uel quia processu tem=  
 poris pituita coquitur, & sanguis efficitur, modo a natura  
 uincatur, ut refert Gal. 2. de uic. in morb. ac. De alijs intētioni=  
 bus loquitur Gal. 1. ad glauc. c. 12. ibi curamus quotidianā cū oxy=  
 mellite in primis diebus, et his quæ ualde urinā ciūt, circa sta=  
 tum habenda est uētriculo sollicitudo & c. Vide illum fusius.  
 Vide etiā Razē, 10. alm. cap. de cura febris phlegmaticæ & c.



## De pronosticis febris quotidianæ.

Hip. aph. 4. aph. 63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvantur Raze. 10. alm. ca. de quot. interpol. Hæc febris multis moratur mensibus & mortis suspicionem habet. Et. 18. com. quotidiana est periculosa. Et Auer. 4. collig. Deterior omnibus est quæ ex phlegmate vitreo & saluior omnium quæ est mundorum temporum, & quæ est multi sudoris nam humoris sig. tenuitatem & corporis rarā texturam, & raro inquit Auic. euacuantur febrientes a læsione stomachi. B. quia quum locus pituitæ sit stomachus fieri nō potest ut si sit febris pituitosa q. non noceat stomacho, sicut tertiana felli & hepatis & quartana spleni & c.

## De febre quartana.

Febris quartana ut plurimum periodica, est febris a melancholia non naturali putrefacta per adustionem bilis generata plerumq; eueniens, cuius est agrum de quarto in quartum diem affigere, & hæc duplex exquisita & spuria, exquisita fit a naturali melancholia, spuria uero a nō naturali, & hæc cap. de hum.

## Loci consentientes de febre quartana.

Causæ quartanæ sunt quæcunq; atram bilem generant, nā ex solo humore atrabili putrefacto oritur, putrescit uero atrabilis ob sui crassitiem, multitudinem, aut ob aliquā meatuum obstructionem aut ob facultatis expulsoe impotentiam, quæ in corpore corrupta expellere nequit unde sequitur putrefactio. Fiunt etiam quartanæ ex aliquo hepatis uel splenis affectu uel successione aliarum ægritudinum & c.

## Loci consentientes de causis quartanæ.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 5. generatur quartana ex solo humore atræ bilis putrefacto putrescit interdum ob crassitiem aut multitudinem, aut tenacitatem materie inutilis aut aliquam



meatum obstructionem &c. Auic. 4. can. cap. 64. eius cause sunt quæ generant melancholiam postea putrefaciunt eā etc. euenit autē ut plurimum ex successione ægritudinum febriū diuersarum, ex quorum putrefactione quum adduntur & nō euacuantur, multiplicatur melancholia. B. raro quartana continua accidit, ex eo q̄ quum in uenis atrabilis ad putrefactionem, mouetur tanquam uirtuti dissimilis extramittitur, quæ putrescens intermittentem efficit. Notat Arculus ex hoc Auicenna loco quod id uerum non sit, quod putridum a putrido fiat, nam atrabilis ex putredine humorum generatur, quæ non est putrida, quod etiam confirmatur a Galen. 3. de pronost. comm. 29.

#### De signis febris quartanæ.

Signa quartanæ uniuersalia sunt, quia ipsa incipit cum paulo frigore, quod augetur & minuitur in eodem paroxysmo, adueniente statu caliditas non est uehemens, ut in tertiana, sed maior quam in pituitosa, præterea quartana paulatine ac insensibiliter a frigore ad calorem se confert, fit etiam plerumq; in autumno. Cognoscitur ex uictu præcedente, & si homo lienosus sit, si populariter fiant quartanæ, si urinae tenues albæ & aquosæ fuerint signa particularia sunt ut si fiat a sanguine adusto, aderit rubedo urinae signa sanguinis præcesserunt forma ætas tempus, & fit post febres sanguineas. Signa bilis adustæ sunt pulsus uelox frequēs incipit cum horrore frigore siti sudore. Inflammatione tēpore ætate & febrium cholicarum successione. De signis pituitæ adustæ aliquid in præsentia non afferam quum anceps sim, an pituita ita aduri possit, ut in melancholiam conuerti possit &c.

#### Loci consentientes de signis quartanæ.

De omnibus signis tam uniuersalibus quàm particularibus loquitur Auic. 4. can. cap. 65. ibi signa quartanæ sunt quod



incipit cum paruo frigore & c. lege eum fufius. Gal. 2. de cris. cap. 4. omnia hæc etiam habet, ibi, quartana febris cognoscitur si autumnus frigidam & siccam & inæqualem temperaturam habuerit, quia tunc quartanarij circuitus frequentiores fiunt & c. lege locum ultra, de pituita utrum aduri possit ut atrabilis euadat lege manardum.

#### De cura febris quartanæ.

Quinque in cura intentiones conueniunt, quarum prima expostulat uictum optimum, non flatuosum, sed uentrem emollientem. Cauenda est suilla caro & tenacia edulia, et quæcunq; refrigerant ac exiccant, uinum concedatur albū tenue. Concedantur inter uolatilia quæ optimi succi sunt, in statu morbi uictus tenuis adhibeatur magis quā ante & post, sitq; calidus & humidus. 2. intentio est uentris lenitio ac humoris aliqua præparatio, lenimus cum clysteribus uel alijs lenientibus, at præparamus primū cum acetos. simp. rhodomelle sy. de epithimo de fumo terræ de suc. borag. bisanthino cū aquis uel decoctis conuenientibus ut fumo terræ lupulorum borag. epithimi senæ polypodij. 3. intentio est euacuatio quæ parari potest cum sectione uenæ interioris, modo sanguis admisceatur, uel abundare uideatur, aut fiet per pharmacum solutiūū qualis est infusio senæ in sero caprino aut decoctum myrobalanorum cheb. & ind aut confectio hamec. pillulæ de fumo terræ indæ de lapide laxuli & hoc quum decocta ac præparata fuerit materia, interdum etiā euacuatio fiet per uomitum per urinas & sudorem & c. 4. intentio roborat membra sicuti cor cum ung. de nenuph. citrino hepar cum rebus hepaticis similiter lien & stomachus, prout suis locis dictum est. 5. intentio symptomata tollit, perficitq; primo remouendo rigorem ualidum & frigus in ungēdo spinā dorsi cum oleo rutaceo costino cum mitridato etiā theriaca & c. Et hæc de fe-



bre quartana exquisita. At spuria hisdemet intentionibus curabitur. præter q̄ dicta magis ad humiditatem & frigiditatem uergere debet, præsertim si a sanguine adusto uel a bile adusta prouenerit. Digestio etiam aliter ac dixi fiet. sed cū oxy-sachara sy. uiol. acetos. simp. Variabit etiā euacuatio quæ fieri debet cum Myrobalanis citrinis & indis & c. cætera erūt prout dictum est. Cura quartanæ continuæ erit eadem ac di-ctum de interpolata, nisi quod in frigidationem requirit maiorem ob assiduum calorem, item audacius uena seccatur, & tenuius cibandum quum breuioris sit status.

#### Loci consentientes de cura febris quartanæ.

De prima intentione loquitur Galen. 1. ad glauc. cap. 2. ibi uictus instituendus est optimus siue flatibus ac uentrē emol-liens, arcendi sunt a carnibus porcorum, & ab omnibus edu-ctis tenacibus & tarde exeuntibus quæ corpus refrigerant et exiccant. Vide etiam Auic. 4. can. cap. 68. nam ibi fusius de ui-ctu pertractat. De alijs intentionibus loquitur ad unguē Gale. loc. cit ibi quartana mediocriter ac leniter ab initio tractan-da est, nullum forte medicamen aut euacuationem exhibētes nisi sanguis uehementer abundare uideatur, nam tūc uena sec-cetur interior uel media quæ est in sinistro cubito q̄ si niger ac crassus sanguis uideatur, audacius mittatur, si flauus & te-nuis statim supprimatur, quum morbus in suo uigore fuerit prouidendum est uisceribus cum his quæ emolliunt & laxāt, deinde medicamentis utendum quæ urinam cient, et si coctio-nis indicia apparuerint cum his purgandum quæ humores atros exoliunt, non semel tantum sed sæpius si fuerit neces-sarium, utendum & a cibo uomitibus, & qui nequeunt uome-re per inferiora purgentur. Auic. de his fusius pertractat. 4. can. cap. 66. & Razes. 10. alm. ca. proprio.

#### Observationes circa euacuationem.



Aui. 4. can. ca. 66. quando quartana est a melancholia sanguinea, tunc extrahatur sanguis secundum quantitatem necessitatis, & quando non est necessaria, tunc phlebotomia est nocua quatenus debilitat & ducit contrarium melancholice et quatenus mouet humores ad exteriora & c. Gal. 1. ad glauc. cap. ii. Quicumque aliquod ex fortibus medicamentis ab initio exhibuerunt, omnino ante statum, quartanam quae erat simplex sepius duplicem fecerunt & c.

Observatione circa uictus rationem.

Auic. cap. cit. prohibeatur in die paroxysmi a comestione nam rectius est ut eueniat febris uentre uacuo & non occupetur natura, sed praecipitur ieiunium & interdicitur aqua frigida illa die.

De pronosticis quartanae.

Hip. aph. 2 aph. 25. Aestiuæ quartanae magna ex parte breues, autumnales longe & maxime quae ad hyemem attingunt.

Et aph. 5 aph. 70. a quartana capti non admodum conuulsionibus capiuntur, si uero prius capiantur & quartana superuenerit liberantur. B. quia quum duplex sit horum sanatio excretio. s. & coctio haec duo quartana, excretionem. s. a rigore & coctionem a calore febrili efficit. Auic. 4. can. cap. 64. saluior quartana est illa quae non accidit ab apostemate splenis, quae uenit ab apostemate splenis perducit ad hydropem & perniciem, quartana quae salua est liberat ab egritudinibus melancholicis, ut ab epilepsia melancholia, & in ea est securitas a spasmo & non durat nisi per annum modo error non accidat, sunt & quartanae quae per. 12. annos perdurant quibus omnibus inimicus est autumnus & c.

De febribus sanguineis.

Quum duplex sit genus febrium sanguinis, alterum a putrefacto sanguine, alterum a non putrefacto, ambo sub uno



tantum nomine synochi continentur, unde dicimus synochū esse febrem acutam continuam ex sanguine in uenis putrefacto ortam, altera uero synochus. i. continens est febris acuta ex sanguine in uenis non putrefacto in multa copia peccante. i. succis equaliter adauctis, harum febrium tres sunt species ac mastica, epacmastica & paracmastica. i. in uigore perseverantes crescentes & decrecentes.

Loci consentientes de febribus sanguineis.

Gal. 9. meth. ca. 3. duplex est genus synochi, unum quod ex natura eadem cum diarijs constat, alterum est ubi in omnibus uasis ac potissimum maximis equaliter succi putrescunt. Auic. 4. can. cap. 44 inquit medium utriusq. sephemera & putride synochum sapere, nam differt ab ephemera quia humor est qui calefactus est, differt a putridis, quia nulla adest putredo &c. Lege de his Gale. 9. meth. cap. 2. ibi, quedam enim febrium manifestam habet putredinis notam, quedam non habent. Lege etiam 2. de cris. cap. 6. Et Paul. lib. 2. cap. 26. & habebis utranque synochi descriptionem.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 2. & 9. meth. cap. 3. Et. 2. de cris. ca. 6 tres species synochi demonstrat, quas Aet. ser. 5. ca. 70. inquit solum competere febribus a sanguine non putrido factis etc.

De causis febrium sanguinearum.

Sex sunt sanguinearum febrium cause, prima est obstructio. 2. est repletio. 3. multitudo exercitij non consueti laboriosa. 4. consuetæ euacuationis retentio. 5. aquositas ipsius sanguinis ex comestis fructibus elaborata. 6. Humoris crassi & crudi copia sanguine admixta &c.

Loci consentientes de causis febrium sangu.

Paul. lib. 2. cap. 27. continentium febrium origo ex sanguine est, qui nunc efferuescens, nunc putrefactus obstruitur &c. Gal. 9. meth. cap. 3. inquit harum febrium in gracili et frigido



corpore neutrum consistere, sed tantum in corpulentis qui sanguine abundant, & ca 4. loquens de iuvene palestræ perito, inquit quod suspitio erat hanc esse synochon quæ ex sanguinis abundantia & obstructione, præ carnis copia stipatione peruenit & c. Lege de his fusiùs Auic. 4. can. cap. 44. Et Aet. ser. 5. c. 7. ibi, conflatur hæc ob calidi sanguinis copiã etc.

#### De signis februm sanguinis.

Duodecim signis synochum cognoscet, Primo febris assidua est. 2. rubedo faciei & oculorum. 3. inflatio uenarum temporum, & eorum repletio. 4. nullus adest rigor uel sudor. 5. interdum adest nasi pruritus & circa locum cui cucurbitulæ applicantur. 6. somnus profundus. 7. loquendi difficultas cum faucium inflammatione. 8. effusio lachrymarum. 9. pulsus maximi uehementes citati crebri non mordaces. 10. urina neque consistentia & colore a naturali habitu aliena. 11. æstus intolerabilis. 12. graues uigiliæ & c.

#### Loci consentientes de signis februm sang.

De his signis facit mentionem Auic. 4. can. cap. 45. ibi signa febris sanguineæ sunt adhaerentia febris rubedo faciei et oculorum & c. Gale. 9. meth. cap. 4. ubi se inuenisse febrẽ admodum calidam dicit, pulsus æquales maximos celeres et frequentes & uehementes calorisq; qualitatem quæ tactum minime morderet, & urinas συστασι. i. consistentia ac calore non multum a naturali habitu alienas & c. lege Paul. li. 2. cap. 27. ibi, indicia & c.

#### De cura febris sanguineæ.

Cura febris a non putrefacto sanguine, duas tantum intentiones requirit, quarum prima est euacuatio sanguinis per sectionem uenæ usq; ad animi deffectum. 2. est febrilis caloris alteratio, quæ fit interdum cum aquæ frigide potu.

Cura uero febris a putrefacto sanguine quattuor exposcit inten=



intentiones quarum prima est circa regimen quod ad frigidum & siccum ordinari debet, unde in cibando primū morbum & uirtutem metire, nam si ultra septimum diem non se morbus extendere uideatur, parum cibabis exhibendo ptisa nam hordeaceam, panem contritum, cum seminum melonis expressione, similiter ualent lactuca acetosa endiuiā malagranata & c. 2. erit euacuatio quæ fiet per sectionem uenæ uel per cucurbitulas uel per pharmaca solutiua, quæ uaria esse debet, put humorū mixtio cum sanguine diuersa fuerit, unde bilis per cholagoga sicuti cum myrobalanis citrinis educetur, uel cum rheub. casia & c. Pituita cum phlegmagogis ut pluries dictum est. 3. intentio est causarum putredinis amotio, quæ adimi solent per sui contraria, nam si à frigida causa densum stipatum uel corpus reddatur, tunc per relaxantia & rarefacientia curabimus. Si ex obstructione per aperientia, si ex abundantia humorū per euacuantia, si ex crassitie per attenuantia, si extenuitate per incrassantia & c. 4. intentio est caloris febrilis alteratio quæ fieri potest cum rebus infrigidantibus & attenuantibus præsertim si sanguis crassus existat ut cum oxy sachaia acetosimp. sy. de endiuiā, uel existente tenui cum sy. de iuiubis cum aquis & decoctis acetosæ portulacæ & c. uel aliquo cum eclegmate sicuti cum zucharo ros. triasand. diarhodone & c. Correctio accidentiū sicut dolor capitis sitis somni profunditas fiet ut pluries dictum est suis in locis.

Loci consentientes de cura febris sangu.

Gal. 2. meth. ca. ult. loquens de uictu, si continens inquit ultra septimum progressum non uidebitur prorsus a cibo continendus est ager in uirtutem defecturam conijcias etc. Auic. 4. can. cap. 46. cibi sint ex iuiubis ex lentibus cum aceto granatis & sumach. B. intellige sanguine existente tenui. Aet. ser. 5. c. 7. curandi scopus est copiam euacuare, & calorem præter

QQ



naturalem extinguere, & si qua adest crassities seccare, & debilitatis partibus antiquam temperiem bonam restituere.

De sectione uenæ lege Gale. historiā de libero et seruo. 9. meth. cap. 4. Auic. 4. can. cap. 49. intentio in hac febre est euacuatio plurimi sanguinis usq; ad syncopim, & si sanguis fuerit subtilis incrassandus, si cholericus in frigidā, si crassus attenuandus. B. Conueniunt Paul. Aet. Gale. & Auic. in extrahendo sanguinem usq; ad animi deliquium, sed Auerrois qui alias stimulus medicorum dictus est. 3. sui collig. reprobatur euidenti ratione Gal. & aliorum in hac sectione uenæ opinionem, quæ rationes non parui apud me momenti sunt uide tu eas si lubeat. Gale. loc. cit. synochi cum putredine curam recitat, ibi si putredo æqualiter in omnibus uasis subsistat, aut in maximis, &c.

#### Observationes in cura.

Gale. 9. meth. cap. 4. in sectione serua uires, item si ciborum cruditas adfuerit, uel secessus superfuitatum in intestinis, uel alius sanguinis fluxus, uel puerilis uel senilis ætas, uel frigidum uel gracile corpus uenam non secabis usq; ad syncopim, imo naturæ relinques, Itidem ait Auic. & Aet.

#### De pronosticis febrium sanguinis.

Gale. 3. de cris. cap. 4. synochi raro eueniunt & ubi nullus sit error in quarto finiuntur, natura proprijs circuitibus perueniente &c. Auic. 4. can. cap. 44. ex tribus spetiebus saluior est epacmastica deinde omotena, nequior uero acmastica. B. Nota quod acmastica & omotena idē significant iuxta Gal. placitum, quare in nominum significato ipse deceptus est, ita ut intelligere uellet quod decrescens est salubrior, sed acmastica uel omotena seruans. s. eundem tenorem est minus mala & apacmastica quæ augendo se semper procedit cæteris est nequior, quanquam ego crediderim cæteris deteriore quæ



augendo se semper procedit ceteris est nequior quanquam ego crediderim ceteris deteriore quæ acmaſtica nominatur ſicuti & teſtari uidetur & ipſe Galen.

De cauſo febre.

Cauſon ſiue ardens eſt febris continua ardentiffima ex flaua bile putrefacta accenſa, putrefacta inquam ne crederet quiſpiam ſicuti Auerrois. 7. collig. quod ex bile non putrida ebulliente fieri poſſet, ex eo forte Gal. com. deceptus qui eſt. 59. quarti apho. ubi inquit tertiana febris ab ea quæ ardens nominatur humore faciente non differt, utraq; enim a flaua bile fit, Differunt autem quoniam febris ardens habet in uenis una cum ſanguine bilem plurimam ebullientem, Tertianæ uero eandem bilem habet in toto corpore delatā et motā.

Loci conſentientes de cauſo.

Aet. ſer. 5. cap. 78. cauſon ſiue ardens eſt febris cōtinua etc. Gale. 4. de uic. in morb. ac. tex. 13. cauſus eſt febris in qua urēs caliditas ſitisq; incompeſcibilis hominem torquet & c.

De cauſis febris cauſi.

Cauſæ primitiue cauſi ſunt quæcunq; calida & ſicca ſunt ut uini potus, ſalſorum eius uigiliæ, motus laborioſi ira etc. Cauſæ coniunctæ & antecedentes ſunt flaua bilis putreſcens uel pituita ſalſa, unde proprium & legiptimum cauſum nominant qui a bile, improprium & ſpuriū qui a pituita ſalſa puenit. Interdū cauſa ipſius cauſi eſt cerebri inſlāmatio, & c.

Loci conſentientes de cauſis febris cauſi.

Hipp. 4. de uic. in mor. ac. text. 1. cauſis. i. febris ardens fit quum uenulæ tempore æſtuo exiccate, acres ac bilioſas, quæ tenues ſunt, trahunt ad ſe humiditates quas iχωρᾶς uocant.

Et text. 3. fit cauſus ob longum iter, longamq; ſitim & c. ex quibus intelligere poteſ a cauſis calidis & ſiccis oriri cauſum, ſi uis deinde ſcire quomodo uenulæ illæ ad ſe trahūt huius



miditates lege Gal. com. 58. in. 4. aph. ibi a febre ardente habito & c. Aet. ser. 5. cap. 77. ex flaua bile putrescente incenditur & alternis diebus exacerbatur, & quandam habet febris imminutionem siue remissionem. B. Nota quomodo causus differat a synocho, nā causus a flaua bile, synochus a sanguine, causus habet aliquam imminutionem siue remissionem, sed synochus a primordio usq; ad finem unam tantum habet exacerbationem, ne forte sicuti & ipse Arcul. ambas febres in unum confundas. Vult enim de mente Gal. causon in epacmasticam omotenam & paracmasticam diuidi, sicuti synochon, quod nullibi Gal. (quod sciam) somniauit ne dicam scripserit. Auic. 4. can. cap. 41. causon fit secundum duos modos aut est a cholera aut a phlegmate salso putrefacto. Hoc idem etiam adserit Galen. 4. de uic. in mor. ac com. 13. Gal. 1. prorrh. tex. 18. febris ardens tum ob alias causas tum propter cerebri inflammationem eque fit & c.

#### De signis causi febris.

Signa sunt arida lingua nigra, appetitus deiectio, uomitus biliosus, uigiliae interdū deliria, fluxus sanguinis narium, dolor capitis, oculi concaui uentris solutio inquietudo, sitis uehemens, nisi tussis sicca leuiter irritans adfuerit & c.

#### Loci consentientes de signis febris causi.

Auic. 4. can. ca. 42 signa cholericae causonis sunt accidentia mala ex uigilijs inquietudine adustione permixtione mentis & c. Paul. lib. 2. cap. 28. ardentibus haec superueniunt arida lingua crassa & nigra, uentriculi rosio deiectiones pallidae sitis uehemens uigiliae, & nonnunquam delirium & c. B. haec omnia eueniunt ex motu bilis; sed efficacius reddit rationes Gale. de his. 4. de uic. in mor. ac com. 40.

Hip. aph. 4. aph. 54. Quibus plurimum siccae tussis leuiter irritantes in febribus ardentibus fiunt non multum siti in fe-



stantur &c. Vide etiam de his signis Hipp. 4. de uic. in mor. ac. text. 4. &c.

### De cura causi febris.

Curatur hæc febris quadrifariam primo uictus ratione quæ humidis et frigidis constet. 2. euacuatione quæ per sectionem uenæ & alui eiectionem fieri potest. 3. cum extinctione caloris febrilis. 4. cum accidentium correctione, quæ omnia fient prout dictum est in cura tertianæ interpolatæ &c.

### Loci consentientes de cura causi.

Paul. lib. 2. cap. 29. Dupliciter solui debet morbus aut excernendo humores biliosos aut eos extinguendo, excernuntur per sudores uomitiones & imum uentrum, extinguuntur aquæ frigide potu &c. Auic. 4. can. cap. 43. causus curatur cura tertianæ puræ & si indiget euacuatione, festina, nā euacuatio melior est quàm in tertiana, sed complementum sit apud digestionem, & non phlebotometur nisi in urina adsit turbiditas & rubedo &c.

### De pronosticis causi febris.

Hip. aph. 4. aph. 58. A febre ardente habito rigore superueniente solutio. B. rigor incitatur a bili per sensilia mēbra uel loci motu delata, unde Alius soluitur sudores et uomitus excitantur & bilis expurgatur. Hip. aph. 4. aph. 48. in febribus non intermittentibus si partes exteriores frigide interiores uruntur & sitim habeat, lethale est. B. intelligitur hoc de causo, nam Gal. 1. prorrh. text. 7. quando causus interna quidem uret, externa uero nec mediocriter calefacit, lethalis est. Hip. aph. 4. aph. 41. Febres quæcunq; non intermittentes tertia die fortiores fiunt, magis periculosæ quocunq; autē modo intermiserint periculum abesse significatur. Et aph. 4. aphor. 49. In febre non intermittente, si labrum, uel oculus uel nasus, uel supercilium peruertatur uel non uideat, uel non audiat,



iam debuli existēte corpore, quicquid horum euenerit, mors proxima est. Et aph. 4. aph. 50. Vbi in febre non intermittente, difficultas spirandi & delirium acciderit lethale. Et aph. 6. aph. 26. Quibus in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio soluuntur. Auic. 4. can. cap. 41. Raro febris ardens senibus accidit, & si accadat eis pereunt, quoniam non fit in eis nisi a causa ualde forti. B. similis sententia habetur ex Galen. aph. 1. com. 14. ibi, senibus non acutæ febres accidunt, & si quando rarenter talis accadat febris, qualis iuuenibus omnino hæc ad ægrotantis interitum terminatur, quoniam indicium est immensam quandam esse causam febrem facientis magnitudinem & c. Hip. 4. de uic. in mor. ac tex. 10. Si enaribus fluxerit sanguis, soluitur ægritudo, atq; si sudores superuenerint iudicatorij legiptimi cum urinis albis crassisque & leuibus subsidentijs & c.

#### De febre hepiala.

Hepiala est febris pituitosa intermittens a pituita uitrea in locis a corde remotis putrefacta, quæ ex sua propria natura eodem tempore frigus & calorem inducit, dicta est a leni afflictione sicuti *πιάλος* sonat.

#### Loci consentientes de febre hepiala.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 6. quando quis febricitat simul & riget atq; eodem tempore in toto corpore utrunq; affectū sentit ea febris est quæ proprie hepiala uocatur. B. similis sententia est in lib. de inæquali intemperie, cap. 8. Idem etiam adserit Haly abb. 6. suæ theoricæ cap. 6. Et Raze. 16. continentis, cap. 3. Serapio. 6. sui breuiarij. Hæc febris non est continua sed interpollata durans tribus uel quattuor periodis. B. Nota quod Serap. & Auic. in hac febre plurimum a Gale. discrepant, siquidem hepialam prolipiria sumunt, nam quotiens frigus in interioribus & calor in exterioribus sentitur hepialam esse



dicūt. Gal. uero quotiens uterq; affectus una sentitur, sed ideo errant quia nomina simul confundunt. Vnde Aet. ser. 5. c. 87. febris hepiala a leni afflictione uocata est quum simul febricitant & rigent, & utrunq; percipiunt eodem tempore in omni corporis parte. Paul lib. 2. ἡπιάλος ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς ἁλός, ἢ παρὰ τὸ ἡπίως ἀλεαίνειν ὁ περὶ ἐστὶ θερμαίνει. i. hepiala dicitur per translationē a sale, uel ab hepios quod est molliter, & aleanen quod est calefacere eo quod uehementer non urat, sed molliter ac blande calefacit &c.

#### De causis hepialæ febris.

Causa est pituita uitrea partim cruda partim putrefacta interdum cum amara bile coniuncta atq; per sensibilia membra delata ac mota &c.

#### Loci consentientes de causis hepialæ.

Gale. 2 de diff. feb. cap. 6. a pituita tantum uitrea partim putrefacta partim cruda remanente, unde fit ex putrefacta calor febrilis & ex cruda frigus pari ratione gignitur. Aui. 4. can. cap. 51. causa est phlegma uitreū in profundo corporis contentum, quod locum infrigidat in quo collocatur, cui si accidat putredo uapor eleuatur, & partes exteriores petēs calefacit. Galen. de inæquali intemperie cap. 8. si pituitosus succus qui est frigidus, & quem uitreum praxagoras appellat, & amara bilis quæ calida est simul abundant, ac per sensibilia membra moueantur, nil miri est utrunq; a cubante pari modo sentiri. Lege Paul. lib. 2. cap. 25. Et Aet. ser. 5. cap. 87.

#### De signis hepialæ febris.

Signa sunt q̄ una sentitur frigus & calor urina alba tenuis cruda. pulsus rarus tardus, habita. s. aliarum febrium ratione in quibus frequentior esse solet, seruat interdum accessionem tertianam & quartanam ob sui crassitiem & paucitatem, nam humana natura humorem hunc uitreum abun-



dare non finit. Spatium eius paroxysmi est a quattuor horis usq; ad 24. horas, interdum pauca existente materia citius absumitur.

Loci consentientes de signis hepialæ.

De his signis lege Auic. 4. can. c. 52. ibi, signa eius sunt quæ prædicta sunt & urina est frigida cruda & c.

De cura febris hepialæ.

Eadem cura est ac in quotidiana dictum est, uerum calidioribus magisq; incidentibus præsijs indiget & c.

Loci consentientes de cura hepialæ.

Paul. lib. 2. cap. 25. Hæc febris ex pituita nascens quum ex quotidianarum genere existat curationi illarum subijcitur, à quotidiana tamen differt, quia tanto calidioribus magisq; incidentibus indiget quanto frigidior pituita existit.

Observatio in cura.

Auic. 4. can. cap. 60. Caue ne calidioribus in principio medicamentis utaris, sed incipe cum sy. acetoso mellino deinde ad sy. compositos, demum ad semina aperitiua & ad infusionem aloes & troc. de rosis, sed os stomachi præcipue inter alia confortetur & c.

De pronosticis febris hepialæ.

Serapio 6. breuia. Hæc febris non multum permanet & fortasse durat p. 20. dies aut ultra parum, aut minuitur parum quia ob humoris paucitatē lōgo tempore durare nō pōt etc.

De febre lipyria.

Lipyria febris est ea, in qua exteriora & superficies refrigeratur, & profundum uritur & excretiones detinētur, aspera sitientibus lingua est, pulsus paruus & obscurus ob calorem intro se receptum.

Loci consentientes de lipyria febre.

Gal. de inæquali intemperie cap. 8. lipyria est quum intus



in ipsis uisceribus calorem sentimus, & in extremis partibus uniuersis frigus. Itidem ait Auic. & omnes practi-  
cantes.

De causis febris lipyriæ.

Causa quæ exteriora frigeant, & interiora urantur est calor ad interiora reuocatus, uel spiritus quum ad interiora se conferunt exteriora relinquentes, uel ideo frigescent exteriora quia in externis partibus pituita uitrea continetur, aut quia uapor a putrido humore eleuatus, dum a calore sepe-  
tur multoties corpus infigidat &c.

• Loci consentientes de causis febris lipyriæ.

De his causis lege Auic. 4. can. cap. 53. ibi quia uirtus effunditur ad locum. in quo est læsio idcirco exteriora a calore relinquantur &c. Lege etiam Gale. apho. 4. com. 48. ibi, quia fortis inflammatio in profundiori parte corporis uel erysipelas euenit, unde totus ex toto corpore sanguis ad patientem locum trahitur, ut sit in principijs accessionum &c.

De indiciis febris lipyriæ.

Indicia & eius cura manifesta sunt, quia curatur ut catarrax phlegmaticæ, & cognoscitur ex descriptione data, &c.

Loci de pronosticis lipyriæ.

Hip aphor. 4. aphor. 48. In febribus non intermittentibus si partes exteriores frigida interiora urantur, & sitim habeat lethale. Gale. 2. pronosticorum com. 4. Si caput manus ac pedes frigidi sunt, uenter costisq; calentibus malum est et c. quæ possent etiam de lipyria intelligi.

Authores dissidentes circa febrem lipyriam.

- 1 Adserere, lipyriam non esse febrem eo q calor extraneus non diffundatur per totum corpus.
- 2 Adserere, lipyriam esse posse febrem interpolatam.



Confutatio dissidentium circa febrem lipyriam.

Ad primum, respondet Auic. 4. cap. 53. Et si calor nō diffundatur per totum corpus hoc non prohibere quin sit febris dummodo calor extraneus aptus natus sit per totum corpus diffundi, sicuti non repugnat hominem esse risibilem, & si non rideat.

Ad secundum, Galen. 4. aphor. com. 48. Respondet dicens nunquid huiusmodi casus possit fieri in febre intermittente, ego neq; uidi inquit neq; animo capio uidentur, siquidem solis accidere febribus quæ causones ab incendio nominantur perniciosas, uel si aliter libeat appellare *κακον βροχτον* uelut lipyrijs & c. *Quæ continentur ab hoc loco ad pag. 770. non extant in edit. Lugd. Honorati in 16.*

#### De febre pestilenti.

Febris pestilens est calor extraneus ac contagiosus, qui ex putrida ebullitione uniuscunq; humoris circa cor accensi, ut plurimum contingit, Cōtagiosus inquam quoniam ab uno homine in alium facile progreditur, ex ebullitione cuiuscunq; humoris, quum indifferenter ab uniuscuiusq; humoris putrefactione fieri possit. Aer enim corruptus ac putridus cito ad cor nostrum aduolat, & quodcunq; inuenit humorum lethali ueneno inficit, & c.

#### Loci consentientes de febre pestilenti.

Quod febris pestilens sit calor extraneus iam adeo notū est ut probatione non indigeat, Quod uero sit contagiosus probatur ex Auicenna. 2. 1. cap. 8. dicente, quod ex aggritudinibus aliæ sunt quæ de uno ad alium transeunt, ut lepra scabies uariola febris pestilentialis apostemata putrida & c. Isidorus. 4. ethimolog. cap. 6. ex hoc contagium dicitur quod cum unum apprehendit celeriter ad plures transmigrat. Gale. 1. de diff. feb. cap. 4. calidiores inquit ambientis aeris status per inspirationes quidem cor calefaciunt, sed præsertim ar-



terias ut quæ ipsius substantiæ aeris aliquid attrahant, ex quibus omnibus simul cor affici est necessarium &c. Auic. de cura feb. pest. dixit, si autem materia fuerit sanguinea fiat phlebotomia, si fuerint humores alij euacuentur &c. ex quibus uerbis plane intelligitur, quod aliqua febris pestilens sit sanguinea uel biliosa &c.

#### De causis febris pestiferæ.

Principalis causa istius febris pestiferæ est aeris corruptio, ex cuius inspiratione potissimum cor afficitur, Corruptionis autem aeris principium est, interdum cadauerum copia non sepultorum aut lacuum & paludum euaporatio foetida, interdum aeris immensa caliditas, uiculus ratio praua, humores ad putrescendum parati, in fluxus cœlestis in corpora iam disposita, ut sunt plethorica et uiribus destituta agēs, sed aer, qui ex habitu naturali ad immodicam caliditatem et humiditatem conuersus est, hoc potissimum efficit. Tempora uero quibus febres præsertim fiunt pestilentes, sunt æstas atque autumnus initium, tum quia istis temporibus corpora sunt multis de causis ad putredinem declinua, tum quia eorum caliditas & humiditas quæ causa est putredinis tunc magis uiget, licet etiam in uere ob humorum colliquationem & pororum apertionem fieri posset.

#### Loci consentientes de causis febris pestilentis.

Auic. 1. 4. tra. 4. cap. 1. Et quoniam fit aer secundum hunc modum uenit ad cor, quare corrumpit complexionem spiritus qui est in ipso, & putrefit quod circundat ipsum de humiditate, & accidit caliditas egressa à natura, & spargitur in corpore tunc per causam suam erit febris pestilens &c. Gal. 1. de diff. feb. cap. 4. Fit etiam aliquando ob eos qui sunt in corpore humores ad putrescendum paratos qui breuem aliquam occasionem ad febris originem ab aere ambiente



acceperit animal putredinis autem principium uel cadauerū  
 multitudine non crematorum ut in prælijs contingere solet,  
 aut ex aliquorum uel lacuum uel paludum æstatis tempore  
 uaporatione, & contingit præcedere aeris caliditatem im-  
 modicam, quemadmodum in ea pestilentia, quæ Athenienses  
 inuasit, aut quia humores erant ex prauitate uisus putredini  
 obnoxij, aut quia corpora erant ad patiendum parata, &c.  
 Bac. Nota quod ad inducendum aliquod effectum quattuor re-  
 quiruntur, Primum est agentis fortitudo, Nam a minimo fla-  
 tu nec magna nauis moueri potest. 2. est patientis dispositio,  
 Nō enim inquit Arist. 1. physicorum) quodlibet agit in quod-  
 libet. sed in id duntaxat quod determinatum est, unde dici so-  
 let Actus actiuorum non est nisi in patiente bene disposito. Et  
 Auic. 1. 4. cap. 1. Agens solum cum peruenierit, & patienti nō  
 est præparatio non accidunt actio & passio &c. 3. est patien-  
 tis contactus ab agente actu uel potestate concurrens, Nec mi-  
 rum quum ignis nec me possit calefacere, si sua uirtute uel  
 potentia mihi non adhareat. 4. est mora agentis in patien-  
 tem, quod si hæc mora non fieret profecto nec parua styphu-  
 la in magno quantuncunq; igne combureretur, & hæc sunt  
 quæ a Galeno sub paucis his uerbis intelliguntur, quum di-  
 cat, Quod nulla causarum sine patientis aptitudine agere po-  
 test &c. Paul. lib. 2. cap. 34. cibi commune prauis istius modi  
 morbos pariunt, item communis aquæ uitiatæ potio, nimis  
 laboriosa uitæ ratio, labores omisi, inedia, repletio, idq; dum  
 fames grassatur &c. Quod autem cœlestis influxus sit harū  
 causa febrium, uide Auic. loc. cit. ibi. Principium omnium ho-  
 rum sunt formæ ex formis cœli facientes esse necessarium il-  
 lud cuius aduentus ignoratur &c. Gale. 1. de Temperam. cap.  
 4. omnium aeris temperamentum pessimum esse dicit, quod  
 humidum & calidum est, Vide etiam. 3. aph. comm. 21. ubi de



morbis æstiuis ac autumnalibus loquitur, & 3. aphor. com. 16. ubi inquit quod putredines fiunt in illis temporibus, quoniam perspicuum est humida siccis magis esse putredini obnoxia, & cæt.

### De indiciis febris pestiferæ.

Calor febrilis extrinsecus ad tactum suavis est, intrinsecus uero urit ac ægrum molestat, Difficultas anhelandi uisitur ob uapores malignos, Vehemens sitis adest, linguæ ariditas, Nausea ac appetitus prostratus, creberq; uomitus ob humores os ipsum uentriculi infestantes, Tussis sicca, imbecillitas uirium & deffectus animi ob cordis noxam, Adsunt insuper uigiliæ & deliria, interdum quædam conuulsio, ut uix a loco moueri possint, interdum in somnum quædam delatio. Apparent etiam bubones & carbunculi post aures sub alis & circa inguina, prout cerebrum cor & iecur afficitur, & hæc potissimum fiunt, natura uenenum ad partes extrinsecas detrudente, Oriuntur etiam quædam circa cutim pustulæ quæ mox occultantur, Pulsus eorum est uelox & debilis, excrementa sunt foetida, urina interdum aquea, interdum subiugalis & liueus, prout sanguis pituita & bilis dominatur, Differt hæc ab alijs febribus putridis quum in humoribus principaliter cordis accendatur, Aliæ uero in alijs partibus, Præter ea in febre pestilenti nulla fit bona crisis & seuiora sunt symptomata quàm in alijs febribus. Est & altera febris pestilens in qua æger nec ipse medicus percipit calorem multum, nec pulsus & urina sensibili alteratione a naturali distat, sed ipsa ut raro contingit ita celerius ægrum enecat. Loci consentien. de indiciis febris pestiferæ.

Auic. 4. 1. tract. 4. cap. 2. hæc febris est quieta exterius, conturbās interius secundū plurimū per dēs, ex qua p̄cipitur caliditas & inflāmatio fortis etc. Paul. lib. 2. cap. 35. pestilentie



grauiſſima quæq; ſuperueniūt, etenim delirium accidit, bilis  
 uomitio, præcordia intenduntur, labores afficiunt, ſudores  
 longi erumpunt, extrema algēt, alui profluuiâ biliſa tenuia  
 & flatulenta urgent, urinæ cernuntur dilutæ tenues biliſe  
 nigræ, Nares ſanguinem deſtillant, peſtus ardet, lingua torri  
 da eſt ſiticuloſa, triſtitia oboritur, conuulſiones uiolētæ etc.  
 Bac. Nota has febres fieri diuerſas tum ob corruptionis cau  
 ſam tum ob humorum uario modo putreſcentium diuerſita  
 tem, Nam putreſcente pituita ſigna febris phlegmaticæ ui  
 debuntur, ſi bilis biliſa, ſi ſanguis ſanguinea apparent, Ra  
 tione accidentium quia quædam cum ſincopi, quædam cum  
 conuulſione, quædam cum ſanguinis ſcreatu uiſuntur, quarum  
 ſigna ſi recte perpendere uolueris, lege Sauonarolam latius  
 de his enarrantem, nam ſumit ipſe indicia a ſubſtantialiter  
 inherētib; ſicuti a calore miti uel mordaci, A qualitate  
 mutata, ſicuti a colore faciei, Ab exeuntibus mutatis, ſicuti  
 ab urina ab excrementis alui, Ab actione læſa ut a uomitu a  
 dolore capitis, ab anhelitu, a uirium deſpectu, a tuſſi a uigilijs  
 a diſpoſitione corporis &c. Ex quibus ſane omnia indicia cō  
 præhendi poſſunt, Signa tamen propria ut ipſe inquit, ſunt  
 febres cum antraxe glandula & ægrum deficere in facultate  
 animali ſenſitiua ac motrice, cum facie tornatili pulſu inor  
 dinato, urina mala, anhelitu difficili, & ægrum pluris eſſe  
 anguſtiæ ſolito &c. Quod puſtulæ appareant in febre peſti  
 lenti lege Gal. ſ. meth. cap. 12. ubi inquit, ijs qui euasuri erant,  
 puſtulæ quas exanthemata uocant, nigræ toto corpore con  
 fertim multæ apparuerunt, Tales enim ſunt reliquiæ ſangu  
 nis, qui in febre computruit, natura ad cutim illas tranſmit  
 tente &c. Vide etiam Gal. in lib. de Atrabile cap. 4. & plura  
 intelliges, lege in ſuper Almaſorem li. 4. ubi febres peſtiferas  
 uocat deceptorias, nam ſæpe medicos deludunt, uide etiam



Arculum Gord. & Gentilem de fulgineo, lege etiam Aetium. ser. 5. cap. 95. De peste ex Rufo, & inuenies signa pestis future, & quaecunque a me pridem recitata sunt, Quod autem hæc febris ex eo a putridis differat, quod principaliter humoribus cor circundantibus adhaereat, iam notum est ex superius dictis Auic. quum dicat uenit ad cor, & putre fit quod circundat ipsum de humiditate &c. Gal. aph. 2. com. 13. Docet nos inquit Hip. quod post iudicationem nox subsequens facilius existat, quoniam plures iudicationes ad bonum terminantur, nisi sit pestilens constitutio, et sic nulla crisis bona fit in febre pestilenti, Et Auic. loc. cit. Et incipit cum accidentibus prædictis cum fortitudine sua, & uenit ad syncopim, & sic ab alijs putridis differt, uide etiam hunc locum Auic. ubi de altera febre pestilenti agit quæ tam celeriter patientem enecat, &c.

#### De curatione febris pestilentis.

Pestilentie duplex requiritur curatio præseruatiua scilicet & curatiua. Præseruatiua prohibet ne aer fiat pestilens, & si iam factus sit eum alterando reconciliat, Prohibetur ne fiat pestilens illum exiccando cum odoribus gratis ac bene redolentibus, sicuti cum suffumigijs ex ligno aloes ambra Thure moscho Styrace Garyophillis laudano croco & sandalis, aut prohibetur si loca tam publica quam priuata ab omni laebe mudentur, si cloacæ et quicquid putridum est depuretur, cauendo interim ne quis a loco infecto isthuc se conferat, nec inde quicquam deferatur quod noxium sit, Quod si iam factus sit pestilens aer, tunc fenestræ uersus septentrionem aperiantur, irroreturq; domus aceto sandalis aqua rosacea cum fructibus odoriferis et camphora, semper ignis cum cupressinis Iuniperis ac lauri lignis accendatur, &c. At præseruetur homo, si ultra aerem rectificatum, etiam rationem uictus ac rerum sex non naturalium exiccantem custodierit, si ma-



terias in ipso corpore superfluentes pharmaco uel sectione uenæ sæpius eduxerit, si deniq; uirium robur membrorum principalium roborauerit.

Curatiua uero non solum antecedentem febris, sed coniunctam bubones & pustulas efficientem, & utranq; simul comprehendit. Circa causam igitur antecedentem tres curandi indicationes opus erunt. Prima euacuare superfluitates corporis iubet cum sectione uenæ si superfluat sanguis; si nimus humores alios purgare cum rheubarbaro, Manna electuario ros aut catapotijs Ruffi &c. Secunda efficit ut febrilis discrasia alteretur cum frigidis, utpote cum rob de ribes de agresta de granatis de acetositate citri cum oxalidis & cicorij aquis potuq; aquæ frigide, ubi sanguinea uel biliosa febris fuerit. At in phlegmatica aut melancholica suprascriptis miscende sunt calida sicuti species diamosci syrupus de buglossa oxymel simplex aqua melisophilli boraginis &c. Tertia debet materias cordi obnoxias extirpare cum medicamentis huic rei conducentibus ut supra dictum est. Causæ coniunctæ carbunculos siue bubones efficienti, prima indicatio conuenit, ut locus in quo carbunculi inueniuntur, statim sacrificetur, ut inde materia, quæ maligna est eradicari ualeat, Secunda cauterio actuali locum comburi iubet, qui mox ulcerum curatione erit iudicandus, Quod si in emunctorijs carbunculi apparuerint, ultra scarificationem, locus non erit cauterio sed cataplasmate potius suppurante ac attrahente contegendus, mox aperiendus & modo ulcerum curandus est. Tertia indicatio quæ utriq; causæ conuenit, non solum symptomata quæ multa esse possunt, sicuti syncopis, appetitus deiectio uigilia &c aufert sed sex res non naturales ad frigidum, & siccum declinare potissimum iubet, &c.

Locī



Loci consentientes de curatione febris pestilentis.

Auic. 4. 1. tract. 4. cap. 4. Retificationis pestilentie pars est secundum sanos, qui sunt in ea, & pars eius est secundum egros, id est pars studet ad præservingandum sanos & pars ad curandum egrotantes, & sic est duplex præservingatiua & curatiua, & sequitur, Secundum sanos intentio est ut exiccetur aer, & fiat boni odoris, & prohibeatur eius putredo & retificetur cum xyloaloes croco ambrathure, & c. lege locum uberius, & plurima circa hanc rem intelliges. Galenus primo de diff. feb. cap. quarto. Vna siquidem ac prima est in omnibus communis intentio, quod corpus quam maxime superfluitatibus uaccet, atque optime spiret, Secundo loco posthoc, ut præpotenti causæ, quoad fieri potest, aduersetur & c. Auic. loc. cit. summa curationis earum est exiccatio, & illud cum phlebotomia & solutione uentris, & oportet ut incipiat in ea ad euacuandum, si autem materia uincens erit sanguinea fiat phlebotomia, & si fuerint humores alij euacuantur & c. Gale. loc. cit. statim ab initio quæcunq; corpora humida uidebamus omni uia exiccare conabamur, Quæ uero sicciora in his antiquum habitum conseruabamus, At in quibus superfluitates redundabant, hæc purgationibus sanabamus, Obstructiones autem foraminum aperire atque abstergere studebamus & c. Aet. serm. 5. cap. 95. Ventris cura quoq; habenda est, si uero superior uenter pituitam habuerit, uomitu euacuetur. Quibus autem sanguis abundat his uena secetur, bona est & per urinas purgatio etc. Itidē ait Pau. li. 2. c. 35. De alteratione discrasie omnes fere neoterici concordati sunt, inter quos lege Arculanum. 4. 1. Auicē. & Sauonarolam fuissimē de his loquentem, qui & simplicia & omnia fere composita ad pestem facientia copioso satis sermone enumerat. Aet. serm. quinto. cap.

R R



94. Et quandoq; refrigerationibus usi sumus, si ita opus esset, quandoq; uero calefactorijs &c. De causis coniunctis loquutus est Gentilis in suo introductorio, & 4. l. Auic. dicens, & si apostema uenerit ad augmentum, laudo non expectata digestionem, quod fiat scarificatio super apostemate, deinde apostema maturetur ac curetur ut dictum est &c. Vide in hoc latius Arculanum. 4. l. Auic. c. 5. & plura circa causam coniunctam bubones efficientem intelliges. De symptomatibus, & de sex rebus non naturalibus, qui legerit Sauonarolam multa intelliget, Auic. loc. cit. Et quando cadit appetitus restarentur ad comestionem, Nam plurimi eorum qui uiriliter agunt super illud, & uiolenter comedunt, absoluuntur & uiuunt, & oportet ut sint cibi eorum ex acetosis & desiccatiuis & sint pauca quantitatis &c. Vide etiã in hac re Paulũ etc.

#### Observationes in sectione uenæ.

Sauon. Si in hac febre non fieret phlebotomia conueniẽs, maior committeretur error, quàm in alijs febribus, Nã cum uires in hac febre satis imbecilles sint, multo magis ex missione sanguinis & spirituum exhalatione, imbecilliores euaderent, Gui. el. iubet nos debere phlebotomiam potius paritiri quam exquisitam facere. Obiectio.

In febre pestilenti phlegmatica conueniet, ne sectio uenæ, Nam dixit Auicen. si peccent a sanguine alij humores, quod euacuentur.

#### Responsio.

Satisfacit tuæ huic obiectioni Aui. l. 4. de cura febris phlegmaticæ dicens quum uideris urinam crassiorem & rubicundiozem, non erit malum si phlebotomaueris, & in cura tertianæ non puræ si fuerint urinae eorum crassæ tunc phlebotoma, & in cura caufonidis, & fortasse inquit iuuabis eos ex phlebotomia si illic fuerit turbiditas & rubedo.

Obiectio. Erit igitur omni de causa secanda uena?



## Responsio.

Maxime, si fuerint ur nae quales nuper dictae sunt. Intel-  
lige tamen, quod euacuatiua sectio sanguinis redundantiae de-  
bet, ceteris uero diuersiua uel euentatiua. Obiectio.

Ex qua uena fiet potior sectio? Responsio.

Si indifferenter patiens se senserit grauatum seccabitur  
uena media, si circa partes inferiores fuerit lesio, basilica, id  
est iecoraria, si superiores, uena cephalica idest humeralis,  
si in inguine fuerit bubo, ex malleo eiusdem lateris &c.

## Observationes circa curationem.

Arcul. 1. 4. Auic. cap. de cur. feb. post. notat quod cum du-  
plex sit intentio, una quae debetur feбри, ut in frigidatio, Alte-  
ra quae uacat humori, ut digestio, & uacuatio, q̄ potior &  
primum exequenda est euacuatio, quia humor sua maligna  
putredine & uenenositate magis nocet febrienti, quam phar-  
macum sua caliditate. Debet etiam uacuatio praecedere dige-  
stionem, quum digestio ipsa perfici non possit nisi lōgo tem-  
pore, quod in morbo tam acuto expectari non potest, iuxta  
illud Hip. Medicari in ualde acutis, si materia turgeat, eadem  
die, tardare enim in talibus malum est. Obiectio.

Quoniam medicamento uti debemus, leniente, Benedi-  
cto, an uiolenter euacuante? Responsio.

In hac febre neq; leniens, neq; uiolenter euacuans confe-  
runt, Siquidem leniens non nisi ea quae in uis ductuum repe-  
riuntur euacuat, relinquens quae circa cor computruerunt, At  
uiolenter euacuans nimium uires deijcit, quod summopere  
uerendum est, Quare neoterici benedicto tantum uocato  
utuntur.

## Obiectio.

Quid intelligis pro benedicto pharmaco? Responsio.

Scias quod medicamentum duabus de causis dicitur bene-  
dictum, Altera quarum est quod operatur soluendo absq; cor

RR 2



poris molestia, sicuti sunt medicamenta primi ac. 2. ordinis, unde Diamanna Gale. à Mesue descripta inter medicamenta benedicta connumeratur, Altera autem quia tale phar-  
macum absq; noxa corporis soluit, nec aliquam latentem mali-  
tiam obtinet, qua corpus inficiatur, unde electuarium rosa-  
ceum Mesue & Diaphinicon, quoniam solvunt absq; corpo-  
ris noxa etiam inter benedicta ascribuntur, & hoc uoluit i-  
pse Mesues in suo de consolat. parte. 2. cap. primo. & cæ. Vi-  
de tamen in hac re neotericos, ubi de febre pestilenti lo-  
quuntur, & cæt.

#### Observationes circa causas.

Gal. 1. de diff. feb. cap. 4. Oportet siquidem in omni causa-  
rum diligenter advertere, ex qua maxime potentia egrotare  
contingat, deinde corporum dispositiones, tam quæ eidẽ con-  
sentiunt, quàm quæ aduersantur considerare, illud pro com-  
perto habentes, quod quæcunq; consentientes sunt, facillime  
ledunt & c. Bac. consentiunt corpora uarijs superfluitatibus  
plena, iam ex seipsis ad putrescendum parata, & quibus in-  
sunt obstructio foraminum, plethoria, uita otiosa in multis  
crapulis ac rei ueneræe uribus immoderatis dedita & c.

#### Observationes circa alterationem.

Arcul. loc. superius cit. Et si frigida & sicca & acetosa  
conueniant in febre pestilenti, ratione qua putrida & mali-  
gna est, eo quod putredinem prohibeant, & causæ pestis quæ  
ex calido & humido constat, aduersetur, Ratione tamen ca-  
loris & materiæ diuersi generis, non semper, nisi cum alijs  
admixta sint, conducunt, Nam & calidis una cum prædictis  
uti oportet, ubi a pituita uel melancholia febris dependeat,  
similiter in sanis uti possumus calidis & siccis in alterando  
aerem, ut uoluit Auicennas, sed in febrientibus frigidis,  
& siccis, & cæt.



Pestem curantia ac perferuantia a peste.

In frigida dispositione conferunt Ambra, moschus, thus, mastix, aloes, sandaraca, lignum aloes, myrrha, resina pini, laudanum, Aristologia, Iuniperus, nux moschata, Garyophyllus, ebanus, inula, acorus, squinantum, bdelium, uinum aromaticum, cortex citri & semen eius, styrax liquida, laurus, basilica, styrax calamita, been, cinamomum, crocus, calamentum, cassia lignea, tedoaria, mellisophyllon, mentha, borago: In calida dispositione conferunt rose, corallus, sandali, camphora, acetosa, uiolæ, lambrusca, pira, cicorium nenuphar, coriandrum, bolus armena, poma cydonia, terra sigillata, myrtus, arantia, limones, syr. de succo acetosæ, de acetositate citri, de agresta acetosus simplex, tamarindi, uinum uuæ acerbæ, triphera persica, A proprietate ualent succus calendule, gallegæ, scabiosæ, pulueris radicis tormentillæ, puluis ditamni cum aceto & aqua rosacea, acetum scilliticum, oleum de costo, de scorpionibus compositum, theriaca maior, mitridatum etc.

De pronosticis febris pestilentis.

Auic. 1. 4. cap. quarto. Et hæc febris secundum plurimum est perdens hominem, Bac. præsagium fieri debet bonum, si ut inquit Hipp. aphor. secundo, aphor. trigesimo tertio in hoc morbo mente constent, & bene se habeant ad ea quæ offeruntur, quippe horum appetitus leui de causa prosternitur, Hippocrates aph. secundo. aphorif. decimonono. Acutorum morborum non sunt certæ prænuntiationes aut salutis aut mortis, Bac. maxime in his qui cum uideantur reconualescere statim decidunt ac moriuntur, Sauonarola pernitiōsa est febris pestilens, si cum seuis accidentibus calor mitis adiunctus sit, si facies sit tornatilis, & appareant macule nigræ, si urina fuerit turbulenta & subiugalis

R R 3



Et c. Bac. hoc uerum esse potest. Nam scriptum est ab ipso Hippocrate prædict. 2. c. 32. quod exitior urina est, quæ aquosa foetida nigra crassaq; apparet, Lege etiam Gal. apho. 4. com. 70. ibi, Nonnullæ igitur urinæ longo tempore manent perturbata, Nonnullæ cito sedimen crassum habent, Et cito morbum solutam iri significant, quæ uero non resident, si uires adfuerint longum fore morbum ostendunt, si imbecillitas adsit ægri mortem prænuntiant Et c. Auic. 1. 4. Sudor frigidus circa caput Et collum cum febre malum, uomitus foetidus uiridis Et diuersi coloris malus, Anhelitus foetidus malus Et mortalis, putredinem enim iam in corde confirmatam esse significat, Et. 2. 4. omne apostema Et pustula quod apparet, Et postea redit, malum Bac. nihil est inter alia signa deterius quam diuersitatem pulsus cum imbecillitate uirium percipere, Et hoc serua Et cæt.

Authores dissentientes in hac febre.

- 1 Adferere aerem Et aquam nullo modo posse putrescere.
- 2 Adferere cum Dino non posse solum hominem a peste capi quum morbus sit uniuersalis.
- 3 Adferere, cum Sauonarola posse uinum exhiberi in febre pestilenti.
- 4 Adferere, Calefactoria in hac febre nullo modo cōgruere.

Confutatio dissentientium circa febrem pestilentem.

Ad primum inquit Auic. 1. 4. tract. 4. cap. 1. Quod aqua nō putrescit propter suam simplicitatem, sed propter illud, quod de uaporibus malis ei admiscetur, similiter etiam Aer, Bac. quasi dicat in qualitatibus primis nulla fit mutatio, sed si suæ substantiæ alienæ qualitates malæ adhereant, tunc quatenus aggregatum est, ei potest putrefactio contingere, Confirmatur hoc ex Aristot. 4. metheorum omnia annuente posse pu-



trescere præter ignem.

Obiectio.

Si hoc esset uerum uideretur quasi sibi ipsi aduersari, nam in. 25. sect. problem. problemate uigesimo, dum quærit, cur terra & aqua putrent aer & ignis non putreant, respondet quia nihil putret, quod calidissimum & igne refertum sit, si igitur Aer igne refertus sit, fieri non potest ut putrescat. Respon.

Putrescere aliquid bifariam intelligi potest, proprie scilicet & improprie, Proprie omnia mista putrescunt, Improprie uero elementa, quum aliqua putrefactionis accidentia in eis remaneant sicuti foetor & c. Omnia igitur putrescunt siue proprie siue improprie, ut ipse ait Arist. præter ignem qui sui caliditate, omne humidum a quo fit putrefactio, consumit, Hinc est quod aer in parte suprema qua igni coniungitur, non putrescit, sed in ea parte qua ab igne longe abest putrescere interdum contingit, ut ipse Auic.

Ad. 2. Respondet Gentilis ratione probabili possibile esse aliquem solum a pestilenti febre captum & non plures simul, quia fieri potest quod homo in aliquo sit loco conclusus ubi cadauer inhumatus sui foetore cor illius pestilenti putredine inficiat, & sic peste solus ut dicat ratio moriatur.

Ad. 3. Auic. 1. 4. cap. 5. oportet ut non administrantur neque exercitium, neque balneum neque uina, neque tolleretur sitis & c. & sic interdicitur uinum, & ratio est, quia exercitationes, balnea, uina, & sitis, non solum corpus exsiccant, sed etiam attrahendi aeris maiorem copiam irritant, ac corpus accendunt, nec est in febribus quod magis inflammet quam ipsum uinum.

Obiectio.

Paulus ubi catapotia quædam Rasi describit, uino esse assumenda docet, quod si uinum noceret, non antidoti gratia exhiberetur.

Responsio.

Aliud est exhibere uinum ratione medicamenti, aliud ras

R. R. 4



tionem potus, siquidem hic in multa, illic in pauca quantitate assumitur & nota q̄ catapotia Rufi componuntur ex binis partibus Aloes & Gutte ammoniaci, et parte una myrrhæ, nec croci meminit sicuti Arabes. Ad quartum Aet. ser. 5. cap. 95. dixit quod si ardor occuparit partes interiores, extremitates autem & superficies frigida fuerint & præcordia distendantur, his calefactoria fomenta adhibere oportet, ut calor ad superficiem trahatur, & quibuscunque modis conandum est, ut calor ex profundo ad externa educatur, & sic calefactoria etiam congruunt. Adde tu etiam quod si a frigidis febris accendatur calida nimis prodesse. Obiectio.

Quomodo potest fieri febris a frigido? quum frigidum aduersetur potius eius calori, quam opituletur. Responsio.

Hoc fieri solet ob prohibitam transpirationem ex qua humores ad putredinem parati, putrescunt & febrē accendūt.

Obiectio. Anceps sum an febris sit morbus uel causa uel accidens, quum uario modo de ipsa legatur. Respon.

Febris esse potest causa morbus & accidens, iuxta tamen diuersas relationes, Nam febris per relationem ad phrenitidem dicitur causa, sed si referatur ad suam essentiam, secundum quam ledit operationes erit morbus, si uero post alium morbum fieri contingat erit accidens.

De symptomatibus febrium, & .i. de frigore tremore horrore, & rigore.

In principijs febrium tertianæ & quartanæ solent, hæc præsertim symptomata contingere, frigus scilicet, tremor, horror, & rigor, quæ quonam modo inter se differant, & quid sint, scire præsentaneum esse existimauimus. Frigus igitur quod Græci +ύχος dicunt, fit in febribus quando superficies corporis motu inæquali non mouetur. Tremor uero est partium, quæ uicissim sursum & deorsum feruntur



inuoluntarius motus, Horror autem est tremor qui fit quum totum corpus intremiscit absq; tamen concussione. Rigor demum est frigefactio dolorifica cum quadam totius corporis inæquali concussione & quassatione, Differt tremor a rigore, eo quod unius duntaxat particula, sed rigor uniuersi corporis affectus est, Differt rigor ab horrore, quum horror sit solius cutis affectus, rigor uero totius corporis, Differt horror ab utroq; quum nulla agitatione corpus moueat, Hæc tamen ita se consequuntur, in primis accedit quedam inæqualis temperies mox frigus sequitur, inde horror, & quandoq; tremor, nouissime autem omnium rigor, qui totum corpus inæquali motu concutit & quassat, subsequitur & c.

Loci consentientes de frig. tremore horrore  
& rigore.

Gal. in li. de trem. & palp. cap. 6. Exacerbationis aggressum huic quidem cum rigore, alteri uero cum horrore et alteri cum solo frigore aduenire affirmamus & c. Lege caput quintum & sextum huius libri, & inuenies quid horror frigus tremor & rigor, & quomodo inter se differant. Galen. 5. de sympt. caus. cap. 5. Quum enim praua excrementa fuerint congesta, in primis inæqualitatem sentimus, quæ si acria fuerint erosionis quoq; sensus accedit, secundo loco horrorem percipimus: postremo rigorem quo partes quatiuntur & concutiuntur & c. Vide etiam Gale. cap. 4. eiusdem, & 2. de diff. feb. cap. septimo, ubi de rigore & horrore loquitur, ibiq; habet quod horror medius sit inter rigorem & frigefactionem & c.

De causis frig. horroris rigoris & tremoris.

Cææ frig. extremitatū in febribus sūt aut paucitas sptūs nō ualēs ad mēbra extrinseca se diffundere, aut noxa intrinsecus



contenta, sicut apostemata, uel ulcus, aut materia maligna sua multitudine & malitia multum ledēs, aut materia quædam frigida in extimis partibus retenta, sicuti in febre lipyria, aut cibus calorem reuocans ad interiora, aut timor, aut aliud quodpiam symptoma hoc efficiens, aut obstructio partium extremarum, quæ spiritum & sanguinem ne libere exeant, prohibet, aut est principium febris, quo ueniente spiritus & sanguis ad locum materiæ congregantur ut eam expellant, Cause horroris & rigoris sunt humores mordaces qui partim in nobis gignantur, partim extrinsecus inferuntur, uerum hi secundum magis & minus differunt, Nam qui modice mordent pruritus efficiunt, qui magis rodunt, qui uero acriores adhuc sunt horrorem excitant, qui demum mordacissimi rigorem pariunt, Differunt etiam inter se copia & motu, præterea quod laborantium corporum alia suapte natura non ita facile afficiuntur, alia sunt imbecilla, alia facile sentiunt, alia hebetiori sunt sensu, Nam corpus quod facile sentit & imbecillum est a causa perquam exigua afficitur, Robustum uero & obtusi sensus non ita, Rigor insuper fieri potest a calidis uaporibus exhalatis meatibusq; apertis ac resolutis spiritibus sicuti in crisi per sudorem. Fit etiā a malignitate humoris natura attrahente calorem et spiritus, dum eius malitiam abhorret, aut fit ab imbecillitate retentoriæ facultatis sicuti in sudore diaphoretico cui frigus adiungitur &c. Causa tremoris est uaria & multiplex, Nam hæc dispositio facultatis quæ corpus mouet, imbecillitas est, sed causa huius imbecillitatis, aut est alimenti defectus ut in fluxibus & sanguinis eruptionibus, aut inædia aut uitalis roboris exolutio, ut in cardiacis resolutionibus, aut uiolenta uehemensq; refrigeratio uirtutem occupans, aut nimia repletio aggrauans, &c.



IN CVRAN. MOR. LIB. III. 617  
Loci consentientes de causis frig. horroris  
rigoris & tremoris.

De causis ipsius frigoris lege Gal. io. meth. ca. 4. ibi. Mor-  
dens halitus & succus ubi per sensilia corpora fertur, horro-  
res & inaequales totius corporis cōcussiones facit in ijs, qui-  
bus cute stipata, quæ prius transpirabant, iam sunt retēta, etc.  
Vide idem cap. 10. eiusdem libri, ubi Gal. inquit quod ex bal-  
neo præcipue intempestive habito horrores fieri possunt, Vi-  
de tamen de causis frigoris. i. 4. tract. 2. cap. 1. & cap. de horri-  
pilatione et ubi agitur de lipyria febre, & 4. aph. aph. 48. et  
7. apho. com. et cō. 1. 57. & 5. de sympt. causis & c. Gal. in li. de  
plenit. At qui in nobis mordaces gignuntur succi eorum pru-  
riginosi sunt, qui modice acres sunt ulcerosi autē sensum pa-  
ruunt, qui his sunt mordaciores, qui uero hos quoque morda-  
citate superant, horrorem, sicuti qui iam præterea mordaci-  
fimi sunt, hi rigorem inferūt, Vide de causis horroris. 7. aph.  
com. 57. ibi horror autem prauis humoribus per cutem cura-  
rentibus accidit, De causis tremoris mentionem facit Gal. in  
lib. de trem. & palp. cap. 5. ibi, non una duntaxat tremoris  
causa est, sed ob multas uariasq; occasiones fieri contingit,  
& c. Vide tu illum latius, uide etiam Arcul. 1. 4. cap. 12. &  
34. ubi dicit multotiens profundari calorem febrilem, &  
extrema eorum infrigidari, & c.

De indiciis frigoris horroris tremoris & rigoris.

Ex superioribus locis, & ex definitionibus iam datis, pa-  
lam satis est eorum cognitio quæ ex relatione infirmi po-  
stea confirmatur, & c.

De cura frigoris horroris tremoris & rigoris.

Considerandum in primis num rigor in typo sudorē præ-  
cedat sequatur ne, aut illi coniungatur, Si præcedit tunc fit in  
principijs febrium interpollatarum, & pannis calidis remo-



uetur, Si sequatur, uel coniungatur sudori, tunc si fuerit creticus nullo pacto debet cohiberi, si minus sit creticus, tunc uel est debilis uel fortis, si debilis tunc leui frictione & calidis duntaxat applicitis auferetur, Si fortis & longus, tunc quintuplici scopo curabitur. Primo, sex res non naturales ad calidum declinent. Secundo, materia uigorem efficiens per uomitum educatur, praesertim cum eo tempore ad stomachum sese moueat, aut si hoc fieri non possit, per secessum, cum hiera, cassia, & Aloe, uacuabitur. Tercio, Materia, quae mordax est mitigetur, ac fiat in posterum, ne amplius rigorem efficiat, unde si fuerit tenuis incrassabitur, si crassa extenuetur cum syrupis ad hunc rem facientibus ut alias dictum est. Quarto, Danda est opera, ut materia quae uelocissima ad membra sensilia aduolat, non tam raptim, sed quietius moueatur quod fiet per ea, quae infrigidant corpus & quietem inducunt, aut per ea quae sensum obtundunt, utpote per soporifera. Quinto, Extremae partes ligentur ac fricentur, nec non rebus calidis, utpote cibarijs unctionibus & similibus utemur. Nam fortis per ualidas inunctiones a partibus dorsi posteris applicitas, (a quibus rigor praesertim incipit) auferetur, similiter cum calidis lintheis & cum frictione, Iuuant etiam ad pedes ponere calidos lateres uino aspersos & inungere extremas partes cum oleis calidis &c. Cura uero tremoris erit, si a frigefactione proueniat, cum calidis medicamentis, si a cardaicis stomachicisq; exolutionibus cum his quae superficiem densant refrigerant ac porros claudunt, si ab alimenti defectu siue inedia cum his quae nutriunt, si a repletionem per ea quae euacuant &c.

Loci consentientes de cura frigoris horroris  
rigoris & tremoris.

Auic. 1. 4. cap. 12. Quod est de hoc sequens sudorem reti-



ficatur uelociter, & non indiget regimine, & cretico non oportet ut contrarium fiat per remotionem, & non est de illis quæ debilitant, & quæ faciunt aliud &c. Bac. Hinc elicitu quod aliquis est rigor sequens sudorem, aliquis creticus sicuti ex Auicen. textu colligitur, Quod autem quintuplici scopo curetur, lege Arculum plura super Auic. narrantem, & inuenies quæcunq; a me pridem declarata sunt.

**Obiectio.** Non intelligo cur rigor debeat curari, quum præsertim curata febre, ipse curetur.

**Responsio.**

Scias uelim quod rigor interdum accidit cum febre, interdum sine febre ut habetur ex Auicenna dicente, in forti quando perseverat, siue sit in febribus siue sit in alijs, &c. Sed si fuerit in febribus peruertit curationem tribus de causis, Interdum propter tristem eius sensum naturam debilitantem ac contristantem, interdum ob eius motum compressiuium, ex quo resolutio ac uirium imbecillitas sequitur, Interdum etiam ob uehementem caloris retractionem qua fieri potest, ut inde suffocatio sequatur, & sic cura peruertitur, At ubi in rigore hæc non formidentur, cura nulla est, & ita non debet curari rigor, &c. Galenus in libro de trem. & palpit. cap. quinto. Si aliquis ex refrigeratione tremunt calidis medicamentis eos curare licet, At si exhausti ut in cardiacis stomachicisq; exolutionibus tremuli nonnulli fierent, hos calefacere periculum extremum est, e contrario procedendum esse affirmo, his enim superficiem condensare, & medicamenta quæ refrigerant, & inspissant, atq; poros claudunt, ad mouere oportet, Si uero alimenti defectu, ut in his qui inedia se conficiunt, et ultra modum euacuatis, tremores aduenirent, hos nutrimento egere unicuiq; patet, insuper quicunq; ob humorum repletionem, uirtute grauata, tremore



corripiuntur, hos uacuatio sanat &c. Bac. Vide ad confirmationem eorum quæ dicta sunt uerba Hippoc. ibi a Galen. recitata. Quod autem in rigore remedia adhibeantur dorso, lege Hip. aphor. 5. aph. 69. ibi. Rigores incipiunt ex lumbis magis & per dorsum in mulieribus, sed in uiris parte corporis posteriore, &c.

De pronosticis rigoris & tremoris &c.

Hip. apho. 4. aphor. 58. A febre ardente habito rigore superueniente fit solutio. Bac. rigor accipitur pro uehemēti frigore, & græce πῦρος dicitur, & fit ob flauam bilem per sensilia membra ueloci motu delatam, quo fit ut per aluum uel sudores uel uomitus postea deiiciatur, aut per sudorem, si a uenis ad cutem deferatur, & sic fit optima crisis dummodo fuerit concocta materia, & natura morbum superet in die decretoria. Et aph. 4. apho. 46. Si rigor inuidat febre non deficiente ægro iam debili lethale est. Bac. lethale dixit, tum quia uis imbecillis ferre non potest rigoris agitationē, tum quia ab imbecillitate facultatis retentoriæ rigor proueniens, malitiam humoris, & uirium imbecillitatem arguit. Et aph. 4. aph. 63. Quibus in febribus rigores quotidie fiunt, quotidie febres soluantur, Bac. fit rigor in febribus tertianis & quartanis, quæ soluant sed permanet quædam dispositio præter naturam in corpore, a qua secundum circuitum rursus febres & alij morbi generantur, Nam causa reuersionis febrium est duplex caliditas scilicet derelicta, in quo materia computruit, & humoris qui debet putrescere qualitas respirationem prohibens, ut Auicennas ipse testatur. 4. can. ca. de feb. putrid. in genere. Hip. aph. 6. aph. 26. Qui in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio soluantur. Bac. fiunt tremores a materia a uenis ad neruos delata, fiunt deliria si una cerebrum ob uapores ad caput elatos compatiatur. Et aph.



7.aph.4. A sudore horror non bonum. Bac. quia tum imbecil-  
 litatem uirium, tum malignitatē humorum talis horror ma-  
 nifestat prout in sudore diaphoretico uisitur. Et aph.7.aph.  
 26. In forti dolore uentris, partium extremarum frigiditas  
 malum, Bac. frigiditas talis fit uel ob magnitudinem inflam-  
 mationis, aut propter animi deliquium, uel ob caloris natiui  
 extinctionem, interdum etiam ob uehementiam doloris, ad  
 quem natura una cum sanguine contrahitur, non relinquens  
 solum extremas partes corporis, sed interdum caput & uni-  
 uersum cutim ubi precipue medios corporis partes dolor  
 occupet. Et aph.7.aph.1. In morbis acutis frigus partiū ex-  
 tremarum malum, Bac. inquit Galenus acutos morbos ab eo  
 uocari, quorum febres magna ex parte continuæ sunt, quæ si  
 citra inflammationem fuerint, nedum extrema frigesce-  
 re, sed exuri contingit, At si inflammatio aliqua fuerit, ipse in-  
 flammationis calor trahit ad se sanguinea ueluti cucurbitu-  
 la, & extremæ partes ex hoc frigescent, & uiscera urun-  
 tur. Auic.2.4. tract.1. cap. 63. Rigor plurimæ redditionis in  
 febre praua cum debilitate uirtutis est mortalis & cum fir-  
 mitate uirtutis, quando febris cum eo non remouetur, non  
 est bonū, & deterior omnibus est, ut sequatur ipsum euacua-  
 tio non adiuuans, & non sedetur cum eo febris, & si non ac-  
 cidat euacuatio iterum, tunc significat, quod humor motus  
 est uincens, qui expelli non potest & est malum &c. Hipp.  
 aph.7.aph.7. ex multa potatione rigor & desipientia malū,  
 Bac. calor natiuus interdum ex multa potione extinguatur, et  
 sic fit rigor; interdum caput repletur, & ita desipientia oriri  
 solet, Quodcunque autem horum casuum acciderit, malum  
 est, Et aph.7.aph.57. Alyce idest anxitudo oscitatio horror,  
 uinum æquale æquali potum soluit ægritudinem, Bac. quo pa-  
 tio intelligi debeat aphorismus. lege Gal. commentum &c.



Authores dissentientes circa rigorem frigus  
& horrorem.

- 1 Adserere, rigorem non posse citra febrem contingere.
- 2 Adserere, frigus esse tantummodo causam ipsius tremoris.
- 3 Adserere, non esse exhibenda solutiua in rigore.
- 4 Adserere horrorem non posse gigni nisi ab intrinseca causa.

Confutatio dissentientium circa rigorem  
frigus & horrorem.

Ad. 1. Gal. lib. de inaequali intemperie. cap. 8. Veruntamen nos ipsi tum alij iuniorum medicorum non paucis sapen-  
mero uidimus rigorem, quem nulla sequuta sit febris, quin-  
etiam ijs qui rigent, nec tamen febricitant inaequale tempe-  
ramentum est &c. Et reddens rationem inquit, Caterum in-  
cidit tum mulieribus, tum quibusdam uiris, uerum debet o-  
mnino deses praecessisse uita & ciborum quaedam homo sum-  
psisse, ex quibus tardus & pituitosus succus qualem Praxa-  
goras uitreum existimat, nascatur &c.

Ad. 2. Gal. in lib. de trem. & palpit. cap. quinto. Tremoris  
uero neque una causa est, neque etiam frigus tremoris dun-  
taxat causa existit, sed uario modo fieri contingit, &c.

Ad. 3. Auicen. i. 4. cap. 12. & solutio inquit uentris cum eis  
quae sunt sicut hiera & diacitoniten & diaphinicon, imo  
quando rigor est prauus & laboriosus, & proprie sine fe-  
bre dentur in potu pillula foetide, quoniam ipsae sunt sani-  
tas eius &c. Bac. Nota quod dari solutiua in rigore bifaria  
potest intelliigi, aut scilicet sedato iam rigore, aut stante ri-  
gore, dum uita in mortis discrimine ponitur, & nullus sit a-  
lius euadendi modus, nisi per euacuationem. In his tamen  
primus magis mihi arridet quam secundus modus, & si alij  
astruant secundum posse periclitari: dum materia in motu  
existens



existens facilius euacuetur, Vide tamen in hac re Arculanum in. i. fen. 4. Auic. & Gentilem.

Ad. 4. Gal. aph. 7. com. 57. liquet autem inquit, quod nunc a nobis habetur sermo de horrore qui ex corpore provenit in salubri, & non de illo qui causam extrinsecus habet, & sic ab extrinseca causa etiam gigni potest, sicuti in libro de inaequali intemperie etiam ipse planius fatetur, &c.

#### De sudore.

Sudor est defecatio siue superfluitas sanguineae humiditatis serosae & tenuis quae interdum in diebus iudicatorijs, Interdum in toto morbi tempore sine iudicatione cōtingit etc.

#### Loci consentientes de sudore.

Auic. 1. 1. cap. de qualitate generationis humorum, Sudor est inquit superfluitas tertiae digestionis, Gale. aphor. 4. com. 38. dixit, (prout habet antiqua uersio) quā sudor naturalis nihil aliud est quā purgatio naturae ex nimijs superfluitatibus, & com. 42. eiusdem sunt inquit de sudoribus qui in diebus iudicatorijs fiunt, & de ijs qui in toto morbi tempore sine iudicatione apparent &c.

#### De causis sudoris.

Sudores omnino fieri a natura humidam superfluitatem euacuante, iam compertum est, siue per modum crisis id fiat, siue a morbo naturam cogente, fiunt etiam ab exercitio, a balneis, & a cibis abundanter deuoratis, sunt tamen sudorum aliqui frigidi ab humore frigido, aliqui calidi ab humore calido prodeuntes, Rursus contingunt sudores, uel ob uitium imbecillitatem uel ob corporis raritatem, uel excrementorum tenuitatem, &c.

#### Loci consentientes de causis sudoris.

Galen. aphor. quarto. comment. 38. fiunt sudores uel natura humiditatem superfluam euacuante, uel quando non



continentior in corpore, morbi ratione & c. loquitur etiā de hac humiditate superflua aphor. 4. com. 36. & com. 37. eiusdem ubi reddit rationem de frigidis & calidis sudoribus, Quod uero contingant ob uirium imbecillitatem & corporis raritatem, lege Gal. aphor. 4. com. 41. ibi, si sudor multus non esset, posset & propter uirium imbecillitatem & corporis raritatem accidere & c. Vide etiam. 6. de sympt. cau. cap. 2. ibi, Multus sudor fit ob corporis raritatem aut ob excrementi tenuitatem, aut eius abundantiam, detinetur autem a contrarijs causis, utpote si paucum si uiscidum si crassum fuerit excrementum, aut si constipantur meatus, id uero ipsis accidit uel quia obturantur, uel quia clauduntur & c. Auic. 2. 4. cap. 66. Sudor fit, aut causa materiei propter multitudinem suam aut subtilitatem suam, aut causa uirtutis ex uehementia scilicet expulsiuæ, aut mollificatione retentiuæ, aut causa pororum quando dilatantur & c.

#### De signis sudoris.

Cum inter indicia morbos demonstrantia sudores reponantur, non est signorum signa denuo ostendantur, quum per se & pateant, & ex relatione, si non aliter infirmi cognoscantur, sed potius quæ ipsi portendant inuestiganda sunt, quippe sudor quam partem corporis obtinet, ibi morbum esse significat, & c.

#### Loci consentientes de signis sudoris.

Lege aphor. 38. quartæ sectionis ibi, Qua parte corporis sudor est, ibi significat morbum, lege Galeni commentum.

#### De cura sudoris superflui.

Erunt in curatione sudoris superflui indicationes quinque, quarum prima, si a raritate corporis sudor accidat, porros ac omnes meatus claudet ac constipabit per ea quæ in crassant ac obturant euentando ac in frigidando corpus. 2. si a materia



tenui proueniat, crassiore eam reddet. 3. Si sudor ab imbecillitate retentoria facultatis, siue a fortitudine expulso-  
 ringat, primum retentoriam facultatem roborabit, et ro-  
 bur expulso- ringe remittet cum his quæ pluries dicta sunt. 4. ma-  
 teriam, quæ a centro ad circumferentiam mouetur, in contra-  
 riam partem auertet. 5. omnium ultima sex res non natura-  
 les instituet, ut materia ad sudorem apta crassescat, & corpo-  
 ris facultates foueantur, &c.

#### Loci consentientes de cura sudoris superflui.

De curatione sudoris superflui, siue per crism siue aliter  
 contingentis habes Auic. 4. 1. cap. 13. ibi, cum fuerit necessitas  
 & sudor pertransit terminum, tunc oportet ut euentetur ac  
 in frigidetur locus, & in aere frigido ægrum concuti, & se-  
 ipsum mouere &c.

#### Obiectio.

Quomodo se ipsum mouere uel concuti, cum omnis mo-  
 tus potius calefaciat quàm in frigidet, & sic sudorem promo-  
 ueat, qui reprimendus esset?

#### Responsio.

Tuæ huic obiectioni satisfacit Aristoteles quinta sectione  
 problem. problem. 34. dicendo non omnem motum habere  
 cum calefactorium, quippe fieri potest, cum mouemur, ut fla-  
 tus excitetur, qui refrigerare nos potest, Nam flatus quisque  
 ut ipse ait frigidus est, uide de his singulis intentionibus neo-  
 tericos Auicennæ commentatores, & reliqua intelliges quæ  
 à me scripta sunt &c.

#### Observationes in restringendo sudorem.

Auic. loc. cit. Oportet ne sudor ceticus quantum possibile  
 est restringatur, & non oportet ut occupetur in exsiccando  
 illud quod rorando egreditur faciendo exsiccationem post  
 exsiccationem, Nam illud est occasio ad prouocandū & mul-  
 tiplicandum, & fortasse attrahit syncopim, Nam eius abster-  
 sio addit in ipsum & eius demissio restringit ipsum, &c.



Bac. attrahit interdum syncopim resolutis scilicet in abster-  
sione spiritibus, & abstersio est causa sudoris, quia eo remo-  
to ne detur uacuum, alius subsequitur & demissio restringit,  
quia per seipsum sudor incrassatur ac foraminibus corporis  
adheret ita, ne intra se promere possit, uide de hac re Arist.  
sect. problem. 2. problem. 12. ibi cur detergenti magis profluit  
sudor & c. lege latius sectionem totam et plura de sudoribus  
intelliges. Gentilis refert se cuidam mulieri sudorem diapho-  
reticum curasse cum rosata nouella a Nicolao descripta cuius  
semuntia tuto exhiberi potest & c.

#### De pronosticis sudoris super flui.

Hip. pronost. 1. text. 29. Sudor optimus est per omnes acu-  
tos morbos, si per diem uenerit decretorium et integre sedat  
febrem, Bonus etiam si ex toto corpore prodeat, faciatq; ut  
ager ferat facilius morbum, si uero nihil tale efficiat, nequa-  
quam utilis est, pessimus uero si frigidus egrediatur & circa  
caput tantummodo uultum & ceruicem, Hic enim cum acu-  
ta febre mortem cum mitiore morbi longitudinem indicat  
& c. Bac. Iudicantur sudores multifariam. 1. per eorum sub-  
stantiam ut crassi tenues & uiscosi, aut per eorum quantita-  
tem ut si sudor sit multus paucus mediocris, aut per eorum  
qualitatem ut calidus frigidus pallidus clarus Amarum dulcis  
foetidus, aut per infirmi relationem, & hoc ratione leuitatis  
& grauitatis, aut per eorum tempora ut in principio morbi  
augmento statu & declinatione, aut per eorum locum, ut in  
toto corpore uel in eius parte etc. De his tamen lege uberius  
Auicen. 2. 4. cap. 70. & latiore longe sententiam inuenies.  
Hip. aphor. 4. apho. 36. Sudores febricitanti si inceperint bo-  
ni & 3. & 7. & 9. & 11. & 14. & 17. & uigesimo, & uige-  
simo septimo, & trigesimo quarto. Hi enim sudores iudicant  
morbos, qui uero non ita fiunt, laborem significant et morbi



longitudinem & recidiam: Bac. non solum intelligitur aphorismus de sudoribus, sed etiam de alui excrementis & urinis multis, & iuxta aurem abscessibus, quæ in prædictis diebus cum tollerantia ægri appareant optima sunt indicia. Disce etiam hic ex aphorismo qui sint dies iudicatorij. Disce adhuc ex Galeni commento quod morbi in diebus imparibus habentes accessionem citius terminantur, qui uero paribus tardant, & hoc ex motu humorum &c. Et aph. 4. aph. 41. Sudor multus ex somno factus absq; causa manifesta corpus uti pluri cibo significat, si uero cibum non accipienti hoc accadat scire oportet quod euacuatione indiget. Bac. Multus sudor fit teste Gal. uel ob ciborum recenter sumptorum immoderantiam, uel ob illorum qui præterire multitudinem, si primum, prohibendum est, ne in posterum plures sed pauciores assumantur, si secundum euacuandum erit. Obiectio.

Si sudor sit motus naturæ ab intrinsecis ad partes forinsecas & somnus e diuerso, miror quomodo in somno possit contingere.

Responsio.

Fit in somno quia magis roboratus calor in humiditates agit, ex quibus fiunt uapores, qui in sudorem postea abeunt. Hip. aph. 4. apho. 42. Sudor multus calidus uel frigidus semper fluens, frigidus magis calidus minus morbum significat, Bac. nota ex Gal. frigidos sudores frigidam materiã innuere, & peiores sunt, calidi uero calidam et minus sunt exitiales.

Obiectio. Quo frigidi frigidã materiã demonstrant, si etiam in acuta febre, quæ a calidis humoribus proficiscitur, fieri possunt? Responsio. Frigidi sudores bifariã fieri possunt, uel a calore naturali deficiente, nec ad cutem sese extendente, non febre acuta, aut a materiã morbi a qua ipsi decidunt, De hac 2. intellexit Gal. quod frigidi frigidã materiã manifestat, et nõ de prima diuisione, et ita nulla est tua obiectio.



Hip. aphor. 4. aph. 37. Frigidi sudores cum acuta quidem febre, mortem cum mitiori autem longitudinem morbi significant. Bac. frigidus est sudor quum humores in animalis corpore tantæ frigiditatis sint, ut neq; a calore natiuo, neq; a febrili possint calefieri, idcirco talis sudor in febre acuta perniciosus est.

Obiectio.

Quomodo potest esse frigidus sudor in acutissima febre, quum duo contraria esse simul non possint in eodem loco?

Responsio. Non sunt in eodem loco, nam febrilis calor in uasis continetur, sudor uero circa cutim, & sic nō sunt in eodem loco.

Obiectio.

Si febris est calor extraneus per totum corpus diffusus, quomodo non sunt in eodem loco?

Responsio.

Febris diffunditur per totum corpus modo nō sit aliquid, quod ipsam prohibeat, sed defectus caloris natiui hoc efficit ut febris non diffundatur, quæ nil aliud est, quàm calor naturalis mutatus in igneum qui cum deficiat, nō potest diffundi, Hipp. apho. 4. aph. 5. febricitanti sudor superueniens febre non deficiente, malum prorogatur enim morbus, & multam significat humiditatem, Bac. si multa sit humiditas, necesse est ut morbus quoq; sit longus, quum natura non nisi longiori tempore eam & dissolvere & concoquere possit & c.

Authores dissentientes circa sudores.

1. Adserere, sudorem non esse superfuitatem tertiæ digestio-  
nis, sed secundæ.
2. Adserere, plurimum sudorem semper esse malum.
3. Adserere, sudorem in febribus circa caput & collum esse  
bonum.
4. Adserere, sudorem a multa exercitatione non esse da-  
mnandum.

Confutatio dissentientium circa sudores.



Ad primum dicimus sudorem qui provenit insanis corporibus esse superfluitatem tertiæ digestionis ut voluit Avicennas, Sed in febrientibus corporibus esse secundæ digestionis, quum a materia in uenis contenta defluat, potest tamen dici tertiæ digestionis quoad transitum quia dum effluit etiã transit per locum tertiæ digestionis, &c. Ad. 2. loquens Gal. de sudoribus creticis. 6. de sympt. cau. cap. 2. inquit tantũ abest ut dissolutam naturam portendant, ut qui robustas vires annuntient, Nam eiusmodi sudores corpus purgant, atque haud absimiles sunt his, quos & modica exercitatio & balneum & æstiuus calor euocant. Et. 9. meth. cap. 5. inquit, nisi detrahatur sanguis in febribus quantum vires tollerant, pro certo habendum fore, ut suffocentur uel a syncope omnino periclitentur, nisi eos uel uirium robur, uel plurimus sudor a morte uindictet, & sic plurimus sudor non est semper malus &c. Ad. 3. Gal. 1. pronost. com. 29. Pessimus sudor inquit, est si frigidus egrediatur. Item cum eo malum esse dixit si circa caput & ceruicem eueniat, licet frigidus non sit, hic enim minatur syncopen, si uero circa tales partes frigidus appareat pessimus est, quippe qui non in super fore, sed iam syncopen esse indicet, & ita siue frigidus siue calidus sit, in febribus malus est &c. Ad. 4. Gal. 6. de symptom. cau. cap. 20. respondet dicens sudorem qui per immodicas exercitationes efficitur, non nihil utilis humoris excernere, & ita cum magis damnat quam laudet.

De fluxus superflui sanguinis narium causis.

Quid sit fluxus sanguinis narium, nemo est, qui ignoret, eius tamen causas multiplices esse comperio, Nam aut a nimia aquositate, uel bile irritante fit, aut a nimia superfluente febrili caliditate, aut ab imbecillitate retentoriæ facultatis, aut ab expultrice irritata, aut ab ipsa natura critica ipsum



expellente, Fit autem plurimum in iuuenibus usi ad trigessimum quintum annum &c.

Loci consentientes de causis fluxus sanguinis narium.

Gal. 5. meth. cap. 2. Sane ex uena uel arteria sanguis profuit, aut referato eorum ore, aut tunica eorum diuisa, diuiditur autem uulneratione contusione ruptione erosione &c. Quomodo autem anastomosis & diapesis uenarum fiat deinceps ipse docendo prosequitur, uideas igitur textum si lubeat, Vide etiam in hoc. 1. 4. cap. 14. Arculanum plura de his causis differentem &c. Quod in iuuenibus fiat usque ad 35. annum lege Hipp. pronost. 1. tex. 37. ibi. Sanguinis fluorem in iuuenibus, trigessimum quintum annum agentibus expectare oportet. Bac. quia per hanc etatem plurimus sanguis abundat etc.

De cura fluxus sanguinis narium.

Cura fluxus sanguinis narium consistit in remouenda ipsius fluxus causa. Primum si a tenuitate sanguinis proveniat, protinus cum his que dicta sunt, incrassetur, si a nimia caliditate per ea que infrigidant, Si ab imbecillitate uirtutis per ea que & retentoriam robovent, & expultricem mitigant, Secunda intentio erit in diuertendo tum cum euacuantibus, tum cum his que ad contrarium sanguinem reuocant cum cucurbitulis circa iecur aut ipsum splen applicitis, &c. Tertia intentio circa ea uersabitur que uenarum ora comprimunt, fitque tum cum his que naribus instillantur ac sufflantur cum puluere scilicet trochiscorum de terra sigillata de charabe bolo armena, tum cum his que ex albumine oui pauco acetato & pulueribus dictis in modum cataplasmatum componuntur. Quarta intentio erit sex rerum non naturalium, que ut sanguinis crassetur ac frigesiat, & retentoria uis roboretur, ordinata sunt &c.



## Loci consentientes de cura fluxus sanguinis narium.

Aet. *serm. 5. cap. 124.* At uberior excretio eius multitudinem & laxare & minuere potest, paulatim igitur euacuationem facere oportet inde, unde natura impetum habet, sufficiente autem facta euacuatione consueti more eundem suppressere & c. quæ autem suppressant lege ipsum *serm. 6. cap. 94.* ibi sanguis narium eruptionem sistit urticae succus & c. Lege etiam *Gal. 5. meth. cap. 3.* ibi. At si ex uulnere & c. & multa ad curationem facientia intelliges. At particulatim de omnibus intentionibus lege *Auicennam. 1. 4. cap. 14.* ibi. Cum autem necesse est prohibere fluxum sanguinis narium in febribus acutis & c. lege etiam ibidem *Arculani commentarium*, uide insuper *Gentilem de fulgineo* in suo practice introductorio, & ibi intelliges qui cibi administrandi sint, Quidue in causone prohiberi debeat, & multa ad hanc rem efficacitæ remedia, quæ non solum suis qualitatibus, sed a tota specie ut aiunt sanguinem cohibent, & c. Hac nota tamen quod in febre quartana fluxus sanguinis narium, nisi nimium superq; fluxerit non compescendus est, imo potius comprimendo gulam (in ea præcipue febre quæ a melancholia per adustionem sanguinis generatur,) ac setis porcinis irritandus est, & hanc rem attestatus est *Auicennas* loco superius citato ibi. Quandoq; aduenit fluxus sanguinis narium patientibus quartanam, quare oportet ut iuues cum facientibus fluere sanguinem ut dictum est & c. *Galen. 5. met. cap. 6.* eodem modo eorum quibus ex naribus sanguis profuit aliqui ex capitis refrigeratione deterius habuerunt & c. lege hunc locum fusius.

R. BLANCHARD

PROF. FAC. MED. PARIS



Observationes circa curam fluxus sanguinis narium.

Gal. s. meth. cap. 6. non sine discrimine, nec omni tempore loca quæ circa particulam unde sanguis profluit, sunt posita, refrigeranda sua serim, imo posteaquam in alia prius auerteris, ut exempli gratia, ubi sanguinis missione usus sis, uel artuum frictione deuinditioneq; uel ad præcordia delixis cucurbitulis, quin ne sic quidem ad frontem & caput illico refrigerantibus utendum, sed prius est ad contraria reuellendum, utiq; affixa in summa ceruice cucurbitula, Quippe duplex est auersio, & quæ ad totius corporis inferna, & quæ ad capitis posteriora, propterea uidelicet quod ipsæ nares & in superiore & in anteriore parte sunt sitæ &c.

Cohibentia sanguinem narium.

Cohibent sanguinis narium fluorem Acatia, aizoon, antimonium, tela aranea, athanasia nic. cum succo plantaginis, puluis dragacanthi uustus, bolus armena, camphora cum aceto & aqua lactucæ, cartæ ustæ, semen cicutæ, coagulū agni, cinis cholearum terrestrium, corallus, coriandrum recens, hematites lapis, constringere extremitates corporis, gallæ cum oui albumine, gipsum cum lentibus, bolo armena & aceto, gumi arabicum cum sanguine draconis, charabe, fumus lane succidæ, uaporatio lapidis molaris cum aceto, limacia cum aceto, minium, myrtus, rosa, mumia, succus nepitæ, olibanum, ostraca usta cum aceto, cortex oui combustus, semen & radix peoniæ, plantago, succus rutæ, epithema circa hepar cum sandalis, sanguis columbæ & asini, sarcacolla cum oui albumine, solatrum sumach, spodium, stercoris asinini odor et succus impositus, uernix, uirga pastoris, succus urticæ, roscisci de terra sigillata, troc. stellæ tucis &c.

De pronosticis fluxus sanguinis narium.



Hip. aph. 4. aph. 27. Quibus in febribus sanguinis fluxerit multitudo, quacunq; ex parte, cum reficiuntur, alui ijs humectantur, B. causa ob quam uenter humectatur in resumptione est calor natiuus iam propter fluxum sanguinis debilitatus, quo fit, ut nec cibi bene concoquantur nec in sanguinē transmutentur, nec per totum corpus distribuantur, unde humiditas ad uentrem illabitur, & sic fit aluus humidior. Et aphor, 5. aph. 32. Menstruis deficientibus, sanguis ex naribus fluens, bonum, Bac. Consuevit Hippocrates per unum exemplū multa notare, unde si sanguis per hæmorrhoidas etiam defluent, non essent propter hoc quod aphorismo aduersaretur.

Obiectio. Cum per tot loca possit sanguis expurgari, ut per hæmorrhoidas uarices sputum &c. Cur tantummodo de naribus facit mentionem?

Responsio.

Quia omnibus alijs maius uel minus inest detrimentum, sed sola quæ fit per nares uacuatio nullo modo periculosa est, Hip. & Gal. pronost. 3. cap. 7. capitis dolor uehemens & continuus cum febre, si quod ex indicijs extiterit exitiosis integro lethalis est, si uero ex ijs quæ didicisti de ægro tanquam conualituro speres a principio quidem ad septimum diem sanguinis e naribus fluorem expectato, Hipp. ibidem magis expectari sanguinis oportet eruptionem in minoribus natu quintum & trigesimum annum agentibus, in maioribus autem natu suppurationem &c. Et aph. 4. aph. 25. sanguis quidem supra, qualiscunq; fuerit, malus infra autem bonus est. Bac. hic intelligitur de sanguine, ab ipso ore, non a naribus destillante, alioqui aphorismus esset falsus, quum sanguis e naribus defluens possit esse bonus &c. Et aph. 5. aph. 60. Quibus in febribus aures obsurdauerunt, sanguis ex naribus fluens, aut aluus turbata soluit morbum, Auic. 2. 4. tr. i. ca. 73. & 74. Et plurimum accidit fluxus sanguinis narium iuuas



tius in imparibus, & parum fit in quarto, In. 2. uero. 5. 7. et 9. fit & melior est qui sequitur partem infirmam & diuersificans non est cum illa bonitate, fluxus sanguinis narium paruus est malus, & pluris malitie est qui est sanguinis nigri & parum fit malus ex sanguine rubeo & splendida, & quum cadit in. 4. significat difficultatem crisis & c. Aet. ser. 5. cap. 124. fluxum sanguinis e naribus in quarta die in febribus fientem, pessimum signum Hippocrates dicit, multitudinem enim significat in toto corpore aut in capite & c.

#### De asperitate lingue.

Asperitas siue scabrities lingue nihil aliud est, q̄ superficiiei lingue inæqualitas cū siccitate et duritie, Fit aut a uaporibus tenaciū humorū ad linguā peruenientibus, aut a caliditate nimia febrili satis superq; desiccāte, Fit etiā interdū in somno dum hiante ore dormimus hiatus siquidem oris humiditatem absorbit & c. Loci consentientes de lingue scabritie.

Quod lingue asperitas sit superficiiei inæqualitas non est cur probem cum sensui satis pateat. Aet. ser. 5. c. 118. lingua inquit in febribus aliquando siccatur aliquando exasperatur magis aut minus & diffringitur, aut nigrescit, aut carbonis speciem induit quod ad uiscerum inflammatione contingere solet & c. Gal. 2. de cau. morb. cap. 7. Quippe exasperantur quæ antea fuerunt læuia, & leuigantur quæ prius erant aspera, illa quidem ob acres humores, aut medicamenta abstergentia, hæc uero ob pinguem humorem aut uiscositatem & c. Hip. prorrh. 1. text. 3. Densæ lingue atq; aridæ phrenitice Gal. in com. inquit scriptum esse τῶν αἰμάτων id est asperæ non autem παχύτης id est densæ & reddit rationem, quæ postea uidere poteris, & subdit quod talis lingua immoderate siccitatis nota est, quo fit ut & ardentibus superueniat febribus & c. lege liberius hunc locum, & plura scitu digna



inuenies: Auic. 1. 4. cap. 22. demonstrat asperitatem a uiscositate humorum fieri etiam a siccitate, quum dicat, cum eius asperitas non est pp uiscositatē, imo a siccitate oportet &c.

De cura asperitatis linguæ.

Asperitas unico duntaxat scopo curabitur, si ei naturalis leuitas restituatur, uerum si ad eius causas respexeris, Bine erunt, in curanda asperitate indicationes. Altera quæ causæ antecedenti oppugnet, Altera causæ coniunctæ, Antecedens causa si humores uiscosi fuerint, aut eorum uapores, euacuatione quamprimum tollendi sunt si febrilis & igneus calor, frigidus extinguendus erit, Moxq; si tanquam causa coniuncta uiscidus humor asperitatem efficiat, statim cum abstergentibus remouebitur, Colluatur ergo primū os cum oxysaccharo hydromellite & aqua hordeacea, & choleari argenteo, uel canula, uiscositas illa auferatur, possumus etiam en hoc casu cōficere ex saccharo & oleo Amygdalino dulci ueluti eclegma ac linguæ superficiem linire, moxq; spongia linguam expurgare, Sed si febrilis feruor in causa fuerit, tunc Asperitatem humectando aut in frigidando curabimus, utpote cum portulacæ succo in ore retento, Facit etiam rhu obsoniorum mulsæ admixtum, similiter prunæ damascenæ & myxa. At nigredini linguæ summopere subuenit sacculus ex mucilaginibus seminum citoniorum psyllij super lingua admotus, nam scabrietem et tollit. Loci contin. de cura asperitatis linguæ.

Gal. in arte med. c. 95. quæcūq; partes ob id quod exasperata naturalem amiserint habitū, his leuitas naturalis est restituenda, ossa leuigādo & asperam linguā leniendo humidis q̄ nihil mordeāt, et lentorē habeant etc. Auic. 1. 4. c. 22. In essentia uiscositatis idest dū asperitas uiscositatē sequitur, fricetur lingua cū brusco cum oleo amygdalino & zuccharo tabarzet, idest ultimæ coctionis donec mundetur &c. Aet. ser. quinto



cap. 118. lingua quæ siccatur opus habet humectatione. Humectanda autem est cum decocto seminum lini, efficacius tamē erit si una myxæ coquantur. Deinde colluat os aqua pura aut spongia pura detergeant, Et portulacæ succus in ore detentus locos humectat, & prunorum damascenorum aut myxarum ossa in ore detenta mitigant &c. Vide uberius Paulum lib. 2. cap. 53. & Auic. loco cit. lege etiam Arculanum & Gentilem de fulgineo in suo introductorio, ibi, Si lingua propter humorem superfluum fuerit aspera os prius lauari oportet cū aqua & aceto, & post mundari debet cum choleari argenteo, quod si lingua fuerit propter calorem adurentem nigra ualet ad hoc sacculus mucilaginum &c.

#### Observationes circa uictum.

Aet. ser. 5 cap. 118. Sunt cibi mordacitatis exortes & omnino non adstringentes, leuesq; ac sorbiles &c.

#### Observationes circa decubitum.

Paul. lib. 2. cap. 53. Caterum in latus decumbere prodest, nam supinus cubitus exsiccat, item os conuiuere, hiatus enim madorem absument, Auic. loc. cit. Et non oportet ut non ponantur puluinararia multa, neq; supinetur dormiens, nam hæc duo exsiccant lignum &c.

#### Observationes circa topica.

Arcul. in. 1. 4. Auic. præmittatur remedium Auicennæ scilicet zūcharum cum oleo amygdalino, & remaneat super linguam per horam. Deinde sequatur oxymel, nam primum mollientia, mox abstergentia magis conueniunt.

#### De pronosticis.

Aet. ser. 5. cap. cit. Si uero lingua nigrescat, aut carbonis speciem referat, et præcordia reperiuntur mollia, periculosum signum est &c. Auic. loc. cit. Oportet ut non dimittatur super linguam nigredo, imo fricetur cum eo quod scis, et si nō,



elevabuntur ad capui vapores maligni, & faciunt cadere in  
syrsen &c. Bac. nigredinem hanc linguæ fieri a vaporibus  
adustis ex materia in uentriculo uel in membris spiritali-  
bus contenta, non est qui ignoret, unde ab eorum uaporatio-  
nem & gustus corruptio sequitur, & accidit casus in syrsen  
idest in paraphrenitiden &c.

### De uigiliis superfluis.

Vigilia quam greci *αγρυπνια* uocant, est si physicum lo-  
quamur quædam sensuum solutio, cuius causæ efficientes sunt  
concoctio iam perfecta, caloris natiui super humiditatē ob-  
struentem uictoria, & puri sanguinis ab impuro in corde  
peracta seperatio, sunt & aliæ accidentales causæ, sicuti cor-  
poris tactus, terribile somnium, malus humorum motus, do-  
lores &c. At si medice loquamur uigilia est animalis dispo-  
sitio, qua effunditur spiritus animalis ad instrumenta sensuum  
& motus, ut eis utatur, & eius causas esse dicimus siccitatē  
scilicet primi sensitui, & calorem interdum cum materia,  
interdum absq; materia. Fiunt etiam uigiliæ in febris sic-  
cis cerebrum mordicantibus sursam elatis &c.

### Loci consentientes de uigiliis & earum causis.

Quod uigilia sit quædam sensuum solutio, hoc innuit sa-  
tis unice Aristoteles in lib. de somno & uigilia, & ibi om-  
nes adamasim causas recitat, quæ nuper a me exaratae sunt.  
De secunda diffinitione medica loquitur Auic. satis fuse ubi  
de uigilijs & sathara uerba fecit. Gal. in lib. de plenit. circa  
finem, Si principium sentiendi inquit siccescat, at incalescat,  
statim in uigilias illabatur, Nam biliosi omnes ex utraq; bile,  
insomnes degunt, & 2. aph. com. 3. Sic & uigiliæ fiunt qui-  
dem propter calorem primæ partis sensituiam: sed uel ex so-  
la intemperatura, uel ex humoris biliosi abundantia &c. Vi-  
de etiam Gal. 3. de loc. aff. cap. 5. ibi, Ad hæc non minori argu-



mento sunt capitis ardor & refrigeratio, siquidem ardor uigilias, refrigeratio soporem inducit & c. lege locum et uberiorius de uigijs & somno plura inuenies, Auic. prima tertij, cap. 4. eius causa complexionalis est caliditas & siccitas, Fit. etiam ex uitrositate humiditatis occultæ in cerebro, aut propter dolores et cogitationes communes & c. uide latius hunc Auic. textum & c.

#### De signis uigiliarum.

Si uigilia à siccitate nuda absq; caliditate prouenerint tunc capitis adest leuitas, & siccitas oculorum linguæ et narium, nec aliquid caloris uel frigoris in capite percipitur, si à calore cum siccitate fierent, præter iam dicta signa adhuc uisitur inflammatio & adustio, si ab humorum nitrositate, tunc nares excrementis abundant, oculorum adest lippitudo, & sentitur quædam parua grauitas in capite & uelociter expergiscuntur cum quosdam saltu, si uero oriantur ex dolore febribus & cogitatione, tunc eorum causæ pro indicijs supeditabunt.

#### Loci consentientes de signis uigiliarum.

Auic. prima tertij. tra. 4. cap. 5. signa eius quæ fit à siccitate pura sine materia & non socia caliditati, sunt leuitas capitis & sensuum & c. Vide latius in hac re eius interpretes & qui recentior de his scripserunt.

#### De uigiliarum curatione.

Scopi pro curandis uigijs erunt tantum duo, quorum alter causas uigiliarum remouebit, Alter uero multis modis somnum inducet, Si igitur uigiliam ex siccitate ac caliditate aeris cibi uel potus, aut ab accidentibus animi corporis sicuti à doloribus a febre, aut a falsis humoribus contingerint, unice per contraria cuiusq; causæ curabuntur. Si igitur a siccitate uigilia prodiret, tunc humido uictu balneo temperato quiete



quiete & tranquillitate fruatur, & caput cum oleis humeantibus, ut cū oleo nenupharino uiolaceo uel rosaceo inungatur, Si uero a caliditate similiter frigida proderunt ut lauca portulaca endiuiā cucurbita &c. Si a dolore sedetur dolor, prout eius causa manifestabit, Si uero fierent ab humorum nitrositate, tunc omnia acria & salsa procul sint, & euacuetur humor salsus uel nitrosus cum cōfectione hamech. electuario de dactylis &c. Cibetur patiens piscibus petrosus, & carne tenui &c. Somnus post hæc introducitur cum lotionibus extremarum partium cum rebus somniferis, cum inunctionibus & cum unguento populeone opio & croco, aut cum his quæ uirtutem animalem relaxant ligando siue uinciendo extrema corporis, fabulando cum luminibus accensis, compellendo eum ut palpebras aperiāt ac conuiuet, Prouocari etiam somnus potest, cum suppositorijs cum epithematis circa tempora, cum suffumigijs & pulueribus, cum pillulis de arnaglossa, & potionibus ut syrupo de papauere uiolato cum decocto capitem papaueris et seminū eius emulsione, cum eclegmate, ac ipsis odoribus olfaciendo scilicet oleum nenupharinum de papauere, & nares linire modo non sit quod prohibeat &c.

#### Loci consentientes de cura uigiliarum.

Prædictæ indicationes ex ipso Auic. l. 37. c. de cura uigiliarum sumuntur, ubi singulus somnum efficientes causas remouet, unde inquit oportet ut habens illam, cuius causa est siccitas utatur cibo humido, & balneis temperatis &c. Vide illum fusius, & multa uno intuitu comprehendens quæ de prima indicationum a nobis supra relata sunt, De secunda indicatione loquutus est Aet. ser. 5. cap. 116. ibi si uigilia nimium infestauerint manus & crura deligari iubebimus eo tempore, quo ad somnum conuerti solent & hortamur, ut assidue



aperiant ac claudant palpebras, donec satis fatigati fuerint, deinde de repente soluimus ligamenta & tollimus lucernam & multam quietem esse iubemus & c. Itidem ait Paul. lib. 2. c. 41. & Auic. 1. 4. cap. 20. ibi multiplicentur inter manus eius candellæ & eleuentur uoces cū fabulis & c. De cæteris rebus somnum proliciētibus totas est in hoc capite plenus Auicen. & Aetius ubi puluinares odora menta suffumigia cataplasmata, & unguēta somnifera docet, itidem Paul. loc. cit. quos ne sim ita nimis longus a te consulendos relinquo. Vide fusus in hac re Auic. 1. 3. tract. 4. c. 6. Item. 1. 4. ca. 20. uide etiam gentilem in suo introd. ibi circa inquietudinem habentiū febrem ualet ad hoc odorare frigidum olea uel intigatur tenta bombacis in illis oleis, & ponatur in naribus. 2. oportet applicare temporibus infrigidantia. 3. Si non fuerit quod prohibeat ut opilatio fortis uel apostema ualet syrupus de papauere, & c. **Observationes circa stupefacientia.**

Arcul in. 1. 4. Auic. non conceditur inquit decoctio papaueris & mandragoræ & similium stupefacientium in statu paroxysmorum aut exacerbationum, ne opilatio porros sua frigiditate intensa magis noceat quā stupefaciendo conferat, unde Auic. ibi dixit esse talia preparanda cum eger inuenit leuitatem & quietem ex paroxysmo & c. & hæc intelligi debent de his omnibus quæ siue odore siue suffitu, siue lotionem & uapore possunt stupefacere, Nam Paul. lib. 2. ca. 41. loquens de suffitu, id ualere inquit modo caput repletum non sit, & Auic. loc. cit. Similiter si non fuerit quod prohibeat detur in potu syrupus de papauere, & loco eius & c. unde eius expositores prohibentur hæc inquiunt si pleuritis ab humore crasso uel asthma adfuerint & c.

**Somnum inducentia.**

Somnum prouocant Agnus idest casus, aixoon, alchechen=



gi amygdale amara, amomum, anethum, anisum, odor ari-  
stologia, camphora cum aqua lactuce in modum caputpur-  
gi, Castoreum cum oleo rosaceo, ceparum plurimus esus, ci-  
cuta, cinnamomum, odor cyperi, coriandrum, cotula, crocus,  
diacodion, diapapauer helleborus, phylonium romanum, Ra-  
dices granati sylvestris, mandragora hiosciamus, lactuca, fo-  
lia salicis, cucurbitæ, laudanum, malua, myrrha odor matri-  
caria, muscus herba, nenuphar, oleum Anethi, lactuce, papa-  
ueris uiolarum, nenupharis, cucurbitæ, opium, aqua hordea-  
cea, albumen oui papauer, peucedanum, unguentū populeon,  
porrum plantago, requies nicotiana rosæ, uiola, usnea, so-  
latrum sandali, fumus styracis, sy. de papauer, triphera un-  
guentum ros. uinum purum.

## De pronosticis uigiliarum.

Galenus. 7. meth. cap. 6. siccatur totum corporis habitū uigi-  
lia eoq; infestissima est ijs qui ex siccitate laborant, et 12. met.  
cap. 1. ledunt aut uires uigiliae dolor et immodica euacuatio,  
et cap. 5. eiusdem uigiliae spiritum corrumpunt et c. Auic.  
1. 3. tra. 4. cap. 4. et dicitur qd ille in quo sahara fit fortis dein-  
de accidit ei tussis, moritur, et cap. 6. eiusdē et quādo species  
saharæ accidit in ætate senili, eius cura ē praua, et alibi dixit  
qd uigiliae cerebri intemperiem corrumpunt, ac ipsum debilitāt,  
humores adurunt et acutos morbos prænūtiānt etc. Hip. aph.  
2. aph. 3. somnus atq; uigilia, utraq; si modū excefferint, malū.  
Bac. si modū excefferint intellige naturalē, non qui tempore  
optime ualitudinis fieri solet, sed de eo, qui naturæ expediet  
contra morbum, et nota somnū et uigiliā modū excedere tri-  
pliciter, quātitate scilicet qualitate et tēpore, quātitate si fue-  
rint superflui uel deficientes, qualitate si fuerint profundi et  
leues, tempore, si consueto uel insueto tempore dormierint  
uel uigilauerint, et sic trifariā nisi mediocritatē seruauerint,



utraq; mala sunt. Et aph. 7. aphor. 18. In uigilia conuulsio uel desipientia malum, Bac. lege Gal. comm. ubi inquit quod ex ijs quæ maxime euacuant & exsiccant uigiliæ sunt, atque ideo conuulsionem ex siccitate faciunt & desipientiam, quia immodicæ siccitatis ratione in longis uigilijs biliosior redditur sanguis &c.

### De siti superflua.

Sitis est appetitus frigidi & humidus, & fit a superflua caliditate cerebri pulmonis & membrorum spiritualium, aut ab eorum siccitate, aut à toto ut in febribus, aut fit a mala concoctione uentriculi, a quo uapores eleuati sitim inducunt, aut a mala temperie calida & sicca sine materia, uel cum materia biliosa & salsa.

### Loci consentientes de sitis superflue causis.

Quid sit sitis lege Gal. de inæquali intemperie cap. 3. ibi ex esuriendo uel sitiendo deficiente hic humida, illic sicca substantia, &c. & 1. de diff. feb. cap. 7. siccitatem inducunt diurnæ euacuationes, & longi temporis fames & febres ardentes, atque ut in uniuersum dicatur, quæcunq; animalis solidas partes exsiccant sicuti febres heclicæ &c. Aet. serm. 5. c. 19. Sitis duplex est altera ob humiditatis inopiam, altera ob caliditatis redundantiam, In febrientibus itaq; ambæ affligunt &c. Gal. aph. 4. com. 19. Sitis fit aut propter uentriculi dispositionem, uel propter datum medicamentum, uel propter humoris euacuati naturam &c. lege rationes quas posthac adducit, uide etiam latius de his causis. 5. aph. comm. 27. & 4. de sympt. cau. cap. 7. ibi. Si uero falsi & biliosi humoris uitio mordicationem senserit uenter potionem magis, quam cibos desiderabit &c.

### De curatione sitis superflue.

Sitis unica duntaxat indicatione curabitur, si causam a



qua sitis proficiscitur, unice remoueamus, Quare si caliditatis ac siccitatis redundantia fuerit, statim cum refrigerantibus & humectantibus tollitur, ut cum mucilaginibus seminū citoniorum psyllij & zaccharo, uinoq; granatorum compositis, si a calefactione cerebri & membrorum spiritualium, tunc ultra inunctiones circa caput factas ualet etiam anhelare super aqua frigida, uel frustum angurie in ore retinere, uel Gargarismata ex aqua frigida & omphacio os colluere, aut epithemata circa collum gulam hepar frigida applicare, his tamen adde ad maiore horum penetrationem aliquid aceti, Si causa fuerit mala concoctio, uel simplex siccitas somno quam primum auferetur, Si a uaporibus in somno cōcentratīs, uigiliæ eos resoluendo etiam sitim sedabunt, Si causa fuerit intemperies calida, & sicca simplex, tunc frigida actu & potentia congruunt, si talis intemperies fuerit biliosa uel salsa imbibita, tunc potus actu sit calidus potestate frigidus, Sitis ab eduliorum caliditate facta, aut ob multum uini potum, protinus remouebit frigide potio, Quæ nisi iuuerint, ad narcotica & sensum oris uentriculi stupefacientia recurremus. Interim sex res non naturales in contrarium discrasie præparentur, & si qua alia adsint symptoma corrigantur &c.

Loci consentientes de cura sitis superflue.

Quod caliditas & siccitas suis contrarijs remoueantur, non est, ut totiens probetur, quum medicorum libri ex his refferri sint. Paul. lib. 2. cap. 52. Verum sitim in febribus placare solet fons capitis ex oleo frigidissimo uel rosaceo uniuersim super accommodatus, & hoc intelligitur quando a cerebri caliditate sitis proficiscatur, unde Auic. 1. 4. cap. 17. Oportet ut inungatur caput cum oleo frigido ualde &c. Bac. intellige tu nisi fuerit quod hoc fieri prohibeat, sicuti destillatio, uel capitis repletio, De siti quæ procedit ex calore spiritualium



membrorum loquitur etiam Paul. loc. cit. & Aetius serm. 5. c. 19. ubi commendat & glycyrizam & catapotia, quæ ex semine papaueris domestici tragacantho & ouorum albumine conficiuntur. Itidem ait Auic. proponens & mucilagines seminum citoniorum semina lactuce nigrae & tamarindos & c. De siti ex mala concoctione uel simplici siccitate loquitur Gal. 5. aph. com. 27. ibi. Concoquitur enim per somnum ut liquet, & subdescendit id quod efficit sitim, Aet. ser. 5. ca. 19. At sitis ob siccitatem factæ medella est somnus, cōcoquit enim humores, sed sitis ob caliditatem medella sunt uigiliæ, Bac. ratio est, quia calor in uigilijs circa superficiem expanditur, & uapores qui os uentriculi infestabant per uigilias resoluntur, unde Auic. loc. cit. & sitis quandoq; fit ex frigore & abscindit eam somnus, & quandoq; fit ex calore, & abscindunt eam uigiliæ, & c. De intemperie calida & sicca lege Arculanum in. 1. 4. Auic. & intelliges quomodo frigida actu & potentia congruunt, De siti ex edulij calidi, & uini calore facta, uide Aet. loc. cit. & Gal. 5. aph. com. 27. ibi. Et illam quæ facta est ex uino caliditatem aqua restringere Theorema est medicinale. Quod ad narcotica sit tandem procedendum docet Arculanus loc. cit. qui cum octo modos extinguendi sitim poneret, septimus inquit est stupefaciēdo aliquantulum os stomachi cum intense frigidis actu & potentia, et hoc ualet in quacūq; siti & c. Aet. loc. cit. sint omnes cibi humectantes, & sic de reliquis sex rebus non naturalibus intelligito & c.

#### Obseruationes circa sitis remedia.

Aet. serm. 5. cap. 19. lenimenta quædam sitis excogitanda sunt, nam intēpestiue sumptus potus non solū sitim nō extinguit, sed etiam uice uersa auget. In principijs n. exacerbationum, omnes materiæ febres accendētes ad profundum declinant, & propterea sitim intendūt, Datus autē in illo tempore



potus a materie multitudine superatur, et simul uitiatus accessio sit mali, Quare in principijs et augmētis potus exhibitionē prohibere oportet, Inuigoribus autē primum per gargarismos et per collutiones oris sitis mitiganda erit, declinatione incipiente potus dabitur, In remissione uero etiam nolētes aliquādo cogantur potum assumere, ne humores ad exacerbationis accessionem delati resiccētur ac exurantur &c.

### De pronosticis sitis.

Hipp. aph. 4. aph. 19. Qui in medicamētis purgati nō sitiūt, nō quiescūt priusq; sitiāt. B. nota duplicē esse sitim, mendosā s. & uerā, Mēdosa sit in multis qui purgātur, ante ipsam euacuationē, & sit ob malā uentriculi dispositionē, uel ob pharmacū assumptū, uel a natura humoris nondū euacuati. At uera sitis illa est, quæ ab euacuatione exiccāte uentriculi humiditatē p mēbrorū inanitionē prouenit, pōt et interdū accidere, uel ob mordicationē, uel ob quā fecit medicina calefactionē, sed quæ dicta est prius euacuationē iā fore cōpletū significat. Obiect. Quō distinguitur uera sitis à mendosa? Respon. Dupliciter ratione symptomatū, & ex eo q. statim a principio esse incipit, Ratione symp. quia mendosa cū grauitate ac molestia uentriculi mouetur. Vera at cū quadā quiete leuitatē ac sōno, præterea mēdosa, ab absumptione medicamēti statim incipit, uel paulopost, uera aut in pcessu euacuationis euacuata. s. nō parua quātitate humoris, sed de hac re legere poteris fusius Mesuē, ubi d. 4. intētionē laxatiuonū, c. de siti loquitur, ibi. n. triplicē sitim demonstrat, Alterā quæ supoccupās dī, Alterā q. succedēs et duplex est, una quæ euacuationi sufficēti succedit, altera q. euacuationi nimiiū superfluētū seqtur uide illū fusius. Hip aph. 5. aph. 27. Qui noctu bibere apētūt, ijs admodū sitiētibus, si sup dormierint, bonū. B. scias uelim q. potus trifariā cōsiderari pōt. a. ut sitim sedat ac demulcet, & exhiberi debet



parua huius quantitas ut lambendo potius quam deglutiendo bibatur. Secundo ut cibum liquefaciat, ac ad formam chyli illum redigat, idcirco in multo cibo multus potus, & in paucis paucus exhibeatur. Tertio, ut ad membra chylus deferatur, unde Auic. cap. de eo quod bibitur & comeditur inquit hominem non debere bibere in hora digestionis, sed facta digestionem, & de hoc potu tantum dari potest, quantum ipsa sitis naturalis desiderat & c.

Authores dissentientes circa sitim.

- 1 Adferere potum ualde sitienti non esse propinandum.
- 2 Adferere a somno potius augeri sitim quam tolli.
- 3 Adferere, sitim non esse indicium debite euacuationis.

Consultatio dissentientium circa sitim.

Ad primum respondet Gal. aph. 5. com. 27. dicens illud non esse in obscuro quod potus ualde sitientibus est dandus siue ex potatione uini meracioris siue ex defectu potus, sitis aduenierit, Nam defectui succurre confert & c. & ita innuit potum esse sitienti propinandum.

Ad secundum respondetur quod somnus sitim ex nimio potu aut cibo producentem aufert, ut testatur Gal. loc. cit. & Hippocrates in eodem aphorismo, nam somnus calorem reuocando concoctionem adiuuat.

Obiectio.

Si a caliditate sitis oritur, quomodo per calorem reuocatum a somno potest auferri?

Responsio.

Scias quod cum calor naturalis in somno concentratur ualidiorem efficit concoctionem, ex qua id descendit quod sua acri caliditate sitim producebat, & sic calor digerendo sitim remouet, nec credas sitim a temperato calore oriri, quum potius ab igneo & non naturali ipsa proueniat.

Ad tertium Galen. aphor. 4. com. 19. Verum inquit in his quando abunde fuerint euacuati consequitur sitis, sufficiens



enim est ea, quæ ex euacuatione provenit siccitas hanc effice-  
re &c. Bac. quasi dicat sitis cum incipit ob membrorum ina-  
nitionem, est perfectum completæ euacuationis indicium, un-  
de Auic. 4. 1. cap. 6. Ex significationibus quibus cognoscitur  
hora, qua est catharticum constringendum, est scitis, & cum  
uentris solutio perseverauerit, & sitis non acciderit, non erit  
timendum quod superfluitas perueniat &c. Obiectio.

Quonam modo igitur cognoscam esse nimis euacuatum.

Responsio. Poteris cognoscere si ex cholagogo exhibito  
ultra bilem pituita uel alius humor educeretur, deterioris ta-  
men periculi ac timoris est, si ab alijs humoribus etiam san-  
guis exierit, ut testatur Auic. 4. 1. cap. cit.

De alijs febrium symptomatibus.

Quæ supersunt febrium symptomata de his fusius in se-  
cundo libro mentionem fecimus, nam de tussi, de dolore  
capitis, de alui profluuijs, de uomitu, et similibus re-  
petere, præter id, quod molestum est, etiam non  
debet. Quicquid igitur breuitati studen-  
tes de industria misimus, tuum  
erit quotiens lubeat, ad  
hæc confugere.

Finis libri quarti.



Liber Quintus.

De tumoribus præter naturam, & .1. quid sit tumor.



**T**UMOR quem Græci ὄγκος dicunt est teste Hip. omnis præter naturam molis uel tumor id unum est eorum quæ corpori accidunt, distensionem in longum latum & profundum significans ac naturæ modum excedens, uel tumor est id incrementum, per quod partes corporis à naturali habitu in quantitate recesserunt, quæ definitiones etsi tumori quadrent, in multis tamen mancas esse putarim. Nam incrementum quod loco generis in definitione ponitur, non modo ægris, sed etiã sanis cõuenire potest, siquidem crassi in latum & profundum ultra naturalem statum augeri possunt, quum nedum adhuc præter naturam se habeant, Hæc igitur particula scilicet actiones lædens, in definitione deficiet, alioqui tumor de quo loquimur non esset morbus, sed potius symptoma uel aliquod pathema ut dolor. Erit itaq; tumor ita definiendus. Tumor est præter naturale incrementum, naturale statum in corpore excedens ac noxam actionibus inferens ab aliqua materia replète ac extendente confectum.

Loci consentientes de definitione tumoris.

Loquitur de prima definitione Gal. .1. pronost. com. 33. c. 13. ibi. Tumorem solet Hippocr. nominare omnem molem præter naturam etc. De. 2. loquitur. .1. de tumoribus præter naturam. c. 1. ibi. Quod apud græcos ὄγκος uoce significatur, unum quoddam ex his quæ corporibus accidunt, existit. Sic. n. nominant ipsi διαστολή id est distensionem, non autem dimensionem ut



Aug. luc. De. 3. definitione uerba fecit Gal. 13. meth. ca. 1. ibi. In hoc. 13. de tumoribus qui præter naturam incidunt differere incipiemus, in quibus scilicet partes à naturali habitu in quantitate recesserunt etc. Quod uero non integræ sint istæ definitiones ostendit Gal. non solum in. 1. de tumoribus, cum exemplum afferat de crassis, sed etiã. 1. de morb. diff. c. 12. ubi inquit si tumor ad tantam magnitudinem attollatur, ut ob hanc ipsam functio impediatur morbus censeretur debet, alioqui uel symptoma uel pathema sicut et dolor etc. quibus uerbis plane adserit particulam super a me dictam in his deficere, Quod autem nostra definitio sit uera probari potest tali ratiocino, Illa est uera definitio, quæ datur per genus & differentias, et nullius rei extraneæ essentiam explicat quam definitæ, sed definitio hæc a nobis data est huiusmodi, igitur erit uera. Quod probari facili poterit, si singulas definitionis partes examinemus, nam particula præter naturale incrementum quæ loco generis ponitur, dicta est ob ipsos uentris mamarum ac testiculorum tumores qui sunt naturales, Deinde naturalem statum excedens, adiunctum est, ob alicuius partis uel totius symetriam, quæ naturæ limites non excedit. Subdidi, noxam actionibus inferens, ut excludatur symptoma ipsa quæ morbum sequuntur, ob aliqua materia, propter tumores in luxationibus quæ ex ossibus non ex alia materia humoralis constituuntur. Demum additum est, replente ac extendente, ut ostendatur tria esse morborum genera in tumore simul coeuntia, scilicet intemperies, mala compositio & soluta continuitas. De diuisione tumorum in genere.

Tumorum tres sunt principales differentie, quas Iuniores in sex postea partiti sunt, Nam tumorum aliqui sunt cum dolore, ut inflammationes, aliqui absque dolore, qui sunt molles uocantur ædemata, si duri, hos Greci uocant scirrhus. Quod si inter inflammationes erysipelas,



inter *ædemata* flatuosa inflationes, & demum ἀποστήματα connumerentur erunt sex scilicet inflammatio *Erysipelas* *ædema* *scirrhus* inflatio & ἀποστήμα quod latine abscessus & barbare exitura nominatur.

Loci consentientes de tumorum diuisione.

Gal. aph. 4. com. 34. Neq; nos latet triplicem esse tumorū differentiam, uel enim sunt cum dolore, quos iuniores inflammationes nominant, uel absq; dolore duri, quos greci *scirrhos*, uel sine dolore molles quos *ædemata* idest inflationes &c. Quod uero *Erysipelas* inter inflammationes enumeretur, lege Gal. 2. ad *Glauc.* cap. 1. ubi *Herpetes Erysipelata* inter inflammationis species connumerat, de quibus cum fecisset mentionem, postea hæc uerba subdit, Inflammatio quidem in tot species secundum ipsam passionis naturam diuiditur, Multas uero quispiā prætermittas putaret deceptus multitudine nominum, sed hæc omnia inflammationes quædā sunt in prioribus comprehensæ speciebus &c. Et sic *Erysipelas* est inflammationis species.

Obiectio.

Si *Erysipelas* inter inflammationes reponitur, non erunt igitur sex tumorum genera distincta ut Iuniores adserunt.

Responsio. Satis tuæ obiectioni facit Galen. in primo ad *Glauc.* cap. ult. ubi inquit, quod inflammationes dicebantur a ueteribus, quædam ueluti excandescentiæ, sed a Iunioribus non æque. Neq; enim *Herpetas* neq; *erysipelata* nec tale aliquid quicquam inflammationibus annumerant. sed uni tantum affectui ex calidis, qui fit cum tumore duro atq; dolore *phlegmonoso*, &c. quibus uerbis plane significatur quod Iuniores aliter ac ipsi ueteres de tumorum generibus loquuntur, idcirco Iuniores plura, ueteres uero pauciora esse faciunt, uel dicimus quod si *erysipelas* fiat a sanguine tenui inter inflammationes connumeratur, sed si a flaua bile pro-



ueniat erit distinctum aliud ab inflammatione genus, & sic sex erunt.

De causis tumorum præter naturalium  
in genere.

Omnis tumor fit uel per fluxionem uel per congestionem Fluxionis causæ sunt quinque; pars expellens, membrum suscipiens, multitudo uel mala qualitas humoris meatuum laxitas & amplitudo, & membri caliditas seu dolor attrahens, Cōgestionis causæ sunt error facultatis alteratoris & altricis, & imbecillitas expulsores. Rursus tumorum causæ primitiue sunt, casus, percussio, fractura, distensio luxatio & inordinata uictus ratio. Antecedentes causæ sunt quattuor humores tam naturales quàm non naturales, ex naturalibus primū ex sanguine oritur phlegmone ex flaua bile erysipelas, ex pituita edema, ex melancholia scirrhus, ex non naturalibus, ex ijs scilicet qui a massa sanguinis segregati sunt abscessus, & pustule proueniunt, Causæ coniunctæ sunt materiæ siue humores in ipsa laborante particula contentæ, Tumorem actu producentes &c.

Loci consentientes de causis tumorum præter naturalium.

Conciliator diff. 96. Apostema dupliciter generatur, aut per fluxionem quando materia ex uenis & arterijs ad membrum glandulosa defluit, aut per congestionem, quæ fit a superfluitate nutrimenti. De his similiter loquitur etiam Gale. 2. de diff. feb. cap. 11. & 13. meth. cap. 5. & 6. de sympt. cau. cap. 2. ibi tumorum causa est humorum fluxio &c. Quod autem causæ fluxionis sine quinque lege Auic. 2. 1. cap. 18. ubi ex parte membrorum enumerat membrum expellens & debilitatem membri recipientis &c. Quod calor membri & dolor sine causa fluxionis lege Gal. 13. meth. cap. 5. & 6. ibi sane fluxio=



nis causa duplex est & c. De causis congestionis loquitur Gal. etiam. 13. meth. cap. 5. & 2. de diff. feb. ca. 2. ibi at cum plus assumptum fuerit quam possit alterari, de quod superfluum est a uirtute expulsoia detruditur, quæ si imbecilla fuerit, grauat & extēdit & in eodē loco residet & c. De causis primitiuis loquitur Aui. 3. 4. ca. 1. ibi et de eis primitiua sunt cōtusio aut incisio aut fractura aut diffocatio & c. At de antecedētibus facit mētionē Gal. 1. de dif. mor. ca. 12. ibi. Principio qđ oēs nascātur ex abūdāti humore, Erysipelas à flaua bile, cācer ab atra Phlegmone à sanguine, edē a pituita & c. Itidē ait. 13. meth. c. 4. & Pau. li. 4. ca. 17. sub diuersis uerbis hæc met recitat, & Aui. 2. 1. ca. 5. ibi. Materie uero unde fiāt apostemata sunt sex, quatuor. s. humores, aquositas & uētus & c. Cāterū de humoribus naturalibus et nō naturalibus satis lucide, ubi de humoribus scripturus loca citauimus, Quod aut abscessus & pusilla fiat a nō naturalibus non solū habes Gal. 2. ad Glauc. Sed et Aui. ubi de exituris uerba facit, In reliqs cōsule neotericos et præsertim Guidonē Cualiacū, Ioā. di uige, Guliel. Placentinū Argilatā, & cāteros qui de manuali operatione scripserunt.

De signis tumorum præter naturalium in genere.

Signa communia quibus tumores cognoscuntur, ex eo nota sunt, qđ pars cui accidunt magis remittitur, quam cum naturaliter se haberet, & in tumorē extensa cute attollitur. Cognoscuntur etiam tumores per calorem tumitionem & dolorem, uel per has differētias, quæ ex calore frigore mollitie ac dritie spectantur, Nā color ruber sanguinem subesse significat, flauus & pallidus bilem, subalbidus & laxus pituitam, liuidus & fuscus melancholiā, Principij tumoris signa sunt fluxus ac distensio particula incipiens cum modico dolore, Cognoscitur augmentum, quum tumor ad molē paulatim attollitur, et eius symptomata augētur, status quū tumor una cum



*Symptomatis in suo uigore perseverat, Declinatio, ubi non solum tumor deprimitur, sed etiam eius symptomata minuuntur. Signa suppurationis sunt dolor intrinsecus pulsatio & caloris augmentum, Signa resolutionis tumorum sunt leuitas membri et deficientis pulsatio, Signa corruptionis particulae sumuntur a nigredini loci liuiditate et graueolentia, sed de his et alijs signis dicemus, ubi de singulis tumorum differentiis seorsum tractabitur.*

*Loci consentientes de signis tumorum in genere.*

*De signis communibus plane uerba fecit Gal. 14. meth. cap. 9. cum dicat commune tumoris signum esse, quum pars magis renititur quam ante quum naturaliter se haberet, lege locum fusius, nam habet omnia ferè signa quae pridem à me recitata sunt. De temporibus tumorum lege Auic. 3 4. c. 2. ibi fit adhuc principium quum materiae defluunt & c. et. 2. 1. c. 5. Principium apostematis fit, quum humor ad exteriora egreditur, Status, quum agritudo ad maiorem statum puenit in quo esse debet. post incipit minui et declinat eius esse ad resolutionem, aut ad puris collectionem & c. De signis supurationis loquitur Hip. aph. 2. aph. 47. ibi. Dum pus conficitur dolores ac febres accidunt magis, quam iam confecto. Obiectio. Quod dolores accidunt, tum propter extensionem membri, tum propter tumoris calorem, non mirum est, sed quo pacto febres accidunt cum fieri non possit quod illa sanies sit materia febris, ad huc capere non possunt? Responso. Intellige hos febres fieri non per se, sed potius per accidens, ex transpiratione seu aporis putridi ad cor, & non ex sanie tanquam febris materia, aut quia ex calore membri in quo pus conficitur, dum sanguis feruesces mutatur ad sanie, corpus totum calefit, et sic fiunt febres, nouisti. n. ex Gal. quomodo pus originem trahat a sanguine quod semimalam transmutationem habet. Obie. Dolores et febres accidunt ne in declinatione tumorum, an in augmento, siquidem dictum est per Aui. quod post statum incipit minui tumor et declinat eius esse ad puris collectionem, febres*



igitur in declinatione contingent, & non in augmento?

Re. ponsio. Tempora tumorum sunt in triplici consideratione apud medicos. Nam interdum consideratur ipsorum quantitas, interdum accidentia, & interdum materiae concoctio. Hic igitur Auicennas considerat quantitatem ipsius apostematis, quia tunc uidetur quasi detumescere, & in quantitate minui cum pus in ipsum conuertitur, idcirco quo ad eius quantitatem, declinationem nominauit, non quo ad eius materiae concoctionem, & accidentia, quia reuera hæc potius in augmento contingunt quam in declinatione. De alijs signis lege fusius Auic. 2. 4. cap. 2. & multa colliges circa hanc rem idonea, uide etiam Aet. ser. 14. cap. 31. ibi. Resolutionem dicimus, quum humor allapsus discutitur &c. De signis quæ corruptionem particularum ostendunt, ubi de gangrena loquemur satis fuse tractabimus si Deus uoluerit.

De cura tumorum præter naturam in genere.

In primis considerandum est, num tumor factus sit, an adhuc fiat, Si factus sit, tunc cura est, ut quod præter naturam in particula continetur per euacuationem quamprimum remoueatur, Si uero adhuc in generatione fuerit, prohibendum per euacuationem ne fiat, uerum antequam curationem horum aggrediaris duo potissimum scopi, quibus cura uariatur, respiciendi sunt, Quorum alter a tumorum differentia sumitur, Alter a læse partis natura. Tumorum igitur differentia habetur ab ipsorum quantitate qualitate & materia efficiente. Considerabis itaq; quantitatem, quum sciueris, aliter magnum tumorem esse curandum aliter paruum. Qualitatem, si cognoueris hunc esse calidum illum frigidum, hunc ab influxu fieri, illum a congestionem, hunc factum, illum adhuc in generatione esse materiam, si phlegmonem a sanguine, & si pelata a flaua bile &c. Secundus scopus qui a læse partis



partis natura sumitur, erit tibi notissimus, si partis temperiem formationem situm ac potentiam contemplatus fueris, nam aliter tumor in carnosus partibus quàm in nervosis, aliter in glandulosa parte quàm in alijs non glandulosis curabitur. His igitur sic se habentibus. Primo, si tibi occurrerit tumor ex influxu humorum generatus, excogita primum causas, quæ tunc eum excitant ut abscindantur, et si quid in eo collectum est, removeatur, quod ut magis aperte loquar, ad particularem curationem descendam, Scito igitur id primum quod si tumor fiat ex influxu, tribus scopis curabitur, fluxionis scilicet diuersione, doloris mitigatione, ubi tumor de genere præsertim inflammationem fuerit, Tertio eius quod collectum est, euacuatione, Diuersio fiet in corpore plethorio per sectionem uenæ, In cacochymo per purgationem, quæ cuique humori redundanti sit accommodata, Doloris mitigatio perficietur anodinis ac dolore demulcentibus, aut malâ qualitatem retificantibus, aut uias eiusdem partis naturales aperientibus, ut facilius affecta pars repurgari possit euacuatio eius quod collectum est, fieri solet, uel in principio tumoris per repellentia, aut in fine per discutiëntia, de quibus posthac suo loco dicemus, uerum interim memorare quod sæpius à me dictum est, in principio alicuius, qui ab influxu generatur, tumoris, esse puris repellentibus utendum, in augmento repellentibus cū discussorijs, ita tamē quod discutiëntia à reprimētibus ualde uincantur, in statu utraq; æqualiter esse admiscēda, in ditione solū resoluëntia ac relaxantia esse adhibēda, Quod si tumor in abscessū puenerit, tūc primum mitigatorijs mox suppurantibus ac cōcoquētibus demū ipsis discutiētibus remedijs utere. Quod si nec habilis sit materia ad discutiēdū, nec spōte locus apiatur, tūc manu opatrice indiget, ut scalpello incidatur ac pus ipsū amoveatur ne aliqua erosio intrinsecus supueniat. Apto igitur tumore, tū detergētibus opus est et carnē implētibus



demum more aliorum ulcerum ad cicatricē inducētibus, etc.

Loci consentientes de cura tumorum in genere.

Gal. 13. meth. cap. 6. dicamus communem omnium tumorum curationis indicationem esse euacuationem, qui uero adhuc in generatione sunt, in ijs prior euacuatione est confluentis ad affectum locum humoris inhibitiō & c. lege locū hunc fusius, & inuenies quod duo scopi sint, qui de tumorum curatione indicent, ibi uariatur cura non tantum pro tumorum differentijs, sed etiam pro laborantiū particularum ratione, & c. De differentia tumorum in quantitate, qualitate materia loquitur Auic. 2. 1. cap. 5. ibi Apostemata diuersis differunt differentijs in materia ut nosti, in qualitate, quia aliud calidiū aliud non & c. Quod uero situs formatio temperies & potentia membri considerata sint, lege Gal. 2. ad Glauc. cap. 2. ibi. Quattuor uero sunt ab his indicationes, ab eorum temperatura à formatione à siti à potentia & c. De abscissione causarum tumores efficientium loquitur Gal. 13. meth. cap. 2. ibi quæ causæ tumores accersere uidetur has cum in corpore iam conceptæ sunt, sed adhuc incipientes et exiguæ sunt, utiq; ne maiores fiant prohibendum & c. De tribus particularibus intentionibus scilicet de fluxionis diuersione, de doloris mitigatione, ac euacuatione loquutus est Gal. de. i. 2. ad glauc. c. 2. ibi semper fluxionis motum ad contrarium trahere expedit & c. ibiq; etiam de mitigando dolore loquitur, quum dicat si magnus dolor cum fluxu inciderit, tunc in huiusmodi affectibus sufficit uehementiam doloris mitigare etc. quomodo fiat dolor postea docuit Gal. 13. meth. cap. 6. ibi fit dolor propter intemperiem, uulnus, contusionem, distorsionem, obstructionem, & spirituum flatuosum & c. & in hoc capite etiam uerba facit de uacuatione tumoris dicens uacuatur quod impletum est, non modo medicamentis ijs quæ digerunt, sed et



tiam quæ adstringunt & refrigerant. i. repellentibus & digerentibus ubi præcipue tumor ad suppurationem nõ uertitur, unde Gal. 2. ad Glau. emplastrum habet, quod non solum id repellit quod influit, sed & quod continetur, exiccat & circumiacentia membra corroborat, quod ex semper uino, corticibus malorum punicorum in uino decoctis rhu & farina hordei componitur, quo utendum est ubi nullus dolor adfuerit. Aet. ser. 14. cap. 31. In principio repellentia, In augmento ex discussorijs aliqua ad repellentia admiscebimus. In uigore mitigatorijs dum uehementissimi fiunt dolores, utemur in declinatione solis discutientibus &c. De tumoris in abscessum peruenientis cura loquitur Gal 2. ad Glau. cap. 6. ibi curatio eorum qui abscedunt tumorum fit incipiente abscessu per ea quæ dolorem sedant atq; elaxant, procedente autem tempore ad ea quæ concoquendi ac suppurandi uim habent transferri oportet &c. Et. 13. meth. cap. 5. Si aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea uideatur tibi, totum digerere posse, secare, exitum ei, quod digestionem non cessit, eo potissimum oportet, quo est editissimum &c. hoc idem adserit Auic. 3. 4. cap. 29. ibi cum inueneris exituram, (sic ipse abscessum nominat) cum maturatione, cuius non speratur eruptio, tunc oportet ut perfores, quoniam si demiseris saniem, corrumpitur & corrodet uenas &c. Bac. Intellige si abscessus fuerit in membro nobili, uel in loco quem uenæ tendones Nervi carthilagine occupent, Nam tunc. i. remouendum est pus, ne ex hoc mali aliquid subiectis partibus contingat, Quomodo autem diuersæ fiant sectiones, prout diuersæ sunt partes corporis affectæ docet Auicennas ex opinione Amyli, ibi, Si exitura fuerit in capite, tunc sectio fiat æqualis, ne cooperiant eam pilli, si in oculo fiat lata &c. lege eum fusius, nam ipse in his sectionibus uidetur quasi lineas naturales sequi, uide etiam de his



sectionibus Gal. 13. meth. c. 5. ubi in axillis & inguinibus ipse myrti folium in sectionis magnitudine imitari docet, quæ sectionis non plane magna est, nec adeo turpem reddit cicatricem, nec particulam imbecillam ut in sectione magna fieri solet, Auic. loc. nuper cit. Et cum perforaueris eam antequam facias eam conglutinari, oportet ut mudes eam &c. Bac. Plures satis intentiones in hac re monstrauit Gal. 13. meth. cap. cit. ibi. Quin etiam mitigare prius incisam partem oportet fomētis uel cataplasmate, moxq; ea quæ pus citant, deinde ea quæ expurgant, Demum quæ cicatricem inducunt, nisi adfuerit concacuitas quæ implenda esset, imponantur. Mouet pus ipsa manna, ut ipse testatur quæ nil aliud est q̃ thuris purgamentum &c.

#### Observationes in ualentibus medicamentis.

Gal. 13. meth. cap. 5. Quum fidenter iam ualentibus medicamentis utaris tunc observatio bis in die quem præstent effectum, primum mane. 2. uesperis Bac. Hinc forte orta est occasio quod medici bis in die ægros uisitant.

#### Observationes in repellentibus medicamentis.

Guido gu. lia. Repellentia in principio omnis tumoris ab influxu excitati conferunt, exceptis his casibus, si materia fuerit in emunctorio, si uenenosa si crassa & ad motum inepta, aut particule impacta, Si tumor critice fieret si talis tumor à causa duntaxat primitiua excitetur, si in principe aliqua parte oriatur si in plethorico corpore, si in corpore cum imbecillis uiribus destituto sim cum dolore uehementi incidet, quia tunc mitigare opus est, & non repellere.

#### Observationes in resoluentibus medicamentis.

Gal. 2. ad Glauc. cap. 6. Melius est fortiter resoluentibus medicamentis commiscere emollientia, ne humores in scirrhus conuertantur.

#### Observationes in sectione tumorum.



Auic. 3. 4. cap. 29. & sis sollicitus ut cadat porta perforationis inferius & quære locum saniei cum tua perforatione, & perfora in loco maturiori & magis carnosio, & sit illa pars longior à uenis arterijs & chordis &c. Bac. Neoterici ex hoc Auicennæ loco plura alia notât, ut primû fiat sectio in loco quo materia est collecta, locus sectionis sit inferior, fiat sectio secundû longitudinē musculorum neruorum et uenarum, uidentur nerui arterie uenæ quoad fieri poterit, nec tota affatim euacuetur materia, sed paulatine, ne resolutis spiritibus ex nimia euacuatione uirtus prosternatur, demû blandius quam fieri potest, & sine dolore locus seccetur, &c.

Observationes post uacuationem puris.

Gal. 2. ad Glauc. cap. 2. postquam secueris & pus euacua-ueris, cauendû est deinceps, ne oleum, aut aquâ imponas, aut si quando uulnus abluere oporteat, tunc melicrato, uel oxycrato uino & mulso utendum est, Itidem ait Auic. 3. 4. c. 27. ibi & non oportet ut approximet perforato uel secto aqua, neq; oleum, neq; aliquid quod sit pingue &c.

Prohibentia tumores & apostemata.

Prohibet ne tumores fiant acetû, acetosa, althea, bolus armena, bleta, camaleonta, camphora, hepatica, uaporatio lapidis molaris cû aceto, lutum samium, ouum, psyllium, rubus caninus, sanguis draconis, solatrû, sumach, stercus, terra sigillata, talch, tribuli, acatia, chymolea creta, poma pôtica acetosa styptica plumbum sandali plantago, & quæcunq; frigida & styptica sunt. Sedantia dolores apostematum.

Dolores sedant althea, radix canabis syluestris cassia fistula, cucurbita, folia ebuli fermentum, hiosciamus, malua, farina hordeacea, orchis, panis frumenti cum mellicrato, parietaria, folia pini, polenta, pulegium, sarcacolla, stercus uaccæ, uiola cum farina hordei usnea &c.



## Maturantia tumores &amp; apostemata.

Althea, amomum, anethum, butyrum, caulis, folia coloz-  
cyntidis frumentum ficus galbanum lapatium rotundum, li-  
lium, semina lini malua, mellilotum, capæ narcisi, panis cum  
aqua & oleo, pix, sanguis hirci uel urfi calidus sapo, uiscus  
cum resina & cera radix hircos, ceratum Andromachi mes.  
diachylon, fœnugræcum cum uitello oui et terebenthina, chei-  
ri idest uiolæ citrinæ.

## De pronosticis tumorum.

Auic. 3. 4. cap. 1. Quando multiplicatur materia aposte-  
matis calidi & magnificatur apostema, tunc est de summa  
apostematum althoin mortificantium & de summa prædi-  
ctorum est, quæ dicitur Barachien, & istæ speties male, &  
quæ eis simulantur multiplicantur in anno pestilentie, & de  
apostematibus calidis illa sunt mala quæ non excitantur ad  
declinationem, quam sequitur leuitas & detumitio, neq; ad  
aggregationem materiam, imo ad corruptionem mēbri & c.  
B. Althoin & Barachiæ, sunt nomina apostematum quæ in tē-  
pore pestilenti solent accidere, interpretantur enim aposte-  
mata uenenosa, ut ipsæ refert Auic. loc. cit. cap. de Althoin.

Hip. pronost. 1. tex. 40. Quicumq; tumor dolens durus &  
magnus est, periculum mortis breui fore significat, Quicum-  
que uero mollis non dolens digitis cedit prementibus diutius  
immoratur, & c.

## Authores dissentientes circa tumores.

- 1 Adserere, tumorem & apostema idem esse cum Auicennianis.
- 2 Adserere, tumorem non esse morbum quum in genere quantitatis sit, & non qualitatis.
- 3 Adserere, omnem præter naturam tumorem esse tantum morbum, & non symptomæ.



- 4 Adferere, tumorem esse morbum simplicem, & non compositum.
- 5 Adferere, apostemata esse duntaxat calida quæ a sanguine & bile oriuntur.
- 6 Adferere, non dari causam coniunctam apud Gale. quum ipsa sit morbus.
- 7 Adferere non esse diuersa tempora, quo ad concoctionem & symptomata.

Confutatio dissentientium circa tumores.

Ad primum. Idem. nō potest definiri per idem, nisi utrumque uim relationis obtineat, neq; idem potest esse genus & species respectu eiusdē. sed apostema est tumoris species prout notat Gal. 3. ad Glauc. & definitur per tumorem, ut apparet ex Conciliatore diff. 95. ibi. Apostema est tumor præter naturam mutans membrum a sua naturali dispositione &c. Igitur idem tumor & apostema non erit, non enim tumor apostematis semper tumor est ut apparet. Verum de his nominibus esse illos parum sollicitos, quibus rerum scientiam inuenire propositum est, monet Gal. 6. meth. cap. 1. idcirco nō adhibendo nos fidem nominibus interdum pro tumore, etiā nomine apostematis more arabum sæpe utimur.

Ad. 2. habes exemplum de magnitudine uitiata a Gal. 1. de morb. diff. cap. 9. ubi de corpore Nicomachi immodice aucto quod sanitati restituit Asclepiades, recitat, & sic morbus dicitur etiam in quantitate.

Obiectio.

Si apostema non est in genere qualitatis, quomodo erit morbus? Nam omnis morbus in affectu, a naturali habitu permutato & actiones ledente consistit, ut Gal. 3. de sympt. diff. cap. 1. & sic in qualitate reponitur, & nō in quantitate.

Responsio. Duo in tumore considerantur, incrementum scilicet illud quo corpus tumescit, et mala eius dispositio qua



membrum afficitur, erit igitur ratione incrementi in genere quantitatis, sed ratione malæ dispositionis erit in qualitate, & sic erit morbus actiones ledens &c. Ad. 3. respondet Gal. I. de mor. diff. c. 12. Quod si tumor non eousq; tumeat, quo fun-ctio impediatur, symptoma potius uel pathema dicitur, q̃ morbus, Præterea id quod ad inflammationem sequitur erit symptoma, sed tumor teste Conciliator diff. 95. ad inflammationē sequitur, erit igitur quādoq; symptoma & nō morbus.

Ad. 4. Auic. cap. de comp. ægritud. inquit quod apostema est ægritudo composita ex omni genere ægritudinum, & sic non erit morbus simplex, Nam ipse pro apostematis nomine tumorem præter naturam intelligit. Obiectio.

Morbus compositus ad membra tantum cōposita attinet sed apostema fit etiam in membris simplicibus, igitur non erit compositus, nam mutat membrum à naturali qualitate, ad eam quæ est extra naturam. Respon.

In apostemate iuxta Auicennæ placitum, Cōsideratur mala temperies, mala compositio et soluta continuitas, Erit igitur ratione malæ complexionis morbus consimilis in simplicibus membris, & ratione malæ compositionis morbus compositus, & ratione solutæ continuitatis erit ad utrumq; indifferens. Ad confirmationem argumenti dicimus qualitatem ibi posse accipi pro communi quadam dispositione ad temperiem compositionem & solutā continuitatē, & sic nulla erit tua obiectio, quam nuper attulisti. Ad. 5. Respondet Auic. 2. 1. cap. 15. dicens non esse existimandum quod apostema calidum sit illud, quod ex sanguine & cholera tantū generatur, sed illud etiam quod ex quacunq; materia siue illa sit calida p̃ essentiam, siue accidat caliditas ei propter putrefactionem, Bac. non minus ac si diceret, Apostema dici potest calidū per se, cum ab humoribus calidis gignitur, aut per accidens pro-



pter putrefactionem ei contingentem. Ad. 6. Gale. 1. de diff-  
mor. c. 7. Quum affectus ipse functioni primo incommodat,  
eius uero causa, ipsam non ledit, affectum quidē morbum, id  
quod efficit, causam morbi nominamus, id quod in succis  
crassis uiscidisq; atq; in obstructione facile deprehenditur,  
quippe obstructio ipsa morbus est. succi autē obstructionē fa-  
cientes sunt causse morbi & c. ex quibus plane uerbis pate-  
causam coniunctā dari posse apud Gal. nō enim de anteceden-  
tibus causis loquitur Gal. Sed de his præcipuæ quæ obstructi-  
nes actu efficiūt, Quod autem causa coniuncta distinguatur  
a morbo, hoc probat Gal. 1. meth. cap. 8. dicens, eius affectus  
qui actionem impedit, causæ possunt quidem nō esse, possunt  
& adhuc remanere, ergo diuersæ inquit omnino ab affecti-  
bus sunt causæ, Quod Galeni argumentum si concesseris, hoc  
etiam concedas licet, causæ cōiunctæ sunt causæ, igitur ab af-  
fectibus diuersæ, & sic distinguuntur. Ad 7. Galen. 3. de uic-  
rat. in morb. ac. c. 62. Coctis siquidem qui affectum progignūt  
humoribus, cōfestim excreabunt, Quod si qualia oportet so-  
lum expuere cœperint, in neutro adhuc odorū neq; in affe-  
ctu, neq; in symptomatis morbus augebitur, Nam sæpius affe-  
ctio ipsa, qua laborāt, mitior quidem existit, sed symptomata  
augentur, ut in phlegmone obseßis particulis & c. et sic fieri  
potest, quod morbus nō crescat crescētibus symptomatis quū  
eorū diuersa sint tēpora, et hæc dicta sint ad eorū confusionē  
qui crescentibus symptomatis, semper credunt morbum au-  
geri, & c.

#### De inflammationis definitione.

Commune quoddam nomen erat apud Hip. & alios uete-  
res, ut quicquid efferuescētia ac ignea quadā dispositione cor-  
pus afficeret φλογωσις diceretur sub quo nomine non solū  
erysipelata herpes bubo dothienes phigethla et carbūculi cō-  
tinebātur, sed quicquid ab optimo & cōmixto sanguine ortū



trahebat, At Iuniores magis proprie loquentes: id tamen φλεγμαν esse dixerunt, quæ ab optimo ac sincero sanguine, mediocriter tamen crasso & superfluenti prouenit, appellantur inde φλογωσιν non ueram inflammationem, sed eam duntaxat, quæ à uitiato & non naturali sanguine, alijs humoribus admixto generatur, Definiunt autem uerā φλεγμαν esse tumorem cum rubore ac duritia tactui renitentem & pulsatiles dolores afferentem absq; febre, quæ cum adhuc corpori intrinsecus ac extrinsecus accidat, de ea quæ extrinsecus nobis occurrit, uerba faciemus.

Loci consentientes de inflammationis definitione.

Gal. 2. de Art. cur. ad Glauc. cap. I. Cōmunis igitur in omnibus immoderata caliditas, & ueluti quedam φλογωσις, unde & φλεγμαν nomen, de ipsis efferre antiqui consueuerunt & c. Auic. 3. 4. cap. 20. Et scias quod nomen phlegmones in lingua Græca est absolutum super omne quod inflammatum est, deinde dicitur de omni apostemate calido, postea dicitur de eo quod est ex apostemate calido cū proprietate prædicta, & non caret inflammatione & c. Gal. 13. meth. cap. 1. Quum autem ueteres phlogosin subinde phlegmonem appellant, sciri uolumus nos nō hoc loco de hac phlegmone differere, sed de ea quæ supra inflammationem tensionem quoque in particula facit & c. Quid uero sit inflammatio habetur ex Gal. in lib. de sectis ad eos qui introducuntur cap. 19. et 20. ibi. Inflammatio est tumor præter naturam calidus durus & tactui renitens atq; dolorem afferens, partem ipsam, non magis quàm antea fuit, rariorem uel duriorē uel densiorē efficiens sed effluxu humoris superuacui repletam, atque ea causa distentam & c. Itidem ait in lib. de tumo. cap. 2. & 2. de loc. aff. cap. 7. & 1. de diff. morb. cap. 12. ibi porro phlegmonē in præsentia non nominamus & c. Quod inflammatio sit si-



ne febre, lege Gal. in lib. deffinit med. Quod atque adeo non uera phlegmone detur habes ex Auic. loc. cit. quum dicat, & parum contingit ut phlegmon sit simplex, sed secundum plurimum associatur ei erysipelas &c.

### De causis phlegmones.

Causæ phlegmones, etsi plures esse uideantur, hæ tamē ad numerum duntaxat ternarium redactæ sunt, ut earum quædam sint prægressæ, quædam antecedentes & quædam coniunctæ. Causæ prægressæ siue externæ sunt contusio fractura luxatio &c. quæ dum dolorem parti inferunt humorū etiam fluxionem concitant. Antecedentes sunt, calidioris quàm pars sit copia sanguinis, qui ad imbecillam partem aliquā ipsum recipientem, uel ad se trahentem detruditur ac relegatur, Mittitur autem sanguis ab una uel pluribus particulis, aut quia nimis superuacuuus, aut qualitate sua molestus aut utroque modo est noxius, Pars uero læsa ipsum attrahit, uel ob calorem morbosum, uel ob dolorem in ipsa parte cōsistentem. Hinc est quod excretoria facultas, tum à dolore, tum à mala sanguinis qualitate, excitata totis uiribus quod ei infestat, expellere conatur, quo fit ut sanguinis aliquid & spiritus in affectam partem exprimat unde pars pro influentis ratione humoris in tumorem attollitur. Causa autem coniuncta est ipse sanguis in laborante particula iam impactus &c.

### Loci consentientes de causis phlegmones.

Quod phlegmones causæ sint tres duntaxat. præter cæteros omnes notarunt neoterici. De causis præincipientibus et antecedentibus loquitur Auicennas. 3. 4. cap. 2. ibi. Et de eis sunt primitiue sicut contusio aut incisio aut fractura &c. Et antecedentes sunt corporeæ ex repletionem, aut malitia humorum aut debilitas membri recipientis &c. Gal. 13. meth. cap. 3. At communis omnium phlegmonarum generatio ex sanguine



nis influxu est copiosioris scilicet, q̄ pars postuletur, sane copiosior sanguis influit, alia quapiam, alijsue particulis aliquādo eam mittentibus, & ea quæ phlegmone laborare incipit, recipiente, aliquando particula quæ affligitur hunc ad se trahente & c. lege locum hunc fusius, et omne id intelliges quod à me nuper relatum est, Aet. ser. 14. cap. 31. Omnis inflāmatiō ob sanguinis affluxū, uel à manifesta causa uel ab occulta generatur, à manifesta quando offenso pede glandula inflāmantur, ab occulta quando aliqua parte delegāte aut toto corpore transmittente, & affecta parte ob debilitate recipiente, humorum copia affluxerit & c. Paul lib 4. cap. 17. itidem habet sed breuiori satis sermone, Vide tamen de his uberius Gal. 2. ad Glau. ca. 1. ibi fitq; semper ex omni ferè occasione, etc. quē locū si diligēter examinaueris rei totius scopum attinges & c.

## De signis phlegmones.

Phlegmones signa sunt tumor præter naturalis in parte læsa, uehemens dolor nisi pars inflammata hebetis sensus fuerit, pulsatio molesta, tensio ita etiam magna ut pars illa prope modum frāgi sentiatur, calor maximus inest, qui adeo partem interdum lædit ut comburi quasi se sentiat. Rubor etiam per summa uiget, non minus ac si ab igne comitaretur, Demū renixus ipsius partis in ipso tactu apparet, Signa autē quibus phlegmones status principium, augmentum & declinatio cognoscuntur, in sermone uniuersali satis copiose ostendimus, Verum aduerte q̄ phlegmone postquam hæc tempora percurrerit, quattuor modis terminari solet, in resolutionem scilicet suppurationem corruptionem & indurationem, quorū etiam signa in capite uniuersali supra satis exarauimus & c.

## Loci consentientes de signis phlegmones.

Gal. de his signis loquitur. 2. ad Glau. cap. 1. ibi sanguine optimo & mediocriter crasso ad particulam effluente, & ob



multitudinem conculcato, uehemēs dolor hominem arripit, nisi membrum, sensum omnino hebetem habuerit pulsusq; in profundo molestus accidit, tendiq; omnino ac frangi membrum apparet &c. lege fufius hunc Gale. locum & rē magis notam percipies, Auic. 3.4.c.2. & signa eius sumuntur ex ca-  
 liditate & inflammatione, & additione quantitatis & ten-  
 sione & impulsione & pulsatione, si est sumersus, & sit pro-  
 pinquus arterijs etc. locū ultra legito, nā omnes illas de qui-  
 bus nup loquebamur causas ad unguē recitat, imo quod plus  
 est si sensum Auicennae Gal. conferas praeter id, quod una cō-  
 sentiunt etiam locum Gal. magis dilucidatum inuenies ut nō  
 immerito Galeni interpres appellari debeat, Nam ubi dixit  
 Gal. pulsus in profundo molestus accidit, maxime hoc intel-  
 ligi debet, si arterijs, ut exponit Auic. propinquus fuerit &c.  
 De hisdemmet signis loquitur etiam Gale. 13. meth. cap. 1. ibi.  
 Ultra inflammationē etiam tēfio partis uisitur &c. ibidē ha-  
 bet. 14. meth. c. 2. De signis quae phlegmones tēpora indicant,  
 plura habes ex Aet. ser. 14. c. 31. ibi. Erit inflāmationis princi-  
 piū etc. De signis permutationis ipsius inflammationis nō so-  
 lum apud neotericos habetur sermo, sed iuxta Auic. & Gal.  
 2. ad Glau. c. 2. De cura ipsius phlegmones.

Omnis inflāmatio, quae ex influxu partim fiat, partim fa-  
 cta sit, duplici scopo indiget, Quorū alter est, ut quod influit,  
 prohibeat, Alter, ut quod iā influxit euacuet, Prohibetur qui-  
 dē influxus auersione, repulsione, ac causas ipsius fluxionis re-  
 motione, Euacuatur qđ influxū est p medicamēta digerētia ac  
 discutiētia, aut p ea q primū reprimere sūt idonea, ac parti  
 affertæ robur inducētia, erit igitur in cura primus inflāmatio-  
 nis scopus fluxionis inhibitiō. 2. materiae parti inharētis re-  
 motio. 3. erit sympt. una cū uictus ratione correctio, Fluxionis  
 itaq; inhibitiō p sectionē uenae perficietur, si modo ætas uires



Regio tempus ad hanc perpetranda conspirauerint, quæ e  
directo materiæ fluentem auertat, sicuti à dextris in dex-  
tra parte uel a sinistris in sinistra facta &c. Verum si cor-  
pus qd inflammatione laborat cacochimū fuerit, per ea primū  
euacuandum est, quæ humorem noxium extirpare possunt an-  
tequam ad Auersionem, (quæ græce antispasitis dicitur) acces-  
seris. Sic enim fluxionis motus ad contrarium trahitur, Se-  
cundus in curatione scopus erit prout tempora inflammatio-  
nis exposulant, siquidem in primis ut dictum est (serua-  
tis iam regulis in capite uniuersali traditis) repellenda est  
materia cum oleo rosaceo oui candido succo plantaginis etc.  
aut more Galeni cum oxycrato aqua frigida cui paululu m  
aceti admixtum sit, aut cataplasmate, ubi dolor nō adsit quod  
ex semperuuo malicorio et rhu in uino decoctis cum polen-  
ta componitur in augmento non solum reprimendum sed etiā  
digerendum est, sicuti cum folijs maluæ absinthij rosarum fa-  
rina hordei una cum oleo chamomillino admistis ac cataplas-  
matis modo impositis. At in morbi uigore uaria sunt, quæ  
ad discutendum ac dolorem demulcendum præparantur, si-  
cuti emplastrum Gal. ex medulla panis in feruenti aqua ma-  
cerati, cum melle, aut unguentum basilicon althea chamomil-  
la & ceratum diachylon &c. In declinatione solis discutien-  
tibus utendum erit, Quod si tumor digerētibus medicamen-  
tis nō resoluatur, sed potius ad suppurationem se uertat, sta-  
tim ad maturantia ac pus ipsum mouentia recurrendum est,  
qualia sunt, quæ temperatum habent calorem, sicuti cataplas-  
ma quod ex farina triticea, in aqua & oleo uulgari medio-  
criter decocta componitur, aut hoc quod ex radicibus altheæ  
maluæ caricarum decocto ac farina triticea componitur, sup-  
puratione facta, quæ ex doloris febris & caloris remissione  
deprehenditur, nisi locus sponte aperiatur tūc incisione uel



aliquo erodente medicamento sanies euacuanda est, eaq; uacuata ulcus detergendum, moxq; sarcoticis ac glutinantibus siue ad cicatricem inducentibus utendum, Neoterici facta incisione protinus ad tollendum dolorem, lychnum in candido ac luteo oui cum oleo rosaceo intinctum ulceri imponunt, moxq; digerentibus cum oleo rosaceo terebinthina & luteo oui cōpositis utuntur, indeq; ad detergentia quæ ab ipsis mundificatiua uocantur se conferunt, Detergunt syr. rosaceus rodomel oxycraton, ac mellicraton &c. Tertius scopus symptomata ab inflammatione remouet, ac uictus rationem instituit, symptomata sunt dolor, durities relicta, ac partis læsæ corruptella, Dolor statim si adfuerit, demulcendus est, ne sui causa maior fluxus uel uirium imbecillitas contingat, fiet hoc mirifice cum oleo rosaceo ouorum luteis admisto, aut cum pasto cui oleum rosaceum cum paucula cera adiunctum sit, His omnibus admisceri potest crocus cum in sedandis doloribus sit maxime efficax, Quod si nec anodinis dolor sedaretur ad narcotica præsertim familiaria erit recurrendū, sicuti ad folia hiosciami oleum de papauere, & huiuscemodi alia, At si inflammatio in scirrhosam duritiem peruenerit, tunc mollientibus primum utere, sicut cucumeris agrestis radice cum caricis pinguibus in aqua decoctis, adiecta farinæ portione cum suillo adipe, uerum hæc durities tanti facienda non est, quantum si corruptella partis uitiatæ appareat, Nam ubi hæc contigerit, protinus, ne pars cui adiuncta est, corrumpatur, eam excides, aut scarificationibus quàm plurimis (si corruptio in superficie duntaxat fuerit) partem excitabis, atq; aqua salsa scarificatam partem ablues, moxq; cataplasma ex fabarum & orobi farina in oxymelite cocta admouebis, De his plura intelliges ubi de Gangrænæ cura loquimur, Interim uictus ratio tenuis frigida et humida insti-



tuatur, ac omnes animi perturbationes longe absint.

Loci consentientes de cura phlegmonis.

Gal. 13. meth. cap. 2. Ergo quæ causæ phlegmonem accerere uidentur has adhuc incipientes, ne maiores fiant inhibere conuenit, Quum autem eo peruenerint, quo phlegmonem creent has summouere oportet, & quantum iam phlegmones genitum est sanare &c. Quod autem fluxus prohibeatur auersione docet etiam Gal. 4. meth. cap. 6. ibi. Hoc perpetuum est, quod ab Hip. didicimus incipientem fluxionem ad contraria trahendam esse, fixam uero in laborate particula uacuandam esse, etc. Similiter habes ex Gal. 13. meth. c. 6. quod euacuanda sit materia in phlegmone contenta, per digerentia ac reprimentia, ibi uacuatur quod impletum est non modo medicamentis ijs quæ digerunt, sed etiam quæ adstringunt & refrigerant &c. De 1. curationis scopo loquitur Auic. 3. 4. cap. 3. ibi. Cum causa est antecedens, tunc oportet ut incipias cum euacuatione, et comple ei quod meretur ex phlebotomia & solutione uentris &c. Vide Gal. 2. ad Glauc. cap. 2. ubi inquit quod semper fluxionis motum ad contrariū trahere expedit, atq; emplastrum apponere ex semper uiuo malicorio, &c. ut supra dictum est, uide etiam 13. meth. cap. 6. quæ phlegmone adhuc in generatione sunt inquit earum causas prius abscindes, quæ uero iam factæ sunt, has utiq; curabis solas, uerum si totum corpus male sit affectum, idq; uel plethoricum, aut cacochymum tunc plethoricum sanguinis missione, cacochymum purgatione quæ cuique superanti succo sit accommodata, corrigetur &c. De curatione etiam ipsius phlegmones lege Gale. 3. de temper. cap. 5. ibi. Ergo quum duplex in ijs quæ phlegmone laborant particulis affectus sit &c. De secundo scopo loquitur Auic. 3. 4. cap. 3. ibi. Et incipe cum reperiussis, deinde appone in augmento cum intramissione mellifica-



mollificatiuorum & humectantium cum repercussiuis, & quantum procedit in augmento, tantum procedas in additione mollificatiuorum, paulatine & exiccantia sunt quæ sanant in fine, nā prohibent remanere aliquid quod fiat sanies, etc.

**Obiectio.** Cum omnes ferè Græci, ut Galenus, Aetius, & Paulus in augmento discussoria cum repellentibus admiscere iubeant, cur nunc Auicennas cum repercussiuis mollitiua adiungit? uidetur enim longe aliter ac sentiant Græci rem exponere. **Responsio.** Facile soluitur hæc tua obiectio, modo intelligas repellentia in principio applicita esse interdum adeo frigida, ut non solum materiam fluentem reprimant, sed in parte contentam ita impactam ac quandoque duram efficiunt, ut uix absq; mollientibus possit discuti, unde dictum est ab Auic. mollitiua esse cum reperimentibus admiscenda. Verum si non ualde frigida fuerint reprimentia paulatim ut Græci ad discutientia perueniendum erit, & hæc ad obiectionem dicta sint, quāuis breuius respondere potuissem, si nihil referi dixisse, quæ mollitiua sunt etiam uim discutienti habere &c. Lege hac de re Gal. 2. ad Glau. cap. 4. & nota quod reprimentia in principio morbi conueniunt duplici de causa. Primo quia affectis partibus robur inferunt, unde minus prompte affluxus excrementorum in se recipiunt. Secundo quia eorum, quæ in ijs iam contenta sunt. tenuissima retrorsum exprimunt. Quod si tum fluxio humorum per ea remedia compescitur, tūq; dēsit in affecta particula crassiore detinetur, id tempestiua erit relaxatio, ut Gale. inuit. 11. meth. cap. 15. Aet. ser. 14. cap. 32. si inflammationes ad suppurantionem conuertantur, adiuuare oportet ut q̄celerrime suppurentur. Ibiq; suppuratoria q̄ plura docet, hoc idem habet Auic. ibi. Cum uideris inceptionem apostematis incedere itinere exituræ, tunc dimitte infrigidationem, & incede in uia eius,



quod maturat & saniem facit, &c. Itidem ait Paul. lib. 4. cap. 18. Quod autem Neoterici facta incisione, ijs utantur, quæ dolorem primum leniant legere poteris iuxta Ioannem de Vigo cap. de phlegmone, & plura quæ pridem à me dicta sunt, inuenies lege et am Gal. de cura ulceris phlegmones. 13. meth. cap. 5. ibi, Non ipso ulcere etc. De tertio scopo & præsertim de doloris mitigatione loquitur Auic. loc. cit. ibi, & multotiens sedat dolorem uinum dulce mistum cum oleo rosaceo & pauca cera, aut lana æsopi infrigida in æstate, & tepesacta in hyeme &c. Itidem ait Pau. lib. 4. cap. 17. & Aet. loc. cit. ibi dum uehementissimi fiunt dolores mitigatoria applicabimus &c. De scirrhusa duritie loquitur Gal. 14. meth. cap. 4. ibi, Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus nullum uehementer excalefaciens siccans ue medicamentum est aptum, sed ea tantum quæ cum molliendo digerere possunt, &c. De corruptela partis habes Auic. tertia. 4. cap. 3. ibi, Si ergo timueris aliquid de corruptione emplastra locum cum farina hordei & uolubili, et si apparet aliquid de hoc, tunc scarifica locum, & scias quod scalpellationis alia est magis appars, alia magis profunda, & illud est secundum locum apostematis & dispositionem membri &c. Bac. Nota quod si carnosus fuerit locus, in quem corruptio decidit, & ipsa sit satis profunda expediet locum altis multisq; incisionibus scarificare, eoq; magis, quo membrum sensu ac motu priuatum senties, At si locus fuerit neruosus paucaq; corruptio in superficie, tunc leni et nõ profunda scarificatione opus est, sed de his ubi de Gãgræna tractabimus uberius sermocinabimur, et cæ.

#### Observationes circa curam phlegmonis.

Gal. 2. ad Glauc. cap. 2. Oportet in his inflammationibus principia curationum optima fieri. Nam quæ in ipsis errata contingunt, difficulter sanabiles aut omnino insanabiles fac



ciunt dispositiones sunt autem hæc duo maxime errata, si nulla de toto corpore prouidentia habeatur, & si calefiat atq; humectet etiam membrum &c.

Observationes circa reuulsionem & deriuationem.

Gal. 13. meth. ca. 6. si circa sedem uel partem huic uicinam phlegmone incidit, aluum non deijcies, neq; cum in uesica uel cole uel renibus est, cepta urinas prouocabis, sed ad partes quæ maxime lōginquæ sunt, semper reuulsionem facies, etc. Itidem habetur 13. meth. cap. 11. ibi, si circa fauces & palatū, aut deniq; in ore phlegmone laborare inceperint, in his omnibus cauenda sunt quæ pituitam per os euocant &c.

Observationes circa reprimentia & resoluentia.

Auic. tertia. 4. ca. 3. Et scias quod administratio eorū quæ fortiter reperiunt in primis, & eorum quæ fortiter resoluunt in fine, est mala, Nam in frigidatio fortis perducit ad corruptionem membri, & in resolutione uehementi accidit dolor, &c. Observationes in scarificatione.

Paul. lib. 4. cap. 17. si ob defluxionem ortas inflammationes scarificatione diuiseris, præsertim per initia malū quoddam haud mediocre egrotanti accerses, &c.

Inflammationi conferentia.

Conferunt inflammationi, modo recte distinguas tempora, Acatia cum albumi oui, Acetosa, aphodilli decoctio, Folia alcannæ, Althæa, berberis, amomum, smirnon, atriplex, auricula muris, bolus armenia, blitus, camphora, Folia cannæ recentia, chamomilla, cassia fistula, cauda equina, caulis agrestis, ceratum de sandalis, cerusa, chymolia, lithargirium cum cerusa & aceto, cucurbita, diachylon paruum, dragachātum cum succo uermicularis, farina cum mellicrato, farina foenu græci, scoria ferri, fursur cum aceto, holusiamenū, folia hyosciami, succus alchehegi, lenticula aqua, lycium, lingua arietis.

XX 2



tis, semen lini cum melle & oleo, lupinus cum aceto & melle, lutum sigillatum, samium, malua, mellilotum, succus mentham, myrtus, nasturtium, nenuphar, oleum nenupharinū, cucurbita, uiolaceum, rosaceum, myrtinum, opium cum succo corrigiolæ, Farina hordeacea cum uitello oui, oximum fluuiāle cum aceto & oleo, panis frumenti cum melliorato, Folia papaueris, portulaca, plātago, psyllium, rosa ruta syluestris, sandali, sanguis leporis, semperuiuum, solatrum, terra sigillata, tribuli, uiola, uirga pastoris, uolubilis magna, Iridis radix. Folia uitis & c.

#### De pronosticis inflammationum.

Hip. pronost. 1. tex. 33. Tumor in ilijs durus & dolens pes-  
simus est, si omnibus ilijs fatiget, si uero altera parte infestat,  
sinistra, minori cum periculo est & c. Bac. idest si inflamma-  
tio dextram partem affligat, propter iecur plurimo non uacat  
periculo, si sinistram minus mali affert, si utranq; laceffit  
exitiosissimum malum est. sed quia de interioribus hoc dictū  
est, lege Auicennā in superiori capite, ubi de pronosticis, Tu-  
morum uerba fecimus.

#### Auth. dissidentibus circa inflammationem.

- 1 Adserere, in omni affectu externas causas esse semper in-  
quirendas.
- 2 Adserere, Idem esse, dicere phlegmonem ad suppurationem  
& ad putredinem finiri.
- 3 Adserere, uinū dari posse in inflammationibus.
- 4 Adserere in omni phlegmonem motum tanquam nociuū  
esse uitandum.
- 5 Adserere, omnem, internam inflammationem esse lethale

#### Confutatio dissidentium circa inflammationes.

Confutat primum Gal. 4. meth. cap. 3. ubi inquit illud iam  
definiri tempestuum est, nullam externarum seu primitiuas



rum causarum curationis indicatricem esse, sed huius indicationem ab ipso affectu initium habere, Apponet autem id liquido in iis quibus nosci affectus exacte potest, siue ulcus siue Erysipelas, siue phlegmone in parte aliqua consistat, superuacuum est, causam quæ horum quodlibet, efficit, inquirere, nisi iam etiam faciat &c. & sic externæ causæ non sunt semper inquirendæ.

Ad secundum Inquit Galenus pronost. primo tex. 31. quod omnis tumor præter naturam dissecto cõmittente eum humore, curatur, Ergo perspicuum est, ut nisi desistat, cunctant, humores ac spatio temporis prorsus mutatio futura est per qualitatem interdum ad putredinem, quotiens nihil eorum concoctionem præ imbecillitate natura molitur, Interdum si vires ualeant in pus &c. quibus uerbis apparet liquido, non idem esse finiri ad suppurationem & ad putredinem.

Ad 3. Gale. 4. meth. cap. 7. Non latet autem & de uini usu quod cauendum id est, ubi phlegmones suspitio adest, alias dari nihil uetat. Ad 4. Respondet Gal. 13. meth. cap. 6. dicēs illud enim patere, uel me tacente arbitror, eū cui crura phlegmone laborant, non esse uel ambulatione uel cursu exercitandum, sed nec stare illi esse iubendum, imo sedenti plurimū fricari, mox manuum motu exercitari illi est satius, At si cui in supernis partibus coeperit pars aliqua phlegmone tentari, huic motus ex inambulatione, aut cursu, est salutaris &c. Bac. Intellige tu ubi copia humorum non fuerit plurima, Nā si corpus ualde plenum fuerit, non tantum exercitium, sed etiam balneum illi non erit proficuum, ut monet Galenus. aphor. 3. cõmen. 20.

Ad quintum Galenus pronosticorum primo. cõmen. 34. dixit. Quod inflammatio interna mortem breui fore significat ut inquit Hippocrates, At uero id, nisi



aliquid intimum afficiatur, mēdaciū est, intima sunt iecur, uentriculus, lien, & abdomen. Nam muscoli si ita affecti fuerint raro mortem afferunt, nisi magnitudo inflammationis una cum imbecillitate uirium esse contingat, aut medicus aut æger errorem cōmittant &c. & sic non omnis inflammatio nō t rna lethalis est, ut patet &c.

De erysipelatis definitione ac diuisione.

Quum duplex sit erysipelas Alterum legitimū ac exquisitum, Alterum uero adulterinum et spurium, legitimū erit ex sanguine & flaua bile calidioribus quā opus sit mixta fluxio, quæ inferiorem carnem nō molestat. Sed cutim, quā *ἐπίδερμιν* græci uocant) tantummodo afficit, Adulterinum uero est quod alijs tumoribus una admiscetur & ab illorum exuperantibus symptomatis nomenclaturam adeptus est, ut sit erysipelas phlegmonodes quum inflammationem superat, aut erysipelas ædematodes quum in mīstione ædema uincitur uel erysipelas scirrholes, quum ipsum ex nimium refrigerantibus durum & uix resolubile euadit, Atque hic affectus duplicem habet differentiam, utique uel cum ulceratione sit erysipelas, uel absque ulceratione. Cum ulceratione tunc esse dicitur, cum non tantum cutim, sed ipsam quoque inferiorem carnem exulcerat. Definitur etiā alio modo erysipelas, quod sit tumor rubens cum ignita inflammatione febres interdum ac dolores inferens etc.

Loci consentientes de definitione erysipelatis.

Paul. lib. 4. cap. 21. Tumorem ex feruente & tenui sanguine conflatum, priuatim quidem & proprie erysipelas, qui ignis sacer dicitur Gal. appellauit. Qui uero nec planè biliosa nec sanguinea fluxio est, sed ex ambabus mixta, utique ab eo quod in mīstura superat nomē uitio indidit etc. Hoc idem habet Galenus 2. ad Glau. cap. 1. & 14. meth. ca. 2. ibi, Erysi=



pelus biliosæ fluxionis germen est, ac circa cutim maxime consistens tum hanc externam, quæ omnium partium commune est tegumentum, tum membranosam & tenuem quæ singulis internarum est circumdata, atque hic affectus duplicem habet differentiam, quod uel absque ulceratione, uel una cum ulceratione incidat, quum uero nec planè biliosa nec sanguinea fluxio est, utique ab eo quod in mistura superat, nomen ipsi indatur ac dicitur de eo quod exuperatur, sicuti phlegmonem erysipelatosam id uocemus uel erysipelas phlegmonosum &c. Et eodè in loco cap. 3. inquit, quod sicuti phlegmoni admiscetur erysipelas, ita etiam aliquando ædemati et uocatur erysipelas ædematosum nō secus q̄ ubi ex refrigerando durū ægreq; resolubile redditur uocabitur erysipelas scirrhusum etc. Hoc idem sentit Auic. 2. primi, cap. 5. ibi, Apostema quod ex cholera rubea & pura componitur, est erysipelas, & ex eis est compositum nomine composito superantis præponendo nomen, quandoque enim phlegmonem erysipelatodem dicunt, quandoque erysipelas phlegmones etc. Vide & Gal. in lib. de tumoribus præter naturam cap. 10. De ultima definitione erysipelatis habes non solum Cornelij Celsi locum libr. 5. cap. 26. ibi, Erysipelas dicitur cum super inflammationem rubor, &c. Sed etiam hoc idem à Galeno in lib. finit. med.

#### De causis erysipelatis.

Causæ erysipelatis externæ quidem sunt frictiones, motus uiolenti, insolatio, medicamentorum admotio, ualde attrahentium, & quæcunque sanguinem extrinsecus in bilem promouere possunt, Causæ antecedentes sunt flaua bilis una cum sanguine admixta, aut feruidus sanguis substantia tenuissimus ad partem læsam concurrens, Causæ coniunctæ sunt prædicti humores erysipelatē actu efficientes.



## Loci consentientes de causis erysipelatis.

Satis superq; de causis erysipelatis attestantur loci in eius definitione adducti, lege tamen Gal. 14. meth. cap. 1. ibi, Morbus quem græci erysipelas uocant, is uti monstratum est ex bilioso succo nascitur &c. De indiçis erysipelatis.

Cognoscitur erysipelas ex calore, multo inflammatione uehementiori, maioriq; febre, & ex calore rubeo ad flauum pallidum ue declinante, Quod si tetigeris facile sanguis subterfugit ac rursus illabitur exquisite tenuis & aspectu rubidus, Signa uero quibus erysipelas à phlegmone distinguitur, sunt, quod non dolet, nec ita alte pulsatur in corpore, ut ipsa inflammatio siquidem in cute magis consistit, quàm alte descendat, At ubi per cutim diffusum fuerit, parum & quasi nihil infestat, præcipue si exquisitam fuerit, Dolor erysipelatis magis mordicat ac pungit, quàm ullam more inflammationis, tensionem faciat, Incipit etiam à naso, deinde per totam faciem expanditur &c.

## Loci consentientes de indiçis erysipelatis.

Gal. 2. ad Glau. cap. primo Erysipelas multo inflammatio-  
ne calidior, magisq; colorem flauum representans, & si teti-  
geris facile sanguis subterfugit rursusq; illabitur exquisite te-  
nuis & aspectu rubidus, non tamen dolet & hic ut inflam-  
matio &c. De signis interstinguëtibus erysipelatē à phleg-  
mone habes plurima ab Auic. 3. 4. ca. 4. ibi. Et illa ex quibus  
discernitur à phlegmone sunt, quoniam erysipelas magis ap-  
parentem habet rubedinem & clariorem, quæ rubedo de-  
struitur per tactum, deinde reddit uelociter, & uides in ru-  
bedine erysipelatis colorem croci quod nō apparet in phleg-  
mone, & erysipelas fit in cute, & phlegmone profundatur  
etiam in carne &c. Videas uberius hunc locum & plurima  
intelliges, Gal. 14. meth. ca. 1. signa etiam quibus erysipelas à



phlegmone distinguitur, satis fuse declarat, & quæ amborū sunt cōmunia, ibi. Sed præstiterit fortassis eum pluribus uerbis a phlegmone distinguere &c. Auic. 3. 4. cap. 4. et ubi plus accidit erysipelas, accidit in facie, & incipit a lepore nasi & expanditur in facie tota &c. De cura erysipelatis.

In curando erysipelate duo maxime consyderabis, humorum scilicet ad partem imbecillam fluxionem, & eorūdem in eadem parte malam qualitatem, siquidem defluxio uacuationem per se expostulat, & mala qualitas, qua calida et mordax est, refrigerationem, Nec uacuationis indicatio sicuti in phlegmone refrigerationem superet, sed refrigeratio euacuationem, Nam plurius facienda est mala erysipelatis qualitas, q̄ ipsius humoris aggregata q̄titas, uerū ut duo hæc assequaris quadruplici scopo curationem hanc aggredi oportet primo, cū rationis uictus institutione, secundo cū materiæ ad læsam partē defluentis, auersionem tertio cum humoris iam defluxi euacuatione, quarto, cum Symptomatum si quæ acciderint ablatione, Victus igitur ratio ea semper instituenda est, quæ humectet ac refrigeret, Absint pinguia, acria, dulcia & quæcūque caliditatem præ se ferunt, similiter omnes aliæ res nō naturales esse debent ad frigiditatem et humiditatem procliuēs. At auersio humoris in legitimo erysipelate fiet nō per sectionem uenæ ut in inflammatione, sed potius per medicamentabilem flauam educentia, Quod si erysipelas cū inflammatione coniunctum sit, aut sanguis ipse nimis redundarit tunc uenam secare opus est, humerariam si in capite, aut Iecorariam si in infernis partibus erysipelas cōtineatur, Euacuant igitur bilē rhabbarum, manna, tamarindi, cassia, infusio rosarum & id genus alia tertius scopus est humoris iam fluxi uacuatio, quæ primū fieri debet p̄ repellentia ad alias partes, (seruatis tñ his quæ in capite uniuersali traditæ sunt regulis) aut per



ea quæ per insensibilem habitum humores digerunt, Repel-  
lemus itaque quod influit ac feruorem refrigerabimus per ea  
quæ humectant & simul frige faciunt sitq; refrigerandi termi-  
nus coloris ipsius mutatio, nam quod non exquisitum est ery-  
sipelas si plus æquo refrigeretur, cutem liuidam facit ac deni-  
grat, & in senili corpore sic refrigeratum non adeo potest  
discuti, quin induratus tumor relinquatur, idcirco antequam  
locus niger uel liuidus appareat, ad discussoria progredien-  
dum est. Refrigerant igitur, solanum semperuiuum, portula-  
ca, umbilicus Veneris, psyllium, altercum, lactuca intybum,  
lenticula palustris, cerata ex aqua admodum frigida & id ge-  
nus alia. Discutiunt autem emplastrum ex hordei farina &  
ceratum rosaceum cui admistum sit aliquid calcis etc. Quod  
si liuor cutim occuparit, tunc incisa cute cataplasma superpo-  
nendum est, & locus aqua salsa uel aqua & aceto abluendus  
est. Quartus scopus remouet ipsa erysipelatis symptomata si-  
cuti dolores & relictas durities, non secus ac dictum est in  
phlegmones cura cum mitigatorijs scilicet ac mollientibus,  
utrum si contingat ipsum erysipelas ulcerari, curetur cum un-  
guento de cerusa de plumbo, &c

#### Locī consentientes de curatione erysipelatis.

De hac erysipelatis cura loquitur Gal. 14. meth. cap. 3. ibi,  
curationis uero methodus, sicuti in alijs compositis &c Vbi  
habes quod pro sanguinis missione, medicamento, quod bi-  
lem trahat uti debemus. Obiectio. Paulus qui in om-  
nibus ferè imitatur Galenum, non cholaggon sed sectionem  
uenæ proponit ac commendat. Quare hoc in loco à ipsius  
Galenī textu erit ualde discrepans. Responsio. Conci-  
liatur locus Pauli, si de erysipelate, quod à sanguine redun-  
dante, uel una cum phlegmone admistum fuerit, tantum intel-  
ligatur, lege ultra iam citatum Gal. locum & intelliges quo-



usque in erysipellate refrigerandum sit, & quo modo in erysi-  
pelate spurio, non ita frigidis, sicuti in exquisito utendum sit.  
Mox quæ refrigerent & humectent, & cætera denique om-  
nia, quæ à nobis iamdudum recitata sunt, Auic. tertia 4. ca-  
pi. 5. oportet ut euacues corpus in ea cum solutiuo cholerae,  
& si indigeat phlebotomia, phlebotoma etiam, & phleboto-  
mia quidem non confert, nisi quando materia est inter duas  
cutes. Bac. suspicor Auicennæ textum hoc esse in loco corru-  
ptum, & quod legi debeat, & phlebotomia quidem nō con-  
fert, nisi quando erysipelas est inter duas materias, ac si dice-  
ret quando una cum phlegmone coniunctum est, & tunc con-  
cordatur cum superioribus dictis. Quod uero hoc ita sit ex  
eius uerbis paulo inferius recitatis cognoscitur, cū dicat fac  
illud secundum quod existimatur esse de duabus materiis & c.  
lege totum hoc Auicennæ caput, & certo intelliges eum non  
tantum Gal. interpretem, sed uerum in suis dictis paraphra-  
sten fuisse. Obiectio. Auicennam, quem nunc tantope-  
re extollis haud scio quomodo cum Raze concordaueris? Si  
quidem Auicenna iubet in principio erysipelatis frigida &  
styptica, quæ sicca sunt esse applicanda. Razes uero frigida et  
humida, prout omnes græci fatentur. Responsio.

Non erit ita magna inter utrunque discordia, si de erysi-  
pelate cum ulcere & sine ulcere distinxeris. Nam Auicen-  
nas styptica ad loci roborationem & ad ulcus, quod siccari  
expostulat, imponenda iubet. Razes uero in erysipellate ex-  
quisito, in quo nullum est ulcus, ut Græci humida esse applican-  
da dixit, & utriusque ratio uera est. Vide latius de hac cura-  
tione Aetium Ser. 14. cap. 59. itidem Pau. lib. 4 cap. 21. Quod  
uero in erysipellate refrigerationis indicatio superare debeat,  
uacuationis indicationem, habes huius rei causam à Gale. 13.  
meth. cap. 8. ibi, In illo nanque refrigerationis indicatio ma-



gisurget &c. Habes etiam medicamentum simplicissimum refrigerans ac humectans aduersus erysipelata ex Gale. 10. meth. cap. 9. ibi. Incipiam autem ab eo medicamine quod omnium quæ humectant & refrigerent simplicissimum &c. Habes in super curationem erysipelatis cum ulcere ex Gal. 4. meth. ca. 5. ibi In quocūq; ulcere erysipelas superuenerit &c.

#### Observationes circa curationem.

Gal. 2. ad Glau. cap. 2. Erysipelati, quod cum inflammatione coniunctum est, mixta, quantum fieri potest, curatio est ad hibenda, semperq; illi, quod magis superat resistendum &c.

#### Observatio circa euacuationem.

Ioannes Tagaultius Quoniam erysipelas uehementiores quàm phlegmone febres accendit, medicamenta, quæ impen se sunt calida, ut scamonijs succus & electuarium de succo rosarum huic affectui minime idonea sunt.

#### Observationes circa repellentia.

Gal. 14. meth. ca. 3. Periculosa tamen toti corpori est eiusmodi curatio propterea quod bilis iterim ad aliqd princeps membrum fertur, quippe, quum si uel sanguis ipse abundet, haud tutum sit ex minoris notæ membris fluxione eius repellere. Vnde concludit, quod non nisi post totius corporis uacuationem repellentibus auxilijs uti debemus &c.

#### Observationes circa uictus regimen.

Ioannes de uigo cibus itaq; sit, ex farre hordeo contuso, in aqua omnibus decoctis cum amygdalis & semine comuni & nullatenus cum brodio, quia laborantes tali passione uitare debent pingua salsa calida & acuta, uinum interdicatur. Vtiliter tamē sumuntur lactuca, borago, cucurbita & omnia incrassantia sanguinem &c.

#### Igni sacro conferentia ex Dioscoride.

Conferunt asarum, acacia, acinos herba, anchusa, lycor.



psis, Aizoen maius, brastica sativa, acetum, beta. Baccharis, bechion, crocus, cupressus, coriandrum, cicuta, cotyledon, cici, chalcitis lapis, erugo ferri, harundo, helxine, isatis, lens, lilium, lens palustris, lapis smyris, myrtus, malua, mandragoras, portulaca, plantago partenion, polygonon mas, pentaphillon, peristereon rectus, papauer sativum, psyllium, Rhamnus, rosa, ruta, rubus, idea, salix, sanguis, seris, solanum sativum stratiotes aquaticus et urina, unguentum de plumbo de cerusa, oleum rosatum myrtinum violaceum. De pronosticis ignis sacri.

Hip. aph. 6 aphor. 25. Erysipelas ab exterioribus uerti ad interiora non est bonum, ab interioribus autem ad exteriora, bonum, Bac. exemplum ueluti omnium morborum attulit Hip. Siquidem bonum signum est, ab interioribus ad exteriora omnem morbum uerti. Contra uero malum sicuti in experientia quotidiana comprehenditur. Et aph. 7. aph. 19. In ossis exutione erysipelas, Bac. adiunge tu, malum, Nam osse nudato si caro circumstans ab erysipelate apprehendatur, fieri non potest, quin sit malus affectus. Et aph. 7. aph. 20. Ab erysipelate putredo aut suppuratio, Bac. intellige tu haec absque dubio erysipelati superuenire, dummodo uel repellentibus aut digerentibus ipsum non discutiatur. Et Aphor. 5. aph. 43. si mulieri grauidae in utero sit erysipelas, lethale, Bac. lethale quidem erysipelas utrique est et mulieri et foetui, Nam si febres acutae, a quibus afficiuntur, solae interimunt, quanto magis si cum erysipelate coniungantur, Auic. 3. 4. c. 4. Et quando accidit erysipelas, a fractura ossis sub cute, tunc illud est malum et c. Bac. hoc dictum Auicennae non idem est cum apho. superius narrato ut quidam existimarunt, siquidem aliud est denudari, aliud sub cute frangi, hoc enim duplici ratione malum est, tum ob fractionem ossis, tum ob inflammationem quae post fracturam superuenit. poteris et de uario erysipelatis euentu praedicere si uaria fuerint, quae curationem peruertat accidetia etc.



Authoritates dissidentientes circa erysipelatē.

- 1 Adserere, quod idem semper sit erysipelas & ignis sacer.
- 2 Adserere quod phlegmone sit maioris inflammationis q̄ erysipelas.
- 3 Adserere erysipelatē non esse tumorē præter naturālē.

Confutatio dissidentientium circa erysipelatē.

Quod idem semper non sit erysipelas & ignis sacer ostendit Celsus lib. 5. qui ignem sacrum ab erysipelate diuersum facit, siquidem eum inter mala ulcera connumerans, duas ignis sacri species esse demonstrat, Alteram in altitudine postulis continuis, alteram in sumæ cutis exulceratione, latam et inæquabilem &c. Obiectio. Qui sit igitur ut à latinis ignis sacer dicatur, si idem semper non sit? Responso. Latini in hoc Plinium imitati sunt, qui dum in pluribus exponendis simplicibus Dioscoridem sequeretur, pro erysipelate ignem sacrum in omnibus ferè interpretatus est. Ad secundum Auic. tertia 4. cap. 4. Inquit, quod quandoq; consequitur ex caliditate erysipelatis, ut comburatur cutis, et non est ita in phlegmone, non ergo est inquit inflammatio erysipelatis, minor inflammatione phlegmones, imo plus &c. & sic calidior est erysipelas ipso phlegmone. Ad tertium Gal. in lib. de Tumor præter naturam, cap. 10. quum fluxio biliosa in aliquam partem decumbit, siquidem fuerit bilis exquisita, cutem exulcerat, si uero sanies aquosa, uel sanguinem habeat admixtum, minus erit acris & magis particulam in tumorem attollit, quàm exulceret, hoc igitur erysipelas nominatur, Alteram uero herpes, &c. Quibus uerbis planè duo nobis ostendit, alterum quod tumor sit erysipelas, alterum quod ab herpete longo interuallo disidet.

De Herpete, & eius differentiis.

Herpes qui à serpendo dictus est, nil aliud est, quàm flauæ



bilis in aliquam partem defluxio, & hic triplex est. Primus dicitur ἑρπης ἐξοιδόμενος, qui exedendo carnem ac cutem ueluti serpens ambulat, Alter uero ἑρπης κεχρησμένος, qui pustulas ad formam milij per cutem affert. Tertius generis nomine sibi uendicato ἑρπης simpliciter nominatur, qui solius cutis exulceratio est, Hunc morbum falso uocant Auicinniaui formicam, siquidē formicæ nomen, quam Græci μύρμηξ αὖ dicunt, uerrucis potius congruit, quàm herpeti, Hancq; diuidunt in miliarem ambulatiuam ac corrosiuā. Definiturq; formica miliaris quod sit pustula uel multæ pustule, quæ egrediuntur & faciunt accidere apostema paruum &c.

Loci consentientes de herpete, & eius differentiis Gale. 2. ad Glau. cap. 1. Quando bilis flaua secernitur & in aliquo membro consistit herpes uocatur, siquidem crassa sit secundum substantiam totam exulcerat cutem usque ad carnem suppositam, atque hunc affectum Hippocrates nominat herpetem exedentem. Si uero te maior fuerit, id quod in superficie est tantum, ueluti deurit, atq; hæc species generis sortitur appellationem, quum simpliciter & sine additione herpes uocetur. Altera species est miliaris dicta, quoniam in hoc affectu pustule parue ac multæ per summā cutem similes milio excitantur, &c. Vide de hac re Aetium Ser. 14. cap. 60. ibi, si flaua bilis citra alterius humoris mixturam secreta iuxta partem aliquā constiterit Herpes appellatur affectio etc. Itidem ait Paul. lib. 4. cap. 20. ibi, cum bilis flaua, &c. Auic. tertia. 4. cap. 6. Formica est pustula aut pustule quæ egrediuntur, & faciunt accidere apostema paruum & ambulant & fortasse ulcerant &c. Et paulo post, & ad summum omne apostema cutaneum ambulatiuum, quod profunditatem non habet est formica, uerum alia miliaris & alia corrosiua etc.

De causis ipsius Herpetis. Causæ præincipientes



herpetis sunt quæcunque bilem flauam progignere apta sunt. Causam recedens herpētis excedentis est crassa acriorq; bilis exulcerans, sicuti herpētis simpliciter dicti, minus acris & tenuior bilis, At herpes miliaris ab ipsa etiā bile oritur. Multo tamen minus acri ac calida quā prior quanquā alij opinati sint hunc herpetem, non à sola bile flaua oriri. Sed ab ea duntaxat, cui portio pituitæ admixta fuerit. Causæ coniunctæ sunt ipsi humores hunc uel illū herpetē actu producētes.

Loci consentientes de causis herpetis.

Gal. 14. meth. cap. 17. herpetas inquit biliosus procreat succus adeo tenuis profecto ut non solum omnes interiores partes, quæ utique carnosæ substantiæ sunt transeat, sed etiam ipsam cutem usque ad sumam cuticulam erodit & c. & paulo post loquens de miliari herpete dixit, quippe is non protinus ulcus facit, sed admodum exiguas pustulas ad spetiem milij, quæ interposito spatio in uicinas abeant adeo non sine ratione uuibsdam uisum est in eiusmodi uitio, bili esse aliquid pituitæ admixtum & c. Paulus lib. 4. cap. 20. si flaua bilis substantia crassior sit, acriorq; totam cutem usque ad carnem subiectam exulcerat & herpetem exedentem excitat, si tenuior et minus acris calidaq; herpetem miliarem. At Oribasius authore pituita cum flaua bile mixta herpetem miliarem creat etc. Itidem habet Aetius ser. 14. cap. 60. & Gale. 2. ad Glau. ca. 1. Auicennas autem nullam agit de his causis mentionem.

De signis herpetis, & quo mō ab erysipelate differat.

Cognoscitur omnis herpes tum à colore partis lese, tum à figura pustularum & ab ipsa quam in cutem imprimit punctura. Color enim flauus est & malum serpit ab uno in aliū locum, Figuraq; pustularū ad instar milij se habet, interdum latior est, cum acuto capite pungiturq; locus ac si à formica perfoderetur unde nōmē illi à barbaris inditum est, Cognoscitur



scitur bilis esse crassa si cutem usque ad subiectam carnē cor-  
rodat, aut esse tenuis, si cutem duntaxat deurit, aut esse cum  
pituita admista si pustulas exiguas excitet. Differt herpes  
ab erysipelate ulcerato, humoris tenuitate, siquidem tenuissi-  
mus humor est, qui herpetem exulceratum promouet. Differt  
à phagedena, quum herpes ulcus non semper sit, sicuti phage-  
dena. Differt à cancro, quum crassissimus sit humor qui can-  
crum, mediocriter crassus qui phagedenas, at tenuissimus,  
qui herpetum procreat &c.

#### Loci consentientes de signis herpetis.

Auic. tertia 4. cap. 6. & color quidem formicæ ad citrini-  
tatem est decliuus, & est inflammata cum substātia uerrucali  
& rotunda, & paulo post, et sentitur in omni formica, sicut  
punctura formicæ &c. Quibus plane uerbis, tum partis lesæ  
colorem, tum figuram & loci puncturam aperte demonstrat,  
& si uerrucas cum herpete fœdo quodam errori combinet,  
quod itidem faciunt omnes, qui suum Auicennam sequuti  
sunt, lege de hac re Ioannem de Vigo, cap. de formica, Gale-  
nus. 14. meth. cap. 17. At tenuissimus est humor, qui herpe-  
tem exulceratum excitat, crassissimus qui cancerum, proxi-  
mum ab ijs occupat, quod crassitudinem attinet, qui phagede-  
nas creat &c. Faciunt etiam ad hanc rem demonstrandam  
loci superius adducti non solum in causis, sed etiam in defini-  
tione positi &c.

#### De cura herpetum.

Omnis morbus, qui ab humorum confluxione oritur, tri-  
plici scopo curari solet, primo prohibendo ne humor in par-  
tem affectam confluat, secundo si confluxerit etiam impactus  
existat, euacuatione remoueatur, tertio si ulcus, uel pustula in  
loco relicta fuerit oportunis remedijs auferatur. Prohibetur  
itaque humor ne ad partem defluat, si is qui defluit à toto cor-  
pore euacuetur, quare in herpete exedete flaua bilis primum



uacuari debet, tum per ea quæ cholagogo dicuntur, tum etiam humorem per urinas euocantia, At in herpete miliari non tantum cholagogis opus est, sed eo quod mista sit facultatis medicamento, euacuatoq; corpore statim expedit ad ea quæ influentem humorem possunt reprimere, curationem aggredi, reprimentia tamen non sint frigida & humectantia, sicuti dictum est in erysipelate, præcipue uti herpes exedens curari debeat, nam frigida & ualde exsiccantia potius expetit, quàm humectantia, cuiusmodi sunt lactuca polygonium, portulaca & c. Sed eius loco sumantur caprioli ex uite, folia rubi & plantaginis, quibus lenticula interdum mel & farina hordeacea adiungi possunt, si in forma cataplasmatum ea applicare uouerimus. Secundus curandi scopus optime per ea perficitur, quæ humorem id fluxum, & in parte contentum dissipant ac digerunt, quod utique fieri poterit (modo humor ille uitiosus in partem lesam non amplius confluat) per id tantum cataplasma, quod à Galeno in curanda phlegmone superius expositum est, quod constat ex corticibus malorum granatorum & c. nam præter id quod humorem repellit etiam exsiccet, digerit, & corroborat. Tertius scopus ulcus ipsum, siue pustulas curare intendit, unde omne ulcus exsiccari desiderat non tamen exsiccatione mordente sed leni, præsertim, si nec malignum nec ualde putridum fuerit, quod hoc linimento perficitur. Accipe lythargirij unc. i. cerusæ unc. s. Tucia 3. i. succi plantaginis solatri unc. ij. Radicum oxylapathi 3. s. acetii 3. i. s. olei rosacei unc. ij. Misce, & fiat linimentum. At ubi malignum ulcus fuerit, tunc arsenico calce & sandaraca utere, uel saltem his ceratis, quæ ex prædictis rebus componuntur. Pustule uero solis discussoriis in declinatione morbi adhibitis euanescent. Loci consentientes de cura herpetis. Gal. lib. 14. meth. cap. 17. Horum omnium communis cura



ratio est, ut inhibeatur primum humoris confluxio post sane-  
tur ulcus, & paulo post, ad curationem oportet inquit cogno-  
scere tum humoris copiam, tum crassitudinis tenuitatisq; mo-  
dum & sic superabundantem euacuare, itaq; si quis toto prius  
corpore purgato, mox quæ influentem humorem reprimant,  
regerantq; medicamentis utatur, iam herpetem curauerit, sin  
neutrum horum fecerit, & cicatricem tantū inducat, is exul-  
ceratam cuticulam ita sanauerit proxime tum illi, quo minus  
exulceretur non consuluerit, & huius rei causam ostendit  
exemplo Romanæ mulieris quæ herpetē in malleolo patieba-  
tur & c. lege totum hoc caput & omnia quæ à me pridem di-  
cta sunt luce clariora inuenies. Auic. 3. 4. cap. 7. Formica cor-  
rosiua alienetur ab humectatione, quam administraſti in ery-  
sipelate. Humectatio enim non est conueniens ulceribus, & c.  
Paul. lib. 4. cap. 20. Corpore igitur toto medicamine quod dis-  
cende bili est, uacuato, loco affecto refrigerantia, siccantiaq; in-  
ducuntur, principio caprioli uitis rubi, & plantaginis appli-  
cantur, postea uero lenticula his miscetur interim, & mel et  
polenta & c. itidem habet Auic. loco citato Gal. 14. meth. cap.  
17. In herpete uero, quoniam tenuis humor est, qui id uitium  
creat, abunde est etiam aluum soluisse, uel urinas per ea quæ  
id modice efficiunt citasse & c. Aet. ser. 14. cap. 60. utimur in  
herpetibus erodentibus pro euacuatione sero lactis cum por-  
tione scamoni, In miliaribus eo, quod bilē simul ac pituitam  
ducit, posthæc medicamentis refrigerantibus ac simul exsica-  
cantibus cum adstrictione, ita ut herpeti in superficie tantum  
erodenti, mitissima adhibeantur, Miliari uero magis discussio-  
ria & c. Galenus loc. nuper citato. Constat inquit quod in ge-  
neratione ulceris exuperare debebant, quæ repellendi facultate  
habent, ubi non amplius confluit in agrotantem particu-  
lam uitiosus humor, quæ digerunt lege etiam pro Tertia in



tentione non solum Aet. sed & Paul. & plura inuenies ad pustulosum herpetem & ad ulceratum remedia lege insuper Ioan. de Vigo Argillatam Cornelium Celsum Ioannem Tagaultium qui plura docent ad ulcus herpetis facientia.

#### Observationes in repellentibus.

Gal. lib. 14. meth. cap. 17. si quidem exiguum uitiosi humoris, etiam si quis ad uiscera et magnas uenas retrudat, nullum profecto quod sensu percipiatur malum committet, ac si eius lenis quantitas non sit, in princeps aliquod membrum aliquando procumbit, ubi scilicet prius natura uiribus totum corpus expurgantis non sit uel per deiectionem uel urinas uel cutim, quæ totum corpus includit, euacuatum &c. Bac. ac si diceret non esse reprimendum si multus sit uitiosus humor &c. Nota etiam ex hoc loco quod flauæ bilis euacuatio est facilis, pituitæ uero et atræ bilis, difficilis, eo potissimum quod utraque sit crassior, ac glutinosior, quo fit, ut magis purgantis medicamenti ope indigeant &c.

#### Observationes circa uictus rationem.

Cel. lib. 5. in omni sacro igne neque lenibus, & glutinosis cibis, neque salsis & acribus utendum est, sed his quæ inter utrunq; sunt, qualis est panis sine fermento piscis hedus aues excepto, & apro omnis uenatio &c.

#### Herpeti conferentia.

Conferunt maxime herpeti Acetum, capilli adusti, chelidonion, caries lignorum succus cicutæ, cupressi folia cum hordeo & aceto, coriandrum cum pane, Radix Curcumæ, Ficus non maturæ in modum emplastri, Stercus gallinæ recens chamæpytis cum melle non sinit dilatari, lentes cum aqua maris coctæ, decoctio seminis lini cum uino. Folia plätaginis, malua, Folia myrticum uino & oleo rosaceo, muscus herba, Folia oliuæ agrestis, olibanum cum aceto & oleo succus parita.



rie cum cerusa, pētaphyllon, pix humida cum sulphure, Psyllium cum aceto, Acacia, Folia rhamni folia rubi, ruta cū oleo rosaceo & aceto. sal cum aceto prohibet augeri, cinis salicis cum aceto, semperuiui succus, solatrum cū cicuta, uel eorum succus cum cerusa, succus tytimali, Herpeti etiam corroden-  
ti conferunt Alumen cum tartaro & sale gemeo, Aizoon, Arsenicū, Helleborus niger, lupini, unguentū diaphinicon, unguen-  
tum de plumbo & c.

#### De pronosticis herpetum erodentium.

Hip. aph. 6. aphorif. 45. ulcera quaecunque annua sunt, aut etiam diuturniora, os abscedere est necessarium & cicatrices cauas fieri. Bat. difficulter sanantur diuturna & longo tem-  
pore durantia ulcera tum ob humorum prauorum influxio-  
nem tum ob malam dispositionem in membro patiente diu contractam, tum ob aliquam ossis in eo loco corrupti passio-  
nem, & hoc intelligi potest de phagedenis, & exedentibus alijs ulceribus, sicuti in hoc commento planè notatum est a Galeno Celsus lib. 5. cap. 28. omnis autem sacer ignis, ut mini-  
mum periculum habet ex his quæ serpunt, sic propè difficili-  
me tollitur & c.

#### Auth. dissentientes circa herpetem.

- 1 Adserere ulcus cruentum purum & sordidum, inter pro-  
prios ulceris differentias connumerari,
- 2 Adserere omnia ulcera esse siccanda.
- 3 Adserere terminum siccationis nō dari in ulceribus sicuti  
infrigidationis.

#### Confutatio dissentientium contra herpetem.

Primum confutat Galenus 2. meth. cap. 2. ubi connumeratis  
particularibus ulcerū differentijs subiūgit, at cruentū et purū  
& sordidū, nō à proprijs differentijs, sed ab externis sympto-  
matis sunt appellata. Ad 2. Respondet etiā Gale. 4. meth. ca. 1.



dicens eos ulceratarum partium affectus non esse siccandos, in quibus contusio contingere solet, nam carnes contusas cæsasq; putrefactas necesse est, in pus uersas liquari, quibus uerbis planè intelligitur, quod partes quæ sine contusione sunt ulceratæ, eas quàm maxime siccare oportere, at quæ cum quadam contusione lesæ sunt, ijs quamprimum pus mouere &c. Ad secundum Gal. aph. 6. commen. 45. terminum assignat siccitatis, ibi, dicens quod terminus siccitatis est, ut abscedat pars eius quæ est uitiata &c.

#### De gangrænæ & sphaceli definitione.

Gangræna est totius corporis mutatio a naturali cuiusque habitu in alienum atque mortificatio partis non integra cum ulceratione, uel hanc citra, quam mox sequitur sphacelus, ubi membrum ab ipsa deprehensum omni sensu destitutum fuerit ac omnino e mortuum, uocaturq; σφάκελος à græcis syderatio & caries à latinis, barbare esthimenō & ineptius aschachilos, cuius ethymologiam quum uellet Ioannes de uigo interpretari, ita hallucinatus est, ut uix scias, quid in hac re significare uoluerit &c.

#### Loci consentientes de gangrænâ & sphacelo.

Quod Gangræna sit corporis mutatio &c. lege Gal. in lib: finit. med. Quod uero sit carnis mortificatio, habetur ex Gal. in lib. de Tumor. præter naturam cap. 12. ibi at Gangræna solidorum corporum mortificatio est &c. Aet. ser. 14. ca. 16. Gangrænam appellant, quando ob inflammationis magnitudinem mortificatio partis imminet &c. Gal. 6. meth. cap. 5. sphacelus est totius ossium substantiæ quedam corruptella &c. hoc idem habet Paul. lib. 4. cap. 19. ubi syderationem pro sphacelo eius interpres latine interpretatus est de ethymologia sphaceli & esthiomeni, lege Ioannem de uigo & eius errorem intelliges &c.



## De causis Gangrænæ &amp; sphaceli.

Quum igitur Gangrænæ sit membri alicuius corruptio, fieri non potest, quin ab altera harum trium causarum proueniat, Primum à spiritu uitali, qui ne ad partem lesam descendat prohibetur. Secundo à tempore membri egrotantis iam corrupta. Tertio ab utraque causa quandoque simul aggregata. Prohibetur igitur spiritus uitalis ob magnam contusionem & fracturam, uel ob aliquam obstructionem, aut ob nimiam membri compressionem, aut ob medicamentâ, quæ membrum frigefaciunt ac mortificant. Corruptitur uero membri temperies ob uenenosam aliquam inflammationem, uel pustulam in eo contentam, aut ob febres diuturnas, aut obstupefacientia aliqua remedia diu tali membro applicita, aut ob ulcera à medicis non satis methodicè curata, aut demum ob aliqua alia temperiem naturalem corrumpentia &c.

Loci consentientes de causis gangrænæ & sphaceli.

Auic tertia 4. cap. 15. Dico quod membro accidit corruptio & putrefactio propter causam corrumpentem complexionem eius & spiritum animale, qui est in ipso aut propter aliud prohibens eum peruenire ad ipsum, aut propter aliquid congregans utrasque intentiones, sicuti uenena calida et frigida, & ea quæ cum sua substantia sunt contraria spiritui animali, & sicut apostema & pustula & ulcera mala ambulatiua uenenosæ substantiæ, & ea in quibus erratur &c. lege locum hunc & cetera intelliges, quæ à me pridem recitata sunt &c. Quod ob inflammationem hoc malum oriatur, satis constat ex Paulo lib. 4 cap. 19. ubi inquit quod inflammatio, neque discutiatur, neque in pus mutetur, sæpe in gangrænam & syderationem incidit &c. Itidem ait Gal. 2. ad Glau. cap. 9. ibi consequens est, ut deinceps dicamus de inflammationibus quæ gangrænæ factæ sunt, nominant autem gangræ-



nas ea quæ ex magnitudine inflammationis sunt mortificationes quæ nondum integræ factæ sunt & c. & in lib. de Tumor. præter naturam cap. 7. Igitur Gangrænæ & carbunculi excitantur, quum sanguis tanquam feruens, atque inflammationi propinquus cutem exurit & c. & in lib. finit. med. Gangræna gignitur inquit, uel plethora antegressa, uel dum extinctio fit, aut phlegmone et chyrurgi imperitia male curata etc. Et in lib. de Tum. cap. 9. Generatur gangræna ubi uehementer obstructa sunt in maximis inflammationibus, tum ora uulforum, tum etiam omnes cutis meatus & c.

#### De signis gangrænæ & sphaceli.

Cognoscitur Gangræna, si coloris flos, qui in inflammationibus aderat, statim extinguatur, similiter dolor & loci pulsatio, nedum sedato affectu ob sensum illius partis iam emortuum, euanescent, quin immo nigrities, ac quedam membri molities in memb. o uisitur. Fit etiam illa pars putrida ac foetens, quæ dum digitis præmitur, facile præmenti cedit, nec amplius attollitur, uel resilit, sed ueluti à carne seiuncta cutis remanet & c.

#### Loci consentientes de signis gangrænæ.

Gale. in lib. de Tum. præter naturam, cap. 9. quæ sic laborant corpora naturali perspiratu destituta, facile mortificantur, ac coloris flos extinguatur, qui in inflammationibus aderat, deinceps dolor & pulsus abeunt, affectu ipso nequaquam sedato uerum sensu emortuo & c. Auic. tertia. 4. cap. 15. ponens discrimen inter gangrænam & sphacelum, quem ipse corruptum ac barbare ischacilos uocat, inquit, quod in principio, & proprie quod est phlegmonodes non corrumpitur cum eo sensus, cui est sensus, & tunc nominatur gangræna, quæ cum ita confirmata sit ut destruatursensus & caro, & quod sequitur ad os, siue sit incipiens aut succedens apostemata



ti, nominatur aschachilos. i. sphacelus. Fac. hoc idem uidetur esse à Paulo mutuatum, quum dicat ubi membra siccitate in totum sensu fuerint destituta, affectum non amplius gangrænam sed iam syderationem nuncupant & c. Auic. tertia. 4. capi 16. Si autem pertransit dispositio dispositionem apostematis & dispositionem coloris, & incipit peruenire ad molli- tiem, & humectatur parumper, tunc est inceptio eius in pu- tréfactione & c.

### De cura gangrænæ & sphaceli.

Cum sanguinis corruptio non modica gāgrænā efficiat, eius curatio potissimum tribus scopis perficietur, primo pro- hibendum est, ne materia antecedens in coniunctam trāseat. Secundo materia coniuncta euacuanda erit. Tercio locus qui à putrefactione laesus est, si possibile fuerit, à tali affectu uin- dicabitur, prohibetur materia antecedens ne in coniunctam perueniat, non solum uictus ratione, sed etiam fluxionis san- guineæ per uenæ sectionem, auersione, aut medicamento san- guinem depurante, qualis est cassia fistularis, tamarindi deco- ctum fumariæ & c. Vacuatur materia coniuncta scarifican- do ac secando partem laesam, illamque abluendo cum aqua falsa oxycrato uel decocto lupinorum in lixiuio, & in cir- cuitu corruptæ partis interdum hyrudines applicando, et ubi sanguinem satis copiose egredi permiseris, ad medicamen- tum quod ad putrescentia faciat, cuiusmodi est farina orobi uel lolij aut fabarum cum oxycrato, statim peruenies. Inter- rim opus est partes sanas aliquo tuente medicamento preser- uare, ne in corruptionem decidant cum oleo omphacino ro- faceo in quo aliqua frigida & adstringentia bullierint. Pro- derit etiam circa partes iam scarificatas, ubi præcipue mor- bus se iam remittere cœperit, unguento egyptiaco tunc sanè uti. putredinem enim prohibet ac resoluit, facitque ut putre-



factum a sano longe absistat. Quod si nec his remedijs gāgræ na detineatur, quin in sphacelum abeat, protinus membrum, quod ipsa occupat, ad uiuum usque resecandum est, mōxque uri id, quod inter sanum & uitiatum locum residet, quamprimum candenti ferro oportet, ut simul & semel putredo ac sanguinis profluium cohibeatur. Post cauteria & inustiones, si qua remanserit crusta butyro eam à partibus ambusis, remouebis. Caue tamē ne tā cito crusta decidat ut profluium sanguinis denuo irritetur, qua tādē amota per curationem aliorum ulcerum membro tam uehemēter affecto non inepta medicaberis &c.

Loci consentientes de cura gangrænæ, & sphaceli.

De primo scopo loquitur Celsus lib. 5. ibi in eiusmodi casu primum est, si uires patiantur sanguinem mittere etc. Gal. 2. ad Glau. cap. 9. Curatur autem euacuantibus nobis, quā possumus multum sanguinis, qui in membro patiente compingitur cuius causa fiunt mortificationes ob id, quod arteriæ ex angustia loci nequeunt se attollere etc. Itidem ait Paul. lib. 4. cap. 19. ibi Gangrænam curamus, sanguine ex parte uitiqua affatim emisso &c. Et Aet. ser. 14. cap. 56. Quod autē euacuanda sit materia cōiuncta omnes ferē demonstrant qui de hac rescripserunt. Auic. 3. 4. cap. 16. si autem illud non ualet, non inuenis excusationem, quin scalpelationem profundam facias diuersorum modorum in locis et ponas sanguisugas & phlebotomes uenas proximas ei paruas, ut accipiatur sanguis malus cum cautella eius &c. Gal. 2. ad Glau. cap. 9. sanguinem uero quū emanare permiseris, imponere debes ex medicamentis aliquod ad putrescentia utilibus, cuiusmodi est farina orobi uel lolij, si uero talia non adsint farina fabarū adhibe, atque ipsum oxymel solum, & si fortius uelis, sal adijce uel ex trochiscis aliquem exquisitissime tritum, qualis est Andronis



Et Polyide, Et Passionis Et c. Hoc idem recitat Paulus sed breviori satis sermone, cui addit, quod nonnulli ubi putridam partem præciderint, quo securius radicem euellant, candens ferramentum adigunt. Gal. loc. cit. quando abscindis aut circūcidis id, quod iā putruit, eam, quæ ueluti quædam radix est, sanæ parti adiunctam adurere Et c. Aet. ser. 14. cap. 56. proinde partim mortificatam celerrime refecare oportet, quatenus contingit uicina sanam, ita ut nihil prorsus putridi relinquatur. Deinde locum inurere Et c. Itidē habet Auic. 3. 4. cap. 16. Ibi quod si pars carnis incipit corrumpi incide eam, Et paulo post, quum inciditur membrum iam putrefactum oportet ut cauterizetur id, quod circuit ipsum cum igne aut cum medicinis adurentibus Et c. Gal. loc. cit. Facta adustione solemus uti succo porri, quum uero exciderint crustæ huiusmodi ulcera possunt quibuscunque medicamentis, quæ carnem inducant, ad sanitatem perducī Et c.

#### Observationes in adhibendis medicamentis.

Gal. ad Glau. cap. 9. Verte animum ad corpus ægrotantis, nam si rusticum fuerit Et durum natura, fortissima medicamenta desyderat, Fœmineum uero Et molles carnes habens, imbecilliora, sic Et uiri quicunque Et molles carnes habent Et balneas amant Et in otio degunt, mollia exigunt, medicamenta, neque dubium est idem in pueris faciendum esse Et c.

#### Gangrænæ conferentia.

Acetum prohibet eius ambulationem, cantharides linitæ, Cancer cum melle cinis foliorum ficus, Stercus columbi cum farina hordei iride uisco Et adipe porum fel ursi, Baccalauri cum melle. Lumbrici terreni cum melle, decoctum lupinorum marubium, Nuces ueteres, passulæ cum oleo coctæ, Pentaphyllon, Pōpholix. Raphanus cum melle, Tithymalus cum polenta Et oleo. Laudantur etiā à Dioscoride. Ampelos leu-



ce, Brassica sativa. Bulbus esculentus cinnamomum, charatias, Galiopsis. Juglans, lixiuia e ficu, liliu, lēs, lupinum satiuum, la serpitiu, rhus, raphanus, urtica, & uua passa &c.

### De pronosticis gangrænæ.

Celsus lib. 5. Gangrænâ uero si nondum planè tenet, sed adhuc incipit, curare non difficillimum est, utique in corpore iuuenili, & magis etiam si muscoli integri sint, si nerui uel lesi non sunt, uel leniter affecti sunt, neque ullus magnus articulus nudatus est, &c. Gal. in lib. de Tumor. præter naturâ, cap. 9. Gangrænâ nisi per q̄ celerime curetur, facile, quæ sic affecta est pars, mortificatur, nec non alias continuas inuadit, atque hominem perimit, & loc. cit. cap. 7. quin & febrem acutissimam infert, atque in discrimen uitæ trahit &c. Hoc idem confirmant Paulus & Aetius locis superius citatis. Celsus lib. 8. cap. 33. Dictum est membrum præcidi oportere, sed id quoque cum periculo sumo fit, nā saepe in ipso opere uel profusione sanguinis uel animæ defectione moriuntur, uerum hic quoque nihil interest, an satis tutum præsidium sit, quid unicum est &c.

### Auth. dissentientes circa gangrænâ & sphacelum.

- 1 Adserere Gangrænâ à sphacelo non differre.
- 2 Adserere Gangrænâ etiam ossibus posse accidere.
- 3 Adserere, in sphacelo totum corpus non esse purgandum.

### Confutatio dissentientium circa gangrænâ & sphacelum.

Ad primum inquit Aet. ser. 14. cap. 56. quod ubi mortificatio partis iminet Gangrænâ uocant at ubi pars mortificata sensum amisit, non amplius gangrænâ sed sphacelus nominatur & sic secundum magis & minus differunt. Ad secundum Galenus in lib. de Tum. præter naturam, cap. 12. Gangrænâ solidorum corporum mortificatio est, uerum ossa nequa-



quam corripit sicuti sphacelus &c. Ad tertium Gale. 4. meth. cap. 5. Ad hæc etiam purgationis meminit Hippo. totius corporis, tum in alijs quibusdam uulneribus, tum in ijs, quibus cariem, quam sphacelum uocant, instare est metus &c. Quod si uniuersalis uacuatō in sphacelo adhuc nō factō conuenit, quanto magis in ipso iam confecto. Obiectio.

Fiunt sphacelus & gangræna ab eadē causa an à diuersa?

Respōsio. Memini me legisse σφάκελου interdum oriri ex aneurismate idest ex apertione arteriarum, ut testatur Gal. in lib. de Tumor. præter naturam cap. 12. Interdum ex fractura ossium & humiditate superuacanea in his partibus contenta, cuius rei fecit mentionem Gal. 6. meth. cap. 5. Ibi quini-  
mo nec ossis caries, quam sphacelum uocant ex alia occasione oritur &c. Sed Gangrænam tantummodo dixit à corrupti sanguinis fluxione progigni, ut supra relatum est &c.

De oedematis definitione & diuisione.

Oedema quod barbari undimiam uocant, duplex est, uerum & spurium. Definitur uerum, quod sit tumor laxus, mollis, & doloris expers, qui ex naturali pituita in aliquam partem defluxa generatur. Spurium uero quod à naturali pituita degenerat, ita est multiplex, prout uariæ sunt phlegmatis species, aut uaria humorū cum phlegmate mixtura, nam si à flatuoso ac uaporofo phlegmate tumor fiat, tunc inflatio oritur, si ab aquoso, aquosum apostema, sicut in hydrope uisitur, si à crudo & crasso, abscessus pituitosi, quos aliqui barbare exituras phlegmaticas nuncupant, & Auicennas du bellet. In quorum numero à Græcis melicerides, stratomata, ganglia, & acheromata reponuntur, si à gypseo, strumæ, uulgo scrophule dictæ, si à putrefacto ulcera et fistulæ pueniunt, qđ si alij humores una cū phlegmate admisceantur, tunc oedema, uel erit phlegmonodes, uel erysipelatodes, uel scyrrhodes, etc.



## Loci consentientes de œdematis definitione.

Gal. 2. ad Glau. cap. 3. Oedema autem uocamus tumorem mollem doloris expertem, quem ex pituitosa substantia, aut spiritu uaporoso fieri constat. Et. 14. meth. cap. 4. sicut ex fluxione biliosa constat erysipelas, ita ex pituita ipsum œdema, rarius quidem atque indolens tumor & cæ. & hæc de uero ac legitimo œdemate. De spurio autem loquitur Auic. terti. 1. 4. trac. 2. cap. 1. ubi apostemata phlegmatica inquit uel esse simplicia & nominantur apostemata mollia, aut aquosa, sicut accidit membro, ut in eo aggregetur aqua sicut hydropisis proprie, aut dubillet in quibus sunt nodi lenes, aut nodi duri & scrophuli & c. Quod autem œdemati aliis humores admisceantur ita ut phlegmonodes & erysipelatodes fiat, lege Galenum. 1. de morb. diff. cap. 12. ibi. nam phlegmoni magna ex parte miscetur aliquid, quod uel erysipelatis, uel œdematis, aut scirrhi naturam seruat, similiter erysipelati quod phlegmones, aut œdematis, aut scirrhi speciem referat, ita similiter in reliquis omnibus perpende & c. id est idem fieri existimato in œdemate, atque scirrho & cæ. lege fusius Guidonem Gualiacum, Ioannem de Vigo & Argillatam, & plura ad hanc rem facientia, inuenies & c.

## De causis œdematis.

Tres sunt œdematis causæ, primitiua ut casus percussio, & uictus ratio deprauata. Causa antecedens est copiosa humoris pituitosi ad aliquod membrum defluentis repletio. Causa coniuncta est ipse humor pituitosus in aliquo membro infarctus ac aggregatus & c.

## Loci contentientes de causis œdematis.

De causa primitiua loquitur Auic. terti. 4. tract. 2. cap. 2. ibi. Et quando accidit ex percussione & similibus, & nō occurrat materia, quæ attrahitur ad locum eius, nisi phlegma



tunc non apostemat præter apostema phlegmatis &c. De causa antecedente loquitur Gal. 1. de morb. diff. cap. 12. ibi. Principio quod omnes ex abundanti nascuntur humore, sicuti erysipelas à flava bile, phlegmone à sanguine œdema à pituita etc. Et in lib. de tumor. præter naturam, cap. 10. Erysipelas inquit biliosa exuperante fluxione gignitur, inflammatio sanguinea, œdema uero à tenui pituita &c. & in lib. 14. meth. cap. 4. sicut ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex pituita ipsum œdema, equidem scio inquit aliter quoque œdema provenire, sicut in affectibus aquæ intercutis, & malis corporis habitibus &c. lege tu neotericos scribentes, & plura de his forte intelliges &c.

#### De signis ipsius œdematis.

Verum œdema facileprehenditur, si signa exuperantis pituitæ in parte læsa adfuerint, & si eius tumor sit laxus, mollis, albus, qui dum digito ipse præmitur foueā admittit, nec attollitur, sed præmentis digiti uestigium relinquit, ibique nullus uel exiguus sentitur dolor. Calor est modicus, & si quæ alia dicta sint pituitæ indicia hoc ad œdematis cognitionem spectant, nam quo magis pituita fuerit tenuis, eo, tumor erit mollior, et quo magis crassa, eo tumor erit magis ad duritiem decliuus.

#### Loci consentientes de causis œdematis.

Gal. 14. meth. cap. 7. Oedema inquit ex pituitoso succo oritur, proindeque præmentibus nobis cedit, digitiq; admodum alte in ipsa descendunt &c. Auic. tertia. 4. tract. 2. cap. 2. Apostema est album, molle, in quo non est caliditas, & quanto plus est materia subtilior, & magis madida, est mollicatio eius uehementior, & digitus facilius penetrat in eo quod comprimit, & quanto plus materia est, crassior est ad duritiem, & ad frigus magis decliuus, & plurimum eius est de uapore phlegmatis, et de genere eleuationis. Bac. pro genere eleuationis.



nis intellige inflationis, quæ ex uaporoso spiritu sæpius progignitur &c.

De curatione œdematis.

Quoniam œdema ut dictum est ex pituitosa fluxione oritur. Idcirco antequam curationem aggrediaris, in primis considerandum est, num œdema hoc sit symptoma, ut in hydrope & cachexia, an morbus per se, si symptoma tunc nulla propria curatione indiget, sed sola frictione cum sale & oxyrhodo tollitur. At si per se morbus fuerit, tunc etiam inuestigandum est, num, tale œdema sit uerum & simplex an spurium & alijs humoribus admixtum. Si uerum & simplex per se fuerit, tunc duplici scopo uniuerſaliter curabitur, prohibendo scilicet, ne humor ad aliquam partem defluat, aut euacuando, si iam fluxus, & in aliquo membro impactus extiterit, quod ut commodius fiat, tunc alijs quatuor particularibus scopis indigemus, Primo uictus ratione, secundo materie antecedentis purgatione, tertio humoris iam fluxi resolutione, quarto accidentium remotione, uictus igitur ratio sit ad caliditatem & siccitatem cum quadam attenuatione decliuis. Vinum sit album olygophoron & odoriferum, utiliter sumuntur in ferculis fœniculum, petroselinum, &c. At materiam antecedentem purgare expediet, nisi plethora quod raro contingit, aliqua immineat, cum castia, Diaphinicone, electuario indo, confectione de turbit &c. modo primum ipsa peccans materia cum oxymellite, scy. de duabus radicibus bisantino rodometellite et similibus æquata seu preparata fuerit. Nam hæc & delitescens intrinsecus materiam, non modo crassam incidunt, sed tenuem digerunt, & euacuant. In. 2. uniuerſalis scopo, cum fluxa sit iam iam materia, tunc ijs plurimum uti conueniet, quæ modice digerunt, nec ualde exsiccant, sicuti spongia in aquosa posca imbuta, aut cum lotionem ex ijs quæ utranque intentionem aggregant, quale illud est Auicennæ decoctum



Alūm ex baurach. i. nitro cinere & aceto &c. De his reme-  
 dijs plura habes iuxta neotericos authores, quorum cateruā  
 recensere oportunum fore non arbitror. satis est, si post mor-  
 bi incrementum in statu & declinatione, fortioribus exsic-  
 cantibus ac resoluentibus remedijs utaris, sicut est emplastrū  
 Auicennae, quod recipit stercoris uacini libram semis calami  
 aromatici spicæ absynthij añ unc s. cum decocto caulium fiat  
 emplastrum. Spongia etiam sumopere ualet in lixiuio imbu-  
 ta quod ex cinere ilicis aut fici confectum sit. Quod si œde-  
 ma per hæc dissolui nedum possit, sed potius ad suppuratione-  
 nem uertatur tunc maturantibus siue suppurantibus opus erit,  
 quale est ceratum de diachylone aut emplastrum ex altheæ li-  
 liorum alborum ac maluarū radicibus & cæteris suppuran-  
 tibus compositum, Factā ꝑ suppuratione, tunc aperiendus est  
 locus uel caustico aliquo medicamine aut ferro, expurgatoq;  
 pure, fiat deinceps prout in alijs ulceribus sordidis dictū est.  
 Accidentia demum si qua interciderint, auferantur. Nam si  
 dolor œdemati adnectatur, cum ano dinis sedandus est, sicuti  
 cum oleo chamomillino de absynthio cū œsypo humida etc.  
 Si durities adfuerit statim cum emollientibus tollenda est, ut  
 cum medulla crurium uituli cerui dialthea &c. Si pruritus  
 acciderit, sicuti in œdemate ab aliqua solutione perueniente,  
 tunc lenimento quod ad pruritus faciat, quale est id quod a  
 Ioanne de Vigo in hoc casu describitur, utendum est &c.

Loci consentientes de curatione œdematis.

Quod œdema accidens curatione propria non indigeat,  
 author est Gal. 2. ad Glau. cap. 3. ibi. Nonnunquam in pedibus  
 & cruribus eorum quos aqua intercutem uexat, & alijs qui  
 malo habitu laborant, solet contingere, uerum tale œdema in  
 periculosis illis dispositionibus accidēs est, nulla propria præ-  
 cipuā ꝑ curatione indigens &c. Itidem ait 14. meth. cap. 4.

ZZ



Et adiungit, quod satis est ad huius curam si partes tumidas perfricaueris oxýrrhodino, aut oleo Et sale Et c. quod itidē ait Paul. Et Aetius, Auicennas uero Et queritur cura quæ est causæ Et c. De quattuor illis scopis loquuntur omnes ferē, qui recenter de hac re scripserunt. Plura habes etiam circa uictus rationem iuxta Ioannem de Vigo Et Guidonem Gualiacū. De purgatione loquitur Auic. tertia. 4. cap. 3. ibi, Euacuatio quæ fit cum solutione uentris Et abstinentia ab eo, quod generat phlegma, est res, quæ est necessaria Et c. De secūdo uniuersali scopo loquitur Gal. 14. meth. cap. 4. ibi, At si ex pituitoso humore in particulam influente oedema constitit, abunde aliquando satisfacit spongia, quæ ex aqua in qua sit aceti aliquid, maduerit Et c. Auic. loc. cit. Et quum factum fuerit illud, oportet ut sit repercussio eius in principio cum eo quod aggregat exiccationem Et resolutionem Et fricetur locus frictione dura, deinde administrentur super ipsum exiccatiua Et c. Quæ autem bona sint in principio docens, inquit. Et administretur super ipsum spongia nouæ infusa in aceto admisto, aut infusa in aqua baurach Et cineris Et c. Gale. 2. ad Glauc. cap. 3. curationis intentio in huiusmodi affectibus mixta est, una quidem ut eorum substantia discutatur. Alia ad aliquid congregandum Et restringendum Et c. Auic. loc. cit. Et quotiens additur egritudo, ponatur acetum in quo infunditur spongia fortius parum, Et apud statū perueniatur cum ipso finis in fortitudine Et c. Bac. idest quo magis ad declinationem morbus properat, Et magis ualida administretur medicamenta Et c. Quod itidem demonstrat Galenus loc. cit. dicens. Si igitur per ea quæ dicta sunt non sedetur, tunc aliquid fortiorum medicamentorum, quod temperaturam admistam habeat ex dictis potestatibus adiiciendum est Et c. De accidentibus remouendis plura habes ex Auic. loc. cit. ibi, oportet ut



sedetur dolor in primis cum his quæ sunt sicut asypus humi  
da & uinum coctum & ceretaria ex oleo & c. Multo tamen  
plura capies ex Ioanne de Vigo & Guidone Gualiaco quos  
maturius poteris tuo arbitratu consulere & c.

Observationes circa spongiam applicandam.

Gal. 2. ad Glau. cap. 3. oportet autem spongiam esse omni-  
no nouam, quæ si non affuerit saltē exquisite abluta sit aphro-  
nitro & nitro & lixiuio. Bac. Auic. tertia quarti, cap. 3. in-  
quit, quod si sponsia non inueniatur, pānus duplicatus in dua-  
bus tunicis cum aqua cineris administretur & assiduetur su-  
per ipsum una uice post aliam, & oportet ut sponsia com-  
prehēdat omnia latera, ne declinet materia ad latus aliud etc.  
In substantia enim spongiæ sunt exiccatio & resolutio, Ga-  
le. 14. meth. ca. 4 si nouæ copia non sit, melius est eo quod uul-  
gus uocat elychnion utare & c.

Observationes circa ligaturam.

Auic. loc. cit. Et strictura cum ligamentis confert ei, in quo  
non est materia crassa, & oportet in illa ligatura ut sit ince-  
ptio ab inferiore ad superius & c. Gal. 14. metho. cap. 4. De-  
ligetur ab inferiore sursum, sit autem arctatio mediocris, ueluti  
in ossis fractura ac quidem primæ fasciæ iniectiones, quæ  
scilicet inferne incipiunt, magis arctande, quæ deinceps sunt  
sensim remittende, cæterum ut laxa sit aliqua deligatio-  
nis pars & c.

Observationes circa poscam.

Pusca quam græci οξύπρακτον nominant, ita tēperata esse  
debet inquit Gal. 2. ad Glauco. ut possit ipsam quispiam bibe-  
re, quæ autem plus aquæ continet in principio adhibenda est,  
maxime laxis corporibus, quæ uero fortior fuerit uirilibus  
corporibus & duram habentibus pellem, et quæ ad primam  
spongiæ appositionem non iuuantur. Auic. loc. superius cit. et  
non oportet ut contangat ipsum aqua & c. Bac. intellige tu de



aqua simplici, nam præter id quod ipsa humectat etiam sumo pere frigefacit. Quod extra medendi scopum existimat.

Oedemati ac phlegmaticis apostematibus conferentia.

Conferunt oedemati et pituitosis abscessibus, alumen, apiū, abrotanum, bdellium, folia brancæ urinae cum assungia ueteri cataplasma allei cum aceto, castoreum, folia brassicæ oleū de cherua, cyclamen cum oleo bullitum, radix cucumeris asinini cum farina hordei uel elesterium, fœnugræcum, radix liliorum alborum, lupini cum oleo, matricaria, mentha myrrha, nasturcium cum aqua & sale, oleum de styrace, folia paritarie, pustule cum uino coctæ, pix cum cera & oleo, folia platani, sal cum mentastro & melle, sisymbrium, sponsia noua, radices tamarisci, uiscus cum calce, hypericon, oleum liliorum alborum, &c.

De pronost. oedematis.

Hip. pronost. primo tex. 34. si uero mollior tumor est, nec dolet & pressus digitis cedit diuturniorem efficit iudiciu uem, ac minori cum periculo est, Bac. lege Gal. commentum, & intelliges quid fiat cum minori periculo siue intrinsecus, siue extrinsecus hoc accedat, nota etiam, quod oedemata accidunt magis in hyeme q̄ in alijs temporibus & plus in senibus & in ijs præcipue qui ad ganeam dediti sunt quàm in iuuenibus & ijs qui parco uictu utuntur. Terminatur etiam oedema per resolutionem raro per suppurationem, & ut plurimum in nudos, siue abscessus desinit &c.

Auth. dissentientes circa oedemata.

- 1 Adferere idem esse oedema cum inflatione.
- 2 Adferere, nudum oedema per se dolorem efficere.
- 3 Adferere oedema purum fieri a dolore tanquam a causa primitiua cum Auicenna.



## Confutatio dissentientium circa oedemata.

Ad primum Gal. 14. meth. cap. 7. uidetur respondisse dicens, nunc de inflationibus differamus, quibus diuersa ab oedematis curatio est. illa namq; ceu diximus ex pituitoso succo ortum habent, inflationes uero ex flatuoso spiritu collecto nascuntur, & sic diuersa non modo sunt in causa, sed etiam in curatione. unde idem esse non possunt &c. Ad secundum idem Gale respondet pronost. primo cōmen. 34. dicens, quod mollis tumor dolore uacat. Hinc inferas tu, sed oedema est tumor mollis igitur dolore uacat. Ad tertium respondetur quod oedema si rōne doloris efficeretur ut Auicēnas sequeretur quod pituita ad locum dolētem sola transiret, quod est impossibile, nam instrumenta naturæ, quibus loco dolenti solet auxiliari inquit Gal. sunt sanguis spiritus & bilis ex quibus tumor calidus generatur potius quàm frigidus, quare nullo modo a dolore tanquam a causa primitiua fieri poterit, nisi forte de oedemate alijs humoribus admixto Auicennas intellexerit &c.

## De strumarum definitione &amp; diuisione.

Strumæ quas Græci  $\chi\omicron\pi\alpha\delta\acute{\alpha}\varsigma$ , & Plinius scrophulas a scrophis uidelicet, quæ id morbi patiūtur, nominant. sunt tumores glandosarum carniū indurati, qui in collo sub alis, ac inguinibus oriuntur, quarum differentias Aetius esse plures existimat a loco orta natura magnitudine & uasorum complexu deductas.

## Loci consentientes de strumarum definitione &amp; diuisione.

Quod strumas siue scrophulas latini &  $\chi\omicron\pi\alpha\delta\acute{\alpha}\varsigma$  Græci nominarint, legere est iuxta Plin. lib. ij. ibi. Guttur homini tantum & suis intumescit aquarum, quæ potantur uitio, propter quod quedam tubera spongiosa per corpus aliquando



inpersa scrophulae dicuntur, quae etiam sub strumae appellatione continentur &c. Gal. de Tumor præter naturam cap. 17. Quum inflammationes glandosarum carniū ad scirrhū deuenerint, huiusmodi affectus struma & à græcis *χοιρας* nuncupatur &c. Et. 13. meth. cap. 5. Quod si scirrhusior adenarum phlegmone fuerit, hæc ægre sanabilis et struma dicitur &c. Quod autem strumae nascantur in partibus iam comemoratis, testis est Paul. cur autem magis in his partibus quam in alijs duplicem Gal. reddit rationem, alteram quia hæ glandulosæ partes facilius fluxiones recipiunt, cum natura sint rariores, alteram uero, quia robur uenarum articularum neruorum & musculorum est ualentius, sed corporum quæ glandularum sunt naturæ, imbecillius &c. Aet. ser. 15. cap. 5. Differunt strumae inter se magnitudine, quia alie parue, alie magnæ, alie mediæ, natura, quia alie mansuetæ, alie malignæ, mansuetæ habent citra inflammationem & dolorem moderatam duritiem, malignæ inflammationes ac dolores inducunt, loco, quia quædam in anteriori parte colli, quædam ab utraque oriuntur, quædam sub cutis superficie, quædam circa uasa nobilia insident, ortu, quia quædam eleuatae facile huc uel illuc impelluntur, quædam insertæ, quæ ad tactum renituntur, multitudine, quia una & plures generantur. Vasorum complexu, quia quædam uenas at arterias implicatas habent, quædam uero non habent &c.

#### De strumarum causis.

Strumarum causæ præincipientes sunt, deprauata uictus ratio, & quæcunq; possunt pituitam crassam generare. Antecedentes sunt humores crassi ac glutinosi, qui perinde in scirrhos hunc morbum pariunt. Causæ coniunctæ sunt ipsi humores in hisce partibus impacti ac collecti strumas actu efficiētes &c.



## Loci consentientes de causis strumarum.

Auic. tertia. 4. trac. 2. cap. 10. cibi crassi & potus aqua super eos, & nauseatiua satietas, & repletio uitanda sunt, quoniam hunc morbum generat. Gale. apho. 3. cō. 26. Horum adenum passio struma quoque est, non ex calida materia, neque ad suppurationem properante. sed pituitosiore & frigidiores consistens & c. Visum est in Celso quod ex pure & sanguine concreto id mali contingat, siquidem lib. 5. cap. 28. dū strumā definit, hæc uerba habet, struma quoque est tumor in quo subter concreta quedam ex pure & sanguine, quasi glandulæ oriuntur & c. Quod autem tales humores in hisce locis impacti efficiant strumas, authoritatem habes iuxta omnes neotericos qui de hac re scripserunt.

## De signis strumarum.

Notæ strumarum facile capiuntur, si pituitosorum tumorum indicia memoriæ mandaueris præsertim si ex colore albo, & ex duritie quam materia crassa efficit, diligenter id mali inuestigaueris. Cognoscuntur strumæ quæ in pellicula, siue uelamento includuntur ex earum mobilitate & cutis segregatione, infixæ uerò quum a loco dimoueri non possunt, sed carni adherentes tenaciter permanent. Strumæ etiam plures sunt & ad instar racemi uuarum una post aliam dependet, et in locis supra allegatis sæpe reperiuntur, idcirco a nodis Auicennæ differunt, quum ipsi singulares sint, et non plures ut strumæ.

## Loci consentientes de signis strumarum.

Quod ex indicijs tumorum pituitosorum strumæ deprehendantur, testis est Guido Gauliacus. Auic. tertia quarti tra. 2. cap. 9. scrophulæ ut plurimum accidunt in carne molli & eis uelamen neruosum, & forte ex una earum generatur plures & simulantur in hoc altualil & c. Bac pro altualil intellige uerrucas, id est similes uerrucis, quando ex una earum plu-



res dependeant, lege locum hunc Auic. & differentiam strumarum cum nodis intelliges, Ioannes de Vigo duas rationes affert, quibus ipsæ a nodis differant, quas uidere poteris ubi de excrescentiis phlegmaticis agit, Paulus libro. 6. ca. 35. de illis loquitur quæ suis membranis includuntur &c.

#### De curatione strumarum.

Quum strumas curare uolueris primū considerato, nunc curationem admittant an per se incurabiles & carcinodes sint, si primum tunc duplici scopo strumæ curabuntur, uictus uidelicet ratione & eius quod in corpore abundat uacuatione. ceteræ uerò carcinodes nullo pacto curationi per manum cedunt. Vicius igitur ratio sit incisoria tenuis & calefactoria, absint frigida potio immoderata repletio, humida habitatio, & quantum fieri potest inedia tolleretur. Euacuatio fiet, aut per uenæ sectionem existente plethora, aut per uomitum, aut per alui solutionem, prout tempus ætas & rei euentus exposulabit, uena si opus fuerit, secari debet cephalica, uomitusq; a prandio uel sumo mane cum helleboro raphano anetho in aqua decoctis & adiuncta oxymellitidis portione, irritabitur. Vacuatur etiā pituita per sedem facta aliquali præparatione, cum agarico hiera picra confectio de turbith pilulis de hermodactilis diaphinicone, & cæteris huiusmodi aliis pluribus, quibus iā peractis, si strumæ non cesserint, primum ad emolientia, deinde ad digerentia ac discussoria progrediendum erit, emolliunt omnes ferè adipēs & medullæ ammoniacum, bdellium styrax altheæ radices, æsopus, dialthea, butyrum, diachylon, & cetera alia cerata, quorum cathalogum recensere nunc nostri instituti non est. Discutiunt uero strumas stercus caprillum, uel bubulum cum melle & aceto, in formam emplastri redactum. Itē calx uiua cum melle uel oleo uel adipe suillo excepta. Quod si nec



strumæ discuti possint, de duobus alterum necesse est, aut quod uitiatum erit, excidatur, aut medicamento id putrescere cogente, curetur, strumas igitur ad suppurationem perducunt, non solum emplastrum ex fenugræco seminibus lini, radicibus liliorum alborum cum uiscilagine althææ confectum, sed id quod a Paulo refertur lib. 4. Quod recipit Myrrhæ drach. x. Ammoniæ thymiamatis drach. vii. uisci quercini drach. vii. Galbani drach. iij. Propolis drachma, quæ omnia in pila contunduntur. Cæterū iam maturatas caustico aliquo uel medicamento rumpantur, uel ferro, Rumpit eas loliacea farina cum fimo columbæ & semine lini uino incocta, At ruptæ mox detergantur cum unguento ægyptiaco aut apostolorum uulgo uocato. Hæc enim sumope ad strumas ulceratas et malignas proficiunt. Quod nisi quid horum prodesse uidebitur, ad earum incisionem ac euulsionem te conferes, In hocque Albucasin aut Aetium ex leonida, aut Paulus libro sexto, capite trigesimo quinto, consules, nam de harum incisione satis luculenter pertractarunt, Caue tamen in hac incisione dum circa collum operaris, ne arteriæ, quas carotidas uocant, uel recurrentes nerui quoquo modo offendantur. Nam quod inde sequitur satis noxæ maioris esse potest, quàm strumæ relictæ & cate.

#### Loci consentientes de cura strumarum.

Auicenn. tertia quarti tracta. secundo, cap. decimo. Radix super quam est fiducia in curatione habentium scrophulas est euacuatio & subtiliatio regiminis &c. lege tamen hunc locum Auicennæ, & circa uictus rationem plurima intelliges, quæ itidem habet Ioannes Tagaultius in suo Guidone. Gauliaco, quod rursus repetere locus non est, Paul. lib. 2. ca. 35 Maligne quas carcinodas aliqui dixerunt, notū est omnibus, quod per manum curationi non cædunt. Quod uero uacuatio



fieri debeat tum per uomitum, tum per solutionem uentris, & uenæ sectionem satis patet per Auic. loc. cit. dicentem, & de euacuatione laudabili est uomitus, & necessarium est solutione educere phlegma crassum cū pilulis, & iterum sumantur inquit turbith & zinziberis & sacchari partes æquales, & bibantur usque ad drachmas duas, nam præter quod soluit phlegma crassum, est etiam non calesciens, neque intestinorum faciens rasuram, & phlebotomia iterum inquit est iuuatiua, & oportet proculdubio ut fiat ex cephalica & c. His tamen adiungit Ioannes Tagaultius, quæ uirnam ciere possunt, tum quæ collectum humorem in halitum dissolunt, ac discutiunt, Aet. ser. 15. cap. 5. Caterum inchoantes strumas tum in pueris, tum in his qui chirurgiam non admittunt medicamentis dissoluere ac discutere conabimur & c. Paulus lib. 4. cap. 33. Probe autem discutit strumas calx melle, uel gymnastiorum sordibus uel oleo uel adipe suillo excepta, Gal. 14. metho. cap. ij. Est uero duplex intentio, nempe uel totum quod uiciatum est scalpello excidentibus nobis ueluti in cancro, uel putrescere id medicamento cogentibus & c. Quod uero maturatæ rumpantur caustico, & præcipue loleacea farina cum fimo columbino testis est Paulus loco superius citato, similiter quod abstergi debent cum unguento apostolorum uocato etiam hoc testatur Auicennas ibi, iam inuenimus unguentum apostolicon relatum ad christianos in scrophulis mortalibus ruptis sanationis magnæ & c. De incisione ac euulsione strumarum loquuntur ferè oēs iam dicti, sed satis breuiori sermone ac lucidiori ab Aetio ex leonida dictū est. Aui. 3. 4. cap. 10. etiam de hac re facit mentionem ibi, qd si fuerit necessariū in curatione scrophularū uti ferro & c. Qd autē in his sectionibus ac euulsionibus cauendum sit, ne arteriæ & nerui recurrentes tangantur, exemplum habes ex Cale. 1. de loc. affec.



ca. 6. ibi, quum ex ceruice quidam cheradas in profundo incubentes excideret, unguibus eas euellens, imprudens ob ignorantia simul recurrentes nervos distraxit, atq; hoc pacto puerum liberauit a strumis, sed mutum reliquit &c. Paulus Animum inquit ubiq; adhibe ne arteria et nerui recurrētes uiolētur &c.

Observationes circa uictus rationem.

Auic. tertia. 4. ca. 10. Tolleret famem quantum potest, & aborreat omne quod replet caput materia, & oportet ut custodiat prae paratus eis caput ab eo quod facit currere ad ipsum materias ex prae parauionibus facientibus currere, sicut prosternere se superficiem, & curuare se super genua prolixe, & habere puluinar demissum, seu non eleuatum, ut caueat ab operationibus quae trahunt materias ad caput, sicut loquutio plurima & dolor capitis & rixa &c.

Observationes circa strumas calidas.

Auic. loc. cit. in huiusmodi strumis oportet ut conficiantur medicinae calidae praedictae cum oleo rosaceo & dimittantur per dies aliquot & administrentur in scrophulis calidis nec oportet, ut superflua sit administratio medicinarum acutarum, imo sufficit eis quod est sicut sauich de tritico cum aqua coriandri, & quum scrophulae sunt magne tunc chirurgici alienent se a curatione earum cum ferro & medicamine acuto &c.

Strumas curantia.

Strumas curant radices acetosae, adeps anguis, ammoniacum, althea cum brassica in uino cocta, apium risus cum fimo porci, cinis hepatis asinini cum oleo, axungia cum helleboro farina & sale, succus cyclaminis, bitumen iudaicum, bdellium, radices & folia capparorum, folia adianti, choctae, siue limaciae cum testibus suis appositae, coriandrum cum farina fabarum, uel ciceris, radix cucumeris asinini cum aceto, carnes eritij marini jicus Pharaonis, id est lac uel decoctum, gal



banum. flores genistæ cum rhodomelite, lactuca asini cū adipe, lacertus uiridis alligatus, radices lapatii cum axungia, lentes in aceto coctæ lolium cum semine lini & stercore columbi, lupinorum farina cum aceto, opopanorum, pix humida cum farina hordei, segapinum, caro serpentis abieclis extremitatibus. stercus cameli & capræ, styrax, caro testudinis comesta & fel eius linitus, uerbasci folia cum aceto, uiscus cum resina & cera, succus uitis albæ cum melle & uino partibus æqualibus urina, urtica cum assungia, radix iridis cum melle ex oleo chamomillæ, unguentum apostolicon. Auic. diachylon, unguentum artauitæ paruum, unguentum de uxi far. Auic. hieralogodion. Auic. oleum cucumeris asinini, oleum irinū, de ben mes. emplastrū Oribasij ex Mesue. ij. antido. etc.

#### De pronost. strumarum.

Auic. tertia. 4. trac. 2. cap. 9. Homines uehementius expositi ad habendas scrophulas in partibus colli & capitis, sunt, curea habentes colla humidarum complexionum, & saluiores scrophulæ sunt quæ accidunt infantibus, & grauiores sunt quæ accidunt iuuenibus, & cap. 10. Multoties inquit redeunt scrophulæ incipientes extenuari & dissolui ad dispositionem suam primam, & scias quod de scrophulis sunt in quibus est cancerositas aliqua & c. Celsus lib. 5. cap. 28. strumæ præcipue fatigare medicos solent, quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt, siue ferro siue medicamentis curantur, plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoque post medicamento opus est, quibus id quoque accedit, quod longo spatio detinent & c. Paul. lib. 6. cap. 35. strumæ quæ attactu indolent, & medicamentis impositis deteriores redduntur, malignæ sunt, nec curationem per manum admittunt & c. Aet. ser. 15. cap. 5. Paruæ igitur strumæ facilius curantur quàm magnæ, & māsuetæ citius quàm inflammatae, at ne-



ro malignæ incurabiles sunt, quum enim omnes huiuscemodi strumæ cæceratæ ac uasis refertæ sint, si eas per chirurgiam aggrediari sanguinis eruptionis periculum imminet, supra hoc quod peritius insidentes rescindi non possunt, nam uenas iugulares & arterias carotidas, maligna struma ueluti radices habet. Verum superficialiæ facilius curantur quàm profundæ, & quæ in collo oriuntur quàm reliquæ, sed uocales nervos uitare oportet &c.

Auth. dissidentientes circa strumas.

- 1 Adserere non differre strumas à stratomate et meliceri de in cura.
- 2 Adserere cucurbitulas i strumarũ curatiõe multũ cõferre
- 3 Adserere p natura glãdularũ diuersũ nõ esse curãdi modũ
- 4 Adserere strumas in mammis oriri non posse.

Confutatio dissidentientium circa strumas.

Ad primũ Gal. 14. meth. cap. 12 inquit quod communes indicationes in his tumoribus sunt tres scilicet digerere, putrefacere & excidere, & quod meliceris triplicem curationem admittit, Atheroma duplicem scilicet excidere & putrefacere, stateoma uero sola manuum opera curatur, quum nec putrefieri possit, nec digeri, sed strumarum curatio alia est, quũ in scirrhuso præsertim affectu fuerint, quia non aliter q̃ scirrhis, qui alijs in partibus nascuntur, cõmunis est, & sic in cura differunt &c. Ad. 2. Auic. 3. 4. tra. 2. cap. 10. Et uentosa- tio est inconueniens patientibus scrophulis secundum plurimum, quoniam nõ est ei possibile ut euacuet ex materia, quæ est in scrophulis, imo attrahit ad eas et incrassat ipsas per id quod extrahit de sanguine subtili etc. et sic nullo modo cõferunt etc. Ad. 3. Gal. 14. meth. cap. ij. duplicem glandularum naturam ostendit & diuersum medendi modum dicens. Sunt quædam in medio uasorum spatium, & ibi quod scissum et de-



ductum est, implent, & pro diductionis firmamento opus sunt, & has iubet uel scalpello excidi uel medicamento putrescere cogentibus tolli, Aliæ sunt quæ uel saliuam, uel lac, uel genitale semen, uel pituitosum humorem in faucibus uel larynge generant, & hæc cum in scirrroso affectu fuerint, non aliter quàm reliquæ partes scirrrosæ curandæ sunt, & sic diuersus est curandi modus.

Ad quartum Cornelius Celsus in mammis quoque foeminarum se reperisse strumas chirurgicus Megeles inquit auctor est. Præterea ad strumas mammarum remedia docet Paulus lib. 4. cap. 33. quæ si illic fieri non possent, frustra esset dare remedium &c.

#### De scirrhi definitione ac diuisione.

Scirrhus qui a græcis dicitur σκίρρος, siue σκληρός & barbare sephiros, duplex est ἀκριβής, id est exquisitus ac purus, siue οὐκ ἀκριβής, id est non exactus & impurus. exquisitus itaque est tumor præter naturam durus quidem, sed omnino sensus atque doloris expers, non exactus uero durus tumor est, doloris etiam expers sed omnino non insensibilis, & si difficulter sentiatur &c.

#### Loci consentientes de scirrhi definitione & diuisione.

Gale 2. ad Glauc. cap. 4. Exquisitus scirrhus est tumor præter naturam insensatus durusq; non exquisitus uero non omnino insensibilis est, difficulter tamen omnino sentitur &c. Itidem habet quarto de uic. in morb. ac. cō. 21. & Paul. lib. 4. cap. 32. Auic. tertia quarti cap. ij. Apostema durum nominatum sephiros, quod purum est, est illud cui non associatur sensus neque dolor, & si remanet sensus quidam licet sit paruus, tunc nō est sephiros purū etc. lege in sup. Aet. ser. 15. ca. 3. ubi de Tumoribus induratis sermonē facit, et idēmet intelliges etc.



## De causis scirrhi.

Causæ scirrhi, prout de alijs tumoribus dictum est, tres esse possunt, pro cataractica, ut uictus ratio, & quæcunque melancholiam crassumq; humorem generare apta sunt, antecedens causa est humor melancholicus ac crassus in toto corpore, ipso liene hepar non expurgante, receptus ac collectus, quæ si non naturalis fuerit per se concretus ac lapidosus exquisitum scirrhum producit. At si per admixtionem aliorum humorum compositus fuerit, tunc non exquisitum scirrhum, sed uel phlegmonodem, uel œdematodem, uel erysipelatodem generabit, quod si per adustionem adhuc genitus sit, tunc cancerum & non scirrhum pariet. Verum si fuerit hic humor naturalis nihil horum, sed non exactum scirrhum tunc efficit. Causa coniuncta est humor melancholicus, siue humor crassus & glutinosus, in parte quacunque affecta impactus, qui contumaciter repugnans non nisi ægre solui potest &c.

## Loci consentientes de causis scirrhi.

De causis primitiuis satis luculenter omnes ferè neoterici pertractarunt, in idq; unanimiter concurrunt, quod omne melancholiam ac pituitam generans causa sit primitiua scirrhi. Auic tertia quarti trac. 2 cap. ij. & sephiros aut sit a melancholia feculenta sola radicali, aut a melancholia commixta cum phlegmate, aut ex phlegmate solo quod induratum est &c. Gale. 14. meth cap. 4. Siquidem humor unde eiusmodi uitium nascitur, aut glutinosus est, aut crassus, aut utriusque rationis particeps, & in secundo ad Glau. cap. 4. Fit ex humore lento & erasso uix solubiliter induratis partibus infixo. quibus uerbis plane demonstrat non solum a melacholia, ut in lib. de tumor. præter naturam fatetur sed etiam a pituita crassa & glutinosa scirrhum oriri posse, ut ipse Auicēnas, in cæteris consule Ioannem Tagaultium Rasim in suo contra



nenti, & ceteros practi-  
cantes, quorum libri ex his referti  
sunt & c.

De signis ipsius scirrhi.

Indicia scirrhi sunt tumor durus insensibilis tactui reni-  
tens, & ceterae apparentes notae, quae melancholicum cras-  
sumque humorem in corpore delitescens demonstrant. Cogno-  
scitur etiam scirrhus cancerosus ex inflammatione, pulsatio-  
ne, ac uenarum in circuitu tumoris apparitione, Scirrhus etiam  
apparet paulatine, sed in dies fit maior, si fiat a melanco-  
lia, color eius est ueluti plumbeus ac liuidus, si uero a phleg-  
mate, eius color ad corporis colorem uergit & c.

Loci consentientes de signis scirrhi.

Aet. ser. 15. cap. 3. Scirrhorum uero nota est tumor pertinax  
& ad tactum renitens ei ad sensus difficultatem inclinat, ut  
tandem hi loci, in quibus est, sensus exortes fiant, & ad ossis  
duritiam perueniant, sed eo pili in ipsis oriri soliti minime  
nutriuntur & exacte glabri fiant & c. De scirrho canceroso  
loquitur Auic. tertia quarti cap. 2. ibi & quandoque canceratur  
sephiros & propinquitas sephiros ad cancrum & elongatio  
eius ab eo est, secundum multitudinem inflammationis eius  
& paucitatem, & apparitionem pulsationis in eo, & occul-  
tationem eius & apparitionem uenarum in circuitu eius & c.  
Quod autem scirrhus paulatine appareat, idem eodem in lo-  
co demonstrauit dicens, & omne sephiros aut incipit appare-  
re paulatim, & additur, aut conuertitur ex phlegmone aut  
erysipelate aut exitura in loco uacuo & c. Similiter de colore  
scirrhi loquutus est dicens & color qui fit ex melancholia  
est cineritius, aut si fuerit ex melancholia cum phlegmate ad-  
mixta, color eius declinat ad colorem corporis & c.

De curatione scirrhi.

In curatione scirrhi considerandum est, num tumor sit du-  
rus ac nullius omnino sensus particeps, an adhuc sensibilitas



tis uestigium in se retineat, primum, ceu illum, qui nullā curationem admittit intactum relinques, alterum uero triplici scopo, dum curationem aggredieris, sanitati restitues, regimine uictus scilicet euacuatione, & eius quod præter naturam in particula continetur, ablatione, regimen in sex rebus non naturalibus sit calidum & humidum, in primis; alimēta euchyma sint, purum ac probum sanguinem generantia, ea; fugienda sunt, quæ non modo crassum & glutinosum humorem uerum & melancholicum & nigrum sanguinem parere possunt, absintq; animi ~~et~~ ueluti sunt ira sollicitudo, curæ uestigia, uigilie &c. Euacuatio totius corporis, plenitudine appARENTE, fiet uel per sectionem uenæ, uel per ea, quæ crassum humorem ac atrabilem euacuare apta sunt, sicut diasenæ Diacatholicon, confectio hamech. Infusio senæ polypodij fumarie item pilule de lapide lazuli, indæ, de fumo terre uel <sup>ca</sup>ria myrobalani indi &c. At si sanguis plurimæ nigredinis per totum corpus appareat, in primis sectio uenæ ualde erit oportuna, euacuato igitur corpore, tunc ad scirrhum affectum cum iis quæ & discutere & eodem tempore emollire possunt curationem conuertas, nam si medicamentis quæ discutiunt uehementer & attrahunt in hoc affectu absque emolliētibus uti uolueris, id certo efficies, ut quod in eo erit tenuium partium discutiatur, quod uero reliquum est, lapidescat ac ueluti insanabile relinquatur, si uero emollientibus tantum utaris absque discussorijs, periculum etiam imminet ne scirrhus nimia duntaxat emollitione facta, in cancerum abeat, quare superest ut utrisque intentionibus eodem tempore scirrhus curandus sit, sunt autem ea quæ cum emolliendo etiam discutiunt a Gale enumerata, inter medullas ceruinam & uitulinam, inter adipēs anserinum & gallinacē, inter resinas terebinthinam & laricinam, Emolliunt infus



per ac discutiunt bdellium, galbanum, ammoniacum &c. Facit ad hanc rem sumopere cortex radicis althææ cum anserino & gallinaceo adipe in forma cataplasmatidis appositus, At quia membra corporis alia alijs naturaliter sunt rariora ac densiora, idcirco etiam remedia sub diuersa specie applicanda requirunt, quippe induratis tendonibus ac ligamentis non tantum emollientibus auxiliamur, sed etiam aliquantulum incidentibus. Hoc modo primum in acerrimo aceto candentem ex igne lapidem pyriten siue molarem inijcito, facque ut uaporem aceti adhuc calidum tendones primum suscipiant, moxque medicamentum quod emolliat, imposito. Verum ab initio particula laborans omnino perfundenda est oleo, non aqua, quippe oleum esse debet tenuium partium non adstringens, sed emolliens quale sabinum, aut id sit in quo foenugraecum althææ & syluestris cucumeris radices aut anethi comam incoxeris, peractaque primum oleo tendonum emollitione tunc satius ac prestantius est posthac per aceti suffumigium curare, quam antea, nam si non idoneo tempore & per interualla aceti uaporem utaris, non sic facilem curam ac a Galeno describitur, inuenies, in cæteris uero carnosissimis partibus, & ubi non est, ut metuas quod nerui uiolentur, tuto ac libere aceto medicaberis, nam in liene affecto ubi per emollientia medicamenta durus tumor emollitus sit, ammoniacum cum aceto liquatum maxime præstat, ac conducit &c.

#### Loci consentientes de curatione scirrhi.

Quod scirrhus insensibilis curam non recipiat, manifeste apparet ex Gale. 2. ad Clau. cap. 4. ibi. Scirrhus igitur insensibilis curam non recipit, itidem ait Paul. libro. 4. cap. 32. Quod autem triplici scopo curetur regimine euacuatione, et quod præter naturam in particula continetur ablatione, attestatur Auicenna. 3. 4. cap. 12. oportet inquit ut de his apostemas



tibus illud curetur, cui est sensus, & sit sollicitudo curationis post mundificationem corporis cum eo quod educit humorem facientem ægritudinem, & fortasse est illa mundificatio cum phlebotomia, si est sanguis plurimæ nigredinis, & super illud sit, quod resoluit & lenit simul & c. Gale 14. meth. cap. 4. Curandi eius communis indicatio est, ut quod præter naturam in particula est totum euacuetur. Modus autem euacuationis eius proprius est, nam detergere id ubi contumaciter inheret oportebit. quod si quis, ijs quæ uehementer trahunt digeruntq; medicamentis uacuare tentet, nec ijs quæ humectent & excalefaciant, molliet ac liquet, huic paucis primis diebus egregie processisse curatio uidebitur, ceterum quod de affectu restabit, id insanabile erit, siquidem toto quod in eo tenuium partium erat digesto, quod reliquum est ueluti lapidosa concretio linquetur & c. Itidem aiunt Paulus, Aet. & Auic. & ceteri scriptores. Quod autem ea quæ cum emolliendo etiam digerere possunt, huic apta sint, lege Gal. loc. cit. & 2. ad Glau. cap. 4. ibi, non igitur curandæ sunt partes induratae medicamento immodice siccante, sed cum eo quod calorem habeat tepidum humiditatem uero nec multam nec omnino minimam. Quod enim superfluum humorem habet, nihil omnino dissoluit & c. Vocantur etiam inquit molliciantia medicamenta omnes medullæ atque adipēs ex medullis primas obtinet ceruina deinde uitulina & c. Aet. Ser. 15. ca. 4. Quum uero partes quædam natura rariores, quædam densiores sint, consequens est, ut singula proprijs medicamentis priuatim opus habeant, quapropter ad tendines & ligamenta præstabilius esse iudico, ut mollientibus medicamentis aliquid adiungatur quod incidendi uires habeat, inter quæ præcipuum est acetum & c. Gale. 14. meth. cap. 5. In aceto acerrimo candentem igni lapidē pyriten seu motare extinguo. deinde post



infusum lapidi acetum ascendente uapore calido in hoc dissimoueri scirrhosum ligamentum uel tendonem cogo atq; exinde rursum medicamen quod emolliat impono, oleo tamen principio curationis non aqua omnino laborantē particulam perfundo &c. Vide hunc Gal. locum fusius & omnia a me superius exarata ad unguem inuenies. Quod itidem facit Gal. 2. ad Glau. cap. 4 ubi si quis curationem perfecte uoluerit intelligere, legere non negligat cercylii pueruli historiam, nam ibi quid pluribus oporteat, Gal. satis luculenter docet &c. Quod uero in ceteris carnosissimis musculorum partibus scirrhis, tutum sit aceti medicamentum, hoc idem innuit Gal. 14. meth. cap. 5. ibi, At in liene & carnosissimi musculi partibus scirrhis affectis, tutus aceti usus est, quippe raræ sunt naturaliter, nec est, quod metuas ne quis nervus eius ui lœdatur &c.

#### Observationes in balneis.

Auic. 3. 4. cap. 12. & oportet, ne multum utatur balneo, quoniam niam resoluit subtile & aggregat spissum, & non potuerit ad hunc finem ut leniat spissum &c. Paul. lib. 4. cap. 32. a balneo autem in totum ægri abstinebunt, uel certe copioso. Aet. ser. 15. cap. 3. a balneis tamen medicatis abstinentiam cōsulo præsertim, quæ alum. aut sulphuris, aut aeris qualitatem admixtam habent, etc. Observationes in aceti administratione.

Gal. 14. meth. ca. 5. Aceti uis modo ea quæ modice et debito tempore utatur, salutaris eiusmodi affectibus est, ceu crassos humores diffecans ac dissoluens, sin uel immoderatus, uel in tempore non idoneo, tenuiores partes absumens, id quod reliquum est lapidescere sinit, sed si quis eo diutius utatur, substantiam ipsam nervorum delibauerit, ob id igitur sæpe nec inter initia, nec longo tempore medicamenti quæ ex aceto componuntur ad ligamenta et tendones, utendum est &c. Auic. 3. 4. cap. 12. & quum apostema est uehementis grossiciei, tunc non est excusatio ab aceto. ipsum. n. incidit & debilitate uirtutem membri, &



proprie quando est neruosum, quoniam est uehementius uacuum a materia, & dimittit eam causæ imprimenti deforis, uerum oportet, ut sit administratio aceti & intromissio eius in medicinis in fine rei non in eius principio & c.

Observationes circa humectantia & exiccantia.

Auic. loc. cit. & reuolutio resolutionis cū lenitate sit cum eo quod non exiccat plurimum & humectatuum raro resoluit, oportet igitur ut sit gradus humectantiū in caliditate ex secundo ad tertium, & in exiccatione ex gradu primo & c.

Observatio circa adipēs & mollientia.

Auic. loc. cit. & oportet ne in istis adipibus, & eorū similibus mollificantibus sit sal omnino, quoniam sal exiccat & indurat.

Observatio circa uacuationem.

Mes. cap. de melan. cano quidem est in ægitudinibus melancholicis, ut non bis uel semel, sed per interualla faciamus euacuationem talem habentem temperiem, ut natura possit regulare euacuationem, non aut euacuatio ipsam naturam & c.

Emollientes medicinæ ex Dioscoride.

Emolliūt adipū medicine, bdelliū, cinnamomū, cypros, cistos, cera, cerussa chalcanthū, calx uiua, æsypus, fœnugræcū, gleucinum, ammoniacū, irinū, laurus, lana succida, linū, lapis gagates, metopiū, myrrha bacotica, medullæ animalium, naphæa, palimpissa, panaces heracleō, psylliū, plumbū elotū resina, styrax uisum & c. Valent et duritiebus mēbrorum subsequētes medicinæ ex alijs authoribus. s. radix acori, althea cū fœnugræco & melle, apiū, balsamus, butyrū, chamomilla, radix can. abis, carnes uacine, caseus antiquus, brassica, cheiri, centaurium, cyclamen, cucumer asininus, helleborus niger, sex uini, caricæ, chamepithys, oxylapathum, lenes, lilium, lolium, malua, marubium, mellilotum, nigella, oleanum, opopanax, pix propolis, raphanus, sapo, segapenon,



serpentaria, sisamum, sycomorus, stercora porci uacca cum aceto, triticum coctum, uitis alba, urtica semina, iris hypericon, æsopi ceratum Democriti mes. Diachylon, hiera Andromaci, tyriaca magna, oxycroceū, algete conf. Auic. prima qn. emplastrum Oribasij ex mes. empl. de melliloto, de styrace uiatici in. 6. trac. oleum uetus anethi liliorum alborum amygdalarum dul. de capparibus, oleum irinum, benedictum, nic. masticinum de ben. & c.

### De pronosticis scirrhi.

Auic. tertia quarti cap. ij. & purum sephiros, quod habet colorem plumbi & est uehementis tentationis, & duritie et fortasse super eum est lanugo quædam, hoc est illud cui nō est sanitas, & est quoddam ex eo cuius color est color corporis, & permutatur de membro ad aliud, & nominatur ferinos, & est durum magnum, quod non sanatur, neque permutatur unquam, & quandoq; sephiros canceratur & c. Bac. in cancerum abit si imprudenter medicus nimium humectantibus usus fuerit, nam in habentibus symbolum inquit Aristo. facilis est transitus & c. Gal. 2. ad Glauc. cap. 4. Scirrhus exquisitus qui omnino sensu uacat, curationem non recipit, præterea durities quæ a nimia corporis exsiccatione prouenit, penitus insanabilis est & c.

### Auth. dissidentientes circa scirrhum.

- 1 Adserere omnem scirrhum esse posse cum dolore.
- 2 Adserere scirrhum substantiali differentia a cancro differre.
- 3 Adserere cum Dino omnem scirrhum quod aliquem sensum habet & dolorem esse cancerosum.

### Confutatio dissidentium circa scirrhum.

Ad primum Gal. 14. metho. cap. 6. Scirrhum nominamus tumorem durum qui sine dolore est, non tamen omnino sine sensu, idcirco scirrhus siue exquisitus siue non exactus dolore



uacat, nisi forte cum phlegmone uel erysipelate coniungatur, quod rarum est. Ad secundum respondit Auic. secunda. 1. ca. de egrit. comp. quod neque multum distat quin differentia inter cancrum & duritiem existat per accidentia inseparabilia & non propter differentias substantiales & c. Bac. intellege tu ac si diceret quod cācer & scirrhus adeo affines sunt, ut differentijs substantialibus non differant eo quod uterq; ab eadem radicali materia oriatur, sed tantum accidentibus inseparabilibus, quæ sunt pulsatio inflammatio, punctio, dolor, & uenarum apparentia & c. quæ in scirrho, sicuti in cancro esse non possunt. Ad tertium. Non solum facit authoritas Gal. sed & Dino ipsa aduersatur experiētia, quum hoc fieri possit quod aliqui scirrhus inueniatur erysipelatodes, uel phlegmonodes, qui adhuc sensum & aliqualem dolorem retineat, sicuti in praxi quotidie uisitur, & tamen carcinodes non sit, idcirco Dinus sua pace dixerim, in hoc ualde decipitur & c.

De cancro & eius diuisione.

Quod a Græcis καρκίνωμα, siue καρκίνος dicitur, & a latinis Cancer, a cancro scilicet fluuiatili ex eo nomē suscipiēs, quod in colore & branchijs tenacibus similitudinem præferat, est in duplici differentia, nam interdum sine ulcere & latens siue occultus dicitur, interdum cum ulcere, & in extremis plerūque partibus oboritur. Idcirco definiunt, quod cancer sit tumor inæqualis liuescens circum circa durus ac malignus sine ulcere, uel ulceratus cum dolore uel indolens, & in aspectu teter & c. Hoc; plures corporis partes occupat. præcipue fœminarum locos & mammæ oculos nares aures faciem labra palatum collum inguina splen & iecur & c.

Loci consentientes de cancri definitione  
ac diuisione.

Gal. 2. ad Glau. cap. 10. sæpe uidimus tumorem forma &



figura cancro animali consimilem. Nam quemadmodum in isto pedes ex utraq; parte corporis sunt, ita in hoc morbo uenæ distenduntur, ac figuram omnino similem cancro representant. uide in hoc latius Auicennam. 3. 4. cap. 15. ibi. Videtur quod apostema sit nominatum cancer propter unam duarum rerum, aut propter suā tenacitatem cum membro, aut propter formam suam & c. Aet. ser. 16. cap. 43. Dux sunt supremæ cancerorum differentia, quidam enim sine ulcere, quidam cum ulcere consistunt, qui sine ulcere sunt, ab omnibus fere ueteribus occulti appellantur, Philoxenus tñ cancrum occultum priuatim nominauit, qui in utero ac intestinis esset, Bac. simili sententia est Gal. apho. 6. cō. 38. ibi. cancrōs occultos dixit, uel eos qui sunt sine ulcere, uel absconditos, hoc est nō apparentes & c. Paul. lib. 6. cap. 45. Cancer tumor est inæqualis oris prætumidis aspectu teter, liuidus & indolens interim si ne ulcere, quem latentem Hip. noīauit, interim ulceratus etc. Quod circum circa durus & malignus sit hoc testatum reliquit Gal. in lib. finit. med. quem uidere poteris, quod autē foeminarum locos & mammas, & partes quascunq; corporis occupet, ultra Paul. Cels. lib. 5. demonstrauit dicens, id uitium fit maxime in superioribus partibus circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarū, & in iecore, et in splene etc.

#### De causis ipsius cancri.

Causæ primitiue cancri sunt, quæcunq; humorem melancholicum, crassum, ac adustū generare possunt, causæ antecedentes sunt, succus crassissimus, siue atra bilis, quæ si citra feruorem fuerit cancrōs sine ulcere, at ubi acrior existat cum ulcere eos generabit. Causa coniuncta est ipse humor cancrōs actu efficiens etc. Loci consentientes de causis cancri.

De causa primitiua uidetur aliqd tetigisse Gal. 2. ad Glac. 10. ubi in Alexandria inquit plurimos tali morbo corripi



propter uictus modum & regionis feruorem. Comedunt. n. farinam elixatā et lentem et cochleas & plura salita et carnes asininas & alia quædā crassum, et atrabilis humorem generantia. hoc idem adserit 3. de temper. cap. 3. ibi. Gignitur non raro alijs ex uitioso cibo, alijs ex quaptam in ipso corpore corruptella & c. idēmet etiam in lib. de atra bile ca. 4. legere poteris. De antecedente causa loquitur Auic 3. 4. ca. 15. ibi, cancer est apostema melancholicum de melancholia adusta a materia cholericā, aut in qua est materia cholericā cū qua cōbusta est, non a pura fœculenta etc. Bac. ut intelligas Auic. scias uelim quod duplici modo atra bilis efficitur adusta, uel qñ in propria essentia aduritur, uel qñ ex adustione flauæ bilis nascitur. species autem atræ bilis, quæ a flaua bile uehementer assata generatur deterior satis est q̄ quæ ex sanguine crassiore originem trahit, ut Gal. 3. pronost. cō. 29. demonstrat, idcirco Auic. a materia cholericā, aut in qua est materia cholericā dixit, ut deteriorem melancholiæ speciē denotaret. Gal. 14. metho. ca. 17. Tenuissimus est humor qui herpetem exulceratum excitat, crassissimus qui cancrū, et in lib. de Tum. præter naturam ca. 8. Verū citra feruorem atra bilis cancrōs constituit, atq; eos cū ulcere ubi hæc acrior fuerit. uide etiā illum in lib. de atra bile cap. 4. & omnes causas ad unguem intelliges.

De signis cancri.

Tumor cæcrosus non facile dū adhuc incipit percipitur. nā adeo exigua atq; cōfusa sunt eius rudimēta, ut facile uulgū latere possint. incipiunt. n. cū tā parua mole, ut uix ciceris, uel fabæ magnitudinē æquēt, at quum magnus effectus sit cancer adeo euidentis est, ut ne puerum quidem clam sit, tuncq; cognoscitur ex duritie, colore liuido inæqualitate uerucosa, & ex uenis in circuitu tumentibus, quæ modo instar pedum cancri animalis effigiem representant, modo minime uisuntur.



Hic tumor tactus præmenti digito renititur, interdum dolores late diffusos & pungentes infert, alias etiam in alijs eos non generat, plus etiam satis nigricat q̄ inflammatio cum calore tamen non ita ingenti, at ulceratus, purulentum uirus satisq; foetidum effundit, & iugiter erodens cum cohiberi non possit alta ac profunda penetrat labri q; prætumidis ulcera inæqualia sordida & grauitèr olètia præ se fert, quæ uix nisi manus opera interciderit curationem admittunt.

Loci consentientes de signis cancri.

Gale. 14. meth. ca. 9. Vitium quod modo describimus alias confusa exiguaq; quæ uulgū fortasse latere possint, affert symptomata, alias ita uehementia & magna & cunctis euidentia, ut ne puerum quidem clam sint, quum autem adhuc incipit nihil miri est si uulgu lateat, non secus profecto q̄ styripes, quæ e terra iam exeunt, quando hæ quoque peritis tantum agricolis cognoscuntur & c. Itidem ait Auic. tertia quarti, cap. 15. ibi, & in primis cum accidit est occultæ dispositionis, & quando apparet in principio ambigitur esse eius, & est sicuti faba parua & c. Gal. in lib. de tum. præter naturam, cap. 8. nigriores sunt colore cancri omnibus quæ inflammatione infestantur, & minus calidi uenæ in his replentur & tenduntur magis quàm in ipsis inflammationibus & cæ. Hoc idem repetit cap. 13. eiusdem lib. ubi inquit quod si atra bilis mordax fuerit, cutem circumpositum exedit, & uirus effundit. De cancro ulcerato habes plurima signa ex Paulo lib. 3. cap. 67. ibi, exulcerato cancro præter dolores & c. Auic. loc. cit. & quandoq; reducit eum ad ulcerationem curatio eius cum ferro & ponit ei labia grossiora & duriora & c. Vide in hoc latius Aetium ser. 15. cap. 43. ex Archigene & Leonida, & de cancro tam sine ulcere quàm ulcerato plura intelliges, ibi, Cancro itaque non ulcerato & c. De ulcerato autem



inquit. At uero ulceratus assidue erodit, et ad profundum suffodit, nec sisti potest, & saniem emittit omni ferarum ueneno deteriore, copia & odore abominabilem &c. Vide etiam Cel. lib. 5. ibi circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur &c. Gal. 2. ad Glauc. cap. 10. ubi in molem satis insignem attollitur, nemo sine manus opere potuit curare etc.

#### De curatione canceri

Curatio canceri non ulcerati trinas duntaxat indicationes in se continet, quarum prima est humoris, a quo uitium progreditur, euacuatio, Altera uero erit prohibitio (si fieri potest) ne de cetero humor atrabilaris generetur. & in uenis colligatur. Tertia est ut locus affectus repulso ac discusso humore in eo præter naturam contento, sane integer restituatur. Vacuatio igitur ut pluries repetitum est, tum per sectionem uenæ tum per ea quæ humorem melancholicum purgant, fieri poterit. Sectio conueniet plurimū, si ætas uires & cætera huiusmodi permiserint, eiusque interdum uicem supplebit menstruorum ac hæmorrhoidarum euacuatio, si minus purgantibus medicamentis quæ atrabilem uacuandam faciant, (facta tamen aliquali præparatione) utemur, non erit igitur incongruum si in primis diebus simplici medicamento purgante quale est ipsum epithymū, uacuabimus. Nam quatuor eius drachmæ infero lactis aut mulsæ propinatæ, si tertio quoque die exhibeantur, maxime conferunt. Quod si hoc non profuerit, nihil prohibet quo minus ad composita in hac re ualentiora te conferas, qualia sunt, quæ nuper in scirrhi capita demonstrauimus quibus etiam annumerantur & hiera Ruffi et Medicamenta nonnulla Gal. Auic. & Razes in capite de melancholia descripta, Interim ne illius regulæ menses obliuiscaris, quod sensim blande & per interualla non semel & simul astatim in hoc morbo uacuandum est. Secunda uero in-



dicatio, quæ ne humor melancholicus colligatur prohibet, ea sanè perficietur, si in sex rebus nō naturalibus, nihil sit, quod non refrigeret ac humectet. unde uictus ratio in primis frigida & humida instituatur. cibariaq; tum probi succi, tumq; tenuem ac probum sanguinem generent, assumantur, cuiusmodi sunt omnes carnes auium exceptis palustribus, pisces petrosi, & ex oleribus malua, atriplex, bletū & cucurbitæ, sed ubi caliditas loci superabundauerit, & succus ptisanæ copiosus, & interdū lactis serū maxime proderit, tertia indicatio quæ humorem iā in particula contentum repellit ac dissipat, certe absoluetur, si primū locus affectus dum totum uacuatur corpus, ita roboretur ac firmetur, ut ne quid redundantis humoris melancholici ad eum confluat, & si quid iam confluxit discutiatur, uerū quia & ad discutiendum & repellendum materia inepta est, sed contumaciter repugnat, idcirco medicamenta ea eligenda sunt, quæ in reprimendo ac discutiendo mediocria sint, & qualitate non mordicantia alioqui si uehementiora fuerint ac diximus, periculum est, ne materia inuenis cōtenta magis crassescat & contumacior reddatur, nec mordicantia sint inq; ne malignitas humoris ex mordacitate irritetur ac effrenet, conducunt igitur & solani succus, & ex metallicis uflis et elotis, tucia plumbū, cerussa, & quæ ex his componuntur, ut diapompholix, diapalma, emplastrū de cancris Auicēnæ quæ nisi profuerint, tunc cancer aut blādius satis placādus est, aut per manus operā auferendus, aut nullo modo curandus erit. in exacerbatione igitur placandus est cū emplastro, quod recipit rosas melilotum semen papaueris omnia cum passo trita coquito, & cū uitellis ouorum mixta subigantur, prosunt etiam folia althææ cocta & imposita, similiter cataplasma ex folijs plantaginis semine papaueris & psyllij cum dactylis pinguibus & adipe anserino subactum



utiliter adhibetur. Quod si cancer per medicamenta non ce-  
dat, si quando per sectionem eum curare ausus fueris, post to-  
tius humoris melancholici purgationem, id totum quod ui-  
tium est, abscindes, eo tamen modo ut nulla canceri radix su-  
persit, & sanguinem eousq; fluere permittes, quo etiā te pre-  
mente, uicina partes ipsum crassiores detrudunt, moxq; can-  
crum aliorum ulcerum modo curabis, cancrum uero occul-  
tos, nec per sectionem, nec uersionem tentabis, sed potius inta-  
ctos eos relinques & c.

Loci consentientes de cura  
canceri.

Gale. 14 metho. cap. 9. Communis indicatio est, ut humo-  
rem unde uitium est natum, illico uacues, mox prohibere po-  
tissimum si fieri potest, ut de cetero eiusmodi succus in uenis  
colligatur sin id fieri nequit. saltem eum omnino ex interual-  
lis euacuare, & simul particulam firmare, nequid humorum  
redundantie ad eam confluat & c. & sicut res sunt curandi in-  
dicationes. Auic. tertia quarti cap. 16. loquens de uacuatione  
dixit, & iam antecedit mundificatio corporis per solutio-  
nem uentris ex materia mala, & phlebotomia, & sumat in  
potu multis uicibus inter quas sint dies pauci quaq; uice qua-  
tuor aureos epithymi cum aqua casei, aut aqua mellis aut de-  
coctionem epithymi in syrupo acetose & c. Gal. 2. ad Glauco.  
cap. 10. itidem habet ibi, quod si etas & uires peruiserint  
sanguis prius mittendus est, & menstrua in mulieribus euo-  
canda & c. hoc idem dicit Paulus libro. 4 cap. 26. ubi epithy-  
mum in sero lactis uel mulsæ exhibitum laudat, & hieram  
quæ nigrum ueratrum recipit. De secunda intentione loqui-  
tur Gal. 2. ad Glauco. cap. 10. ibi, in uictus ratione succus ptisa-  
næ abundanter exhibendus et serū lactis, ex oleribus malua attri-  
plex, et bletū, et qñ tēpus tulerit, cucurbitis utēdū et piscibus

R. BLANCHARD

PROF. FAC. MÉD. PARIS.



petrosus, & auius omnibus exceptis palustribus &c. Paul. libro. 3. cap. 67. cibus dabitur, qui facile in corporis membra queat distribui, boniq; succi, uinum paucissimum aquosum, acrium esus, & omnis repletio uitanda est &c. De tertia intentione habes plurima ex Gal. 14. meth. cap 9. ibi. post purgationem illud de omnibus eiusmodi affectibus est præceptum, quod uel retro regerere humorem, qui in mēbro procubuit, oportet, uel ipsum digerere. præterea quod in principio quidem tam in ipso purgationis tempore, quàm ante, id repellere, ubi iam totum corpus purgaueris digerere, ubi tamen mediocris purgatio tantum præcessit, mixtum esse quod applicatur pharmacum ex repellente digerenteq; facultate conueniet &c. Auic. 3. 4. cap. 18. quatuor intentiones circa curationem cancri docet, quæ sunt cancri destructio, prohibitio additionis, prohibitio ulcerationis, & curatio ulcerati. Prima fit cum eo in quo est resolutio eius quod collectum est, & expulsio eius quod præparatum est ad colligendum in mēbro, unde ex medicinis bonis laudat mineralia abluta sicuti est tucia &c. Prohibitio additionis fit inquit cum abscissione materiei & retificatione cibi, & confortatione membri cum medicinis repercussiuis notis, & laudat aquam coriandri & emplastrum ex agresta trita. Prohibitio ulcerationis fit cum ijs medicamentis in quibus non est mordicatio, & sunt terra sigillata bolus armena, oleum omphacinum, aqua semperuiue, cerussa cum succo lactuce aut mucilagine psyllij, aut emplastrum cum cancris fluuiatilibus recentibus cum clymia curatio, ulcerati fit cum panno in aqua solatri infuso, & quotiens exiccaur made fiat desuper cum aqua eius etc. Aet. ser. 16. ca. 48. In exacerbationibus non ulcerati cancri rosas melilotum semen papaueris cum passo paululum trita coquito, & cum utellis ouorum subasta imposito &c. Paul. lib. 4. cap. 26. loco



dolenti & præcipue in ulceratis cōmendat succum solatri cū molli linteo impositum & medicamētum, quod ex pompholyge constat, Gal. 14. meth. cap. 9. Cæterum si quando cancrū per chirurgiam curare audebis, expurgato humore melan-  
cholico ubi totum quod uitiatum est, prorsus excideris, sicut nulla supersit radix sines effluere sanguinē, nec propere eum inhibebis, imo premendo potius quæ circa sunt, uenas expri-  
mes ex his crassiores sanguinem, mox alijs ulceribus simili-  
ter curabis etc. Quir aut̃ occulti cancri curari non debeant lege Gal. apho. 6. cō. 38. & rem satis apte intelliges & c.

#### Observationes circa purgationem.

Halyabbas in purgando non eris unica euacuatione con-  
tentus sed sæpe & sæpius purgare oportet, donec cognoueris  
materiam cancrum facientem esse penitus uacuatam, itidem  
ait Gal. 2. ad Glauc. ubi inquit quod tam diu faciendum est, do-  
nec sanitas pristina subsequatur, & ratio uictus optimos ge-  
nerans humores interim adhibeatur & c.

#### Cancro conferentia.

Conferunt cancro, alumen cum lumbricis, puluis antimo-  
nij, cinis cancri marini cum plumbo cancer fluuiialis cum mel-  
le, stercus capræ cū melle, caulis crudus sæpe appositus, cheli-  
donij radix, cerefoliū cū melle. succus et semē draganteæ, hel-  
leborus niger, carica pingues tanq̃ singulare remediū non ul-  
cerato, multipeda cū terebinthina, nasturciū cum albo oui et  
aceto, oleū de iynipero, de fraxino, passule cū ruta, plumbū  
cum oleo, lac tytimali. serpentaria, urtica semen, unguentum  
Arabica de uzifur Auic. cera lota, hieralogodion, hiera Ra-  
zes, confectio hamech, decoctio epithymi, pilulæ de fumo ter-  
ræ, de lapide lazuli, diasenæ.

#### De pronosticis cancri.

Aet. ser. 16. cap. 44. Cancros in pectore obortos omnino



deploratos esse scito, quemadmodum & eos qui in capite collo, humeris sub alis & inguinibus generantur. sunt enim incurabiles, nam præterquam quod perfecte tolli non possunt, sanguinis eruptionis timor incumbit ne ex ea æger inter manus pereat, eos uero qui summitatem pupillæ occupant, affectæ partis sectione facile curaueris & c. Celsi lib 5 non idem periculum carcinoma affert, nisi imprudentia curantis agitur est, & paulopost subdit, neq; ulli unquam medicina proficit, sed adusta protinus concitata sunt, & increuerunt, donec occiderent, excisa etiam post inductam cicatricem tamen reuerterunt, & causam mortis attulerunt & c. Gal. 2. ad Gla. cap. 10. Intentio est tumorem præter naturam, qua partibus sanis adhæret abscindere. sed ob uasorū magnitudinē, quum præsertim fuerint arteriæ profluuij sanguinis statim periculum imminet, quod si laqueis eas circumprehendas insequuntur, si autem & morbi radices exurere statuas, neq; huic rei maximum periculum deest, quum prope loca mortalia fit insignis adustio & c. Hippo. apho. 6. apho. 38. Cancros occultos omnes melius est non curare, curati enim cito pereunt, non curati uero longius tempus perdurant. Bac. Cancros occultos uocat, qui in penitioribus corporis partibus latent, sicuti in palato, in sede, & in sinu muliebri, quos nec sectione, nec unctione, nec aliter curandos consulto dixit, siquidem isti medicamentis, uel aliter irritantur breui homines interimunt & c. Paul lib. 4. cap. 26. Hoc malum planè propter succi crassitiem non consanescit, utpote, quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat, tãq; maleficum est, ut mitiora negligens remedia, uehementioribus irritetur & excandescat & c.

Auth. dissentientes circa cancros.

1 Adferere cancerum de uno in alium locum mutari.

2 Adferere,



2 Adferere caneros qualescunq; sint non esse curandos.

Confutatio dissentientium circa caneros.

Ad primum dicit Gal. in lib. de tumor. præter naturam capi. 8. quod humor qui caneros gignit, ob sui crassitiem, non ex uasis in circumiectam carnem delabatur, hoc est de uno in alium locum non mutatum. Obiectio. Alterius opinionis fuisse uidetur Quidius Quum expresse dicat

Vtq; malum late solet immedicabile cancer

Serpere & illas uitiatis addere partes.

Serpere. n. non potest cancer, nisi de loco ad locum mutetur.

Respon. Serpere hic accipitur pro paulatine crescere, si quidem cum cancer incipit, paruus est, moxq; adeo crescit ut ingentem locum occupet sed locum non mutat. Ad secundum Gal. 2. ad Glau. cap. 10. inquit, quod cancerum in principio saepe sanauit, & tunc præsertim quum atræ bilis humor admodum crassus uidebatur existere, nam sic purgantibus medicamentis ex quibus sanitas sequitur, prompte succumbit.

Obiectio. Quo modo hoc fieri potest, quum Albucasis uir in hac re non spernendus dixit se non potuisse sanare aliquem, nec alium quemquam uidisse, qui ad id peruenerit?

Responso. Cancer dum incipit, si in loco corporis existat, in quo possit fieri eius eradicatio, nec de incisione uenarum ingentium uel neruorum timor sit facile curatur, & de hoc non intellexit Albucasis, sed de cancro maligno ac confirmato cū dixit, & quando antiquatus & confirmatus fuerit, non oportet, ut appropinquetur ei & c. cuius rei dubium nemini est, quod non curetur.

De inflationis definitione ac diuisione.

Quod a Græcis ἐμφύσησις siue alio nomine ἐμπύκνωσις, & a latinis inflatio dicitur, excrementia quædam est tumori similis a flatu inspirato concepta qui modo sub cute, modo

BBb



Sub pelliculis ossa & musculos contegentibus colligitur interdum circa uentriculum intestina peritoneum, oculorum palpebras & testium scrota subigitur &c.

#### Loci consentientes de inflatione.

Nomen emphysema idem fere significat ac si diceret ex crescentiam, quæ non aliter quàm siquid cum oris spiritu imple-retur, prouenit, sed de hac re uberius legere est Gal. in libro isagogico, ubi *ἐν τῷ περὶ τῶν ὀφθαλμῶν* inquit est excrescentia oculi simi-lis tumori, & fit cum oculus tumefactus maiorem contraxe-rit pallorem & inflationem &c. Obiectio. Differt ne emphysema ab empneumatosi? Respon. Differt tantum ratione loci & non materiæ, quippe emphysema in locis abditis clam delitescit, empneumatosis uero palam om-nibus sese patefacit, uterq; tamen affectus a flatuoso spiritu na-scitur. Paul. lib. 4. cap. 28. inflatio ex flatuoso spiritu nunc sub cute, nunc sub membranis quæ ossibus circundantur aut mu-sculos, aut aliquod uiscus includunt, collecto, nascitur etc. hoc idem ait Gal. 14. meth. cap. 7. & subdit, porro colligitur ali-quando & in uentriculo & in intestinis, et in medio horum spatio & peritonei &c. Itidem habet Aet. ser. 15. cap. 2. & ita sentit Auic. tertia quarti, ubi de apostematibus uentosis men-tionem facit. Vide etiam Gale. 4. de uic. in morb. ac. cō. 21. ibi inflatio bifariam est, nempe collecto in quibusdam cavitati-bus uel sensui expositis &c.

#### De causis inflationum.

Causæ inflationum effectrices & primariæ sunt quæcun-que natura flatuosa sunt, sicut legumina aqua &c. Causæ uero antecedentes sunt calor parum ualidus cibos uel humores pi-tuitosos resolueri non ualens uel ipse cum suapte natura in flatum transeat id, eoq; fit, si calor uel extremæ imbecillita-tis, aut nimium potens non fuerit, sed quodammodo inter has



affectiones medium obtineat. Causa retenti flatus est uel crassities membri uel constipatio pororum eius, aut quia flatus nimis ex se crassus & nebulosus exire a membro absque medici ope non potest. Causa coniuncta est ipse flatuosus spiritus in aliquo membro inclusus.

Loci consentientes de causis inflationum.

De causis proegumenis consule neotericos practitantes. nam frustra esset omnia in unum congerere, de causis antecedentibus loquitur Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2. ubi spiritum uaporantem in uentriculis oriri inquit, quum uel humores pituitosi, uel cibi ab imbecilli calore in uapores resoluuntur, & paulopost subdit, quod calor in cibos agens si parum ualidus fuerit, ut eos quodammodo dissoluit, ita omnino non conficit, atque hinc flatus siue spiritus exoritur, atque hoc fieri inquit, si neq; calor per extremam imbecillitatem, neq; cum uehementes sunt ei uires. sed quum medium inter has affectiones obtinet. De causis retenti flatus lege Auic. tertia quarti, ca. 19. ibi. Retinetur propter spissitudinem suam & crassitiam, aut propter eius quod continet crassitiam & pororum constrictionem &c. Paul lib. 4. ca. 28. Membrorum autem densitas tum spiritus simul crassities efficit, ut idem spiritus non dissipetur &c. De causa synectica habes locos ex Gal. & Paulo & Actio in locis supra allegatis, quos ipse consulito. Auic. tertia quarti, cap. 19. De apostematibus uentosis aliud fit a uapore leui & similatur aestuationi, aliud fit a uapore uentoso &c. Bac. hic locus Auicennae adeo deprauatus est, ut uix possit intelligi quid pro aestuationis uocabulo inferre uoluerit, nā antiquus codex habet aestuationi gentilis, excitationi, Andrea Bellunensis althebegi. reddit rationem gentilis quod excitationis uocabulo usus sit Auicennas, quod pro specie oedematis Razes. 13. cont. frequenter habet, significareq; dixit eleuatio.



nem, quæ in cachexia fieri solet, sed quo modo hoc in malo habitu cum sit levis uapor ut supra, eleuationem pariat ut ipse gentilis refert, adhuc imaginari non possum, levis siquidem uapor facile discutitur, nec præuiam dispositionem præbet ad hydropem ut cachexiæ nomine demonstratur, nec etiã possum capere, quo modo apostema flatulentum æstuationi, id est feruori, ut sonat uocabulum, assimilatur, idcirco nec codex antiquus in hoc mihi satisfacit. Demum quicquid sibi uelit Andreas Bellunensis pro althebegi tametsi plurima Arabum nomina perscrutatus fuerim, adhuc diuinare non potui. Scio tamen inter Arabica nomina inueniri alterbel, quod ab aliquibus interpretatur inflatio accidens in extremitate, ab alijs quod sit inflatio ex permixtione uaporum cum substantia membri, quicquid horum fuerit, certo mihi magis arri-det, quàm altera interpretatio. Quod si impressoris uitio hoc factum sit, ut pro alterbel, legatur althebegi, non castigationi Andree, sed potius typographo adscribatur.

#### De notis inflationum.

Inflationes facile deprehenduntur ex tumore tactui reni-tente, nam dum inflatio comprimitur non minus ac uter in flatus comprimentis tactum impellit, nec impressionis uesti-gium posthac relinquitur. Interdum etiam dum percutitur so-num instar tympani elidit. luceſcitq; locus inflatione affectus, & quandoq; per totum corpus modo huc, modo illuc flatus impellitur, iuuaturq; æger maxime si ructum uel crepitum tunc emittat &c.

#### Loci consentientes de notis inflationum.

Gal 14. metho. cap. 7. Differunt inflationes ab œdematis, quod pressæ digitis non retinent uestigium, siue *μη βοδινώδεις*, & sonitum ueluti tympanum reddunt &c. Auic. tertia quar-ti cap. 19. & est ei impulsio & uiciſſitudinaria accessio, &



Et fortasse causat sonitum percussio ipsius cum manu et proprie quando inuenit spatium ad quod aggregatur, sicut stomachus & intestina &c. Vide in hoc latius Aet. ser. 9. cap. 27. plura signa recitantem ex Archigene, praesertim si partes stomachi inflatio occupet, nam nimis longus forem, si omnia ad unguem recensere uoluerim, nec esse possum ut ille pingens in paruo totum uolumine mundum, in fine tamen inquit Aet. quod acri leuantur alimento inferne subeunte, et flatibus per ructus siue per intestina exclusis &c.

#### De inflationum curatione.

Inflationes una duntaxat indicatione remouentur, quae curationis omnium communis est, ut id quod praeter naturam in quocunq; loco sit, euacuetur. Sed particulariter tribus potissimum scopis curari solent, quorum primus est caloris imbecillis roboratio. Secundus est materiae crassae & flatuosa extenuatio. Tertius est densitas meatuum corporis reseratio. At haec minime fieri possunt, nisi & recte uiuendi norma tradatur, efficiaturq; interim ut proba concoctio euadat, ac flatuolenti spiritus materia fouens extirpetur. Fugienda igitur quam primum sunt omnia crassa flatuosa humida, cruda, ac uiscosa, ut legumina castaneae fructus &c. quorum loco subeant calida attenuantia ac flatum discutientia, porro ipsa concoctio proba efficietur, si uirtus concoctrix cum rebus aromaticis, quale est aromaticum rosaceum, Diacuminum &c. roboratur, uel si ea extrinsecus adinoueantur, quae hoc idem possint efficere, ut oleum de spica de absinthio de mentha, & quaecunq; simul & semel flatum discutere & concoctionem adiuuare apta sunt, at in extirpatione materiae flatum efficientis maior satis opera danda est, quam in reliquis siquidem uarietas loci affecti, ac flatuosi spiritus crassities et tenuitas, alia atque aliam curationem exposcunt. Si igitur flatum in intesti-



nis contineatur, satis constat hunc ex uitiato uictu fieri, idcirco purgatis per clysterem primum intestinis, per ea quæ attenuant ac calefaciunt, quales sunt irrigationes ex oleo, in quo ruta & absinthium bullierint. flatum discutito, confert etiam atque etiam cucurbitula absque scarificatione adinota, at si in musculis ex contusione inflatio retenta sit, non calidis et acerbis (ne inflammationes uel dolores irritentur) tollenda est, sed ijs duntaxat, quæ mixtas facultates habeant, in principio igitur mitigatoria, & in declinatione discussoria adhibebis, ita tamen ne ab alteris ad altera repente transeas, sed detrahis paulatim mitigatorijs discussoria augeto & c. Mitigatoria sunt sapa & sypus oleum & c. Discussoria sunt lixiuium, acetum, nitrum & c. Quod si inflationes antiquatæ fuerint, primū lixiui utitor, mox ijs, quæ molliunt & discutiunt etc.

Loci consentientes de curatione inflationum.

Gale. 14. meth. cap. 7. Indicatio curationis omnium communis est, ut quod præter naturam est euacuetur. in quocunque id contineatur, propria uero post hanc communem est ut tenuissimis & calidis potestate medicamentis utantur & cæte. Quod uero tres particulares sint scopi, habes ad hanc rem iuxta omnes neotericos practitantes communem sententiam. Paul. lib. 4. cap. 28. loquens de curandi intentionibus dixit huc curandi ratio dirigenda est, ut membra rarefacies crassioresque spiritum extenuet & c. Aet. ser. 9. cap. 27. Cibus autem ipsorum diuidatur, ita ut in prandio tertiam, in cena uero reliquas duas accipiant partes fructuum atque olerum humidiorum esum semper habeant suspectam, & multum potum deuinent & c. Lege in hac re Guidonem de cauliaco tra. 2. ca. 4. & quæ fugienda sint circa uictum, quæue assumenda, longa satis digressionem ab ipso intelliges, Ioannes de Vigo lib. 2. ca. 13. inquit, quia inflatio non fit, nisi per errorem cōcoctricis fa-



cultatis, ideo utilissimum esse uirtutem cōcoctricem cum aromaticis speciebus roborare. De flatu in intestinis contento, et de eo qui in artubus & musculis sub cute latet, satis fuse loquitur Gale. 14. meth. cap. 7. ibi, atque in uentriculo & uisceribus, oleum quod tenuium est partium, quodq; rutam habet incoctam id præstabit & c. & subdit aliquando uero cucurbita magnæ, bis, ter uel sine incisione medio uentri affixa prodest & c. lege uberius hunc generali locum, & inuenies quæcunque a me pridem exarata sunt, itidem habet Auicennas tertia quarti cap. 20. nec ulla in re a Galeno discrepat. idē sensit Paul. & Aetius ser. 15. ca. 2. ubi inquit, at uero musculis ex contusione inflatis ex calidorum & acrium usu partes exacerbantur, & auctis inde inflammationibus muscoli magis læduntur ac dolores intenduntur, mixtas itaque facultates habere oportet & c. uide illum si habeat. Sic Gale. loc. cit. Debēt enim contusi muscoli leniri medicamento, cui mixta facultas sit, quæ simul concoquit, digerat, & modice adstringat & c. & reddit rationem huius adstrictionis, quia inquit si nil adstrictionis tale medicamentum habeat, auget aliquādo phlegmonas maxime in his corporibus, quæ sunt plethorica & cæ. Paul. lib. 4. cap. 28. Quare per initia medicamenta, quæ magis leniunt adhibenda, ubi facta est inclinatio ea, quæ digerunt & cæ. Gale. loc. cit. Quæ uero huius generis inflationes inueterarunt, primo ea quæ ex lixiuio componuntur adhibeas. Secundo loco hoc emplasticum, quod ex sordibus gymnasiolorum percolatis, & una cum calce uiua ad luti crassitudinem admixtis componitur & c. Itidem habet Paul. similiter Auicennas & Aetius, hoc idem remedium commendant, quos legere poteris & c.

Inflationes facientia ex Dioscoride.

Inflationes pariunt allium, capparis, glans, castanea, la-



*serpitium porrum, bulbus esculentus.*

*Inflationum remedia ex eodem.*

*Inflationes dissipant aspalathus, amygdale amaræ, absinthium, anisum, anethum, anthemis, althea, costos, cicer, cyminum, eryngion, epithymum, elenium, hyssopum, hieraciō maius, iuncus odoratus, iuniperus, lac, ligusticum, hordeum, ocimum, peucedanum, rapa sylvestris, rhaponticum, triticum, thymoxhalme, urtica, uinacei, uinum chamædryite uinum absinthite & cæte.*

*De pronosticis inflationum.*

*Faciunt ad earum præfagia satis apte quæcunque infra scriptis aphorismis ab Hippocrate describuntur, quum de inflatione, quæ a spiritu flatuoso progignitur, intelligi possint, Hippo. apho. 6. apho. 40. Quibus dolor circa ilium fit absq; inflammatione, ijs febris superueniens soluit morbum. & apho. 7. apho. 53. Quicunque hepar circumdolent, ijs febris superueniens dolorem soluit, Bac. ex hoc Gale. loco conijcere poteris eos qui inflammatione intrinseca laborant, necessario febricitare, unde per uerbum superueniens, etiam declaratur ab Hippocrate nullam fuisse antea inflammationem & c.*

*Auth. dissentientes circa inflationes.*

- 1 *Adserere inflationes esse secandas.*
- 2 *Adserere, ab inflationibus dolorem non posse effici.*
- 3 *Adserere, inflationes quasunque a superueniente febre dissolui.*

*Confutatio dissentium circa inflationes.*

*Ad primum respondet Gale. 4. in morb. ac. cō. 21. dicens, eos importune facere, qui tumores præter naturam in musculis secant, tanquam pus in imo reperiuri, sed nihil aliud præterquam spiritum, qui totam per carnem minutatim disseminatus est, uel thrombos, uel humiditatem uiscosam inue-*



nerunt, & sic talem sectionem tanquam inutilem ualde reprobat, quod itidem Auicennas dixit tertia quarti, cap. 19. ibi, & quandoque existimat homo quod sit apostema indigens perforatione, quare perforat ipsum & ingreditur uetustitas tantum & c. Ad secundum Gal. apho. 7. cō. 53. inquit quod hepar uehementer dolet tum propter inflationem, tum propter spiritum flatuosum, & sic ab inflatione etiam fit dolor, imo ibi subdit Gale quod dolor uehemēs propter flatuosum spiritum accidit. Ad tertium uidetur ratio & experientia in contrarium posita, nā tympanitis quæ a flatuoso spiritu oritur, tantum abest, ut a superueniente febre soluatur, quod etiam magis ab ipsa augetur. itidem dolor colicus, & quæcunq; a copioso spiritu flatuoso proficiuntur, quinimmo spiritus flatuosus ipse nullibi a febre dissoluitur, nisi calor febrilis illius causam superet, & sic non omnes inflationes dissoluntur a febre, sed hæc duntaxat, quarum causa minor satis est febrili calore & c.

## IOANNIS BACCANELLI

## DE CONSENSV MEDICORVM

## in cognoscendis Simplicibus

## Liber.

Quo modo simplicium facultates cognosci possint.

**D**ictum est a Gale. in secundo de simplicibus medicamentis, quod in expendendis simplicium facultatibus, neq; odoribus, neq; coloribus, neque similibus accidentibus fidem adhibere studeamus, sed ijs duntaxat, quæ tum insanis, tum etiam in agris corporibus perspicuo apparent. Non odoribus inquit quia simplicium temperaturæ his



medijs assequi non possumus, tanquam eorum multa sint, quæ odorem, ceu crassam essentiam obtinentia, non habeant, sed et si qua sint odorata, etiam de his, ob inæqualitatem eorum substantiæ, non certo iudicare poteris, quum corpora dissimilari esse substantia a Galeno per rosæ exemplum alias demonstratum sit, multoq; minus ex colore certum quid de temperaturis habere possumus, cum tam calida & frigida quàm humida & sicca in singulis coloribus reperiantur. Erit igitur uia quasi regia, si per experientiam facultates simplicium inueniamus, hæc q; haberi non potest, nisi eorum uirtutem per gustum, (pleraque enim indicat gustus) prius inuestigauerimus, nam omnes gustabilium corporū particule dum in linguam incidunt, singule pro sua natura, sensum mouent, quo fit ut omnia de temperaturis ex gustu facile coniicias &c.

#### De odoribus.

De odoribus nihil in præsentiarum dixerim, cum ita diuersas eorum definitiones inueniam, ut uix sciam, quid certi explicem, aliqui enim aiunt odorem esse naturam sicci euchymi, aliqui quod odor sit fumalis euaporatio quod de mente Aristotelis astruere conantur, sed falso, quum odorare non solum animalibus terrestribus, sed etiam piscibus ab ipso Aristotele tribuatur, qua ratione fieri non potest, ut ipsa fumalis euaporatio, cum sit terræ & aeris peculiaris passio, in aqua generetur, quare alij melius suo modo definientes, dixerunt odorem esse uaporosam diffusionem, quam rursus definitionem, Auerrois ualidissima ratione confutat, quam longum esset recensere, sat tamen nunc sit intelligere, quod hæc uaporosa diffusio potius ad odoris causam se extēdit, quam ad ipsam definitionem, sicuti ex Auicenna secunda primi, cap. 3. intelligi potest, cum dicat, Plurima causa in propinquitate ad uirtutem odorandi est substantia subtilis uaporosa, pro qua re uide



problematum sectionem duodecimam probl. 10. ubi inquit Arist. utrum odoris natura fumus sit an aer an uapor, uide etiam de sensu & sen. post medium, & secundo de anima, et inde odoris definitionē forte capies sat nobis sit, si medice dixerimus odorata esse plerunque tenuia & calida & si tenuitatis & caliditatis quantitas haud nobis nota sit, ut Galenus ubique fatetur &c.

De saporibus & eorum definitione, ac diuisione.

Sapor iuxta Aristotelis placitum, est passio gustus a terre stri sicco & humido. secundam alteratricem potentiam ad actum deducta, & fit teste Aueroe ex comiscella partis siccae cum parte humida, ubi praecipue aliqua ex calore praecesserit concoctio. Hic potest considerari trifariam, uel ratione primarum qualitatum, uel ratione ipsius substantiae illas deferentis, uel ratione ipsius sensus gustus. Primo modo saporum alij dicuntur calidi, sicut salsus in secundo ordine, amarus in tertio, acris in quarto, alij sunt frigidi, ut acidus in secundo, stypticus in principio tertij, acerbus siue intense austerus in principio quarti, alij sunt medij, sicut oleosus, siue pinguis, dulcis, & insipidus, quāquam dulcia, iuxta Galeni dogma inter calida, sed non urentia reponantur.) Ratione substantiae adhuc tripliciter, quia ex tenui substantia, acris & acidus sapor proficiscitur, ex crassa. Austerus quem ponticum uocant, & amarus ex media plures oriuntur saporis secundum magis & minus distincti. siquidem pinguis & insipidus primum, deinde dulcis, mox salsus, & nouissime omnium stypticus, id est adstringens oritur ratione sensus gustus, quia sapor uel gustui insipidus, uel delectabilis, uel omnino abominandus sese offert, insipidus cum sapore careat, tunc non nisi improprie sapor dicitur, sicuti sapor pituitae & cucurbitae, uerum insipidus etiam dici potest, si formam saporis habeat, nedum tamen ad opus



deductam Sapor delectabilis is est qui nullo modo gustum offendit, sed potius ei suauiter delectat, At abominandus is erit sapor qui uel nimium salsus, Amarus, acris, acerbus, aut qualitercunque fuerit partes gustus disgregans, Erunt igitur saporibus iuxta communem omnium opinionem numero octo, Nam Gal. & si septem tantummodo enumeret id sane intellexit, citra insipidum, similiter Aristoteles septem esse dixit, licet in enumerando postea esse octo concludat, Plinius lib. 15. cap. 27 esse decem adserit, & sunt dulcis, suavis, pinguis, amarus, austerus, acer, acutus acerbus, acidus & salsus, Nec discrepat a Galeno. s. quidem iuxta Galeni dogma idem est Austerus adstringens & Acerbus, nec inter se differunt, nisi secundum magis & minus, unde 4. meth. cap. 7. Id uoco inquit austerum quod styphon .i. adstringens, acerbum uero, quod intensum austerum est, Et scito quod Aristoteles uoluit ex Amaro & dulci tanquam extremis omnes saporibus componi, quod itidem de coloribus ex albo et nigro fieri intellexit.

## De actionibus qualitatum gustus.

Qualitater igitur gustus erunt. Adstringentia, Acris, Amara, acida, dulcia salsa. Oleosa, & Insipida. Quarum actiones singulas nunc exarare sane oportunitum Adstringentia ergo quia terrestria & frigida sunt, ideo contrahunt constringunt, densant, repellunt, incrassant & refrigerant exsiccant, Acris uero quia ignea, extenuant, incidunt, diuidunt perpurgant, excalescunt attrahunt & digerunt Amara, quae terrestria tenuia sunt, perpurgant meatus, abstergunt extenuant, incidunt humores crassos absque manifesta caliditate, Acida tenuia frigida, extenuant, incidunt, perpurgant, refrigerant ac reperiunt Dulcia calida non urentia, concoquunt, laxant, rarefaciunt, Salsa terrestria calida, Constringunt, contrahunt, seruant condiendo, & desiccant citra manifestam caliditatem ue-



frigiditatem, oleosa aquea & aeria, humectant emolliunt,  
& laxant, insipida uero eo quod sunt aquea, cogunt incras-  
sant contrahunt constringunt extinguunt & obstupefaciunt etc.

De tertijs simplicium facultatibus.

Iam ex dictis qualitatibus hæ plerunque facultates pulu-  
lant, quæ sunt, emollientia, pus mouentia, indurantia siue ex-  
siccantia, laxantia, emplastica, de obstruentia, abstergentia,  
aperientia, & rarefacientia, condensantia, constringentia, at-  
trahentia, repellentia, anodyna, diaphoretica, catharetica,  
escharotica, epulotica, lac proritantia, menses citantia, uri-  
nam cientia, et sputum facilitantia & reliqua, ad quæ singu-  
la nostra iam iam conuertatur oratio & c.

De emollientibus & pus mouentibus.

Emollientia & pus mouentia utraque calida & humida  
sunt, differunt tamen quia suppurantia similitum corpori  
calorem & humiditatem habent, mollientia maiorem, quam  
pro natura requiritur, calorem & humiditatem, præterea  
suppurantia in nostris corporibus ultra quod similem calo-  
rem obtinent, etiam existentem in eis humiditatem conser-  
uant, at mollientia præterquam quod calidiora sunt etiam in  
partibus existentem humiditatem desiccant.

De indurantibus & exsiccantibus.

Indurantia quum duplicem habeant substantiam terre-  
nam & aqueam, ut portulaca psyllium solanum & c. ex hu-  
mido frigido; temperamento constant, non humido simplici  
ter, sed potius medium obtinent, ex pugnantibus facultatibus  
exsiccantibus scilicet & humectantibus compositum, nam in-  
durant absolute quæcunque refrigerant & desiccant, dici mus  
tamen durum esse corpus quod ex congelatione durefcit, si-  
cuti siccum quod natuum humorem non retinet, nam dura  
fiunt aut ex resiccatione, aut ex congelatione, aut ex nimia



impletione, aut demum ex harum coniugatione, exiccantur corpora citra congelationem in ualidis exercitijs in sole feruenti, ex inedia ingenti, in febre ardenti, & in medicamentis, quæ ita siccant, ut non refrigerent, congelantur corpora a uehementi frigore, implentur a largi tantum humoris affluxu, quæ igitur ex resiccatione durescunt, ea sanè humectatione curantur, quæ ex congelatione per calefactionem, quæ ex nimia impletione, per inanitionem, quæ ex horum coniugatione per humectationem, & calefactionem &c.

#### De laxantibus & tendentibus.

Laxantia proueniunt ex immodice humectantibus sicuti tendentia ex de siccantibus & refrigerantibus laxantium igitur remediaryum, alia humectant, alia calefaciunt, alia emolliunt, alia euacuando ac purgando laxare solent.

#### De Emplastis.

Emplastica media in caliditate & frigiditate collocantur, horum quedam terrestria siccata sine mordacitate sunt, ut exacte lota calx, cerussa pompholix amyllum, cadmia, terra cretensis, cimolio chandrus &c. Nonnulla sunt terrestria & aquea, ut albumen oui, nonnulla aeria ut butyrum oleum dulce, suillus adeps, & cera elota &c. Vocantur emplastica quæcunque medicamenta sua crassitie ac lenticia meatus corporis obstruunt.

#### De deobstruentibus & abstergentibus.

De obstruentia meatus & intima, quibus *ἰσχυρὰ* aduersantur, calida sunt & tenuium partium, ut nitrosa & amara, cutim uero & ulcerum sordes abstergentia pleraq; sunt dulcia & tenuium partium, ut mel, uel ex cerealibus seminibus, eruum, faba, hordeum, lupini &c.

#### De aperientibus & rarefacientibus.

Aperientia quæ *ῥαισθητικά* dicuntur, & rarefacientia si-



ne οἰσχωτικὰ inter se differunt, nam quæ meatus cutis reserant rarefacientia diuinus quæ uasorum ora aperientia, rarefacientium natura tum modice calida tum minime desiccans, tum tenuium partium erit, aperientium uero crassarum partium, tum acris & mordax, nam aperientia sunt acris et terrena ut cyclaminus cepe, fel taurinum & c. Rarefacientia ut chamamelum althea oleum ex cucumere agresti.

#### De condensantibus.

Condensantia siue πυκνωτικὰ sunt quæcunque refrigerant et adstringunt, ut semperuium portulaca psyllium, lenticula palustris, mandragora, cicuta, altercum papauer, quæ stupefaciendi & enecandi uires habent, si his plus quam ratio exposulat usus fueris.

#### De constringentibus.

Constringentia crassarum sunt partium & frigida et aperientibus aduersantur, nempe eorum essentia est terrena & frigida, hinc τερρωδὴς idest cutis conspitiatio, quæ fit uel meatibus obstructis, uel illis ipsis densatis, cuius curatio habetur a Paulo lib. 1. cap. 21.

#### De attrahentibus.

Attrahentia sunt calida & tenuium partium, suntque in multiplici differentia, nam alia sponte nata sunt, ut dictamni essentia & propoleos, sagapeni & succorum cyrenaici & medici, alia attrahunt ex putrefactione, qualis est essentia fermenti, alia qualitatis familiaritate, attrahunt, idque ex totius essentia similitudine, ceu quæ nutriuntur familiaria alimenta attrahunt talium medicamentorum sunt purgantia omnia.

#### De repellentibus.

Repellentia sunt frigida & crassarum partium, nam ut perpetuo calidum attrahit ita frigidum repellit, quod igitur uehementius cum frigiditate partium crassitudinem habet, id uolentius propellit.



## Deanodinis.

*Ἀνὸδυνα* siue *παλινόρμα* sunt in duplici differentia, quædam enim anodyna per se sunt, quædam per accidens, quæ per se anodyna sunt, ea in primo ordine excalefaciunt & coniungunt etiam habent partium tenuitatem, quæ uero per accidens adeo frigida sunt, ut stupefaciant, ueluti narcotica omnia, anodyna per se, si uere anodyna fuerint, nihil prorsus adstrictionis habeant necesse est, sed magis ut digerant, rarefaciant extenuent, concoquant, nam ita anodynâ & sanantem simul facultatem habebunt, soporifera uero siue *ὑπνωτικά* refrigerant corpus & sensum eousque obstupefaciunt, ut si paulo liberius ebibantur mortem afferant, optima igitur erunt quæ una cum frigore desiccant. Nam quæ frigida sunt cum humoris copia, ceu cicutâ, ea potui non sunt utilia, talis est mandragora excepto eius cortice sicco, & altercū præter eius semina.

## De Catharticis.

*καθαρτικά* sunt in duplici differentia, aut enim excrementa corporis expurgant, aut uim attractoriam familiarium succorum obtinent, quæ excrementa purgant, aut id agunt per uomitum, aut per uentrem, aut per nares, aut per urinâ, aut ex pectore & pulmone & c. Differunt tamen hæc inter se, & si purgantia nomine communi appellentur, tum quia diuersimode uocantur, ut errhina, apophlegmatizonta, uomitoria, uretica, bechica, & c. Tum quia similem uim non habent familiarium succorum, attractoriam & c.

## De Cauticis.

Caustica siue *ἐσχαρωτικά*, non modo calida, sed crassæ substantiæ sunt, ita ut corpus ignis instar colliquent, quod si non uehementer caustica, & tenuioris essentiæ fuerint, cū exiguo dolore & morsu, carnem eliquabunt & *σπυγνικά*, id est putrefacientia uocatur, siue corruptiua absq; dolore, nam  
putrefacientia



putrefacientia humectant simul, & calefaciunt, septica uero sunt, auripigmentum, sandaraca, chrysocolla, dryopteris, pitocampe, aconitum &c.

## De Epuloticis.

ἐπουλωτικά, id est cicatricem inducentia, sunt adstrictoria & desiccatoria, sed quæ conueniunt causis ulceribus, mediocriter abstergentia & morfu uacantia sunt, ut myrrha lythargyrus &c.

## De proritantibus lac.

Lac proritātia calida & humida esse debent, sed si uis lac copiosius fluere sanguinem, ad quem propius accedit, tūc contemplatur, quod si sanguis fuerit paucior, humectantem & excalefacientem uictus rationem exposcit, at uitiatus ceu biliosus primum purgationem desyderat, mox uictum, quem modo diximus, si pituitosus, medicamenta requirit excalefacientia in primo, uel in secundo ordine, non tamen desiccantia, & potiora sunt, quæ non tantum medicamenta, sed nutrimenta etiam esse possunt, ut eruca, fœniculum, anethum dum uirent et humide sunt nam sicca, ut apium polium smyrnium plusquàm oporteat excalefaciunt & exiccant, idcirco uitanda sunt, quum magis extinguunt, quàm lac procreant, similiter quæcunque desiccant, & refrigerant, lac prohibent, & quæcunque plus æquo excalefaciunt, & quæ sanguinem uitiant & corrumpunt, & minorem illum reddunt, fugienda sunt, sed ea duntaxat adhibebis, quæ modice calefaciant, nullamq; insignem habeant adiunctam siccitatem, nam talia lac procreant &c.

## De excitantibus menses.

Menses citantia oportet ut excalefaciant, sed non ualenter desiccant, sicuti in lacte generando modice excalefaciāt, sed non desiccant ut dictum est, utraq; urinas prouocāt uerum non omne ureticum inquit Gale. menses prouocat, nec econtra, ut nonnulli uulgares medici affirmarunt. Vide tamē Paulum libro. i. cap. 47.



## De prouocantibus urinam.

Vrinam cientia sunt, calida & sicca, quum serosum sanguinem segregent, crassum uero cogant, ut semina, apij, petroselini, feniculi, dauci, smyrnij, acoron, meon, & assaron.

## De facilitantibus sputum &amp; renes expurgantibus.

Sputum facilitantia, oportet ut sint incidentia, sed non insigniter calida, ne ualide desiccant, ut adiantum. Sicut renes expurgantia sint incidentia, sed non ualde humida, & lapidem incidentia, sed minimum caloris obtineant, ut radices asparagorum, rubi, betonica, polium, & c.

## De particulari simplicium cognitione.

**A** Brotanum duplex, alterum masculum, quod omnibus notum est, alterum femellum, quod uulgo dicitur santolina & est humilis cypressus Diosco. cap. 26. tertij libri uersione Marcelli Gale. 6. de fac. simp. Plin. lib. 21. cap. 10. Paul. lib. 7. ca. 1. facit & siccant in tertio.

Absinthium triplex, uulgare nostrum, Seriphiū, quod marinum appellatur, & santoni cum quod plurimum in Gallia ultra alpes nascitur, & est illud iuxta Mathiolum Senensem cuius semen uulgo dicitur, sementina quæ pro uermibus datur pueris, & nota q. Canabel Serapionis, non est sementina, ut uolunt aliqui, sed est terra arenosa pluuialis, uide Diosco. cap. 24. et. 25. lib. 3. & Gal. 6. de fac. simpl. ubi amarā & adstrictoriam ac acrem qualitatem illi tribuit, Paulus libro 7. cal. in. 1. sic in tertio.

Acacalis nisi sit species tamarisci, haud scio quid sit, quoniam nullū semen uideri potest, quod sit huic simile, lege Dioscor. cap. 103. lib. 1. Paul. lib. 7.

Acatia, non habetur uera, sed eius loco accipitur succus prunioli agrestis communiter, quāquā satius foret folijs rhus sumach uulgo appellati, uti, quam succo prunioli dicti, quo



niam rhus eisdemmet facultatibus pollet, ac ipsa acatia teste Dioscoride. Nec eius gumi, quod à Serapione dicitur gumi Arabicum, habetur, sed eius loco gumi utimur, quod. 7. de fac. simpl. a Gal. describitur. Diosco. 118. cap. lib. 1. Theoph. cap. pi. 4. lib. 3. nam acatiam simpliciter spinam uocat, Plin. lib. 24. cap. 12. Galen. 6. de fac. simpl. siccatur in 3. & refrigerat in secundo ordine, itidem ait Paul. lib. 7.

Acanthion. i. ἀκανθιον, quid sit nescio, & si aliqui carduum montanum pro specie acanthij demostrent. Dioscor. c. 16. tertij. Galen. 6. de fac. simp. Plin. lib. 24. cap. 12. Pau. calidus est.

Acanthum. græce ἀκανθα, domesticum & sylvestre, esse id quod uulgo brancha ursina dicimus, aliqui affirmarunt, uide Plin. ca. 22. lib. 22. & Diosco. cap. 17. & 18. tertij, & Gale. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. discutit & siccatur.

Achillea. i. ἀχιλλειος, non est millefolium, ut putant aliqui ex autoritate Plin. cap. 5. lib. 25. ubi ipse habet a latinis mille folium uocari, Serapio uocat succum achilleæ, eo quod rubeat, sanguinem draconis, qui nunc paratur ex sanguine arietis sorbis & resina & mille alijs miscellis de Achillea. Diosco. c. 34. quarti, Gale. 8. de fac. simp.

Acinus siue ἀκινος, est iuxta Manardi opinionem basilicum sylvestre, & iuxta Ruellium basilicum, domesticum, sed huic oppugnat Plin. cap. 15. lib. 21. quum dicat acinum non florere, de acino Diosco. cap. 45. tertij, Paul. lib. 7. mediocres adstringendi uires habet.

Acorus siue ἀκορος, est secundum Manardum, uerus calamus aromaticus, Brasauola tenet quod sit galanga, aliqui quod sit uulgare gisirium, cōis opinio quod sit calamus aromaticus. De acoro. Diosco. cap. 2. primi, Gal. de fac. simp. & quinto eiusdem cap. 12. Plin. lib. 27. c. 2. Pau. calefacit & desiccatur in tertio.

Aconitum siue ἀκονιτον, uoluit Leonardus Fuchsius esse her-



ban paris sed falso quum nulla sit cum descriptione aconiti similitudo. Leoniceus credidit aconitum esse napellum Auicennae, quum sint res dissimiles, nec adeo peccauit Auicennas in descriptione napelli, prout notat Leoniceus, ut uideri potest, ex Andrea Belunensi qui Auicennae textum optime correxit. De aconito Diosco. cap. 75. & 76. quarti, duas species assignat. prima dicitur pardaliches, eo quod pardos interficiat altera cynoctonon & lycoctonon, eo quod canes & lupos perdat, at mansa uel bibita, radix non statim interficit hominum sed aliquos in duobus uel tribus uel sex mensibus perdit. Gal. 6. de fac. simp. & Diosc. iterum lib. 6. cap. 7. Paul. lib. 7. lethalis uis & excedens est.

Adiantum graece ἀδίατον, est uulgaris capillus ueneris. Theoph. ca. 13. lib. 7. Adianti duae sunt species nigra & alba. uide Plin. cap. 21. lib. 22. Et Diosco. cap. 131. & 132. de adianto & trichomane, uocatur & adiantum politrichon & gallitricon ab ipso affectu, quem circa capillos efficit. Gale. 6. de fac. simp. in caliditate & frigiditate symetron est, extenuat desiccatur & digerit itidem Pau. lib. 7.

Aegylops, siue αἰγίλος, est id quod uulgo dicitur, segala, & non est auena ut aliqui uolunt. Diosco. 134. quarti, Gale. 6. de fac. simp. Paul. discutit duras inflammationes.

Agallochon. i. ἀγαλλοχόν, est lignum aloes, nunc habetur Venetijs, & nuper eius loco afferebatur, ex rhodo, oliuastrum, quod a Ruellio Aspalathum creditur, Diosco. cap. 21. primi, Gale. nullibi quod sciam, nisi in succidaneis mentionem facit. Pau. lib. 7. locinerosi dysenterici & pleuterici opitulatur.

Agaricum siue ἀγαρίκον, notum est, ideo appellatum, eo quod abundanter in Agaria sarmatiae nascatur. Plin. libr. 16. cap. 8. Nascitur in Gallia super arbores glandiferas, Dioscor. ca. 1. tertij, In Galatia Asia supra cedros, sunt qui dicant in Italia



iuxta laricis arboris radices nasci, Gal. 6 de fac. simp. Pau. digerit crassos humores & incidit.

Ageraton siue ἀγερῶν, sunt qui dicant in Hetruria inueniri simile origano. Diosco. cap. 57. quarti, & Gal. 7. de facul. simp. & 6 eiusdem, Paul. lib. 7. habet uim digerendi,

Allium græce σκόροδα, notum est omnibus, duplex est domesticum & syluestre domesticum σκόροδα a græcis dictum, syluestre σκισσοπόδοι. i. anguinum, non autem ut Brasauola scorodoprason uel ampeloprason, nam ampeloprason nil aliud est, quam porrum syluestre, quod in uineis reperitur, & scorodoprason allium & porrum significat: Diosco. cap. 141. secūdi, Gale. 8. de fac. simp. desiccatur & calefacit, in quarto excessu, uide etiam illum secundo de fac. alimentorum in fine.

Alcea. i. ἀλκία, herba nota est dicitur uulgo malua syluestris siue althea syluestris, non habet proprium caput apud Gal. sed in cap. de malua, de hac mentionem facit septimo de fac. simp. Diosco. ca. 155. tertij, uolunt aliqui hanc esse, quam uulgo dicunt herbam ungaricam, Paulus libro. 7. syluestris malua genus est.

Alypū, siue ἀλυσον, quid sit nescio, Hoc scio plures de mente athuarij uelle alypon esse turbit album, nam hoc ab ipso habetur, ubi de triphera compositioni agit, aliqui dicunt alypon esse alypiam, ut Paul. 22. aliqui dubitant an sit fena, Dioscor. cap. 173. quarti, Paul. bilem atrā semen alypi ducit et ulcerat.

Alyfina græce ἀλυσμα, nisi ea sit, quā Ruellius & Fuschius fistulam pastoris, & ab alijs plantaginem aquaticam, quæ uulgo dicitur barba syluana, affirmare nequid audeo, aliqui dicunt esse speciem betæ aquaticæ: Diosco. ca. 160. tertij, & Plin. cap. 10. lib. 25. duas species assignat, Damasonium etiam uocatur a Gal. 6. de fac. simp. & habet uim absterforiam.

Alifon, siue ἀλυσον, sicut ex Plin. cap. 11. 24. lib. excerptur



uidetur esse herba, quæ rubia minor dicitur, uerum quia Aet. alison uocat syderitim heracleam quæ nullam præ se fert similitudinem cum rubia minori, ideo quid sit affirmare non possum, de hac meminit Diosc. cap. 96. tertij, & Gale. 6. de fac. simp. Nonnulli tamen duas species assignant, inter quas facile posset rubia minor connumerari, uerum ea quæ moribus canum opitulatur deperdita est, nec reperitur Paul. lib. 7. siccatoriam illi ac discussoriam abstersoriamque uim tribuit.

Aloe. i. ἄλν res est notissima, ita ut ubique plantæ eius ad delicias cernantur, cuius tria sunt genera hepaticum succotrinum & cabalinum. Diosc. ca. 23. tertij, meminit de hepatica, & Gal. 6. de fac. simp. desiccatur in tertio, & calefacit in primo, adstringitque modice.

Althea, siue ἄλθα, planta est notissima, & uulgo dicitur maluauschio, meminit Diosc. ca. 154. tertij, Theoph. ca. 19. 9. lib. uocatur & hibiscus, & est malua sylvestris. Gale. 6. de fac. simp. sub nomine hibisci, & 7. de fac. simp. cap. de malua: Pau. lib. 7. discutit relaxat, lenit, & concoquit.

Alumen græce ὑπνία, iuxta Diosc. cap. 77. lib. 5. triplex est scissile rotundum & liquidum, loquendo de his quæ in medicina usum ueniunt (nam plura apud nos genera nunc habentur, sicut alumen rochæ, plumæ, fecis, catini, scaioli, & zucharini) scissile illud est quod nos plumæ uocamus, alumen rotundum non habetur in Italia, nec liquidum quāquam Brasauola affirmat esse alumē rochæ, quem ualidissimis rationibus confutare Mathiolus Sen. conatur alumen zucharinum fit ex alumine roche ouorum albumine & aqua rosacea, alumen catinum fit ex herba uocata soda arabice chali, unde etiam sal alchali peruenit, nota est herba apud hebræos alumen scaiolum fit ex petra lucida scamosa & transparenti, uulgo dicta, spechio d'asino, alumen fecis fit ex fece uini coacta. Gal. 9.



de fac. simp. Plin. lib. 35. cap. 15. Pau. maxime adstringit.

Ambrosia siue *du Beorla*, iuxta Rueliū notissima est in Galia, nascitur inter segetes, uerum eam nec uidi, nec scio quid sit, nisi sit species artemisiae, Diosco. ca. 120. tertij, & Gal. 6. de fac. simp. adstringit & repellit.

Ambræ odoriferae tres sunt species colore distinctae, citrina. s. albida & nigricans, cuius mentio fit a Serap. lib. aggreg. cap. hambar. Auic. lib. 2. calida in secundo sicca, in primo roborat cerebrum & cor confortat, nullibi q. sciam fit mentio de hac apud Dios. uel Gal. aut Pau. uulgo dicitur Ambracane.

Amiantus graece *λίθος αμιανθος*, lapis est qui ex Cypro affertur, similis alumini scissili, similis etiam ligno, unde Brasauola dixit esse aliquos qui eum credant esse lignum crucis Christi, nam in igne positus non comburitur, sed magis illucescit. meminit Plin. cap. 19. lib. 36. & Diosco. cap. 113. quinti libri. Paul. libro septimo.

Amylum graece *αμυλον*, res est notissima, dicitur uulgo, uoce parum deflexa amido optimi amyli conditiones recitantur a Plin. ca. 7. lib. 18 ut sit albus leuis recens lenis, fit amyllum ex granis frumenti, ut Diosco. cap. 92. lib. 2. Et Gale. 1. de fac. alimentorum, excerpitur ex Plin. ca. 25. lib. 22. quod amyllum corpus restringit, & fluxum sanguinis, & in doloribus uesticae media unctia sumitur cum oleo & passulis. Gal. primo de fac. alim. *αμυλον*, id est qualitate carentem, Paulus refrigerat mediocriter & siccatur.

Ammi. i. *αμμι*, Septasarij hoc dicunt ameos, & est simile semen cymino, ut testatur Plin. cap. 15. lib. 20. & Gale. 6. de fac. simp. huius meminit, & Diosco. cap. 63. tertij, Quod uero accipitur per ammi non est uerum, sed quid sit nescio Pau. calefacit & siccatur in tertio. Gal. 5. de fac. simp. itidem ait.

Ammoniacum graece etiam *αμμωνιακον* uulgo dicitur in of-



ficinis dicitur armoniaco, & est duplex iuxta Pli. c. 24. li. 12. primum thrausma dictum & altero est excellentius alterum phyrama, & est crassum & ueluti resina, Primum thuris similitudinem præfert, unde a Paulo & Aetio ammoniacum thymiana nuncupatur, meminit Diosco. ca 89. tertij, & Gal. 6. de fac. simp. Auer. 5. collig. calidum in tertio, siccum in primo, Paul. lib. 7. molliendi uires habet.

Amomum, i. ἄμωμον uerum nonnulli uolunt esse rosam de hierico, non uerum, esse quoddam semen habitum, sed credo uerum non haberi, si recte eius descriptionem perpendamus, utemur igitur loco amomi, acoro ut placet Gale. Diosco. ca. pi. 14. primi, Plin. lib. 12. ca. 13. Gal. 6. de fac. simp. Pau. lib. 7. eiusdem uirtutis cum acoro, sed paulo siccioris.

Ampelitis terra, græce γῆ ἀμπελίτις, sicuti & terra heretria samiachia selinusia, sunt apud me incognita. De ijs Gale. 9. de fac. simp. diffuse & Diosco. c. 138. lib. 5. Paul. lib. septimo.

Ampeloprasson, siue ἀμπελόπρασον i. agreste porrum, uulgo dicitur porandello, de hoc Gal. 6. de fac. simp. meminit & Diosco. 139. secundi, Pli lib. 24. cap. 15. Pau. lib. septimo accerrimum calidissimumque in summo ordine quamobrem ulcerat.

Anagallis græce etiam αἰ ἀναλλίς, est herba quæ alio nomine dicitur morsus gallinæ quāquā non defuerint, qui anagalidem, portulacā syluestre esse affirmarunt, aliqui et dixerunt anagalidem esse pauarinam, uel centonem, sed longe a uero decipiuntur, quum flores illis non sint eius qualitatis ac ab ipso Diosco. pinguntur, cap. 170. secundi, de utraq; anagalide scripsit Gal. 6. de fac. simp. Deceptus est Razes interpretans anagalydem pro matrisylua, Pau. uis est abstersoria sub calida, et attrahitrix, Serapio lib. aggre. calefacit parum & siccatur sine mordacitate.

Anagyris est græce ἀγάρις, planta est aborescens aliquibus



herbarijs ualde cognita, hanc uoluerunt quidam esse quam dicunt uuluariā, refert Mathiolus eius copiā inueniri in Trentino agro, ego eam minime uidi, de hac Gale. 6. de fac. simpl. meminit, & Diosc. ca. 158. tertij, Plin. lib. 27. cap. 4. Pau. lib. 4. calefacit & discutit.

Anchusa, siue ἀρχουσα, quid sit, ut ingenue fatear, nescio, audiui a quibusdam pluribus in locis nasci, & flores habere a buglossa non ualde dissimiles, huius tres species a Diosc. ca. 25. 26. & 27. lib. 4. cōnumerantur, & a Plin. cap. 20. 21. lib. 22. Et a Gal. 6. de fac. simp. quatuor species, Pau. adstringēdi uim habet aliqui hanc Asini lactucam dixere.

Androsamon, siue ἀνδροσαμῶν, i. humani sanguinis herba, notissima est, nam est species hypericonis, differt ab eo, quā frutex sit gracilibus ramulis furcosus puniceo colore, rubentibus uirgis &c. ut Diosco. cap. 164. tertij, & Gale. 6. de fac. simp. Pau. li. 7. duplex genus alterum quod diximus, alterum dionysias dictum, cuius fructus purgant & folia desiccant.

Anemone, siue ἀνέμων, nisi ea sit, quæ a Brasauola uocatur papauer syluestris, cuius flores sunt rubri, certe nescio si unquam uiderim, hoc certo scio non esse herbam uenti, ut Ruelius, nam herba uenti iuxta placitum Simonis Ianuensis est parietaria, quod uulgo dicimus uitriola, aut grassella, sunt qui anemonem uiderint longe a papauere syluestri differentem. Diosco. cap. 167. secundi, Plin. lib. 21. cap. 23. Paulus libro septimo, uim habet acrem abstersoriam, & extrahendi ac recludendi ora uasorum.

Anethum græce ἀνῆθον, res est notissima, quæ ita similē feniculo effigiem præfert, ut uix ab ipso, nisi per gustum cognoscatur, meminit de anetho Gal. 6. de fac. simp. & Diosco. cap. 60. tertij, Pau. lib. septimo calefacit in secundo ordine intensius & siccatur paulo remissius.



Anisum, siue *ανισον*, res nota & uulgaris est, de hoc mentionem facit Gal. 6. de fac. simp. semen suum dicens esse calidum & siccum in tertio gradu, & Diosco. cap. 58. tertij, Pau. lib. 7.

Angelica herba nota est calida & sicca in tertio ordine, unice ualet contra uenena, perseverat a peste comesta, confert humori pituitoso crasso, sanat tussim ab humore uisco- so, si eius decoctum bibatur, consolidat ulcera interiorum, coagulatum sanguinem soluit, roborat stomachum, recuperat appetitum, ualet defectui cordis & morsibus canum.

Anonis siue *ανων*, spina est quæ in aratis terris nascitur, uulgo dicitur bognacho, Gale. 8. de fac. simp. anonis calida in tertio gradu & c. huius meminit Diosco. ca. 19. tertij, & Theophras. ca. 5. li. 6. de hist. plantarum, & Pli. ca. 4. li. 27. Pau. li. 7. urinam cit, calculos conterit, & dolores dentium mitigat.

Anthemis siue *ανθεις*, apud Dioscor. est chamomilla, due alie species a me non uise necdum cognoscuntur. Diosco. capi. 145. tertij, & Gal. ca. 9. lib. 3. & sexto de fac. simp. inquit & chamomilla calida & sicca est in primo gradu, Pau. uirtute tenui discussoria laxantiq; constat.

Anthyllis siue *ανθυλλες*, nisi ea sit, quæ uulgo dicitur falsola de mente Ruellij, certe quid sit diuinare non possum, huius due sunt species, de quibus Gale. sexto de fac. sim. meminit & Diosco. ca. 144. lib. 3. Plin. lib. 21. cap. 29. Paulus libro septimo exiccat & abstergit.

Antirrbinon, siue *αντιρρινον*, quid sit nescio, sunt qui uiderint & uulgarem in Italia nasci passim affirmant Dioscor. cap. 128. lib. 4. & Gal. 6. de fac. simp.

Anthera, siue *ανθηρα*, non est flos, ut nonnulli putarunt in medio rosarum positus, sed potius quedam compositio, ut ex Gal. Pau. Cor. cel. elicitor ad oris ulcera, & pedum scissuras, & digitorum pterigia accommodata.



Aparine inter lentes nascitur, omnibus nota est, uulgo, eo quod folia in modum calcaris habet. speronella dicitur, uel ut aliqui uolunt in modum stellæ folia, heret uestibus hominum. Diosc. cap. 95. tertij, Gal. 6. de fac. simp. Pau. libro septimo, modo dice abstergit & desiccatur.

Aphace, siue ἀφάκη, est res similis uitæ, sed non est uitæ, Theoph. septimo, & .11. cap. lib. 6. connumeravit aphacen inter species cicorij, similiter & Plin. lib. 21. sed ca. 5. lib. 27. postea historiam ex Diosc. recitat, quare iuxta Diosc. connumeranda est inter legumina, non autem inter herbas syluestres, Diosc. ca. 137. secundi, Gal. 2. de fac. alim. Pau. lib. septimo, adstringit ualentius siccatur & mediocriter calefacit.

Apion græce σέλιον, satium, nil aliud est quam uulgare dictum petroselinum, ut testatur Plin. ca. 11. lib. 20. Apium syluestre quo utuntur seplasiarij pro uero apio est apium aquaticum, eleoselinum a Diosc. dictum, ut testatur Theoph. cap. 6. libro septimo, non autem est ut placet Ruellio, quod uulgo dicitur il macerone, Petroselinum uero. i. saxatile apium maxime macedonicum, nussiam in Italia nascitur, apium uero hipposelinum dictum. i. grande apium, illud esse tenetur, quod uulgo leuisticum dicitur, De apio meminit Diosc. 67. 68. 69. 70, & 71, tertij, & Gal. 8. de fac. simp. & 6. eiusdem Pau. lib. septimo, tanti caloris est, ut menses & urinas eliciat.

Apios herba quid sit, nam græce ἀπίο etiam dicitur, nisi sit species raphani haud scio quid dicere debeam, Ruellius familiarem herbam esse rusticis Gallie inquit, & communiter ab ipsis edi, sed quum dicat Diosc. uomitum dicere, nescio si illi credendum sit, sunt qui dicant uidisse inter segetes nasci cum folijs rutæ, sed paulo strictioribus & uiridioribus, ego nec uidi, nec scio quid sit Diosc. cap. 170. lib. 4.

Apiastrum græce μύλλιασ φύλλον, est illud quod uulgo dicitur



tur cedronella ouer melissa, ouer muliferno, in passionibus cordis (si Serapioni creditur) multum ualens. Diosc. ca. 109. tertij, & Gal. 7. de fac. simp. utitur pro marubio duplicata do si Paul. lib. 7. uiribus marubio per omnia respondet.

Arbutus graece *κομαπος* arbor similis cotoneo malo, uulgo dicitur in Hetruria albatro: Dioscorid. cap. 143. primi, & Galenus septimo de fac. simp. tur di libenter arbuti fructibus uescuntur in hyeme, Paulus libro septimo acerbae qualitatibus est aduersatur stomacho.

Arction, siue *ἀρκτηον*, & personantia similia sunt nomina, sed quid sit arction, nisi ut Ruellius, sit lappa minor, facile dicere me nescire, quāquam sunt qui lappam minorem dicant a Diosco. uocari xanthion, de arctio loquitur Diosco. ca. 101. quarti, & Gal. 6. de fac. simp. Personantia tamen est lappa maior Plin. lib. 25. cap. 9. Paul. libro septimo, uis tenuis siccat, & mediocriter adstringens.

Argemone siue *ἀργεμώνη*, inter species papaueris connumeratur, ego tamen nusquam argemonem uidi, & si ubiq; nasci Mathiolus Señ. affirmet, hoc bene scio non esse agrimonium siue eupatorium, ut nonnulli Dioscor. cap. 168. secundi, & Plinius ca. 8. lib. 25. De hac apud Gale. nil memini me legisse Paul. abstergit & discutit.

Argentum uiuum, siue *ἄργυρος*, res nota est, duplex artificiale & minerale, sed quo pacto conficiatur lege Dioscor. cap. 64. quinti, Gal. 9. de fac. simpl. nunquam ausus est experiri an foris uel intus applicandum foret, ueluti uenenum mortiferum. Auer. 5. collig. ca. 9. est frig. & humid. Gal. 4. de fac. simp. cap. 18. calidum est & siccum.

Aristolochia, siue *ἀριστολόχεια* rotunda & longa notissima est apud seplasiarios, tertia species eius est elematitis uocata, quae in Italia non habetur, de quarta specie, facit mentionem



Plin. ca 8 lib. 25. & uocatur pistolochia. De Aristolochia me-  
minit Gale. 6. de fac. simp. & Diosco. ca. 4. lib. 3. commenda-  
tur in epilepsia, Paul. libro septimo, calida tenuis abstergens  
sub acris, Auer. cali. & sic. in secundo.

Armenius lapis siue λίθος ἀρμένιος, iuxta Manardi placitum  
raro inuenitur licet Mathiolus Senensis dicat in mineris Ar-  
genti huius copiam inueniri, & dici uulgo uerd'azurro, quod  
nec affirmare nec negare audeo, siquidē sua experientia com-  
probatum refert in ijs omnibus quæ ab antiquis scripta sunt,  
uide Diosco. ca. 59. quinti, & Gal. 9. de fac. simp. & Alex. tral-  
lium, cap. 22 lib. 1. & Plin. cap 6. lib. 35.

Aron siue ἀρών, est species dracunculi siue serpentariæ, &  
passim cognoscitur, uocaturq; in hebræa uulgo gingaro, &  
fit ex eius radicibus aqua ad dealbandam faciem, Diosco. ca  
pi. 157. secundi, & Gale. 6. de fac. simp. Plin. lib. 19. cap. 5. &  
lib. 24. cap. 16 Et Gal. 2. de fac. alim. Pau. libro septimo, calore  
& siccitate est primi ordinis ex terrestri calida & adstrin-  
gente substantia.

Artemisia siue ἀρtemισία, uulgo cermisia palam agnoscitur,  
in hac deceptus est Brasauola confundens Artemiam cum  
partenio uulgo matricaria appellato, cognosco ego primam  
& tertiam speciem, & est apud Regienses in usu. Diosco. ca  
pi. 118. & 119. tertij, Plin. cap. 7. lib. 25. Gale. 6. de fac. simp. cali-  
da in secundo, & sicca in tertio ordine.

Asaron siue ἀσάρον, est id quod uulgo dicitur bacchara, sed  
quid deinde sit bacchara lege eius caput Dioscor. cap. 9. lib. 1.  
Gal. 6. de fac. simp. Plin lib. 21. cap. 6. Paulus libro septimo, si-  
mitem acoro uirtutem habet.

Asclepias siue ἀσκληπιάς, nisi ea sit herba quam uocant he-  
deram terrestrem, aut uincetoxico ut Fuchsius, certe nescio  
quid sit, hoc scio Empiricos pro mirabili potione in uul-



neribus sanandis hedera terrestre uti. Diosc. ca. 97. li. 3. et Gal. 6. de fac. simp. Plin. cap. 5. lib. 27. Pau. libro septimo, calida & sicca tenuisq; substantie.

Aspalathus, siue ἀσπλάθος, quid sit ignoro, quum in Italia non habeatur. sunt qui dicant esse sandalum rubeum, Ruellius tenet q; sit agallochon uulgare, sed quum non præ manibus habeatur, iuxta Galeni placitum in succidaneis pro eo utemur semine uiticis. Diosc. cap. 19. lib. 1. Pau. libro septimo, constat uirtute acri & adstringente.

Asparagus, siue ἀσπράγος, uulgo notus, duplex domesticus & siluestris per se nascens. Gale. 6. de fac. simp. sunt absterfivi, Plin. 10. ca. lib. 20. uisum corroborat & doloribus thoracis & rhenum medetur. Auic. fen. ulti. lib. 4. bonum odorem in toto corpore inspirant, urinam uero male olere faciunt, Pau. lib. septimo, medius in calore & frigidityte.

Asphodelus siue ἀσφόδελος, uulgo apud seplasiarios dicitur affodilo, a latinis uocatur hastula regia, notus est, huius Gale. meminit. 6. de fac. simp. ubi habet q; cinis eius radice facit ualenter renasci pilos, Diosc. ca. 159. lib. 1. Plin. lib. 22. ca. 22. Paul. lib. septimo, uim habet detergentem discutientemq;.

Asplenon siue ἀσπλνον, est uulgare citrach, etiam lingua ceruina est phyllitis apud Diosc. huius meminit Gal. 6. de fac. simp. & Diosc. cap. 142. lib. 3. ait Gal. & si subtilium sit partium nihilo minus non esse calidum frangit lapidem minuit pienem, Plin. lib. 27. ca. 5. Pau. lib. 7. est uirtute tenue, sed non calidum, ut supra Galenus.

Aster atticus siue ἀστὴρ ἀττικός, a multis cognoscitur, in pratis nascens, Serapio non distinxit hunc ab iringo, quoniam utrique flores in modum stelle habent Diosc. cap. 115. lib. 4. et Gale. 6. de fac. simp. uocatur & bubonium eo quod bubones sanat, & uocatur a Plin. lib. 22. cap. septimo, & octauo, cen-



tum capita, Pau. lib. septimo, mixta est uirtutis digerentis et refrigeratoriæ, iccirco bubonibus prodest.

Astragalus, siue ἀστράγαλος, nunquam a me uisus, nec in usu est, huius meminit Diosco. cap. 60. quarti, & Plin. cap. 8. lib. 26. Gal. 6. de fac. simp. Pau. lib. septimo, non ignauiter desiccatur & eius radix adstringit.

Athara græce ἀθήρα, quid sit, declarat Diosco. cap. 83. secundi, esse genus puliculae quod apud teutonicos paratur ex farina lacte & butyro in conuiujs & in cibandis infantibus, Gale. etiam primo de fac. alimen.

Attractyllis siue ἀτράκτυλλις, a Theodoro interpretatur fusus syluestris, ego certe quid sit nescio. scio Hermolaum uelle carthamum syluestrem, cnicum dictum esse attractilidem, Diosco. cap. 98. tertij, Plin. cap. 15. lib. 21. & Theoph. cap. 4. libro. 6. Pau. lib. vii. uisiccante & mediocriter calida pollet.

Attriplex Græce ἀτράφαξ, notissima res est, uulgo trepeæse dicta, quâquam non defuerint, qui hanc herbam esse illam quæ uulgo dicitur spinachia uoluerint, Diosco. cap. 110. secundi, & Gal. 6. de fac. simp. facit eius semen uomere, & purgare corpus per inferiora. Razes refert se uidisse hominem acceptis eius duabus drachmis asselasse usque ad magnam debilitatem Pau. est humidum & frigidum in secundo.

Auellana græce ἀρούρα, nota est, syluestris & domestica. De ijs, Diosco. cap. 146. primi. Gale. septimo de fac. simp. & 2. de fac. alim. uulgo dicitur niciola, Pau. lib. septimo, frigidiore sunt, & austere in ceteris iuglandibus æquales.

Auena græce βρωμος, res est notissima sic quoque uulgo dicitur de hac meminit Diosco. ca. 85. secundi, & Gal. 6. de fac. simp. Plin. cap. 25. lib. 22. Paul. lib. 7. siccatur & modice discutit alicuius adstrictionis compos existens.

Baccharis, non est asaron ut hucusque putatum est a seplâ



fiarijs, nec est scarlegia ut uoluit Brasauola de mente Leonice-  
ceni, quum in radicibus scarlegia bacchari non respondeat  
ut uideri potest ex Dioscori. cap. 46. tertij. quare dicendum  
est baccharum nostris in partibus non haberi, Paul. lib. 7.  
βακχαρις, acris est & odorata eius folia adstringunt.

Ballote siue βαλλωτη, id est marubium nigrum est ualde  
notum adeo simile est mellissophyllo, ut nisi per odorem ma-  
lum agnosceretur, uix id per uisum scires discernere, Dio-  
scori. cap. 109. tertij, & Paul. lib. 7. acris est & ab-  
sterforia facultatis.

Balsamum siue βαλσαμον, uerum non habetur, sed oleum  
antiquum pro balsamo uendunt, de balsamo lege Plin. cap.  
duodecimo lib. uigesimo quinto & Theoph. cap. 6. lib. 9. &  
Iustinus hystoricus lib. 36. & Dios. cap. 18 primi, Gal. 6. de  
fac. simp. desiccatur & excalefacit in secundo excessu & est  
tenuium partium, itidem asserit, Paul. lib. 7.

Barba hirci graece τραγωπιων, in hetruria uulgo dicitur  
fassefrica, herba nota est sunt qui uelint similem esse scandici,  
huius aqua chymico more stillata mirabiliter uulnera recen-  
tia carnis cum syndone applicata sanat. Theoph. ca. vii. lib. vii.  
Diosc. cap. 132. lib. 2.

Bbdellium siue βδελιον, res nota est, uerum quod pingitur  
a Diosco. non habetur, quod magis nicrescit & resinum est,  
magis molli, duplex reperitur Scicilianum quod folijs & ra-  
dicibus palmae assimilatur & uulgo neapoli dicitur cephalo-  
ne, cuius germen adhuc molle comeditur. Et iudaicum quod  
describitur a Dioscoride capite. 61 primi, de primo loquens,  
Gale. 8 de fac. simpl. dum de palma mentionem facit, dixit,  
medullam encephalon uocari, unde corrupto uocabulo uul-  
go cephalone uocatur, Paulus libro septimo, emollit,  
maturat.

Beta



Beta græce τεύτλον, nota est, nam ubique passim nascitur, nigra est & alba, & tertia species, ut refert Mathiolus in agro Trentino inuenitur, quæ rubea est & radices habet carotis similes, comeditur non minus insuavis quam ceteræ radices in acetarijs, Galenus octauo de fac. simpl. Plinius libro 20. capite octauo, & Dioscorid. capite. 12. secundi. succus betæ albæ per clysterem infusus mirum in modum uetrem constipatum soluit etiam si per alia enemata solui non posset, Paulus libro septimo, nitrosam uim habet abstergit iccirco & discutit.

Betonica græce κίττον, notissima res est, habet multas uires quæ ab Antonio musa Cæsaris Augusti medico exarantur, uide Dioscorid. capite primo quarti, & Galenus octauo de facul. simpli. Paulus libro septimo, duas species enumerat, sunt qui uelint calidam & siccam esse ob id quod incidit & subacris est.

Bitumen quod græci ἀσφαλτον uocant, est quædam mixtura cum pice & alijs miscellis, quare ad eam non confert, quæ a Dioscor. recitantur: Nascitur bitumen in Iudea in eo lacu, quo Iordanus fluuius ingreditur, sed de his latius uide cap. de Naphtha, Dioscorides capite. 84. primi, Plinius libro. 35. capite. 15. Galenus secundo de fac. simp. Bitumen in marimortuo inuentum, uim resicatoriam & excalfactoriam habet in secundo ordine, ad glutinationes uulnorum cruentorum idoneum, itidem ait Paul. lib. 7.

Blatæ græce σίλφν, sunt animalia quæ circa molas, & in pistrinis inueniuntur similia grillis uocatis, ualent ad dolores aurium, uocantur etiam blatæ quæ in carnibus porci falsis inueniuntur, sed non sunt quæ a Dioscoride cap. 35. secundi, recitantur, quæ uero circa molas inueniuntur, ab aliquibus uulgo pintole uocantur, uide Pau. lib. 7.



Blitum, siue βλίτον, uulgo dicitur Biedone, duas habet species alteram caloris rubei alteram albi, nullum ferè usum obtinet in re medica, peruertit stomachum, Dioscorides cap. 108 secundi, & Plinius libro. 20. capit. e. 22. Galenus sexto de fac. simp. Paulus libro septimo, frigidum & humidum in secundo ordine.

Botrys herba, siue βότρυς, aliquibus nota est herbarijs, quæ nisi sit artemisia species haud scio plane quid explicem, meminit Dioscorid. capite. 121. tertij, Plinius libro. 25. capite septimo, & libro. 27. capite. 8. Paulus libro septimo, planta est insigniter odorata.

Brassica, græce κράβη, nota & uulgaris est, uulgo dicitur, cauolo, siue uerza, cuius multæ sunt species, ut refert Theo. capite quarto, libro septimo, & Plinius capite octauo libro nono, prima brassica est, quæ magnum habet tyrsum cum longis folijs, est & altera quæ crispa habet folia, & dicitur apiana, alia est quæ caulem habet subtilem cum teneris & tenuibus folijs, est & apud Plinium lagotoria brassica, quam nonnulli uolunt esse id quod dicitur uulgo il capuzzo, sunt & aliæ quæ plures brassicæ species, quas narrare longum foret, semina brassicæ inueterata si seminantur in rapas transeunt, & econuerso, brassica marina est uulgaris soldanella, Vide Dioscorid. capite. 111. secundi, Galenus tertio de facult. simpli. capite. 14. & settimo eiusdem & secundo, de facult. alim. Paulus libro settimo, quæ comeditur siccatur & abstergit, ualentius tamen syluestris.

Britanica, siue βριτανική, nisi sit bistorta, aut betonica, quæ nunc est in usu certe nescio quid sit, Dioscorides capite secundo quarti, Galenus sexto de fac. simp. Plinius libro. 25. capite tertio, uocatur ab Auicenna. Bertanich. Paulus libro septimo adstringit & conglutinat quidam dixerunt esse lapatium acu-



tum, sed decipiuntur.

Bromos herba, siue βρωμος ἡ πικρα, similis est auenæ, & est auena sylvestris, meminit Plin. lib. 22. cap. 25. & Dioscorid. 135. quarti, Galenus sexto de fac. simp. desiccatur & digeritur mediocriter & sine morfu, & primo de facul. alimen. itidem Paul. lib. 7. asserit.

Buccinæ Græce πρῆφυρα, sunt animalia ostracodermata, id est duri corticis & nascuntur in mari sicuti & purpuræ, sunt similes buccinis siue tubis unde dictæ sunt, maiores iis sunt purpuræ & habent liquorem in gulæ uenis, quo infectiores intingendis uestibus purpureum colorem efficiunt, lege Plin. lib. 9. & Dioscor. capite quarto secundi. Galenus secundo de facul. simpl. desiccant sine morfu dum uruntur & in polinem conteruntur.

Buglossum, siue βύλλισσος, id est lingua bouis, nil aliud est, quam nostra uulgaris borago, de hac meminit Galenus sexto de facul. simp. & Dioscor. capite. 123. libri quarti. Paul. lib. 7. humidum calidumq; temperamento est.

Bulbus siue βολβός, uomitorius, nisi narcissi sit species, & bulbus qui edendo est, nisi sit Ascalonia uulgaris, nescio profecto quid sint, Dioscorides cap. 160. & 161. secundi, Scio nostras Ascalonias non esse Galeni bulbos quum acerrimæ sint, nec quales a Galeno scribuntur. Vide Galenum quinto de facul. simp. capite. 22. & secundo de facul. alimen. Paulus libro septimo. Amari ac adstringentis saporis modice est siccatur glutinat uulnera & abstergit. Vomitorius uero multo calidior, uide & Galen. sexto de facul. simp.

Bunium, siue βουνιον, uulgo nauone saluatico, duæ eius sunt species, ut Plinius capite quarto libro. 20. bunion & buniada, huius meminit Galenus sexto de facul. simp. & Dioscor. cap. 119. quarti, Paulus libro septimo, bunium calidum est urinam



et menses ducit.

Buphthalmos, siue βυφθαλμον, id est oculus bouis, non est cotula, ut Fuchsius, sed flos similis chamomillæ luteus est, non circumcirca albus, ut nonnulli huius meminit Dioscor, cap. 147 tertij, Et Galenus sexto de faculta. simpl. Plinius libro uigesimoquinto, capite octauo, Paulus libro septimo, discutit ac durities emollit.

Cacalia, siue κακαλία, quum semen, ut ait Plinius, capite secundo, lib. 25. paruum producat, ac sunt margaritæ parue, nescio profecto diuinare quid sit, uide Dioscorid. capite. 117. quarti, Galenus septimo de facul. simpl. Paul. libro septimo, ualet sicuti cancamus.

Cadmia, siue καδμείς, fit ære in fornacibus accenso adherente fornacum parietibus, et est res quæ nunc uulgo tutia dicitur. Dioscor. cap. 42. quarti, Plinius libro 34. capite. 13. uide Gale. 9. de fac. simp. Paul. lib. 7. desiccatur abstergit et concava ulcera explet.

Calamintha, siue καλαμίνθα, est id quod uulgo dicitur calamento, huius sunt tres species, ut refert Dioscorid. capite. 38. tertij secunda species, uulgo dicitur neueda, nec est ea uulgaris herba quæ dicitur herba gatta, ut refert Brasauola, nec ista herba gatta est tertia species, ut Ruellius putat, quoniam similis est mentastro, non autem urticæ uel melissæ, ut herba gatta, Galenus de calamintha meminit septimo, de faculta. simplic. Paulus libro septimo, nepita calida et sicca in tertio ordine.

Calamus aromaticus, siue κάλαμος αρωματικός, id est, odoratus uerus non habetur, sed pro eo accipitur radix acori, meminit Theophrastus non, de historia plantarum, et Plinius capite uigesimo secundo, libro duodecimo. Et de uiribus canarum, capite undecimo, libro uigesimo quarto. Et Galenus li-



bro septimo, de facul. simplic. & Dioscorides capite decimo septimo primi, Paulus libro septimo calefacit & desiccatur in secundo ordine.

Calx uiua græce ἀσβεστος, præsertim quæ ex fluminum excoctis lapidibus fit omnibus nota est, hæc si diu lota fuerint omnem mordacitatem amittit, & malignis ulceribus prodest Dioscorides, capite. 87. quinti, & Galenus nono de facul. simpli. Paulus libro septimo, adeo uehementer urit, ut cruentam inducat.

Cancamon, siue καλκάνηρος est lacha, & lacha est lachryma arboris Arabiæ, quæ ad nos non affertur, quare caueant, qui dialacha componunt, quid per lacha imponere debeant, nam gumi rubrum quod demonstratur, non est lacha, quum odore careat, nec debent seplasiarij lacha artificiali uti, quæ componitur ex uerzino grana & cremesi, nec uti debent quod uulgo dicitur sanguis di draco in lachryma, quoniam uires lacæ contrarias habet, hic adstringit, illa aperit, Dioscorides capite uigesimo quarto primi, Paulus libro septimo, extenuat, abstergit, aperit.

Cannabis siue κάνναβις, nota omnibus est, duplex satia & syluestris, sed syluestris non sic nota, semen domesticæ genituram extinguit, sed in gallinis contrarium agit, nam quæ ex huius semine pascuntur multa oua pariunt. Dioscorides capite. 156, & 157. Et Galenus septimo de facul. simpli. Paulus libro septimo, semen discutit flatus & ita siccatur ut genituram arefaciat.

Camphora est arboris indici, statura maximi, quoddam gumi, frigida & sicca in tertio ordine, bona cognoscitur, si intra panem calidum reposta resoluitur, uide Auicenna libro secundo, & Serapionem lib. aggreg. cap. de camphora, huius rei non memini quicquam me legisse apud Græcos aut



thores, multas hæc habet species ex locorum diuersitate sumptas.

Capparis, siue καπάρης omnibus notus, quicunque ex Alexandria afferuntur excellētiore sunt, de ijs Galenus septimo de facul. simp. & secundo de facul. alimen. capite. 24. Dioscorides capite. 164. secundi, Theophr. capite quinto libro. 6. Et Plin. capite octauo, libro. 19. Paulus libro septimo, radix extergit, purgat, incidit, discutit & sua acerbitate, contrahit, stringit, & densat.

Cardamomon, siue καρδάμωμον, uerum non habetur, sed quod per cardamomo uenditur triplex est maius, & minus quod nielam dicunt, Tertium uocatur ab aliquibus mele gesta aut granum paradisi, arabice dicitur cordumeni. Dioscor. capite quinto primi, & Plinius capite. 13. libro duodecimo. Et Galenus septimo de facul. simp. pro cardamomo accipitur cyperus, uel myrtus, ut Gale. in succidaneis. Pau. lib. 7. acre est & lumbricos interimit.

Carduus grace καρόλυνος, habet multas species, nam domestici & syluestris sunt diuersæ species, sunt domestici cardones appellati, qui in postrema cena crudi & cocti cum pipere & sale comeduntur, uulgo dicti carchiosoli, de quibus mentionem facit. Theophr. capite quarto, libro sexto, & Galen. 8. de fac. simp. ubi habet quod sunt calidi & sicci in secundo ordine, Diosco. cap. 14. tertij.

Carum, siue καρος, semen est notum, uulgo carui dicitur, meminit Dioscorides capite 59. tertij, & Galenus septimo de facul. simp. calidum siccum in tertio ordine, & 2. de fac. alim. itidem Pau. lib. 7. asserit.

Cassia siue κασία, duplex uera quæ cinnamomum & falsa quæ cassia lignea uocatur, Cassia uero siliqua est cassia solutina ex Aegypto proueniens, sed νασπιά a græcis de hac quicquam



proditum est, quum uero apud grecos legitur cassia, intellige de ea quæ nunc cinnamomum dicitur, Dioscorid. cap. 12. primi, Galen. de antidotis, & 7. de fac. simpl. exiccat & calefacit in tertio ordine.

Castoris siue fibri testiculi, græce καστορος ἄρκυς in usu sunt & cognoscuntur, uerum qui iuxta seplasiarios cernuntur, nō sunt ueri, sed compositi ut refert Plin. ex renum partibus et testiculis in uescis repositi, Dioscorid. cap. 23. secundi, & Pli. 30. cap. 8. lib. & cap. 3. lib. 32. Gal. 11. de fac. simp. de castoreo lib. scripsit Archigenes, Paul. lib. 7. calefacit siccaturq; cum extenuandi uiribus eximijs.

Castanea siue καστανία, res nota est, Galen. 4. de facul. simp. capite septimo, & secundo de facul. alimen. Diosco. cap. 126. primi, uocantur etiam græce λώπιμα, & connumerantur inter glandes.

Caucalis siue καυκαλὶς, secundum aliquos est id quod uulgo dicitur petrosello saluatico, eo q; apio similia folia habeat Dioscorid. capite 128. secundi, & Galenus septimo de fac. simpli. Pau. lib. 7. dauci modo calefacit & siccatur sunt qui uocent caucalim uuam lupinam.

Cedrus siue κέδρος est arbor ut iuniper, sed quid sit cedrinus liquor nisi sit uernix, certe nescio quid dicere debeā, Dioscorid. capite nono primi, & Galenus septimo de facul. simp. Plinius libro 13. capite 5. maior & minor & minoris sunt duo genera lycea & fenicea. Pau. lib. 7. calefacit & siccatur in tertio ordine.

Centaurium maius, siue κενταύριον το μέγα, nil aliud est q̃ rhaponticum uulgare, meminit Plin. cap. 6. lib. 25. & Gale. 7. de facul. simpl. & Dioscorides capite sexto, libro tertio, Paulus libro septimo, Radix est acris calida, & terreæ adstrictionis.



*Centaurium minus* notum est, nam id esse quo passim utimur, certe scio, apud hetruscus dicitur uulgo *bion della*, ob affectum quem circa mulierum capillos facit, *Centaurium* hoc uentrem soluit, non aut maius, ut Arabes, Diosc. cap. septimo tertij, & Gale. ultra particularem tracta. 7 de fac. simp. etiam mentionem facit, Pau. lib. septimo, radix inefficax, sed colliguli ualide & citra morsum siccant.

*Chalcanthum*, siue *καλκανθον*, id est, atramentum sutorium, est id quod nunc uulgo dicitur *uitriolo*, uide Dioscor. cap. 68. quinti, & Gale. 9. de fac. simp. Pau. libro septimo, carnes humiditas absomit siccaturq;

*Chamecissos*, siue *καμαίσις*, nisi sit *hedera* terrestris, ut *Fuchsius*, haud scio quid sit, uerum quum tot *hederæ* terrestris genera demostrentur, certe nescio quæ uera sit, Dioscor. cap. 121. quarti, & Galenus octauo de fac. simp. Plin. libro. 24. capite decimo, & decimoquinto, Paulus libro septimo, flos eius insigniter amarus.

*Chamædaphne*, siue *καμαίδαφνη*, est Dioscor. *laureola*, sed *laureola* non est *mezereon*, un putarunt nonnulli, sed potius *chamælea* Dioscor. Plin. lib. 21. cap. 11. id uocauit *chamædaphnen* quod uulgo dicitur *uinca* per *uinca*, sed postea cap. 15. libro. 24. *chamedaphnen* appellauit, ut Dioscor. cap. 144. quarti, de qua Galenus sexto de fac. simp. uerba facit, Paul. libr. 7. calida & acris est.

*Chamedris* siue *καμαίδρις*, est herba satis nota, uulgo dicitur *Calamandrina*, recens comesta hominem a peste perseuerat, huius meminit Theoph. cap. 10. lib. 9. Gale. 8. de fac. simp. & Diosc. cap. 103. tertij, Plin. lib. 24. cap. 15. Pau. lib. 7. in tertio ordine calefacit, exiccatq;

*Chamelea*, siue *χαμελαία*, & *Thimelea* apud Arabes est *mezereon*: Dioscorides cap. 166. quarti, & 167. quarti, Gale.



lenus octauo de faculta. simplic. uincentem habet qualitatem amaram.

Chamaeleon albus & niger, siue χαμαιλιον δ' λευκόν καὶ σμικρὸν, albus est id quod uulgo dicitur carlina, niger uero in medicinis quæ per os assumuntur, non est mittendus, nam teste Galeno octauo de facul. simpl. nescio quid mortiferi in se habet, Arabes sepe confundunt chamaeleonem cum chamelea, in chameleonis nigri radice nascitur uiscus qui dicitur ixia, & est uenenum, unde quum in Plinio legeris remedia contra uiscum, intellige contra ixiam, Diosco. capite octauo & nono tertij, Gale. 8. de facul. simp. calefacit in secundo & siccatur in tertio ordine.

Chamæpitys, siue χαμαιπιτύς, uulgo dicitur Iua & Regij orbica, cuius tres sunt species a Dioscoride recitatae, uide Dioscoridem capite. 166. tertij, & Galenus octauo de faculta. simplic. expurgat, abstergit, calefacit in secundo, siccatur in tertio ordine.

Chamaesyce, siue χαμαισυκή, nisi sit species pepli haud scio quid sit, interpretatur enim humilis, & terrestris ficus, lege Dioscorid. capite. 164. quarti, Galenus octauo de faculta. simplic. abstergerendi simul & acrem uim possidet itidem Paulus libro septimo.

Chelidonium, siue χελιδόνιον, duplex maius quod uulgo dicitur cerdogna & minus quod uocatur a quibusdam scrophularia minor ob similitudinem, quam cum scrophularia in radicibus tenet, in hetruria uulgo dicitur fauoscello. Dioscor. cap. 172. & 173. lib. 2. Plin. cap. 8. libro. 25. Gale. 8. de fac. simp. chelidonium minus calefacit & siccatur in quarto ordine absoluto. Pau. lib. septimo chelidonium maius calefacit in tertio & ualenter abstergit.

Chrysanthemon, siue χρυσάνθεμον, quem Romani caltam



dicunt, putauit ego olim corrupto uocabulo id esse quod nos uulgo dicimus colta, & est similis chamomillæ, sed quia non omnes conditiones seruat, quas chrysanthemo tribuit Dioscoridi, nunc certe haud scio quid sit Dioscorides capite quinquagesimo sexto, quarti, differt autem chrysantemus a buphthalmio ea quippe differentia, quæ est in capite. 147. lib. 3. & capite. 56. quarti.

Chrysocolle, siue χρυσocolλη, uulgo dicitur borace, & est duplex artificialis & mineralis, quæ uero paratur ex alumine roche & sale ammoniaco, uocatur borace refacto, uiridior est in medicinis excellentior. Dioscorides capite. 58. quinti. Gale. 9. de fac. simp. & Plin. cap. 5. lib. 33. Paul. lib. 7. abstergit, discutit, siccaturq;.

Cichorium, siue ἐγὼς αὐρία καὶ κικύριον, intibuum ue notum est omnibus endiuium uulgo dicitur, siue radechij, & sunt uera endiuium, uide Dioscorid. capite. 121. libri secundi, & Galenus octauo de fac. simp. Vbi inquit endiuium est herba amara, sed multo plus syluestris, quæ ab amaritudine picris, siue cichorium dicitur, Paulus libro septimo, siccatur, refrigeraturq; in primo abscessu.

Cicuta græce κούριον est herba notissima similis ferule, sed mali odoris, huius meminit Dioscorides capite. 77. quarti, & capite undecimo, libri sexti. Plinius capite decimo, lib. 21. Galenus octauo de fac. simp. Paul. libro septimo, habet uires summæ refrigeratorias.

Cinnabaris siue κιννάβαρις, nil aliud est, quàm id quod uulgo dicitur sanguis de draco in lachryma, qui est gumi cuiusdam arboris aphricæ stillans sanguini humano similis, unde nomen habuit, Cinnabaris uero quo nunc utuntur seplasiarij, duplex est mineralis & artificialis, mineralis nascitur in mineris ubi argentum uiuum foditur, artificialis fit ex sub=



limatione argenti uiui, & sulphuris, minium uero Dioscorid. est nostrum cinnabrium, Vide Dioscoridem, capite. 63. quinti, Gale 9. de fac. simp. modice acrem facultatem habet, et adstrictionis quippiam.

Cinnamomum siue κιννάμωμον, uerum non habetur, sed nostrum duplicatum eosdem met effectus, quos uerum cinnamomum efficit, Dioscorid capite decimotertio primi, Vide de cassia Galenus septimo de faculta. simp. calefacit in tertio, non tamen ita desiccet, itidem Paulus lib. 7. ait.

Circea siue κίρκια, nondum a me cognita, nec uisa est hucusque, de hac loquitur Dioscorides, capite. 125. tertij, Galenus septimo de faculta simpli. Paulus libro septimo, calida est eius radix & odorata eius semen lac generat.

Cirsion, siue κίρσιον, nisi sit nostra uulgaris buglossa, ne scio profecto quid sit. Dioscorides capite decimo quarto, libri quarti.

Cistos κίστος, & hipocistos, apud seplasiarios uocatur corrupto uocabulo hipoquistidos, & est succus radiceis tragoponi, id est barbae de becho dicti ad solem inspissatus, & non est id quod habet Dioscorid. capite. 111. & 112. primi, nam est herba saxosis locis nascens, Galenus septimo de faculta. simplicium. Paulus libro septimo, adstringit, & modice refrigecat.

Citria graece κίτλια μηδικα, siue citro mala, omnibus nota sunt, in quorum numero ponuntur, quae nos uocamus limonia & aurantia poma, unde Virg. aurea mala decem misi, uulgo dicuntur arantie, quasi ac dixeris aurantia, Dioscorides capite. 136. primi, Plinius capite tertio, libri duodecimi, Galenus septimo de fac. simp. Pau. libro septimo, semen tertij refrigerantium siccantiumq; ordinis habetur, cortex siccatur in secundo.



Clematitis, siue κληματίτις daphnoides, est herba quae uulgo dicitur uinca pro uinca sed altera clematitis, nisi sit uitis alba, aut flamola uulgo dicta, nescio quid sit Dioscor. capite septimo & octauo quarti, Galenus septimo de faculta. simplicium. Paulus libro septimo, clematitis daphnoides siccandi uirtute pollet, Altera uero clematitis acri & caustica facultate donata est.

Clymenon, siue κλύμενον, sunt qui uelint esse uulgarem saponariam, sicuti & periclymenon, matrisyluam, decipiuntur uero qui credunt matrisyluam & caprifolium esse unum & idem, quum caprifolium sit pixiacantha. Dioscorid. uide de clymeno Dioscorid. capite decimoquarto quarti, & de periclymeno. capite. 15. quarti, & Galenus octauo de facul. simpl. Plin. lib. 25. cap. yij.

Cnicus siue κνίκος a seplasiarijs dicitur carthamo, & ab aliquibus uulgariter Zafarano sarasinesco, Dioscorid. cap. 182. quarti, & Galenus septimo de facul. simplic. & Theoph. capite quarto lib. 6. Pau. lib. 7. Tertij ordinis siccantium est semen purgat aluum.

Condrilla, siue κονδρίλλα, est species cichorii, est & alterum condrilla genus, quod uulgo ab ipsius lacte lattarola nuncupatur, uide Dioscorid. capite. 122. secundi, & Galenus octauo de faculta. simplicium, cap. de endiuiia & cichorio. Plinius libro. 22. capite. 22.

Conyza, siue κόρυζα, uulgo dicitur pulicaria, eo quod pulices enecet, Dioscor. capite 127. tertij, Theophr. cap. 2. lib 6. & Galenus septimo de facul. simplic. Paulus libro septimo, siccatur & calefacit in tertio ordine.

Corallium, siue κοράλλιον, album & rubrum omnibus notum est lithodendron etiam dictum, album rubro frigidius, Dioscorid. cap. 93. quinti, & Plin. capite secundo, lib. 32. Auic.



de uiribus cordis, Paul. lib. 7. ualidam siccandi uim habet, adstringendi uero mediocrem.

Coriandrum græce κάρδιον, omnibus notum, in uiribus eius dissentiunt, Dioscorid. & Gale. nam tenet Dioscorides, capite. 64. tertij, quod habeat uires frigidas, & similiter Auicenna. At Galenus septimo de faculta. simplicium, quod sit tepentis facultatis cum pauilla adstrictione, itidem Paulus libro septimo tenet.

Cornu cerui, siue κέραν κερας, ceruus animal est omnibus notum, de cuius uita & natura legit apud Aristot. 6. & 9. de natura animalium, & Plin. cap. 22. libro. 8. Dioscor. cap. 52. secundi, Galenus lib. 9. de facul. simp. uim habet exiccatoriam, itidem ait Pau. libro septimo.

Cornus arbor græce κεραια, omnibus nota, mas & foemina reperitur, non plantantur apud apum aluearia, ne apes corni floribus uescentes moriantur, Dioscorides capite. 140. primi, & Galenus septimo de faculta. simplicium, exiccat ualenter, ac uulnera conglutinat. Paulus libro septimo itidem.

Coronopos, siue κορωνόπου, id est cornicis pes est, ut placet Manardo, id quod dicitur uulgo herba stella, & non ut Leoniceus est la sanguinella, quæ est species graminis spinosæ, ut placet Plin. capite. 19. lib. 24. & uocat dattilus. Dioscorides capite. 119. secundi, & Plinius libro. 22. id ait, quod Dioscor. Gale. 7. de fac. simpl. Paulus libro septimo creditur prodesse ad colicos cruciatus manducata.

Costus, siue κόστος, uerus non habetur, sed pro costo quædam uulgaris radix uenditur, nec inuenitur dulcis & amarus ut uulgus putat, sed bene albus & niger, nunc Venetijs optimus uenditur, uide Dioscorid. cap. 15. primi, Galenus septimo de faculta. simp. plurimam acrem & calidam qualitatem



simul & facultatem adeo habet, ut etiam exulceret. Paulus lib. 7. itidem refert.

Cotonea mala siue μηλακωδάρια, uulgo pome codogne forte a cydone cretensi oppido oriunda, quæ minora & in partes diuisa citrina & lanuginosa sunt, ceteris meliora, nam odo rem longe alijs suauiore reddunt struthia uero a Galenus appellata, sunt quæ in magnitudine maiora ac carnosiora, habent corpora nec sic citrina ut prædicta conspitiuntur, muliana uero a Plinio dicta sunt cotonea, uulgo pome bastarde appellata, Dioscorides cap. 136. primi, Paul. lib. 7. frigidi & terrestri temperamenti sunt, Gal. 2. de fac. alimen.

Crimnon siue κρινον, est ex tritico uel zea, granū, crassius trituratū quā farina, quo antiqui uice panis uescebantur, lege Dioscorides cap. 81. secundi, & Plin cap. 8. lib. 18. Gal. 7. de fac. simp. & primo, de fac. alim. ubi de zea loquitur Paul. lib. 7. ualde nutrit, ægre conficitur.

Crithmon siue κριθμον, plures existimarūt id esse quod uulgo dicitur fenochio marino, ouer hrrba di san Petro, ego crederem esse mentam florentinam. Dioscorides cap. 118. secundi, Gal. 7. de fac. simp. uis eius est exiccatoria & abstersoria, Paul. lib. 7. idem refert.

Crocodiliō siue κροκόδειον, est speties chamaeleōtis, sed nō est carlina ut aliqui, at quæ sit uera, demonstrare nescirem, Dioscorides cap. 10. tertij, Plin. cap. 8. lib. 22. & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. calidam siccam & discutiendi uim obtinet.

Crocus siue κροκος ab omnibus cognoscitur, is melior existimatur qui ex aquila Abruci affertur Venetiæ, nascitur multo præciosior in multis Lombardiæ locis, sed rarior, Dioscorides cap. 25. primi, & Galenus 7. de fac. simp. Paulus lib. 7. calefacit in secundo & desiccatur in primo ordine.

Cucurbita græce κολοκύνθα uulgo dicitur zucha et est in tri



plici differentia, nam uel est longa rotunda uel lata, ex semine colli cucurbitæ fiunt longæ, & ex semine in parte rotunda contento, rotundæ, sicut & in parte lata latæ oriuntur, crassiores euadunt cucurbitæ si semen cum acumine uersus terram plantetur Dioscorides cap. 123. secundi, & Plin. capi. 5. lib. 18. & Gale. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. humida & frigida in secundo abscessu.

Cucumis Grace *κίκκος*, est id quod uulgo dicimus cucumere ouer cedrone, ut probatur ex Plin. cap. 5. lib. 19. & ex Dioscorides nec est anguria ut uolunt aliqui, omnes tamen species cucumerum melopeponum & peponum ut affirmat Gal. 2. de fac. alimen. uocantur nomine peponis, melopepones sunt nostri uulgares melones, sed quid sint pepones, nisi forte sint quos Venetiis uulgo uocant peponi, haud scio quid sint scio hos non esse angurias, quum seorsum Serapio capita de omnibus faciat, Dioscor. ca. cap. 124. secundi, Paul. refrigerat & humectat in secundo ordine, semen abstergit & incidit, uide etiam Gal 8. de fac. simp.

Cucurbita syluestris, siue *κολοκύνθη* uulgo dicitur colomintida, ualet mirabiliter in asthma & tussi antiquæ & iuncturarum doloribus, oleum in eius concauitate bullitum nigros efficit capillos, nec sinit canos fieri & prohibet eorum casum, auribus sibilantibus medetur, Diosc. cap. 171. quarti, & Gal. 7. de fac. simp. uide etiam Mesuen. Paul. lib. yij. ualidam habet uim purgandi.

Cucumis syluestris siue *κικκός*, est id quod uulgo dicunt cucumere asinino ex quo fit elaterium, decoctum radicis & eius foliorum & succus eius ualet sumopere hydropicis, cum melle abstergit maculas liuidas ex percussione, ualet etiam ad lentigines & maculas faciei. Dioscorid. cap. 149. qu. arti. & Galenus octauo de facul. simp. Paulus libro septimo, ra-



dix detergit, dissipat, & emollit, succus uero siccandi uires habet.

Cupressus græce κυπάρισσος, arbor nota est, quæ formicis familiarissima est, non nascitur ubi sit aqua, nec eius lignum marcescit. Dioscorides capite. 87. primi. & Plini. cap. 15. libro. 24. & Galenus septimo de fac. simp. Pau. lib. septimo, siccandi uires habet absque calore conspicuo.

Curmi siue κερμη, ut refert Plin. ult. cap. lib. 22. est potus, ueluti ceruisia uide Diosco. cap. 79. lib. 2.

Cuscuta tantum iuxta arabes memoratur, & est satis nota herba, habet uim adstringendi confortandi, ualet obstructionibus hepatis, & lienis & sanguinem purificat.

Cyclaminus, siue κυκλαμινος, est id quod uulgo dicitur panporcino, & est omnibus nota una tantum species, altera uero cydaminus dicta a Dioscor. haud certe scio quid sit. Diosco. cap. 153. secundi. & Gale. septimo de fac. simpl. Paul. libro septimo extergit, incidit, aperit, attrahit, & dissipat. Plini. capite nono lib. 21.

Cyanon siue κυανος, puto esse lapidem lazuli inuenitur in ararijs fodinis, & in quibusdam maris littoribus Dioscor. cap. 60. quinti, Gal. 9. de fac. simp.

Cuminum siue κύμινον, satium omnibus notum, uulgo cumino dicitur syluestre uero ut sciam non cognoscitur, nisi sit quod uulgo dicitur rucheta, calidum est, ut placet Gale. 7. de facul. simp. Diosco. cap. 61. tertij, Pau. lib. 7. in tertio ordine calefacit flatum discutit.

Cynocrambe, siue κυνκραμβη, id est canina brassica, nisi sit species mercurialis herbae, certe nescio quid sit. Diosco. capit. e. 184. quarti, Galenus quinto de faculta. simplicium. Paulus libro septimo, lethalis homini est foedi odoris, citra siccitatem digerit etiam.

Cynoglossa,



Cynoglossa, siue κυνογλωσσον, id est lingua canina, duplex est altera a plin. descripta, altera uulgaris quæ uera non est Dioscorides capite. 124. quarti, & Plinius capite octauo, libro uigesimoquinto.

Cyperus, siue κυπερος, duplex alter cognoscitur quum passim in Lombardia inueniatur, altera angulosi iunci radix similis zingiberi, nascitur in India & est uulgaris nostra curcuma uero Serapionis non est curcuma nostra, sed radix chelidonia uide Dioscorid. capite quarto primi. & Galenus septimo de faculta. simp. paulus libro septimo, siccatur, calefacitq; citra morsum.

Cytisus, siue κυτισος, est herba uulgo dicta trifolio caualliano, ouer tribolo impinguntur equi cytiso, & a quocunque morbo liberantur, libentius quàm hordeo equi cytiso uestuntur. Diosco. cap. 108. quarti, & Gale. septimo de facul. simpli, & plin. l. 6. 13. cap. 24. paul. libro septimo, tepida nature & leniter discutientis.

Daphnoides, siue δαφνοειδής, est quam uocamus laureolam, nec laureola est mezzereon, quum sit chamelea Dioscoridis ut dictum est, chamedaphne postea est species daphnoidis, Diosco. cap. 143. quarti, Plin. cap. 15. libro uigesimoquarto, & Galenus sexto de facul. simp. Paulus libro septimo, calida, acris, & subamara est.

Daucus est secundum aliquos pastinaca syluestris, uerus daucus nondum habetur, quoddam aliud a seplasiarijs pro dauco uenditur græce δαυκος. Dioscor. cap. 66. tertij, Gale. 6. de fac. simp. pau. libro septimo.

Dictamnus, siue δίκταμνος, nuper inuentus habetur Venetijs, uerum quod uendunt pro dictamno est species fraxinellæ, quæ nec dictamno Cretenji, uel falso conformis est, sed quæ sit fraxinella nuncupata, quum nullibi ab antiquis metio fiat haud



scio quid explicare debeam, de dictamno scribit Diosc. ca. 32.  
 & 33. & 34. tertij. Gale. 6. de fac. simp. Theoph. cap. 16. lib. 9.  
 Paul lib. 7. uirtutem habet pulegij.

Dipsacus siue <sup>diplosaxos</sup>, siue labrū ueneris uulgo dicitur scar-  
 zo da scarzare li panni, uocatur & inepte a seplasiarijs uir-  
 ga pastoris, sic etiam pandectarius, ubi dipsacum confundit  
 cum ploygonio qui est centinodia siue corrigiola ouer san-  
 guinaria de dipsaco Dioscorides cap. 11. lib. 3. Gale. 6. de fac.  
 simpl. Plin. cap. 13. lib. 24. & cap. 9. lib. 27. Paul. libro septi-  
 mo desiccatur in secundo ordine & nonnullam adstringen-  
 di uim obtinet.

Dracunculus siue <sup>dracunculus</sup>, duplex maior & minor, & est  
 res ab aro differens & alia, uulgo dicitur serpentaria maior  
 & minor, adest alia herba nomine serpentina siue herba ar-  
 gentina quæ in recentibus consolidandis uulneribus mirabi-  
 lis est & in intestinorū rupturis, de dracūculo, Diosc. ca. 155.  
 & 156. secundi, & Gal. 6. de fac. simp. magis calefactoriū &  
 tenuioribus partibus constat ipso aro, itidem, Paul. lib. 7.

Dryopteris siue <sup>dryopteris</sup>, nil aliud sonat quàm quercuum  
 filix, nam similis est filici, sed multo minoribus foliorum in-  
 cisuris, depilat hæc cum radicibus emplastri modo imposita,  
 Dioscorides cap. 181. quarti. & Galenus 6. de facul. simpl.  
 Plin. cap. 9. lib. 27. Paulus uim habet ex edentem, deceptus est  
 Pandectarius credens esse polypodium.

Ebenus siue <sup>ebenus</sup> est species ut aliqui putāt ligni guaiaci,  
 uel sancti appellati, in quorum ordine id melius ac excellen-  
 tius esse existimarunt, quod minus nigricat, ebenus olim in  
 multa fuit ueneratione ut testatur Plin. cap. 4. lib. 12. & de  
 eius uiribus scripsit Plin. cap. 11. lib. 24. Galenus. 6. de facul.  
 simp. Diosco. cap. 114. primi. Paulus lib. 7. uis est ex calefa-  
 ctoria deterforia & subtilis.



Ebulus & sambucus græce ἀμύγδαλον, res sunt notissimæ, aqua ex eorum floribus elicita dolores capitis a uaporibus calidis factos mitigat, succus ebuli ad solem cōcretus ac siccatus pondere unius drachmæ cum decocto iuxta datus dolores podagricos & iuncturarum & morbi gallici tollit, & in enemate positas sciaticis prodest, Diosco. cap. 168. quarti, & Gale. 6. de fac. simp. Plin. cap. 8. lib. 24. Paul. lib. 7. uterque desiccandi facultas habet, digerit, conglutinat & aquam per aluum educit.

Ebur græce ἰβήρα, uulgo auorio, & est dens elephantis, de quo scripsit Aristo. 6. de natura animalium. ebur ualet fluxui albo mulierum cum lacte ex seminum lactuce extracto cum aqua calybeata bibitus, Diosco. cap. 50. lib. 2.

Echion quid sit nescio uolunt aliqui esse buglossum syluestre, flores iuxta folia purpureos in quibus semen est uiperino capiti simile, habet Diosco. cap. 28. quarti. Plin. ca. 19. li. 25.

Echinus græce ἐχινός, uulgo dicitur riccio terrestre, uide eius uires iuxta Dioscor. cap. 2. lib. 2. & apud Razem in tract. 6. animalium. Gale. 2. de fac. simp. Plin. lib. 9. cap. 25. & lib. 32. capite. 1. Paul. lib. 7. fel eius pilos fluentes glutinat, caro discutit & siccatur.

Echinus herba Gal. nisi sit species spinæ albæ, eo quod capitellum simile echino pisci habeat certe diuinare nescirem, quid esset Plin. cap. 8. lib. 23. Gal. 6. de fac. simp. acerba repellit & siccatur, itidem Pau. lib. septimo.

Electrum siue ἤλεκτρον, latini succinum, arabes charabe, & idem est, uulgo dicitur ambra da corone, habet uim retinendi fluores stomachi & uentris. Diosco. cap. de populo nigra. cap. 98. primi, nec est gumi albæ populi ut brasauola, Plin. cap. 2. & 3. lib. 37. post longam improbationem fabularum Ouidij, inquit certum esse electrum gigni in insulis septentrionalibus & cæ.



Elleborus græce ελεβορος, duplex, albus & niger, uocatur etiam ueratrum, & est omnibus notum, cuius usum damnauit Mesues. sed communiter non solum eius infusio, sed etiam puluis nunc in usu est absque alicuius patientis incommodo, radices quum extrahuntur statim purgantur, & abiecta parte interiori cortices tantum ad solem exiccantur, ex quibus deinde fit puluis, uide de eius uiribus actuarium. Gale. 6. de facul simp. & Diosc. cap. 145. & 146. quarti. ualet suffusus felle, scabiei lepre uolaticis. Pau. libro septimo, uterque calefacit & siccatur in tertio abscessu.

Ephemeron, siue εφήμερον, duplex colchicon & ephemeron nuncupatum agrestis iris, cholchicum uero, id est quod nunc dicitur hermodactilus, & est res uenenosa, sed ephemeron dictum est id quod uulgo dicitur giglio matto Hermodactilus uerus ac legitimus non inuenitur, nec ephemera est liliū conualium, ut Fuchsius, Paul. mixtæ potestatis est repellentis & discutientis. Diosco. cap. 82. & 83. quarti. Galenus sexto de simp. fac.

Epithymon, siue ἐπιθυμόν, est thymi inuolucrum apud seplariarios res notissima, & est uerum epithymon quo nunc utimur. Diosco. cap. 172. quarti, & Plin. capite octauo, libro. 26. Galenus sexto de facul. simp. pau. libro septimo, siccatur & calefacit in tertio abscessu.

Epiros græce, ocimum aquaticum uocatur, Dioscor. ca. 30. quarti, & est forte apud Galen. echinum dictum, sexto de facul. simplicium.

Eryngium, siue ἑρύγγιον, notum est uulgo dicitur Rinzzo, nec eryngium est secacul. Serapionis, imo nec istud secacul. adhuc cognoscitur, iccirco qui eryngio uim excitandi uenerem tribuunt, quum nullibi a Galeno, uel Dioscoride hoc dicatur, summopere decipiuntur, uide Dioscori. capite. 22. ter-



tij, & Galenus sexto de facul. simp. plinius capite secundo, libro. 25. paul. lib. septimo, calefacit quidem non manifeste, siccatur uero nec modice.

Eruca græce ῥυζωμορ, duplex sativa & syluestris & ab omnibus cognoscitur, uulgo dicitur Ruchetta in Hetruria, & Ruchula in Lombardia & comeditur in acetarijs. Semen triatum & cum felle bouino mixtum cicatrices nigras, albas reddit, & cum melle maculas faciei & lentigines delet, uide Diosco. cap. 129. secundi, & Galenus secundo de facul. alim. & sexto de fac. simp. cap. de uitice, plin. cap. 13. lib. 20. Paul. libro septimo, flatulenta est & uenerem instigat, sed syluestris ualentior est.

Eruum græce ὀροβος, uulgo orobo inuenitur intra uarias segetes & species uitæ esse profumitur. Orobum uero quod ex Alexandria Venetias affertur non est uerum orobum, Brasauola putauit id esse Eruum quod uulgo dicitur Ruuione, quod a Galeno uocatur ochron, sed decipitur, nam non prouocat sanguinem cum urina ut orobum, Diosco. cap. 100. secundi, Et Galenus octauo de faculta. simplicium. Plinius capi. 25. libro. 22. Paulus libro septimo calefacit in primo, siccatur in secundo gradu.

Eupatorium, siue εὐπατόριον est nostrum uulgare agrimonium apud græcos, sed apud Arabes & maxime apud Auic. & Mesu. sunt diuersa eupatoria, nam quod ab Auic. describitur, id esse uolunt quod uulgo dicitur canuarola. Eupatorium Mes. est quod in Hetruria dicunt herbam Iuliam, quæ uementer uermes interficit, idcirco in compositionibus Auicennæ uteretur suo eupatorio & similiter in Mesu. herba Iulia, & iuxta græcos agrimonio uulgari. Diosco. cap. 39. quarti, Gale. 6. de fac. simp. Pau. lib. 7. tenuem uim & incidentem sine conspicuo calore habet.



Euphorbium siue *εφορβιον*, res notissima, & est quo uulgariter utimur, uide de eius uiribus Mes. & Dioscor. cap. 87. tertij, & Gale septimo de fac. simp. Plin. ca. 7. lib. 25. Pau. lib. septimo uim adurentem habet.

Faba græce *κναπος* omnibus nota, Aegyptia uero ea est quæ uulgo dicitur colocasia, uide Diosco. cap. 96. & 97. secundi, & Theoph. cap. 4. lib. 4. & Gale 1. de fac. alimen. Pau. lib. 7. non recedit multum a medio temperamento in refrigerando & siccando.

Ferula græce *ραφνη* in Apulia maxime cognoscitur ubi lignorum loco comburitur, uide Theophr. lib. 6. & Gale. 8. de facul. simpl. & Plinius capite. 24. lib. 20. & Dioscorides capite. 82. tertij.

Ficus græce *συκα* omnibus nota, satiuæ & syluestres sunt, uide Diosco. cap. 149. primi, & Gale. 2. de fac. alim. & 8. de fac. simp. Pau. lib. 7. aride siccant in secundo maturant detergant ac discutunt, Ficus uero arbor calidi tenuisq; temperamenti, adeo succus foliorum abstergit ut etiam exulceret.

Filix græce *αρίσις*, uulgo dicitur felese, mas & foemina habetur, uide Diosco. cap. 178. quarti, & Theoph. cap. 20. lib. 9. & Plin. cap. 9. lib. 27. & Galenus octauo de facul. simp. Pau. lib. 7. uim siccandi & amaram habet foetus corrumpit lumbricos enecat.

Flos æris res est diuersa a uiridi ære, quo passim utuntur seplasiarij pro flore æris, nam est pars arist tenuissima ex uapore æris fusi eleuata, quæ uero ui quædam excutitur, ærugo æris dicitur & est æs uiride. Dioscorid. cap. 45. quinti, Plin. cap. 2. lib. 34.

Feniculum græce *μαράθηρον* duplex, domesticum, & syluestre, Domesticum omnibus notum, uide Dioscor. cap. 74. tertij, & Gale. septimo de faculta. simp. Plin. libro. 20. cap. 13. &



Gale. 2. de fac. alim. Paul libro septimo calefacit in tertio, siccat in primo ordine.

Fenugracum græce τῆλυ omnibus notum, buceras a corniculis suis a Theoph. uocatur, Gale 8. de facul. simp. Dioscor. cap. 93. secundi, Plin. cap. 19. lib. 23. pau. lib. septimo calidum in secundo, siccum in primo.

Fraxinus græce μελία, res est notissima, ualet uenenis serpentium Dioscor. cap. 93. primi, Theoph. cap. 11. lib. 3. uide de eius uiribus plin. cap. 8. lib. 24. paul. lib. 7. Morsui uiperarum folia succurrunt, ligni ramenta ferunt esse lethalia.

Fumaria græce καπνός uulgo dicitur fumus terræ, omnibus nota, uide Mes. de eius uiribus, & Dioscor. cap. 105. quarti, Gale. septimo de facul. simp. pau. lib. septimo, acris, & amara est eo dicta q. lachrymas eius succus eliciat.

Fungi græce μύκητες omnibus noti, de quibus agitur iuxta Dioscor. cap. 81. quarti, Gale. septimo de facul. simpl. frigidos & humidos eos appellat. plin. cap. 3. lib. 19. pau. lib. 7. frigidi & humidi, nonnulli exitiosi præcipue putridæ qualitatis participes.

Galbanum siue χαλβαίν, uulgo galbina liquor est cuiusdam plantæ nascentis in syria ferule, Dioscorid. cap. 88. tertij, & Galenus octauo de faculta. simpl. calidum in primo, tertij, & siccum in primo, secundi ordinis. plin. cap. 26. lib. 12.

Galiopsis, siue γαλιόψις, herba est similis urticæ, & est secundum aliquos urtica fetida, uulgo urtica mortua, ouer quella ortica che ha le machie bianche, At secundum Fuchsum est scrophularia, sed reuera scrophularia non fetet ueluti urtica mortua. Vide Dioscoridem capite. 90. quarti, Plinius libro 27 capite. 9. paul. libro septimo, dissipat & emollit scirrhusos humores.

Gallion, siue γαλλίον quo lac coagulatur, herba est similis



lis rubie minori, quæ aparine dicitur, alia certe a præsurâ uocata Dioscor. cap. 91. quarti, & Gale. sexto de facul simpl. Paulus libro septimo, siccandi uim cum mediocri acrimonia habet.

Garrus, siue γαῖρος est iuxta Diosco. quod uulgo dicit salamoia, sed apud Plin. capite septimo, lib. 31. erat condimentum ex interioribus gari piscis maceratis & cum sale resolutis, paul. lib. 7. calefacit & exiccat.

Genista græce στανίον, uulgo genestro, & est herba satis nota ex quo aliqui funes parant. Dioscor. cap. 152. quarti, Galenus octauo de facul. simp. & Mesues inter alia sua solutiua. Plin. cap. 9 lib. 24. Paulus libro septimo semen & flores per inferiora purgant.

Gentiana, siue γέντιανή, herba omnibus nota, aqua eius radicis per balneum mariæ elicitæ, febres opilationum sanat, uermes interficit & sæpe lauando maculas faciei omnes repurgat, Dioscor. capite tertio, tertij, Plin. capite septimo, lib. 25. Gale. 6. de facul. simp. Paul. libro septimo, extenuat, perpurgat, abstergit, & aperit.

Geranion, siue γέρανιον, est herba gruaria, quæ in summitate habet caput gruis, cuius species sunt tres, una latinorum, quæ est id quod uulgo dicitur rostrum gruis, & aliæ duæ græcorum inter quas est pes columbinus, & alia quæ folia maluæ similia habet, Diosco. cap. 122. tertij, Plin. cap. 6. lib. 16. paul. libro septimo, radicem habet esculentam, quæ inflammationes uteri dissoluit.

Gingidium, siue γινγίδιον, nisi sit quod uulgo cerofoglio, ut putat Ruellius & Fuchsius, nescio certe quid sit, nam in Cilicia & Syria nasci traditur Dioscor. cap. 126. secundi, Gale. sexto de fac. simp. & secundo de facul. alimentorum. Paul. libro septimo, non habet calorem manifestum, sed siccatur in



tertio, & adstringit.

Git græce *μελαγχίον*, siue nigella idem sunt Brasauola uult id esse quod uulgo dicitur gitone, aliqui uolunt esse, quod uulgo dicitur rosola, aut id quod pro nigrella a seplasiarijs uenditur, nam omnia indicia præter colorem habet, uide Dioscor. capite. 84. tertij, Galenus septimo de faculta. simpli. plin. capite decimo septimo, libro uigesimo, Paulus libro septimo, in tertio calefacit & desiccatur.

Gladiolus Plinij est acorus, sed gladiolus Dioscor. est, cuius flores in Hetruria dicuntur Monacaccie græce dicit *εμφιον*. Dioscorid. cap. 22. quarti, & Galenus octauo de facul. simp. Pau. libro septimo, radix trahit, discutit, & siccatur.

Glaucium, siue *γλαυκίον* est, quod Arabice dicitur memithe a Serapione & ab Auicena. Nota tamen duo esse in Serapione capita, alterum de glaucio græcorum, alterum de celidonia minori, Dioscorid. cap. 91. tertij, Galenus sexto de facul. simplicium. Plinius cap. 10. lib. 27. Paulus libro septimo, adstringit, & manifeste refrigerat.

Glaux, siue *γλαυξ*, nisi sit, ut Ruellius quod dicitur uulgo galega, siue ruta capraria, quid esset profecto nescirem, ualet enim galega in peste, & ad uenena serpentum epilepsiaeq; si eius succus ad mediam ontiam bibatur, sed quia galega lac non facit multiplicari, dicere possem non esse glaucum, uide Dioscoridem cap. 136. quarti, & Galenus sexto de facul. simpli. Pau. libro septimo, calida & humida temperamento est, unde lac generat.

Glycyrrhiza græce *γλυκύριζα*, uulgo regolitia omnibus nota Theoph. uocat eam sciticam, cap. 13. lib. 9. & Galenus sexto de faculta. simp. Dioscorid. cap. 5. tertij, Plinius capite nono lib. 22. Paulus libro septimo, tepidi, humidique temperamenti aliquid adstrictionis particeps.



Gramen græce ἄρπυρις, multas habet species, sed apud nos due tantum inueniuntur. Altera s. communis, altera quæ uulgo dicitur sanguinella ouer capriola, nota tamen non habere proprietatem ullam contra uermes ut communis erat opinio, Dioscor. cap. 31 & 32 quarti, Gale. 6. de facul. simp. Plin. cap. 19. lib. 24. pau. lib. 7. siccatur & modice refrigerat tenuis & subacerbæ substantiæ.

Halicacabus est apud Arabes Alchechengi, & est species solatri, uide igitur fusius de speciebus solatri, ca. de solatro.

Halcyonium, uulgo spuma maris a seplasiarijs dicitur, cuius species quinque enumerantur a Dioscor. cap. 90. quinti, plin. capite nono, lib. 32, non nisi quatuor species recensuit, ego quum essem Venetijs uix duas species uidi. Gale. 11. de facul. simp. quinque etiam memorat pau. lib. 7. abstergit, discutit acri qualitate præditum.

Harundo græce καλὰρος quinque species habet, ut Dioscor. sed plin. species. 29. enumerat, cap. 36. lib. 16, & cap. 11. lib. 24. uide Theophr. cap. 12. lib. 4 & Gale. septimo de facul. simpl. Diosco. cap. 99. lib. 1.

Hedera græce ἡδέραι, tres habet species, & omnes cognoscuntur, qui maiorem de hedera lectionem cupiunt, legant Theophr. cap. 18. lib. tertij, & plin. cap. 34. lib. 16, & Galenus septimo de fac. simp. & Dioscor. cap. 171. secundi, De hedera terrestri lege chamecissos, paul. libro septimo, hedera contrarijs constat uiribus adstringit refrigerat, acris est et calida aqueæ substantiæ & tepide.

Hedysaron, siue ἡδύσαρον, est herba quæ inter aphacen, id est uitiam nascitur, unde Theophr. cap. 8. lib. 8. inquit, q. hedsaron est, ueluti aphacæ pestis, sicut lolium tritico, uocatur et securidaca eo quod semen in siliquis contentum ancipiti securi simile habeat. Dioscorid. cap. 137. tertij, plinius capi. 17.



libro decimo octauo. paul. libro septimo, amarum est & leuiter adstringit.

Heliochryson, siue *ελιχρυσον*, nisi sit quod a nobis dicitur *geryophilum hispanicum*, haud scio quid sit, uide Diosco. ca. 55. quarti plin. cap. 25. lib. 21. Galenus sexto de facul. simp. sub nomine amaranthi, facultatem habet incidentem & extenuantem unde grumos sanguinis liquat, ac dissoluit, paulus libro septimo, itidem asserit.

Heliotropium, siue *ηλιοτροπιον*, duplex maius & minus, maius apud nos uulgo dicitur *Mirafsole*, apud hetruscos dicitur *uerucaria*, & uulgo herba da porri, quoniam porros dissipat, ualet etiam mirabiliter canceris idcirco dicitur etiam herba canceri, uide Dioscor. cap. 185, & 186 quarti. pau. lib. septimo. Maius calidam, siccam & abstergentem uim habet, minus uero lumbricos interimit.

Helxine, siue *ελξινη*, uulgo uitriolo secundum aliquos, alij dicuntur esse speciem inuolucris, quod flores in modum campanae albos fert, Dioscor. cap. 37 quarti. credo ego uere q. sit paritaria, uide Gale. sexto de facul. simp. & plin. cap. 25. li. 21. pau. libro septimo, uis est abstergendi & leuiter adstringendi cum humiditate subfrigida.

Hemerocallis siue *ημεροκαλλις*, est liliū syluestre, non autem liliū conuallium, ut uolunt nonnulli, Germani utuntur lilio conuallio in corroborando cor cerebrū & omnia membra spiritualia, ualet etiam tremori cordis epilepsiae & apoplexiae morsibus & puncturis uenenosorum animalium, Dioscor. cap. 128 tertij, Gale. 6. de fac. simp. Pau. lib. 7. radix uiribus lilio respondet, uide etiam Plin. cap. 21 lib. 21.

Hemionitis siue *ημιονιτις*, herba est apud me incognita, nec est scolopendria illa quae dicitur lingua ceruina, quā sit phyllitis apud Dioscor. uide de hemionite, Dioscori. cap. 143. tertio



tij, Paulus libro septimo, adstringit & simul amara, lienosis succurrit.

Hiberis siue ἰβερικῆς, duplex, altera Democratis, altera a Paulo & a Plin. recitata, quæ habet folia lauro similia, Prima est lepidion Diosco. Secunda uocatur piperitis, siue piperella a sapore piperis acuto, uide Diosco. cap. ult. primi, & Plin. cap. 8. lib. 19.

Hieracion, siue ἱερῶν, id est lactuca erratica, est herba spinosa similis soncho, id est, cicerbitæ, de qua Plin. cap. septimo libro. 20. multa habet ualet cum lacte mixta infirmitatibus oculorum præsertim cicatricibus suffusionibus caligini cum aqua uero & aceto bibita uentrem purgat, ualet cum uino morsui serpentum & uulneribus, si folia cum caule terrantur, somnum excitat uenerem prohibet, refrigerat & sanguinem auget uide Dioscorides capite. 65. & 66. tertij. Plinius capite. 7. lib. 20.

Hippoglosson, siue ἵππογλωσσόν, uulgo bislingua, uel bonifacia, ualet præfocationibus uteri si cochleare eius radices sumatur, ualet etiam mirabiliter ruptis, siue crepatis, si pulueris chocleare cum brodio carnis quotidie sumatur, uidentur tamen in primis diebus eorum uelle intestina exire, nihilominus postea conglutinantur, idcirco diligenter in primis illis diebus ligentur, Diosco. cap. 127. quarti, Plin. cap. 10. lib. 77 Pau. lib. septimo, molliendi uirtute pollet.

Hippuris, siue equisetum, græce ἵππουρος duplex est, altera quæ uulgo dicitur cauda equina, altera asprella etiam dicta, ualet ut testatur Gale. 6. de fac. simp. omnibus uulneribus, etiam si nerui essent præcisi, Diosco. cap. 44. quarti, pau. li. 7. adstringit & ualenter citra mordacitatem exiccat.

Hordeum græce ὄσπριον, res est notissima, ex qua paratur ptisanæ, Dioscor. capite. 78. secundi, Galenus septimo de facul.



simpli. & primo, de facul. alimen. refrigerat & siccatur in primo ordine cum pauxilla adstrictione, itidem pau. lib. 7.

Hordeum murinum id graece *φοινίς* dicitur uulgo loliū syluestre uocatur, notum est, nam ubique nascitur ac ipsum frumentum, Dioscorid. capite. 40. quarti, plin. cap. 22. lib. 29.

Hyacinthus, siue *ῥακινθος*, est secundum aliquos id quod uulgo dicitur cipolla seluatica, nec est ille hyacinthus, de quo fabulantur poetae ex aiacis sanguine natus, nam ille producit florem rubeum iridi similem. Dioscorid. cap. 61. quarti, Galenus octauo de faculta. simplicium. paulus libro septimo refrigerat in secundo, siccatur in primo, semen leuiter abstergit & adstringit.

Hydropiper siue *ὑδροπέρρι*, non est, ut Ruellius uulgaris canaruola, sed potius quaedam species persicariae, quae nullam in folijs maculam per se fert, haec enim seruat omnes illas conditiones, quas illi tribuit Diosco. cap. 150. secundi, Galenus. 8. de fac. simp. Pau. libro septimo, acquaticum piper calidum, sed piperi modo.

Hyoscyamus, siue *ὑοσκόμας*, albus & niger non inuenitur, sed tantum qui flores flauos profert uulgo dicitur iusquiamo ouer dente cabalino, Diosco. capite. 67. quarti. latine dicitur apollinaris herba, siue altercum, Galenus octauo de faculta. simp. plinius capite quarto, lib. 25. paul libro septimo, est ex tertio refrigerantium ordine.

Hypecoon, siue *ὑπεκόν*, est herba quae uulgo dicitur ruta seluatica, Diosco. ca. 66. quarti, Gale. 8. de fac. simp. plin. ca. 12. lib. 27. pau lib. 7. refrigerat in tertio.

Hypericon siue *ὑπερικόν*, ascyron androsemō, & cori una & eadem res est, & si aliqua in folijs caule & floribus differentia adsit, uocatur hypericon uulgo perforata, nec est ruta syluestris, ut opinatur Brasauola, sed est uera perforata,



qua uulgariter utimur, Dioscor. cap. 162. & 163. & 164. & 165. Galenus octauo de facul. simp. Plin. cap. 8. lib. 26. Paulus libro septimo, tertias species calefacit & siccatur tenui substantia prædita. De alijs dictum est in Androsemon.

Hyssopus, siue ὕσσωπος, uulgo etiam hyssopo dicitur, aliqui putarunt gratiolam esse hyssopum montanum, sed decipiuntur nam gratiola in locis humidis nascitur & soluit uentrem educens bilem & pituitam & ulcera conglutinat. de hyssopo lege Dioscor. cap. 27. tertij. Gale. 8. de fac. simp. calidus & siccus in tertio ordine.

Iaspis græce ἰάσπις, uulgo dicitur diaspro, meminit Dioscor. cap. 160. lib. 9. & Galenus nono de fac. simp. Paulus libro septimo, confert non continētibus cibum in stomacho.

Indicus lapis, siue λίθος ἰνδικός, uulgo endego, naturalis non habetur quo uero utimur fit ex isatide siue guado, Dioscorid. cap. 61. quinti. Plin. cap. 6. lib. 35. Paulus libro septimo, contra hemorrhoidas ualet.

Inula græce ἐλέγιον, est uulgaris planta, quæ dicitur uulgo euola ouer iola, Dioscor. cap. 27. primi. & Plin. cap. quinto. lib. 19. & Galenus sexto de fac. simp. ualet pectoris humoribus uiscidis, item sciaticis in modum cataplasmatidis & luxionibus paruis ab humiditatibus factis, Pau. lib. 7. calida est & sicca cum excrementitia humiditate.

Irion græce ἱρίον, quid sit, quum modo inter segetes modo inter herbas acuta, ac est nasturtium, connumeretur, certe puto quod res sit similis sysamo, nascitur ubique cū folijs eruce floribus paruis & flauis, a quibus cornicula quedam, in quibus est semen, proueniunt, Dioscor. cap. 147. secundi. Plin. duobus in locis 7. & 10. cap. lib. 28. & cap. 25. lib. 22 similiter Gal. 6. de fac. simp. & primo, de fac. alim. Pau. lib. 7. Erismi semen igneum calefactoriumq; est.



Iris, siue ῥίς, apud seplasiarios dicitur irios, & uulgo zilio morello, de hac nullibi iuxta Gal. nisi in Andromachi theriaca, ubi illyrica commendatur Dioscori cap. 1. primi libri. & Plin. cap. 7 lib. 21. Paulus libro septimo, affatim calefacit extergit & maturat tenuis substantiæ tussi utilis.

Isatis, siue ἰσάτις, uulgo guado da tingere, nam colores sua uiuacitate omnes conseruat, Dioscor. cap. 107. & 108. secundi. Gal. 6. de fac. simp. paul. lib. 7 siccandi uires & adstringendi habet.

Isopyron siue ἰσόπυρον, huc usque non uidi ne qui uiderit, uel cognouerit adhuc intellexi, quare aliorum iudicio hunc relinquam Diosco. cap. 116. quarti. Gale. sexto de facul. simpl. Pau. lib. septimo, abstergit, incidit semen eius Iuncus odoratus græce, ὄνυξ, est quod uulgo dicitur squinanto prouocat urinam & menstrua. Vide Diosc. cap. 16. primi. Gal. 8. de facul. simp. Plin. cap. 18. lib. 21.

Iuncus siue ὄνυξ, est id quod uulgo dicitur zuncho. Dioscor. cap. 50. quarti, & Galenus octauo de facul. simpl. duas species iunci memorat, ut oxyschenon & oligoschenon Paulus, libro septimo oxyscheni semen somnificum est utriusque semen frixum desiccatur & fluxus cohibet.

Iuniperus græce ἀμύγδαλις, est res notissima, gumi eius sandaraca, siue scriptorum uermix est, sandaraca inquam arabū, nam sandarax Diosco. est res mineralis similis auri pigmento, fit ex hoc gumi & oleo de semine lini artificialiter uermix liquida, qua utuntur pictores ad illustrandas picturas, ualet combustionem ignis & doloribus ac tumoribus hemorrhoidarū, gumi uero iuniperi ualet catharrhis, cohibet mēstrua, fistulas exiccat, uermes interficit & resolutis neruis cōfert, Diosco. cap. 89. primi, Gal. 6. de fac. simp. ualet etiam scissuris manuum ac pedum ex frigore factis & fluxum sanguinis &



hemorrhoidarum constringit.

Ixia uiscus est radicibus chamæleonis adhærens, quo pen-  
næ sagittis adglutinantur, Dioscor. cap. 21. lib. 6.

Ixus siue ἰξός, est uiscus quercinus qui paratur a pueris in  
capiendis auibus, Dioscor. cap. 94. tertij. Galenus sexto. de fa-  
cul. simpli. Pau. lib. 7. calefacit cum acrimonia & humores  
ex alto elicit.

Lactuca græce γλαράξ ἡμερος, res nota est Galenus sexto de  
facul. simp. frigida & humida sed non excessiue, tollit sitim,  
& semen eius fluxum spermatis cohibet, & secundo de fac.  
alim. generat sanguinem quàm aliæ herbæ meliorem, sed nō  
omnino laudabilem, Diosco. cap. 125. secundi.

Lambrusca græce ἀμύσλος ἀγρία, est uitis syluestris omni-  
bus cognita, Diosco. cap. 2. quinti, plin. cap. 29. lib. 12. paulus  
libro septimo, germina habent uim abstergerendi nonnihil &  
adstringendi.

Ladanum, siue λανθάνος, aromatarij laudanum dicunt, plin.  
cap. 17. lib. 12. & Gale. septimo de fac. simp. Diosco. ca. 113. pri-  
mi, paul. lib. 7. calidum in secundo, emolliens mediocriter di-  
scutiens & maturans.

Lagopus, siue λαγώπους, id est pes leporinus, nisi sit garyo-  
phillata, ut Pandectarius, nescio certe quid sit, ualet in potio-  
nibus pro uulneribus & menstruis & sputo sanguinis dysen-  
tericis & ramici per os sumpta & emplastri modo imposi-  
ta, est calida & sicca, Dioscor. cap. 19. quarti. Gal. septimo de  
fac. simp. pau. lib. septimo, desiccatur.

Lanaria herba, græce τριούριον, siue radícula, res erat tem-  
pore Dioscoridis multum in usu, sed apud nos quid sit, ne-  
scio, ualet enim sum opere in dealbandis lanis, cuius semen  
condisi dicitur, quod etiam minime habetur, Diosco. cap. 152.  
secundi, plin. cap. 3 lib. 19. & Gale. octauo de fac. simp. calida  
in quarto



in quarto quodammodo ordine siccaeq; est.

Lapathum, siue λαπαθον, siue rumex, uulgo dicitur romice, de quibus plura Dioscor. cap. 106. secundi, Oxylapathon, enim & hippolapathon & oxalida sunt species lapathi, uocatur primum, lapatium acutum, secundum magnum lapatium, quod folia rheubarbaro similia habet, & oxalida, quæ acetosam et uulgo, herba brusca uocant, plin. cap. 21. lib. 20. & Gale. septimo de fac. simp. pau. lib. 7. oxylapathum discutit & pauxillum repellit.

Lapsana, siue λαμψαινη, res est incognita, sed iuxta plini. est species brassicæ syluestris. Diosco. cap. 107. plinius capite octauo lib. 20. Galenus septimo de fac. simp. pau. libro septimo, abstergit, discutit.

Laser, siue laserpitium, græce σιλφιον, uulgo assa, quæ in fetidam & odoratam diuiditur. assa fetida est, quæ habetur apud aromaterios, odoratus uero laser, est quod uulgo dicitur belzoino, nota tamen non haberi assam dulcem, nec eius loco succum glycyrrhicæ poni. sed potius belzouinum uocatum. Diosco. cap. 85. tertij. Galenus octauo de facult. simplic. paulus libro septimo, probe calefacit, extrahit, emollit. plin. cap. 3. libro 19.

Lathyrus, siue λαθυρις est, quæ uulgo dicitur cataputia, siue cazzapuzza maior, nam minor est riccinus Diosco. cap. 172. quarti, Gale. 7. de fac. simp. plin. cap. 11. lib. 27. pau. lib. 7. purgandi uim obtinet.

Laurus arbor notissima, græce δάφνη. olim in precio habita. Sunt qui uelint per se laurum ignem accendere, dummodo rami simul coufricentur et sulphur sursum prohibiciatur, Diosco. cap. 91. primi, Gale. 6. de fac. simp. paul. libr. 7. folia siccant & calefaciunt insigniter.

Laurus Alexandrina, siue laureola græce δαφνοειδης, & si

FFf



rusco ethypoglossso similis sit imo pro hyppoglossso a Fuchio accipiatur, quum reuera non sit, mihi incognita restat, Dioscor. cap. 142. quarti, Gale. 6. de fac. simp. paul. libro septimo, calida, acris, & subamara est.

Lemnia terra græce λιμνιάς γῆ, est uerus bolus armenus orientalis dictus, si bene consideretur Galeni locus lib. 9. de facul. simp. nec est terra illa sigillata, quam tanti faciunt, Dioscor. cap. 67. quinti. plin. cap. 6. lib. 35. Paul. lib. septimo, siccatur, & adstringit mediocriter.

Lentes siue lenticulae, græce φακὶς, uulgo dicitur lenticchie, Dioscor. cap. 98. secundi, Galenus octauo de facul. simp. paul. libro septimo, siccant in secundo ordine, medio caloris & frigiditatis temperamento.

Lens palustris, siue φακὶς ἐπὶ τῶν τελευμάτων, uulgo dicitur zen, uel lenticularia, oritur in aqua. Dioscor. cap. 34. quarti, Galenus octauo de fac. simp. Paul. lib. 7. humectat, & refrigerat in secundo abscessu.

Lentiscus arbor græce σκίμος τὸ δένδρον est, quæ mastichen producit, Dioscor. cap. 77. primi, Galenus octauo de fac. simp. Plin. cap. 6. lib. 13. Paul. lib. 7. siccatur in secundo medius in calefaciendo & refrigerando.

Lepidium, siue λεπίδιον est piperitis, ut dictum est de Iberide Dioscor. cap. 165. secundi, Ruellius Hermolaus & Manardus putant, quod sit raphanus. Plin. cap. 8. lib. 19. Gale. 7. de facul. simp. calefacit in quarto, & est simile nasturtio. Paul. lib. 7. idem refert, sed ipse inquit in tertio.

Lichen, siue λικηνῖς est herba a seplasiarijs hepatica uocata. Plin. cap. 4. lib. 26. duas species commemorat, alteram quæ solum latifolium apud radices habet, alteram quæ petris adheret, ueluti muscus, ualet hæc herba lichenis. i. uolaticis, Dioscor. cap. 51. quarti, Gale. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. exterendo



purgat, mediocriter siccatur & refrigerat.

Ligusticum siue λινυστικόν ab aliquibus pro leuistico accipitur, sed si litera Diosco. bene ponderetur, non est uerum ligusticum uide Dioscor. cap. 53. tertij, Galenus septimo de fac. simp. paul. lib. septimo, excalefaciunt ac probe flatus discutiunt semen & radix.

Lilium græce κρίνον, res est uulgaris & notissima, id inter liliorum species facile connumeratur, quod uulgo martegone dicunt, Dioscor. cap. 107. tertij, Gale. septimo de fac. simp. pli. plin. cap. 5. lib. 21. Paulus libro septimo, flos lilij discutiendi ac emolliendi uireis habet.

Limonium siue λιμόνιον, res est similis betæ syluestri, ut Plinius capite octauo lib. 20. quanuis affirmet Gale. se nunquam betam syluestrem uidisse, Diosco. capite. 18. quarti, Galenus septimo de fac. simp.

Linum siue λίνον res uulgaris est, oleum ex eius semine omnes neruorum & iuncturarum durities mollit, & est mirabile hemorrhoidibus, ignis combustionibus cum aqua rosea lotum, sumuntur & in principio morbi lateralis ex eo uncia quatuor, & sanat, Dioscor. cap. 94. secundi, Gale. septimo de fac. simp. calidum, quasi in principio, medium inter siccum & humidum.

Lithargyros siue λιθάργυρος res est ex plumbo & ære proueniens dum argentum & aurum depurant, uide Dioscorid. capite. 56. quinti, Plin. capite sexto, libro. 33. & Galenus nono de facul. simp.

Lithospermon siue λιθασπέρμον, seplasiarij milium solis uocant crederem ego id esse, quod uulgo dicitur lacrima dacone miratur Plin. cap. 11. lib. 17. de lithospermo, Diosco. capite. 149. tertij, Paulus libro septimo, calculos frangit & urinas elicit.



**Lolium** græce αἰρα, uulgo dicit loio, nec est pseudomelanthium ut fuchsius Galenus 6. de facul. simplicium Dioscorides cap. 191. secundi, Paulus lib. 7. calidum in primo tertij, & siccum in fine secundi.

**Lotus ægyptia** siue λωτος αἰγυπτίος, uocatur a Serapione handacoca ex cuius semine paratu oleum ad dolorem iunthurarum, uerum de utraque loto intelligit Serapio, Diosco. cap. 109. quarti, Gale. 7. de facul. simpl. Plin. cap. 17. lib. 13, & cap. 31. lib. 15. Paulus lib. 7. lotus arbor extenuat & siccatur ac mediocriter adstringit.

**Lotus satiua** siue λωτοῦ ἡμερος, nisi sit melilotus uulgaris haud scio quid sit, lotus syluestris ignota est, Diosco. cap. 106, & 107, quarti, Paulus libro septimo, lotus domestica a nonnullis triphillon appellatur, absterforias uireis & modice sic canteis obtinet.

**Lupini** græce ἐρίμος, sunt omnibus noti, amari dulcorantur & comeduntur, maxime domestici, Dioscorid. cap. 101. secundi, & Gale. 1. de. facul. alimen. & 6. de facul. simpli. Paul. lib. 7. esculentum obstruit, amarum abstergit dissipat & sine morsu deficcatur, lumbricos occidit & uiscera purgat.

**Lychnis** siue λυχνίς, nisi id sit quod uulgo dicitur rosete, profecto nescirem quid sit, nam Plin. cap. 4. lib. 21. inquit rosarum spetiem esse in aquosis locis nascentem cum quinque folijs Diosco. cap. 105, & 106. tertij, Gale. 7. de fac. simp.

**Lycium** siue λυκίον, aliud est quo seplasiarij utuntur, aliud quod a Diosco. cap. 117. primi, recitatur, Quod uero in officinis uenditur, alij componunt ex baccis lygustri, alij ex matrisylua, alij ex utrisque simul sed uti possumus pro lycio sumach. uide Gale. 7. de fac. simp. nam ex pixiacantha arbore fieri inquit, ualens ulceribus oris malignis & serpentibus, Plin. cap. 7. lib. 12. & cap. 14. libro. 24. Paulus libro septimo



calefaciendo & refrigerando medium est, desiccatur uero in secundo abscessu.

Lycopsis, siue λυκοψις, nisi sit species anchusae, aut cynoglossa uulgaris, nescio profecto quid sit, uide Dioscorides capite. 27. quarti, plinius capite undecimo, libro. 27. paulus libro septimo, radix adstrictoria.

Lyncurion est electrum, siue succinum plumas, siue paleas trahens, ut refert Dioscor. cap. 73. secundi, unde pterygophoron dictum uide de electro.

Lysimachia, siue λυσιμαχίον, a Lysimacho rege nomen capi- piens nostris temporibus non cognoscitur, nec est lysimachia ut Ruellius quae uocatur cereta sed alia longe diuersa herba, nam cereta folia lino similia habet non salici, ut Diosco. capite tertio quarti, plinius capite septimo, libro. 25. Galenus septimo de fac. simp.

Macer, siue μακίς, nisi sit macis qui est cortex nucis indicae nescio quid sit, nec aliud coniectari possum, Dioscor. cap. 95. primi, Galenus octauo de facul simp. interpretatur a Pandetario cortex mali punici, sed qua de causa, nescio paul. lib. 7. inter frigiditatem & calorem medium obtinet siccatur in tertio ordine & adstringit.

Malabathron, siue μαλαβάθρον, uulgo folium indicum, nobis ignotum, pro quo utimur cassia, uel nardo indico, ut Galenus in succidaneis Dioscor. cap. 11. primi, Plinius capite. 27. libro duodecimo.

Malua graece μαλάκη, res notissima omnibus. Dioscorides capite. 109 secundi, Galenus secundo de faculta. alimen. Theophrastus capite quinto primi, plinius capite. 21. lib. 20. paulus lib. 7. syluestris mediocriter discutit & mollit, hortensis uero imbecillior.

Mandragora, siue καυδερανόρας. Pluribus in locis Italiae na-



scitur. Vanum est credere mandragoræ radices habere formam hominis, uerum propter pomum quod cum radicibus euellitur, formam hominis sine brachijs præ se fert, unde Pythagoras αὐτοπομορφον appellauit: Dioscor. cap. 74. quarti, & Galenus septimo de fac. simp. frigidum est in tertio, sed poma eius aliquid caliditatis in se habent, plura habet Serapio in lib. aggre.

Manna siue *μαίνα*, non dico thuris, sed solutiuæ est in multiplici differentia, ut referunt Arabes, nec aliud est manna quàm ros, siue liquor suauis noctu cadens super arborum folijs, aut super terram, uel petram, uel herbas, quæ deinde condensata in modum gumi euadit, Duplex est quæ ad nos affertur masticina s. & bombicina, masticina dicta, quia similis grano mastice est, & est excellentissima, sed bombicina nullius ferè precij, quæ uero Calabrensis dicitur, ualidior est, quæ in folijs, quàm quæ in ramis arborum colligitur, unde uulgo dicitur manna di foglia, quæ minutis granis transparens grauis alba dulcis & suauis, Arabes duas mannæ species assignant, Mannam. s. & Tereniabim, nec inter se hæc duæ differunt, nisi quod Tereniabim est altera manna liquidior, uide de manna Galenus tertio de fac. alim. ad eorum confusionem, qui Gal. mannam non cognouisse affirmant in capite de melle, ubi multa de manna pronunciat, est & manna thuris, & est quidam puluis, ut testatur Dioscor. cap. 69 primi, uide de manna Auic. & Serapionem cap. de tereniabim & menh.

Marrubium græce *μαρρόβιον* est planta notissima, uide Galen. octauo de fac. simp. & Theophr. ca. 2. de histor. plant. & Diosco. cap. 110. tertij, Est & alterum marrubium nigrum, baliote dictum, quod adeo melissæ est simile, ut uix ab ipsa, nisi malus odor adesset, agnosceretur, Dioscor. cap. 108. tertij, Paulus libro septimo. Nigrum est acris & absterforiæ facul-



tatis, prasiō uero calefacit in secūdo siccāt, & uiscera laxat.

Marum, siue μαρόν, nisi sit quod uulgo dicitur maiorana fina, haud scio quid sit, nam bene redolet, ut marum, uide Gale. de antidotis cap. de comp. hedicroi, & Diosco. cap. 44. tertij. Medica herba in Hispania abundantissima in Italia non habetur, uocatur arabice alfasasat, Ruellius hanc nasci in Gallia adserit, uocariq; trifolium maius, cap. 136. secundi, Flin. ca. 16 lib. 18, a medis inuenta dicitur & græce dicitur μηδίων.

Medion, siue μηδίων, quum nec uiderim, nec apud me de eo aliqua sit imago, in Media enim tantummodo nascitur, ne scio quid affirmare debeat. Dioscor. cap. 20. quarti, Plinius cap. 12. lib. 27. Galenus septimo de facul. simpl. contrariam semini eius habet temperiem, nam menstrua herba constringit, quæ semen prorsus elicit.

Melilotus, siue μελίλωτος, quem etiam fertulam campanam uocant affertur ex Neapoli Venetijs, quo uero utuntur seplasiarij, uerus non est, sed species trifolij, sunt tamen qui dicant melilotum uulgare esse lotum. Dioscor. Plin. cap. 9. lib. 21. Et Gale. 7. de facul. simp. Dioscor. cap. 43. tertij, Pau. lib. septimo, diuersis facultatibus pollet adstringendi. s. & discutiendi & concoquendi.

Melissophyllon, siue μελισσοφυλλον, uulgo dicitur moliferno ouer cedronelia, res nota est, Cardiacis & tristibus, ut reserunt Arabes & passionibus cordis ualet, & aperit opilationes cerebri, Dioscor. cap. 109. tertij, Galenus septimo de fac. simp. Pau. lib. 7. uiribus marubio respondet.

Menta & mentastrum, græce ἡδυσσμος ἢ μέντρος καὶ ἀργεῖος, res sunt manifestæ excitant uenerem, ut Gale. & Dioscor. quauis contrarium sentiat Plin. cap. 14. libro. 20. uide in hoc Gale. 6. de fac. simp. & Dioscor. cap. 36. & 37. tertij, uermes etiā interficit, Paul. libro septimo, calida in tertio ordine tenuis



acris cum humiditate semicocta.

Meon, siue *μῆον*, & si multa copia nascatur in Hispania, nullibi tamen quod sciam in Italia habetur, nam quod passim ostenditur pro meo, est radix saporis pastinacæ similis, eius uice funguntur myrhobalani, uulgo dicti ben delli profumeri, unde etiam sub nomine nucis unguentariæ appellantur. Diosco. cap. 3. primi, plinius cap. 23. lib. 20. Galenus septimo de facul. simpli. paulus libro septimo, calefacit in tertio ordine, in secundo siccatur.

Mercurialis herba græce *λινόεσις*, ob enematum usum notissima, uide plin. capite quinto, lib. 25. Galenus. 7. de fac. simp. & Diosco. ca. 183. quarti, paul. lib. 7. aluum liberaliter subducit & illita discutit.

Millefolium græce *μυριόφυλλον*, eius duo capita habet Dioscor. alterum de stratiote millefolio, & alterum de myriophyllo, sunt qui uelint stratiotem esse millefolium uulgare nostrum, quum in myriophyllo unus tantum coliculus & in nostro uulgari plures inueniuntur, de stratiote loquitur Gal. 8. de fac. simp. & Diosco. ca. 110. quarti, de myriophyllo ca. 100. quarti, et Gal. 7. de fac. simp. in fine, plin. cap. 16. lib. 24. paul. lib. 7. uim siccandi adeo obtinet ut conglutinet uulnera.

Mora græce *μωρέα ἢ συκαμινέα*, tam alba, quàm nigra cognoscuntur, habent uim soluendi & constringendi, Dioscori. capite. 147. primi, Galenus octauo de facul. simp. paul. lib. 7. itidem adserit.

Muscus arborum græce *βρῆον*, uulgo dicitur usnea, quæ ut refert Serapio somnum prouocat, uomitum & fluorem uentris cohibet, & est medicina cordis, ut Auic. Diosco. cap. 20. primi, Galenus sexto de faculta. simplicium. paulus libro septimo, q. cedris adheret distrahendi simul & moliendi uim moderatam habet.



Musculus odoratus est res quæ in gazellarum folliculis continetur, recens & immatura grauis ac pessimi odoris, sed quum maturuerit tanquam sanies e folliculis egrediens est gratissima ac pretiosissima calida & sicca in secundo ordine, lege Serapionem lib. aggregre.

Musculus marinus est uulgaris corallina, quæ pro enecandis uermibus datur pueris, in frigidat, ut Gale 6. de fac. simp. Diosc. ca. 94. quarti. paul. lib. 7. in frigidat & adstringit, græce dicitur βρῆον θαλάσσιον.

Mumia uera non habetur, sed posset parari uera, si corpora mortuorum ex aloe, myrrha, & croco condirentur, deinde id liquoris ad tempus exciperetur, ualet ita parata doloribus capitis frigidis paralysi, oris tortura, uirtigini si extrahatur per nares cum aqua maiorana & doloribus aurium cum oleo uiolaceo albo, est calida & sicca in tertio secundum Arabes.

Myos otis græce μύος ὠτα i. muris auricula, nisi sit quod uulgo dicitur lentone, haud scio quid sit. Galenus. 6. de facul. simp. Diosc. cap. 175. secundi. plin. ca. 12 lib. 27. paul. lib. 7. refrigerat & humectat & uocatur ab ipso alsine.

Myrrha uera græce σμύρνα, non habetur, nisi forte nostra communis sit, quæ a Diosco. dicitur caucalis, siue ergasime, nam nostra cunctis conditionibus requisitis indiget, quum nec sit uiridis, nec crassa, nec acuta, nec odorata, nec colore unita, quare caueant qui in potionibus ac catapotijs eam imponunt, Diosc. cap. 69. primi, Galenus octauo de facul. simp. & in libro Antid. in compos. Theriacæ. paulus libro septimo, calefacit in secundo, & siccatur, uide etiam Plinium capite. 16. & 17. libri. 12.

Myrrhis herba, siue μύρρις, nisi sit cicutaria, ut communis est opinio, uel cerefoliū ut manardus, nescio quid aliud sit, qui



tenent hanc esse angelicam herbam ualde decipiuntur, siquidem angelica cicuta folia non habet, sed potius pasinacæ, Diosco cap. 111. quarti, Pau. lib. 7. calefacit in secundo, et non nihil extenuat.

Myrtus græce *μύρτις*, nota est omnibus, eius facultas frigida & terrestris, ut refert Gale. septimo de facul. simp. Quod uero myrtidanum dicunt est quoddam gibbosum ueluti adnatum myrto, Dioscor. cap. 33. primi, Paulus libro septimo, ualentior siccatur.

Naphtha siue *ναφθα*, est ueluti oleum petreolū, uel de monte Zibio appellatū, reuera bituminis genus, quod in mari mortuo, quod est stagnum minoris syriæ, nascitur, calefacit exsiccatur & uulnera recentia conglutinat Diosc. cap. 86. primi.

Napellus Auicennæ, nisi sit toxicon Dioscoridis, ut putat Manardus, nescirem profecto in Dioscoridis capita hunc referre, est enim mortiferum uenenum, Auic. lib. 2. calidum & siccum est in sumo.

Napum græce *βούβις*, uulgo Nauon, & est res notissima, ex cuius semine oleum in Aegypto extrahitur. Diosc. ca. 103. libro secundo.

Narcissus est res nota, similis est hermodactilo folia habet porracea, tenuiore tamen & angustiora caulem sine folijs concavum, in quo candidus flos existit, Dioscori cap. 155. quarti. Theoph. cap. 6. lib. 6. Plin. cap. 3. lib. 21. Gale. octauo de fac. simp. Pau. lib. 7. uim habet aliqualem attrahendi & abstergendi græce *ναρκισσός*.

Nardus siue *ναρδος* est, quam spicam nardi seplasiarij uocant, & est syriaca spica & non indica, sed non mirari satis non possum, quod si ab una, eademq; radice multæ ac númerose spicæ pululent, ut inquit Dioscorid. Quur non spicas sed radices esse Gal. dixerit in Andromachi theriacam. De indi-



ca Dioscoridis sunt uerba. ασημετέρα κατὰ δύναμιν ἔρα δια τὸ ἐφ' ὕδατω δ' ὦν τὸ πικρὸν εἶναι καὶ ἐπὶ μηκέτι ἔρα πλείονας τε ἔχουσα τῆς γαλίας α. πὸ τ' αὐτῆς ρίζης καὶ πολυκομους καὶ περὶ πεπωλιγμενός ἐσσι. Nec sat is est dicere mōtanam spicam non ita oriri, quū ipsa teste Dioscoride non nisi bonitate odoris torosioreq; spica differat, quare caueat Mathiolus Senensis quomodo in Manardū, alioqui doctissimum tam aperte latret, nā & Gale. in eodem loco iubet in his & alijs Diosco. consuli. paul. libro septimo, calefacit in primo, siccatur in secundo. Vide & Gale. 8. de fac. simp. & Plin. cap. 12 lib. 12.

Nardus gallica siue ναρδος κελτικη, uulgo spica celtica non habetur apud nos, uide Dioscor. cap. 7. lib. 1. quod uero non sit saluunca Plinij, non est ut probem Gale. 8. de fac. simp. Paulus libro septimo, calidior superiori minusq; adstringit.

Narcaphton siue ναρκαφθον, uulgo dicitur tignamo, ac si diceretur thymiana, quod nihil aliud sonat q̄ suffumigium, uide Diosco. cap. 22. primi.

Nasturtium graece κάρδαμον, uulgo agretto, & est familiarissima herba & notissima, de qua Gale. 7. de facul. simp. loquitur, calida est, Diosco. cap. 144. secundi, Pau. libro septimo semen modo sinapis urit.

Nerion, siue νήριον, uulgo dicitur oleandro est, ueluti uenum, ut Gale. 8. de fac. simp. Enecant etiam inquit Diosco. cap. 80. quarti, flores & folia omnes quadrupedes, ualent etiā emplastri modo morsibus uenenatorum, non autem sumptū, ut putarunt nonnulli. Plin. cap. 2 lib. 24. Pau. lib. 7. extrinsecus uim habet discuboriam, & si intus assumatur, occidit, dicitur etiam alio nomine rhododaphne.

Nymphaea, siue νυμφαία, uulgo nenupharo, potentior est, quae radicem albam fert, uide Gale. octauo de facul. simplic. Diosco. cap. 140. & 139. tertij, Plin. capite septimo, libro 25.



Pau. lib. 7. uires habet sine erosione siccas uentrem reprimat,  
& genituram arefacit.

Ocra, siue *οχα*, est terra gialla q̄q̄ alij uelint esse terram  
rubeam, uide Diosco. cap. 62. quinti.

Ocymoides, siue *οκυμοιδης*, uulgo basilico saluatico, res est  
notissima, uide Diosco. cap. 29. lib. 4. inuenitur inter frumen=  
ta, Gale. 8 de fac. simp pau. lib. 7. radix inutilis semē sine ero=  
sione siccatur.

Ocimum, siue *οκυμον*, uulgo basilico domestico, Diosco. ca=  
pi. 110. secundi, & Gal. 2 de fac. alimen. & 8 de fac. simp. cali=  
dum in secundo ordine cum superflua humiditate, itidē, pau.  
lib. 7. adserit.

Ocimum aquaticum græce *επιβος*, uocatur, Dioscor. cap. 30.  
quarti, & est forte apud Galenum, echinum dictum. 6. de fa=  
cultis simpli.

Oenanthe, siue *οιρανθη*, nisi sit filipendula, ut Fuchsius, ne=  
scio quid sit, uide Theophr. cap. 7. lib. 6. & Plin. cap. 24. li. 21.  
Diosc. cap. 126. tertij, oenanthe etiam accipitur pro flore ui=  
tis syluestris qui insigniter adstringit stomachum & aluum  
firmat, sed oenanthe Diosco. eijcit secundas, stillicidio urinæ  
& morbo regio medetur, uide pau. lib. 7.

Olosteon, siue *ολειστον*, est species consolidæ & non est pi=  
losella, ut nonnulli putarunt, nam pilosella est herba ualde ad=  
strictoria, ita ut uulnera conglutinet cohibet fluores uentris  
& sputum sanguinis & fluxus muliebrum albos de olosteo,  
uide Diosc. cap. 12. quarti, Gale. 8. de fac. simp.

Olyra, siue *ολυρα*, est species zææ uulgo spelta nominata,  
nec est segala, ut Virgilius Marcellus, nā ex olyra panis dul=  
cissimus conficitur, & ex segala amarus, nec siligo est sega=  
la, ut aliqui putarunt, sed potius species grani, ex cuius flore  
panis albißimus & optimus olim conficiebatur, quod con=



trarium omnino accidit nostræ segalæ seu ferragini, ut a Plinio uocatur capite. 16. libro. 18. uide Dioscorid. de olyra, capite. 82. secundi, & Galenus primo de facult. alimen. et octauo de facul. simp.

Opium est papaueris liquor, unde græce dicitur ὁ πῶς μνηκω, fit ex lacte quod a papaueris capite destillat, ut Dioscor. ca 63. quarti, Paulus libro septimo, tenet q̄ sit frigidū in quarto, nihilo minus eius amaritudo non frigidum simpliciter, sed aliquatenus calidum, potius affirmaret, quare diligentius res consideretur, uide Galen. septimo de facul. simp. ubi de papaueris specie agit.

Opopanax, siue ὀπῶπαξ, fit ex panacis herculei liquore, uide Diosco. cap. 50. tertij, & Gale. octauo de fac. simp. calidum in tertio, & siccum in secundo, Mesu. cap. de opo. pituitā crassam & uiscosam in remotis partibus corporis contentam soluit, pau. lib. 7. Mollit etiam & discutit.

Origanus, siue ὀρίανος, quo utimur, ut refert Brasauola est heracleoticus, sed iuxta aliorum opinionem est origanus syluestre, & heracleoticus & onitis nostro tempore non inueniuntur, uide Dioscorid. cap. 29. tertij. Theoph. capite secundo, libro sexto. Plinius capite. 17. lib. 20. Galenus. 8. de fac. simpli. habet uim incidendi extenuandi, siccandi, & calefaciendi in tertio abscessu.

Orminum, siue ὀρμινόν, nisi ut Ruellius sclarea, nescio certe an reperiatur, Diosco. cap. 126. tertij, plin. cap. ulti. lib. 22. Gale. in fine primi, de fac. alim. alteram speciem ormini memorat, pau. lib. 7. marubio simile calidum mediocriter, siccum, & abstergens.

Ornithogalos, siue ὀρνιθογάλον, quamuis ubique inter segetes nascatur, nedum a me uisa est, radices habet, quas edunt pueri, ut refert Ruellius, sunt in Veronensi agro quedam



radices dulces & in sapore castaneis similes, quæ thrassæ uocantur Diosco. cap. 133. secundi.

Orobanche. siue ὀροβάνχη, est herba quæ non solū orobum strangulat, sed omnes quæ uicinæ sunt, plantas sternit, unde ab aliquibus herba lupa, ab alijs cauda leonis, ab alijs uero herba taurina, eo quod a bobus comesta ad coitum eas promouet, Diosco. cap. 131. secundi, Theophr. 8. de histor. planta. & quinto de causis plant. Plin. cap. ult. lib. 22. Pau. libro septimo est temperamenti sicci & frigidi ad primum ordinem.

Oryza, siue ὀρυζα, uulgo riso, nascitur palustribus & uliginosis locis aluum compescit, uide Diosco. cap. 86. secundi. Plinius libro. 18. capite septimo, Paulus libro septimo, uim habet adstrictoriam.

Osyris. siue ὀσυρίς, uulgo linaria dicitur, uide Diosco. cap. 138. quarti. Galenus octauo de facul. simp. plinius capite duodecimo, libro. 27. paulus libro septimo. Amara est & uires iecoris laxat.

Oxyacantha. siue ὀξύκανθα, est id quod Arabice dicitur berberi, nec est si bene huius plantæ notæ consyderentur, quod uulgo dicitur crespini. Dioscor. cap. 107. primi. Galenus octauo de facult. simpli. paulus libro septimo, fructus ipsius mirtibaccis respondet, Auic. tenet quod sit frig. & sic. in tertio.

Peonia, siue παῖονια, foemina est notissima, sed mascula non inuenitur, Gale. sexto de fac. simp. est tenuium partium, sed non nimis calida, imo magis temperata, aut a temperie parum in calore distans Dioscor. cap. 148. tertij. plinius lib. 25. capite. 4. pau. libro septimo. Radix acris leuiter subamara et siccans cui nonnihil adstrictionis inest.

Paliurus, siue παλινγος, quid sit, reuera nescio, nisi nomen sit ad placitum, nam omnes antiqui in paliuro discrepant, Theophr. cap. 17. libri tertij, & cap. 4. lib. 4. Diosco. cap. 113.



primi, plinius cap. 19. lib. 13. & cap. 13. lib. 24. Pau. lib. 7. adstringit & semen incidit.

Palma graece φοινίξ, res nota est, nam dactilis, quos ipsa fert libenter uescimur, in quorum numero ponuntur etiam tamarindi, qui nil aliud sunt quam dactili indiani. Diosco. cap. 129. primi. Galenus octauo de facul. simp. & secundo de facul. alimen. pau. libro septimo, fructus iam maturus calefacit reliquis palma ualde adstringit.

Panax, siue παῖς, quum triplex sit Aesclepium. s. ab Aesculapio, chyronium a chyrone & heracleum ab Hercule, & si aliquibus cognitum dicatur, reuera tamen ego non uidi, sunt qui pro panace Aesclepio monstrant mille folium uulgarre, & pro chyronio inulam campanam, uide tamen Diosco. cap. 50. & 51. & 52. tertij. Galenus octauo de fac. simp. plin. cap. 27. lib. 12. & cap. 4 lib. 25 pau. libro septimo. Herculeum calidum in tertio, & siccum in secundo, mollit, & discutit ex hoc fit opopanax Aesclepiū et chironiū priori sunt calidiora

Pancration siue παγκράτιον, est minor & rotundior scilla, uide Dioscorid. cap. 165. secundi. uide etiam de scilla. Galenus octauo de faculta. simp. paul libro septimo, specie & uiribus scilla simile est.

Panicum omnibus notum, Galen 6. de fac. simp. pau. lib. 7. siccat, & refrigerat.

Papaueris genus siue ῥίον, duplex est, alterum syluestre, alterum domesticum syluestre est id quod flores puniceos, siue rubeos habet, cuius flores inquam a uulgo in laterali morbo sicci habentur pro efficaci remedio, domesticum uero rursus duplex album. s. & nigrum, quāquā horum a Diosco. tertia species assignetur, uide Diosco. cap. 62. & 63. quarti, Gale septimo de fac. simp.

Papauer cornutum, siue ῥίον κέρατος, saepius a me uisum,



sed spumeū, quod prope mare nascitur haudquaquā. Theoph. cap. 13. lib. 9. Qui dicunt glauciū ex hoc papauere fieri, quod & memithe Arabes uocant, reuera decipiūtur Diosco. c. 64. & 65. quarti, Gale. septimo de fac. simp. Pau libro septimo, adstringendi uireis habet.

Papirus, siue *πᾶπιρος*, in Italia non habetur, ut Theoph. capi. 9. lib. 4. & plin. ca. 11. lib. 13. sed tantum in Aegypto, olim ex papyro cartæ conficiebantur, unde etiam nomen adhuc retinet, Diosco cap. 100. primi, Gal. 8. de fac. simp. pau. lib. 7. siccat, cartæ crematæ modo.

Paronychia, siue *παρωνυχία*, & si a multis herbarijs cognita, nunquam a me uisa est. scio tamen folia iuxta radices rotunda habere similia peplo, uide Diosco cap. 52. quarti, Gale. octauo de fac. simp. Pau. lib. 7. extenuat, siccat paronychij me dens citra erosionem.

Parthenium, siue *παρθένιον*, uulgo dicitur matricaria, ouer amarella, nomen adhuc seruans amaraci, nec est secunda species artemisiæ, ut Brasauola & Fuchsius, nec est coltula fetida nec helxine quam paritariam dicunt, ut nonnulli sunt qui dicant athanasiam uulgo daneda uocatam esse speciem matricariæ, Dioscor. cap. 146. lib. 3.

Pastinacæ græce *τᾶφυλινος*, tam domesticæ quàm syluestres sunt cognitæ, uulgo pastonache dicuntur, nec sunt carubiæ, siue carotæ, ut Ruellius, quum non habeant radices sanguineas, ut carobæ. Decipiuntur etiam qui pro dauci semine, semē pastinacæ accipiunt, quum alia res sit daucus a pastinaca, Diosco. c. 54. tertii, Gal. 8. de fac. simp. Pau. lib. 7. urinas & menses mouet ad, bringēdi uiribus prædita, syluestris tñ est ualētior.

Pastinaca piscis græce *τεγορόν* est qui uulgo dicitur pesce columbo, in cauda habet spinam acutissimam & uenenosissimam, unde plin. cap. 8. lib. 32. pastinacæ quoq; radio scarificare



care gengiuas & in dentium dolore utilissimū conteritq; is et cū elleboro albo illitus, dentes sine uexatiōe extrahit. Diosc. ca. 19. 2. ex oleo in quo hepar huius piscis sit decoctū, scabies non solum in hominibus sed etiam in beluis probe expellitur.

Peplius, siue *πέπλος*, a seplasiarijs esula rotunda dicitur & est herba lacte plena, Peplis uero quū in maritimis locis nascatur, nunquā a me uisus est, Diosc cap. 162, & 163 quarti, Gale. 8. de facul. simp pau. lib. 7. eius liquor tithymalorum modo purgat.

Peucedanum siue *πέυκεδάριος* olim Dioscoridi familiare, mihi incognitum est, nec quod pro peucedano monstratur est uerum peucedanum, si diligenter res examinetur sed quum optimum in sardinia oriatur, non esset forte difficile, ut cognosceretur, Diosc cap. 83. tertij, Gal. 8. de fac. simp plin. ca. 9. li. 25. Pau. lib. 7. calefacit, discutit & siccatur in tertio ordine.

Phalaris, siue *φάλαρις* est species lithospermi, quod a seplasiarijs dicitur miliū solis, nam maius & minus reperitur, Diosc. ca. 150. tertij, plin. cap. 12. lib. 27 pau. lib. 7. calida est & tenuis doloribus uesicæ prodest.

Phaselus, siue *φασίολος* uulgo fasolo, cuius spēs plures enumerantur coloribus distinctæ, nam aliqui sunt rubri, albi, alij citrini flauiq; & ex diuersis coloribus picti, Diosco ca. 99. secundi, uide de smilace Auerroim, declinant ad calidum et humidum impingunt corpus.

Phu. siue *φῦ* est ualeriana maior, nam minor etiam reperitur, quæ similis est maiori, nisi quod lanuginosior & breuior est, flores fert albos & purpureos simul mixtos, multas radices tenues habet, maior autem similis olusatro caulem habet cubitalem & maiorem & cetera, quæ in ualeriana uisuntur demptis floribus, qui Narciso nō sunt similes, q̄q̄ locū hunc in Diosco. corruptū putat Ruellius, quod fieri potest,



quum cetera sint satis manifesta. Diosc. ca. 10. primi, Galen. 8. de fac. simp. uim habet nardo similem.

Phycus marinus, siue  $\phi\upsilon\kappa\omicron\varsigma\ \tau\alpha\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota\omicron\nu$ , quid sit nescio interpretatur latine alga a Theodoro. sed non est alga, quæ Venetijs in seruandis uitris reponitur Diosc. cap. 95. quarti, Gal. 8. de fac. simp. pli. ca. 23. li. 13. pau. lib. 7. refrigerat, siccatur in secundo & mediocriter adstringit.

Phyllitis, siue  $\phi\upsilon\lambda\lambda\iota\tau\iota\varsigma$ , est lingua ceruina olim pro scolopendria habita olim inquam, quum reuera nunc sit asplenon, siue citrach arabice dictum, nec est hemiotitis lingua ceruina, ut Manardus Leonicens et Fuchsius et Ruellius adserunt, si locus recte prædatur. Diosc. c. 112. tertij, Gal. 8. de fac. simp. diarrheam cohibet phyllitis. Pau. lib. 7. acerba qualitate constat.

Phyllyrea, siue  $\phi\upsilon\lambda\lambda\upsilon\rho\acute{\epsilon}\alpha$ , non est tilia, ut Hermolaus Ruellius et Marcellus Florentinus interpretantur, nam tilia graece  $\phi\upsilon\lambda\lambda\iota\rho\alpha$ , & non  $\phi\upsilon\lambda\lambda\upsilon\rho\acute{\epsilon}\alpha$  dicitur, de tilia scripsit Theoph. cap. 10. lib. 4. cuius cortex modo emplastri recentia uulnera conglutinat & folia eius trita inflammationes pedum resoluunt, et facit capillos renasci prohibens etiam eorum profluuium, Phyllyrea arbor ignota est nostro tpe, uide Diosc. c. 110. primi, pau. li. 7. tiliae folia adstringunt ideoque ulceribus oris medentur.

Phyllon, siue  $\phi\upsilon\lambda\lambda\omicron\nu$ , uulgo folio, nisi sit persicaria maior, ut Ruellius, nescio profecto quid sit, uide Diosc. ca. 131. tertij, nullibi a Gale. nec a Paulo mentio habita est.

Pityusa, siue  $\pi\iota\tau\upsilon\varsigma\alpha$ , a seplasiarijs Esula maior uocatur, cuius radices ab ijs qui a monte Gargano siue sancti angeli ueniunt, pro turbit uenduntur a peritis tamen medicis neglectae, haec uero Esula maior alscebram, & scebram a Mesue nominatur, cuius rei fidem facit Serapio ca. de scebram, uide Diosc. cap. 160. lib. 4.

Plantago graece  $\alpha\rho\upsilon\alpha\tau\lambda\omega\sigma\omicron\varsigma$  res notissima, maior et minor inuenitur quæ non desint, qui lanceolam herbam esse planta-



ginis affirmant, maior constat septē neruis, media quinque, minor tribus, habent facultatem, aqueam frigidam cum aliquanti austeritate, ut Gale. 6. de fac. simp. Diosc. ca. 115. secundum pau. lib. septimo, refrigerat & desiccatur in secundo temperata ex aquea & terrestri substantia.

Platanus, siue *πλάτανος* in Italia, ut refert Theoph. non nascitur, uide tamen Diosc. de eius uiribus, ca. 92. primi, plin. capi. 7. lib. 15. & Gale. 8. de fac. simp. exiccat & infrigidat, a latis folijs platanus dictus est, habet instar fici folia, pau. lib. 7. frigidior & humidior ui constat.

Polemonia, siue *πολεμώνιον*, nisi sit galega, siue *gearcha* dicta, ut refert Brasauola, nescio quid sit, non habet tamen in summitate corymbos, ut refert Diosc. cap. 9. quarti, uide Gal. 8. de fac. simp. & plin. cap. 6. lib. 25.

Polium, siue *πόλιον*, sunt qui pluries uidisse affirmant, scio ego in hoc seplasiarios decipi, nam herbam pro polio ostendunt quæ caules ualde tenues & lino similes ex seminibus rotundis onustos habet, quæ polium reuera non est, uide plin. c. 7. li. 21. et Theoph. ca. 21. li. 9. Gale. 8. de fac. simp. et Diosc. c. 115. tertij, pau. lib. 7. tertij, calefacientium & siccantium ordinis est.

Polygonon, siue *πολύγονον*, i. herba sanguinalis tam mascula quam femina omnibus nota, uulgo corrigiola, siue centinodia dicitur, Diosc. ca. 4. & 5. lib. 4. pli. ca. 12 lib. 27. Gale. 8. de fac. simp. pau. lib. 7. habet uim adstringendi frigida & humida in secundo ordine.

Polygonaton, siue *πολυγόνατον*, uulgo frasinella, siue ginocchiella dicitur, cuius radicibus libenter mulieres ad fucum utuntur, ab aliquibus etiam uocatur sigillum sanctæ Mariæ, et sigillum Salamonis, Manardus in hoc deceptus est credens polygonatū esse secacul arabum, nam Serapio scribens de secacul nihil refert quod ad polygonatū attineat, Gal. 8. de fac. simp.



Diosco. ca. 6 lib. 4. Paul. lib. septimo, uariæ facultatis est ad-  
strictoria acris & amara.

Polypodium, siue πολυπόδιο, oïbus notū, attuarius purgat  
bilem nigrā & pituitā, Manardus soluit sine molestia, Me-  
sues extenuat corpora quod et Gal 8 de fac. simp ualēter exic-  
care inquit sine mordacitate Diosco. cap. 179. quarti plin. ca-  
pi. 8. lib. 26. siccatur abunde citra modum.

Pompholix, siue πομφόλυξ, qua utuntur seplasiarij non est  
pōpholix, sed potius cadmia, quod uero tucia non sit, apparet  
quā tucia uera leuissimus quidam puluis sit, non autem ut la-  
pis ac nostra uidetur, quare apud pharmacopolas nō inueni-  
ri tuciā nunc affirmare, nisi aliā habere forte inuestigauerit,  
uide Diosc. cap. 42. 5. nec ausus est aliquis qđ sciā hāc in cata-  
potijs, siue pharmacis, quæ p os deglutuntur tuciā imponere.  
Gal. 9. de fac. sim. pli. c. 13 li. 34 pau li. 7 siccatur sine erosione.

Populus siue ἄρεπος tam alba q̄ nigra nota est oïbus uulgo  
ab Hetruscis dicitur oppi, a Longobardis Pi. pe. ex quibus fa-  
bulantur electrū oriri sed reuera ab insula quapiā olim Au-  
strauia dicta a quibusdam arboribus nostro pino similibus ef-  
fluit et ad Germaniā p maris inundationē aliqñ perfertur, hoc  
uulgo dicitur a seplasiarijs charabe, nec est gumi populi, ut nō  
nulli retulerūt Diosc. c. 94, et. 98. 1. pli. ca. 24 lib. 16 pau li. 7.  
Nigra calefacit in primo modice siccatur tenuis substantiæ, alba  
aquosa est tepida terrestriq; substantiæ & abstergoria.

Porrū capitatum græce πρᾶσον κεφαλῶτόν oïbus notum sed  
quō capitatū euadat etiā nostro tēpore cognitum est, nā in  
tēpore transplantationis si folia et radices porris incidantur,  
& aliquid quod illud descendere prohibeat in plantando sub-  
ter ponatur, facile capitatū euadit, Diosc. cap. 38 lib. 2 de por-  
ro uero agresti lege ampel. oprasō. pau. lib. septimo, mali suc-  
ci est & acris extenuat & abstergit.



Fortulaca, græce αἰδράχλω, uulgo porcellana. Gal. 6. de fac. sim frigida in 3. et humida in 2. biliosos ac calidos humores cohibet et ut refert pli. c. 21. li. 20. rupturas umbilici constringit, Diosc. c. 113. 2. pau. li. 7. refrigerat in 3. humectat in secundo.

Potamogeton, siue ποταμόγραν, uulgo dicitur beta aquatica, nascitur in lacustribus & aquosis locis, pruritibus ac uetustis & depascētibz ulceribus prodest, Diosc. cap. 96. quarti, Gale. 8. de fac. simp. pau. lib. septimo, refrigerat et adstringit.

Psyllium, siue ψύλλιον, res notissima est, cuius semine in refrigerandis corporibus saepe utuntur Medici, nam ut refert Gal. 8. de fac. simp. frigidum est in secundo, humectat, & desiccatur mediocriter. Lin. ca. 9. lib. 25. Diosc. cap. 68. lib. 4.

Ptarmice siue πταρμύκη, uulgo oliuella, capleriq; proscopis utuntur & dicitur ptarmica, eo qd odorata planta statim sterutamenta irritat. Diosc. ca. 151. secundi, Gal. 8. de fac. sim. uiridis calida, & sicca in secundo, siccata uero in tertio ordine.

Pulegium græce ῥάϊκον omnibus notum, inuenitur masculum cum floribus albis, & femellum cum floribus purpureis, qui dicunt speciem calamēti esse id quod in usu est ualde decipuntur, siquidem calamēti species per se omnes inueniuntur Diosc. cap. 31. tertij, Gale. 6. de fac. simp. pli. ca. 14. lib. 20. extenuat, calefacit concoctionesq; adiuuat ut Gal.

Pumex græce κλασνῆς est lapis combustus ex monte Aethnae uel uesuuino monte campaniae, qui si iterum comburatur non erit symra inferior. Diosc. cap. 79. quinti, & Gale. 9. de fac. simp. habet uim exiccandi & abstergendi.

Pyrethrum siue πύρεθρον res est quo ad suas radices notissima habet folia ueluti daucus & faniculus agrestis, Diosc. cap. 78. tertij, Gale. 8. de fac. simp. facultas eius est caustica.

Pyrites lapis siue λίθος πυρίτης, uulgo dicitur Marchesita, & ob excellentiam pyrites dictus, probatur qui est aeri similis.



Diosc. cap. 96. quinti, Gale. 9. de fac. simp. Pau. lib. 7. ualide discutit tumores sanguinemq; in grumo concretum.

Quercus græce δρῦς res notissima, connumeratur inter arbores glandiferas, sicuti etiam Elix, Fagus, Cerus, Suber, Farnia, Ischia, uide Diosco. ca. 126. primi, Gal. 6. de fac. simp. pau. lib. 7. folia & fructus siccante ac tepida ui pollent.

Quinque folium, siue πεντάφυλλον, habet plures species, quarum prima est maior, quæ folia mente similia & florem in pallido candidum habet secunda species a prima tatum in colore differt, tertia per terram serpit, quarta quæ folia similia uiti tenet, ab aliquibus diapensia, uel sannicula dicitur, uide Diosco. cap. 40. quarti, Gale. 8. de fac. simp. radix eius exiccatur in tertio, nec euidentem habet caliditatem, pli. ca. 9. li. 25.

Radix græce ῥαυανέλιον, uulgo rauanello, Gale. 8. de fac. simp. calida est in tertio, & sicca in secundo. Diosc. cap. 104. li. 2.

Radicula græce ῥαυανέλιον, siue herba lanaria sicuti tempore Diosc. cognita, ita nunc maxime restat incognita. Diosc. cap. 153. secundi, Gale. 8. de fac. simp. Pau. lib. septimo, calefacit in tertio, siccatur in secundo.

Ranunculus græce ῥαυανέλιον, est apium raninum, cuius species quatuor enumerantur. s. apium, quod est pes columbinus, pes paipi, pes milui & apium risus, quod herba sardonias alias appellatur, unde uirg. immo ego sardonius uidear tibi amarior herbis, hæc si ab homine deuoretur, ita interficit, ut contractis neruis instar ridentis moriens uideatur. Diosco. cap. 166. secundi, plin. cap. ult. lib. 25 pau. lib. septimo, omnia genera sunt excellenter calida, sicca, acria, urentia.

Rhamnus, siue ῥαμνός, nisi sit quod uulgo dicitur spin ceruino, aut id quod Hetrusci dicunt marucho, ne scio si alio nomine illum agnoscam. Diosc. ca. 104. primi, Gale. 8. de fac. simp. exiccatur & digerit in secundo, pli. cap. 14 lib. 24.



Rhaponticum græce ῥαποντικόν, uulgo dicitur Rapontico, notum est omnibus Diosc. cap. 2. tertij. plin. ca. 12. lib. 27. Gal. 8. de fac. simp. pau. lib. 7. compositum ex terrestri frigida & tenui substantia aereaq; calida & leuiter acri.

Rhabarbarum, uulgo reubarbaro, cognoscitur differenter ab omni rhapontico, de quo satis ample tractauit Mesue.

Rhodia radix, siue ῥοδια, nisi sit quæ garyophyllata dicitur, certe nescio si unquam uiderim, hoc scio, eam, odorem rosarum, a quo nomen accepit redolere. uide Diosco. cap. 43. quarti. Gale. 8. de fac. simp. pau. lib. 7. calefacit in secundo, tenui & discutiente ui prædita.

Rhus obsoniorum græce ῥυς, uulgo dicitur sumacho, in condiendis enim cibus antiqui hoc, loco salis utebantur, ueluti etiam nunc in Syria & Aegypto obseruatur, Diosco. cap. 128. primi, Gal. 8. de fac. simp. pau. lib. septimo, constringit, & exiccat in tercio, detergit in secundo.

Ricinus frutex græce ῥικινος, uulgo mirasole, dictus est ricinus ab animale ricino, uulgo zecca quæ in equis & canibus sepe uisitur, quæ heliotropios sit mirasole, dicitur a seplasia-rijs cherua maior, & a Mesgranū regis, Gale. 7. de fac. simp. Diosc. 1. 8. quarti. pau. li. 7. purgat abstergit & digerit.

Rosmarinum græce ῥοσμαρινός, habet duas species, quæ a me nondum uise sunt, rosmarinū coronarium est, quo passim utimur, & uulgare nostrum, Diosc. cap. 79. & 80. tertij, Galenus septimo de fac. simp. habet uim incidendi & abstergendidi, plin. cap. 11. lib. 24.

Rosæ, siue ῥοσά, omnibus notæ, excellentiores sunt rubræ, post has minus rubræ demum albæ, componuntur ex diuersis substantijs, ut Gale. putarem ego earū infusionem, potiore fieri, si ex damascenis rosis pararetur. Diosco. cap. 115. primi, Gal. 8. de fac. simp. pau. lib. 7. iuxta cōstāt substantiæ aquosa. f. ca.



lida adstringēti et amara, flos aut magis adstringit et desiccāt.

Rubus caninus. græce *κυνόσβατον*, non est rosa sylvestris, ut nonnulli putarunt, quum cynorhodon a Cynosbato sit aliud, teste Theoph qui diuersa capita agit, nam de cynosbato loquitur ca. 18. tertij, & de rosa canina cap 6 lib 6. Diosco. capi. 108. primi, Gal. 7 de fac simp fructus adstrictorius & c.

Rubia græce *ῥοῦβία*, omnibus nota, cuius caulibus & folijs ob suam asperitatem, utuntur famina ad illustrandum stagnum, Dioscor. cap. 15. tertij, Gale. 6. de fac simp pau. lib. 7 radix acerbā & amara ita iecur & renes purgat ut sanguinem & menses euocet.

Ruscus græce *ῥυσκίον*, apud Seplesiarios bruscus dicitur, & est herba spinosa similis myrto, quam et sylvestrē mirtum dicunt, eius germina in acetarijs comesta ualenter urinam prouocant & obstructions aperiunt. Dioscor. cap. 14. libro quarto.

Ruta græce *ῥούτα*, duplex est sylvestris montana & satia hortenſis & ambæ species cognoscuntur. Gale. 8 de facul. simp. calida in quarto, est sylvestris & satia in tertio, contra fascinationes eam comendauit Arist. in suis problematibus. Diosco. cap. 47. tertij.

Ruta sylvestris græce *ῥούτα ἄγρια*, hanc harmel Arabes uocant sed quum ex Cappadocia & Galatia herba afferatur, nimirum si nostris partibus non habeatur, qui uero pro harmel semen cicutæ accipi consulunt, ualde decipiuntur quum res sint diuersæ, uolunt aliqui geargam esse rutæ speciem uulgo galega dictam, cui attribuunt, in peste, & contra ueuena miram quandam uirtutem, uide tu tñ Diosc. ca. 48. tertij, Gale. 7 de fac simp. uocat eam moli.

Sabina græce *σαβίνη*, uulgaris est planta, tam quæ similis est cupresso, quæ Tamarisco, cognoscitur. Diosc. ca. 89. primi,



Gal. 6. de fac simp. plin. cap 11 lib. 24. pau. lib. 7. calefacit & siccatur in tertio.

Saccharum siue σακχαρον, Dioscoridis & Galeni quid sit, nonnulli esse ex eodem liquore quo nostrum affirmant, nec ab nostro differre dicunt, nisi arte & natura alij uero longe, a nostro differentem existimant nec eodem liquore cōfici, sed ueluti ex rore factū credunt, Diosc. c. 74. ad finē lib. 2. Gal. ca. de Melle pau. li. 7. c. de melle Sacchar minus dulce nostro, sed æquales uireis obtinet, nec nocet stomacho, nec sitim efficit.

Sagapenum siue σαρδαπυον, uulgo serapino, liquor est ferulaceæ herbæ electissimum habetur Venetijs potētius est orientale, de eius uiribus uide Mesuen, & Diosc. ca 85. tertij, Gal. 8. de fac. simp suffusioni oculorū, et debilitati uisus ualet pau. lib. 7. calidum & tenue cui absterforia uis inest.

Salix arbor græce ῥαῖα, nota est, cuius species recitantur a Theoph. & pli. de tribus succis eius mentionem facit. s. de gumi, & de eo qui fit inciso eius cortice, & de eo qui incisis ramis tempore autūnali per se destillat habent n. uim exte-  
rendi quæcunq; claritati oculorum officiant. plin. ca. 38 li. 15. Gal. 6. de fac. simp pau lib. 7. folia & flores siccant citra ro-  
sionem, & nonnihil adstringunt.

Salvia græce ῥωσισφακον, omnibus nota, ab Agrippa herba sacra uocabatur, eius succus bibitus facit, quæ steriles sunt mulieres prolificas, & confert spūto sanguinis, uide tñ de his Aet. & Diosc. cap 3. tertij, Gale. 6. de fac simp. pli. ca. 6. lib. 26. inquit, q̄ succus foliorum capillos generat, pau lib. 7. euidenter calefacit & leuiter adstringit.

Sambucus & ebulus græce ἀμύλη plantæ notissimæ, succus corticum radicum hydropicis succurrit & semen ebuli in decocto iuæ dolores iuncturarum podagræ & morbi galici tollit, succus etiam eius in sole exiccatus & in chysteribus



iniectus sciatica medetur, fomentum etiam ex eorum radicibus factum tumores pedum qui ex longo morbo prouenerunt, optime resoluit Diosco. cap. 168. quarti, Gal. 6. de facul. simp. exiccat & conglutinat, plin. cap. 8. lib. 24. pau. lib. septimo, desiccat, modice digerit & conglutinat.

Sampsuchum, siue σαμψυχον, uulgo maiorana, nec miretur quispiam, si per diuersa capita mentio fiat a Gale. & a Diosco. de sampsucho & amaraco, nam hoc fieri potuit, ut rem melius exprimeret Diosc. nam in Gale. creditur in eo textu esse menda, ubi pro amaraco legi debeat maro & non amaraco. Diosc. ca. 42. tertij, Gal. 8. de fac. simp. pau. lib. 7. calefacit & siccatur in tertio, tenuis ac discussoriae naturae.

Sandaracha, siue σαρδαράχη, non est uermix, ut aliqui putarunt, quum uermix sit gumi iuniperi, sed est potius res mineralis, quae ab auripigmento non differt, nisi in coctura, nam si quis diu auri pigmentum coxerit, facile illud in sandaracham conuerti efficiet, nec arsenicum crystalinū ex auri pigmento per sublimationem paratur, ut nonnulli crediderunt, sed potius est res mineralis per se oriens, uerum quod uulgo dicitur risagalū ex arsenici, & auri pigmenti pari portione per sublimationem bene conficitur, uide Diosc. de sandaracha ca. 76. 5. & Gal. 9. de fac. sim. pau. li. 7. adurētis est facultatis.

Sarcocolla, siue σαρκον'λλα, est gumi cuiusdam in perside arboris, mire conglutinat recentia uulnera, & ulcera antiqua mundificat glutinat & carnem inducit, & est mirabilis in oculorum destillationibus, optima cognoscitur si sit amara & alba, ualet et ulceribus aurium si in mellicrato bōbix intingatur, deinde pulueri sarcocollae inuolutus auri imponatur. Diosco. ca. 90. tertij, Gal. 8. de fac. simp. plin. cap. 11. lib. 13. paul. lib. septimo, siccandi ac opplendi uires habet.

Satyrion, siue σατύριον, non habetur nostris tēporibus, sed



eius loco utimur testiculis canis, nec Satyrion habet duas radices, ut putarunt nonnulli, sed unam tantum bulbosam pomo similē plures sunt, deinde testiculorū canis species, inter quæ palma christi reponitur. Diosc. ca. 134. & 135. tertij, Gal. 8. de fac. simp. pau. li. 7. calidi & humidi tēperamenti est, unde ueneris appetentiam facit.

Saxifraga, uulgo salsifragia, uulgaris herba est, in frāgen dis lapidibus, & in prouocanda urina sumopere comendatur. Diosc. ca. 17. primi, & pau. lib. septimo, urinam mouet et calculos conterit.

Scāmonia, siue σκαμμωνία, uera & optima erat, quæ ex Mysia Asie olim afferebatur. sed quæ a Diosc. reprobatur in Iudea & Syria oriens, tantūmodo nūc in usu est, nec uera sic alacriter soluit ac nostra, nā olim drachma scamoniæ cū duobus hellebori pro dosi tribuebatur, sed nostra si ad pondus decem, uel quindecim granorū exhibeatur, adeo uentrē exonerat, ut etiā q̄ maxime superq; euacuet Diosc. ca. 165. quarti. pli. cap. 8. lib. 26. pau. lib. septimo, calefacit, digerit, & biliosa ex tergit magisq; eius liquor.

Scilla, siue σκίλλα, uulgo deflexa uoce a seplasiarijs dicitur squilla, referūt nonnulli ut si minutim incisa in uase uitreo melle pleno per totā astatem soli exponatur, deinde epileptico colata tribuatur, præsenteū esse remediū, Gal. 8. de fac. simp. incidit scilla, sed nō adeo calida, ut scdm gradum transcendat, Diosc. cap. 102. secundi, pau. libro septimo, incidit & calefacit & desiccāt in secundo ordine.

Scordion, siue σκόρδιον, uerū nunc inuenitur simile chamedrio differens tñ odore allij, Cretēse a Gal. in lib. Anti. 1. laudatur, et. 8. de fac. simp. cōponitur ex diuersis substātijs consolidat oīa uiscera, ruptis et spāsmo cōfert, ualet doloribus lateris modo emplastri et recēs uulnera ac ulcera cōglutinat. Dio



scocap. 6. tertij. pau.uarijs constat facultatibus quā amarum acerbum & acre sit purgat igitur & calefacit.

Sedum græce ἀνέμων, uulgo semper uiuo dicitur, cuius species tres numerantur a Diosco. cap. 85. & 86 quarti. Maius uulgo dicitur orchiella, minus dicitur uermicularis uel pignola, & est mascula & femella, Gal. 6. de fac. simp. frigida intertio, mediocriter adstringit & siccāt leuiter pli. ca. 2. lib. 25.

Senetio græce ἡριπύρον, uulgo dicitur speliciosa coliculus inest, quodammodo rubens folijs longis & incis, ueluti in eruca uisitur, flores lutei cito in pappos desinentes, Gal. 6. de fac. simp. Diosc. cap. 92. quarti. Donnuli esse cardum benedictum affirmant. pau. libro septimo, mixta. habet uircis refrigerat enim & modice discutit.

Serpyllum græce ἑρπύλλον, res est notissima. Vide Diosco. cap. 41. tertii. Gale 6. de facul. simp. plin. cap. 22. lib. 20. paul. lib. 7. adeo calefacit ut urinam & menses moueat.

Sesamum siue σισίανος, eius semen notum ac uulgare est, sed planta a seplasiarijs minime cognita, est enim similis milio, sed aliquantulo crassior & altior, folia fert rubra cum flore uiridi, & producit in siliquis semen ueluti papauer. Diosco. cap. 90. secundi, Gale 8. de facul. simpl. plin. cap. 10. lib. 18. pau. libro septimo, mediocriter calefacit, mollit, & opplet. Auer. quinto colliget, callidum in primo, humidum in tertio.

Seseli, siue σέσλι Arabice siseleos dicitur, notum est præsertim Maxiliense ualidissime urinam prouocat & epilepsie ac spirandi difficultati medetur, creditur a ceruis inuentū, nam a partu id statim comedunt, ut denuo concipiant, sicut refert Ari. 9. de natura animalium, ca. 5. Diosc. c. 55. 3. & Gal. 8. de fac. simpli. plin. c. 5. li. 20. pau. li. 7. calefacit tenuisq; substantiæ est.

Sideritis, siue σιδήριτις, quid sit, certe nescio quum nusquam illa uiderim, nec est herba iudaica, ut Ruelius, nam herba iu



laica est, quam uirgam auream appellamus, hæc caulem fert rubrum ad duorum cubitorum altitudinem cum foliis modo oliuæ circuncirca incisus et floribus in summitate aureis, uulneibus et fistulis mire confert similiter in frangendo lapide ut Arnaldus de uilla noua, Dioscorides cap 33. quarti. Gale. 8. de fac. simpl. Paul. libro. 7. adstringit.

Sinapis siue *σινάπις*, res est notissima triplex ex syluestribus quæ semen habet paruum, comunis quæ folia habet rapis similis et tertia quæ uulgo dicitur Rugetta album semen ferens et eo utimur, in seruanda uinorum dulcedine Dioscor. cap 143. lib. 2. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 8. lib. 19. Auic. lib. 2. calida et sicca in quarto.

Sifer siue *σισυμβριον*, res est propemodum similis pastinacis domesticis, nascuntur in Germania et uocantur rapaci rinae, uide Plin. ca. 5. lib. 19. Dioscor. cap. 106. secundi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. cal. in tertio ord. Radix cocta stomacho uilis urinam cit, semen tenue et discusso ium cum uino ualet singultui.

Sisymbrium siue *σισυμβριον*, est seplastiorum balsamita, uulgo menta romana uel menta florentina, Sisymbrium uero aquaticum est id quod uulgo dicitur crescione, Dioscor. cap. 117. secundi, Theoph. cap. 7. lib. 6. et cap. 8. lib. 5. de plan. cau. sa et Plin. cap. 10. lib. 19. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. calefacit et cit; in primo, humidum in secundo abscessu.

Sio siue *σιον*, non est quod uulgo dicitur crescione, sed aliud, uerum unum absque altero raro inuenitur, non habet folia lata olusatris similia, sed crescionus habet quales in eruca uisuntur, Dioscor. cap. 116. secundi, Plin. confundit utrumque siue i. sium uerum et sisymbrium aquaticum, ut apparet cap. 22. lib. 22. Gale. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. calidum est urinam citat discutit et renum calculos frangit.



*Smilax aspera* & *levis*, græce *σμιλαξ τραχεία κὶ λεία*, inueni-  
tur aspera quæ folia habet periclymeno similia, arboribus ad-  
uoluitur, & habet innumerosas uiticulas spinosas cum fructu  
uue racemi modo rubenti, lenis uero hederæ folia habet simi-  
lia & uiticulas similes antedictæ, sed non spinosas uulgo ui-  
luchio & a seplasiarijs uolubilis dicitur flores habet orbicu-  
latis, ueluti cāpana, Theoph. cap. ult. tertij, Diosco. ca. 139, &  
140, quarti, Gal. non *smilacē*. sed *milacem* uocat septimo, de  
fac. simp. plin. cap. ij. lib. 16, & ca. 10. lib. 24.

*Smilax arbor*, uulgo de flexa uoce, a *taxo* sic a Romanis  
appellato. *Nasso* dicitur. Vide Diosc. cap. 78. lib. 4. caue tñ ab  
huius fructibus, quoniam interficiunt, Plutarchus inquit, q̄ so-  
la umbra interficit, sed de ea tu intellige, quæ in carbonia na-  
scitur, paul. lib. septimo, est uirose uirtutis.

*Smilax hortensis*. siue *σμιλαξ κητώσις* sicut qui illum esse exi-  
stiment phasellum rubeum, qui uulgo *fasolo turchesco* appel-  
latur, Manardus tenet q̄ sit Galeni *dolicus* & uulgo quod di-  
citur *rouiglione*, sed credo illum decipi, quoniam quod dici-  
mus *rouiglione*, Gal. & pau. non *dolicum* uocant, sed potius  
*ocrum* Diosc. cap. 135. lib. 2. Gal. 1. de fac. alim.

*Smyrniū*. siue *σμύρνον* uulgo dicitur *Macerone*, nec est im-  
peratoria, ut nonnulli quæ commendatur in omnibus frigidis  
ægritudinibus, sicut in doloribus colicis & stomachi, men-  
strua peruocat & urinam, dolores dentium tollit & cum ui-  
no strangulatui uulue medetur, cerebrū masticata purgat, &  
eius puluis ad epilepsiā spasmus, paralesim, et ad febrē quar-  
tanam ante eius paroxysmum per horā utiliter cū uino bibi-  
tur, ualet in peste, et ad oīa uenena spiritum redolere et mem-  
bra sensuum roborare pōt, datur insuper, asthmaticis icteri-  
cis hydropicis & lienoris utiliter, De *smyrnio* loquitur Dio-  
sco. cap. 72. 3. Gale. 8. de fac. simp. plin. cap. ult. lib. 19 pau. lib. 7.



calefacit & siccatur in tertio ordine.

Solanum, græce *ἑρπυλλος*, uulgo dicitur solatro, cuius species a Diosc. quatuor enumerantur, ut solanum hortense halicaccabum, somnificū, & Furiosum, Hortense & halicaccabum, nunc passim cognoscantur, nam halicaccabum est id quod Arabes uoce parum deflexa Alchachengi dicunt, plures etiam species inueniri dicuntur, sed de his quasi per somnium loquuntur Authores, uide Diosc. ca. 69. 70. 71. & 72. lib. 4. Gal. 8 de fac. simp. pli. ca. 31. lib. 21. pau. lib. septimo. Hortense & Halicaccabum adstringunt, & in secundo ordine refrigerant.

Soncos, siue *σόνκος* sunt qui scariolam esse dicunt, Scio apud hebræos uocari Cicerbita. Diosc. c. 120. 2. Gal. 8. de fac. simp. pau. lib. septimo, Adstringit & manifeste refrigerat.

Sparganium, siue *σπάργανον* hucusque non uidi, et si ab aliquibus reperta esse dicatur, hoc scio non esse spatulam fetidā, ut Ruellius, ex cuius succo sanatur scabies & uolaticæ, de sparganio uide Diosc. cap. 23. 4. Gale 8. de fac. simp. pau. lib. septimo, siccandi uireis habet. plin. cap. 9. lib. 25.

Spina alba, græce *λευκακαία*, uulgo bedeguar, dicitur, sicuti Arabice sunt: qui pro spina alba accipiunt carduum benedictum, alij carduum carlinam dictum, alij, alium carduum, Aduerte tñ tu bedeguar tantum nasci in montibus & syluosis locis. Diosc. ca. 123. Gal. 6. de fac. simp. Radix desiccatur et modice adstringit, semen est tenuis essentiae, et calidae facultatis.

Spina Arabica, siue *ἀκανθα ἀραβικὴ* est similis albæ, ego eam non uidi: hoc scio non eam esse, ut Ruellius putat spinam arboris acatie. Diosc. cap. 73. 3. Gale. 6 de facul. simp. Validius adstringit & desiccatur.

Spondylium siue *σπονδύλιον* non uidi. Audiui ab aliquibus esse inuentum, ualet epilepsie eius fructus & orthopneæ, uide Diosc. ca. 81. 3. Gal. 8. de fac. simp. pau. libro septimo, con-



pat uirtute acri & discussoria.

Stachys, siue  $\sigma\tau\alpha\chi\upsilon\varsigma$ , nisi sit Marubium album, nescio quid sit Diosco. cap. 31. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 15. lib. 24. pau. lib. 7. 3. in calefaciendo ordinem occupat.

Stacte, siue  $\sigma\tau\alpha\kappa\tau\eta$  est styrax liquida Diosco. cap. 64. 1.

Staphis agria, siue  $\sigma\tau\alpha\phi\iota\varsigma\ \alpha\gamma\rho\iota\alpha$ , uulgo dicitur strafusano, siue uua seluatica Diosco. cap. 150. 4. Gal. 6. de fac. simp.

Stibium graece  $\sigma\tau\iota\beta\iota\upsilon\mu$  & stibi, Antimonium est, ut placet Auic. & Serap. funditur ipse, & omnia metalla facit fluida, ut ferrum &c. Diosco. cap. 53. 5. Gale. 9. de fac. simp. exiccat, & constringit plin. cap. 6. lib. 33.

Stechis siue  $\sigma\tau\epsilon\chi\iota\varsigma$  Arabice stichados, est res notissima, uide Mes. & Diosco. cap. 28. 2. Gal. 8. de fac. simp. pau. lib. 7. Ape-rit, extenuat, detergit, & confirmat uiscera.

Stebe graece  $\sigma\tau\epsilon\beta\eta$ , quid sit nescio, hoc scio non conuenire cum scabiosa, ut nonnulli affirmarunt, ex cuius decocto sanan- tur scabies & pulmonis uitia. Diosco. de stebe cap. 13. 4. et Ga- le. 8. de fac. simp. pau. lib. 7. semen et folia in tertio adstringunt.

Styrax, uulgo storace calamita, Diosco. cap. 70. primi. Ga- le. octauo de fac. simp. plin. cap. 25. lib. 12. pau. lib. 7. calefacit, emollit, & concoquit.

Sycomorus, siue  $\sigma\upsilon\kappa\upsilon\mu\omicron\rho\omicron\upsilon\varsigma$ , est arbor nostro moro non dis- similis, fructum fert non ramis, sed caudice ficorum grossu- lis dulciorem. Diosco. cap. 148. primi. Gal. 2. de alim. Theoph. cap. 2. lib. 4. plin. cap. septimo lib. 13. pau. lib. septimo, fructus nullius nutrimenti liquor arboris emollit, uulnera congluti- nat & tumores discutit.

Tamarix graece  $\tau\alpha\mu\alpha\rho\iota\varsigma$ , nota est omnibus, domestica apud nos non inuenitur, Diosco. cap. 101. primi, Gale. cap. ul. 7. de fac. simp. plin. cap. 21. lib. 13. pau. lib. 7. incidit, extergit, ita ta- men ut manifeste non exicet, sed adstrictionis particeps sit.

Telephium



Telephium, siue τηλεφίον, nisi sit faba crassa uulgo dicta, certe nescio quid sit Dioscorid. cap. ult. libri secundi. Galen. octauo de facul. simp. pau. lib. 7. calefacit in primo, & in secundo desiccatur.

Tamarindi cognoscuntur, Alias dactili indi uocati.

Terebinthus græce τέρμινθος, res est nunc nota, olim quasi incognita recesserat, Nunc eius resina non liquida, sed potius cocta ad nos affertur Diosco. cap. 77. primi. Theoph. cap. 15. tertij. Inuenitur tam masc. quam foemina. Gale. 8. de fac. simp. fructus adstrictorium quiddam habent, sed in secundo calefaciunt & desiccant.

Teucrium siue τεύκριον adhuc non uidi plin. cap. 5. libro. 25. duas species teucrij memorat, & secundum habere folia fabæ similia adserit, unde nonnulli id esse uoluerunt, quod uulgo dicitur faba crassa, Diosco. cap. 102. lib. 3. Gale. 8. de facul. simp. exiccat in tertio calefacit in secundo.

Thalictron, siue θαλίτρον est secundum Ruelium herba Argentina, quæ folia coriandro similia habet. Dioscor. cap. 93. quarti. Gal. 6. de fac. simp.

Thapsia, siue θάψια, cognoscitur, sed raro ad nos affertur, Valet liuiditati carnis cum thure & cera, ut refert plin. cap. 20. lib. 13. Gale. 6. de fac. simp. Diosco. cap. 151. quarti. Theophras. cap. 23. lib. 9. est radix uomitoria. Pau. lib. 7. acris est, & uehementer cum humiditate calefacit ex alto attrahit & attractum discutit.

Thlaspi, siue θλάσσι, quid sit, non possum affirmare, Nam bursa pastoris multum a thlaspi differt, si quis ratione utriusque perpendat, Diosco. cap. 145. secundi. Gale. 6. de fac. simpli. Paul. libro septimo, semen uiribus acre, ut intestinorum abscessus potu rumpat.

R. BLANCHARD

PROF. FAC. MÉD. PARIS

HHb



Thymbra græce θυμβρα, siue satureia siue cunilla, uulgo Satureo siue peuerella, apud Thuscus coniella, dicit, pollet ac ipse thymus. Diosco. cap. 40. tertij. plin. cap. 8. lib. 19. & cap. 20. lib. 20. Reperitur domestica & sylvestris, quare non mirum si Columella inter thymbam & Satureiam, diuersitatem posuerit. pau. lib. 7. sylvestris præstat quæ thymus, Hortensis uero imbecillior.

Thymus, siue θυμος, Inuenitur albus & niger, At niger iuxta Aetij placitum est malus. Diosco. cap. 39. tertij. Gale. 6. de facul. simp. Theoph. cap. 2. lib. 6. Pau lib. 7. calefacit in tertio, & desiccat, & glutinosos humores incidit.

Tithymali genera sunt septem, siue τιθυμάλων ἑπτὰ εἶδη, ut charatias & myrtites quæ sunt nobis incognita, Paralius uero ab aliquibus cognoscitur, & uulgo uocatur herba mora, ex qua pisces moriuntur, Cyparisius est esula minor, dendrodes, a me nundum uisus haud scio quid sit, Platiphillos, apud Tuscos dicitur tortomaglio. Nota tamen q. cyparisius uocatur a Mesue alscebram & ab Auicen. scebram & est esula minor, ut dixi, alscebram uero mezeheregi est pityusa a Diosco. lac eorum depillat oleo in sole inunctum & ortum tandem prohibet Diosco. cap. 159. quarti, Gale. 8. de fac. simp. Plin. ca. 8. lib. 26. paul. lib. 7. Omnes e quarto ordine calefacientiū acrimonie & ualide amaritudinis participes.

Tragacantha, siue τραγανθα, uulgo draganti eius gumi uocatur: Planta est quæ in Creta & in Acaia nascitur Gale. 8. de facul. simp. exiccat Diosco. cap. 21. tertij, plin. cap. 21. libro. 13. pau. lib. 7. Similes gumi uireis habet.

Tragion, siue τραγιον, quid sit diuinare nescio, sicuti etiam de eius secunda specie dicerem, nisi forte sit pimpinella, uel Saxifragia hircina. Gale. 8. de facul. simpl. Diosco. capite. 47.



et 48. quarti, Plin. cap. 21. lib. 13. paul. lib. septimo, calidum  
in tertio attractorium discutiens.

Tragum, siue τραγός, nisi sit species iunci, haud etiam scio  
quid esse possit, nam sine folijs plin. eam cum minimis race-  
mis pingit cap. ult. lib. 27. Dioscor. cap. 49. lib. 4.

Tragoriganus, siue τραγορίανος, Herba est ut placet Leonis-  
ceno, quæ in acetarijs comeditur uulgo tragone appellata, Dio-  
scori. cap. 30. tertij. plin. cap. 17. lib. 20. Galenus. 8. de faculta-  
simp. Paulus libro septimo, uireis habet origani et nonnul-  
lam etiam adstrictionem.

Tribulus, uel τριβύλος habet duas species ut Theoph. cap. 5.  
lib. 6, quarum una pro ducit fructum spinosum, cuius radices  
a multis pro iringo conduuntur, et reuera decipiuntur Dio-  
scor. cap. 16. quarti, Gale. 8. de fac simp. plin. cap. 16. lib. 21. pau-  
libro septimo. Mediocriter refrigerat, sed terrestris siccando  
ualentior est, aquaticus leniter humectat.

Trifolium, siue τριφυλλον, omnibus notum, cuius species  
apud nos tres enumerantur, Prima habet folia rotunda et  
magna. Secunda longa, Tertia rotunda et minuta, Vide fu-  
sius plin. cap. 9. lib. 21. Scripsit etiam de trifolio acuto Scribo-  
nius, et est species trifolij acetosi et uulgo dicitur Alleluia,  
siue pan cuculo, Decipiuntur qui pro andacocha semen trifo-  
lij accipiunt, nam andacocha, nil aliud est quam lotus syluestris  
siue Aegyptius. Gal. 8. de fac. simp. Dioscor. cap. 114. tertij.

Trinitas herba nota ferè omnibus, habet enim folium in  
tres partes diuisum, simile folijs cyclaminis cum coelestis flo-  
re coloris, Conglutinat uulnera et intestinorum rupturas, et  
quæ in scrotum descendunt, præsertim si medium huius pulue-  
ris cochliare, cum uino styptico sumatur.

Tripolium, siue τριπύλιον, et si ab aliquibus credatur esse



turbat, nihilo minus decipiuntur, siquidem nostrum turbat odorem non habet ut tripolium, sed creditur potius turbat nostrum esse alipiam Diosco. sed quum uerum tripoliū non habeatur, id quod a monte sancti Angeli affertur, esse cortex pityusae creditur Dioscorid. cap. 130. 4. Gal. 8 de facul. simpli. Plin. cap. 7. lib. 26. Pau. libro septimo, calida radix est in tertio, & acris.

Tubera graece *στυρα* uulgo tarusi, de quibus mentionem facit Plin. cap. 2. lib. 19, Gale. 2. de fac. alim. non habet ut ipse inquit euidentem qualitatem Auic. 2. suorum can. Componuntur ex terrestri & aquea substantia & sapore priuantur, generant humorem melancholicum crassum & quandoque paralesim, stomuchum aggrauant, & male digeruntur. Dioscor. cap. 134. secundi. pau. lib. septimo, constant ex terrestri substantia cum modica uirtute tenui.

Tussilago graece *βύξιον*, uulgo farfara, uel ungula cabalina dicitur note est, eius fumus prodest tussientibus, unde nomen accepit Diosco cap. 117. tertij, Gale. 6, de fac. simp. Pau. constat ex calida & aquosa substantia.

Thurbit Mesuae est radix alipiae, ut dictū est de tripolio.

Typha, *τύφη*, uulgo mazza sorda haec nascitur in aquosis, ac palustribus locis, Surda iccirco dicta, quia eius lanugo, si aures alicuius ingrediatur, facile ille surdescit, est nota etiā pueris, quum saepe illam praemanibus habeant. Dioscor. cap. 124. tertij, Theoph. cap. 13. lib. 1. Apud Galenum, uel Paulum nulla, de hac fit mentio Plin. cap. 10. lib. 18.

Umbilicus ueneris graece *κοτυληδα*, uocatur apud Tuscos copertorium sunt qui in Lombardia cymbaria quadam pro ueneris umbilico utuntur, Diosco. cap. 87. quarti. Gal. septimo de facul. simp. Plin. cap. 2. lib. 25. Pau. lib. septimo, refrigerat, repellit, abstergit, dissipat.



Verbasum græce φλόμος, uulgo dicitur tasso barbasso, & est omnibus notum. Inuenitur mas & fœmina, mas ex foliis strictis, fœmina ex latoribus, ceteræ species nondum mihi sunt cognitæ, & si Ruellius primulam ueris esse unam phlo-  
mi speciem crediderit sese profectò decipiens, quum nullibet de eius flore agat Diosco. Succus ex flore huius herbæ om-  
nes faciei maculas abstergit. De uerbasco loquitur Gale. 8. de fac simp. Diosco. cap. 99 quarti, Plin. cap. 6. lib. 26. paul. lib. 7. folium omnium siccantem, & mediocriter adstringentem uim referunt.

Verbenaca tam recta q̄ supina à græcis περιτρεχόν dicta, uulgo berbena uocatur, nec uirtute hæc species inter se differunt, nisi q̄ altera mas quæ raris folijs constat, altera fœmina magis foliosa est Dioscor. cap. 58, & 59, quarti Plin. ca. 9, lib. 25, Gale. 8, de fac. simp. uim habet siccantem.

Vetonica græce νετον, uulgo notissima est, q̄ tot uirtutes præferebat, quot Antiochus musa Cæsaris medicus illi attribuit, Vide Diosco. cap. 1. quarti, & Gal. 8, de fac simp. Mundi-  
ficat renes pulmonem pectus & hepar Plin. cap. 8 lib. 25.

Viola alba græce λευκὸν οἶον ex qua unguetum iasminum fit, nota omnibus est, sicuti & uiola lutea, quæ a seplasiariis uocatur Keiri, de cuius uiribus Gal. 7 de fac. simp. tractat, Diosc. cap. 129, tertij Paulus lib. 7. frutex abstergendi extenuandiq; uires habet, magis autem flores. Vitex græce ὄξυς, uulgo agnoscato dicitur & est duplex albus & niger, maior & minor ut testatur Plin. cap. 9. lib. 24. Gal. 6 de fac simp. calidum & siccum est in. 3. Diosc. cap. 120. primi.

Vitis alba græce ἀμπέλως λευκή, uulgo brionia dicitur. siue zucha saluatica & est res notissima uide de eius uiribus Dioscorides. cap. 176. 4. & Galenus 6. de facul. simp. radix re-  
iuit splenis duritiem.



Vitis nigra siue ἀμπελος μέλαινα, uulgo dicitur uua tamina  
 & apud fuscotamaro, & est res nota Dioscor. cap. 77.  
 4. Plinius cap. 2. lib. 23. Paulus lib. 7. pollet, sed non in effi-  
 caciter ut alba.

Viticella, quæ ab alijs dicitur momordica, ab aliis balsa-  
 mina, ab alijs coranzana, inuolueris herba est, florem habes  
 cucumeri, similem, a quo postea fructus oritur ouo gallinæ si-  
 milis, sed minor satis cum quibusdam ueluti acutis spinis ui-  
 ridis existens ante maturationem, & rubens post ipsam ma-  
 turationem, cuius folia neruorum uulnera conglutinant, &  
 oleum ex infusione eius fructus uulneribus apostematibus et  
 ulceribus mamillarum non solum prodest, sed mirum in mo-  
 dum dolores matricis per clystere iniectum & hemorrhoi-  
 darum uulnerum & apostematum maxime leuat ac tollit, ci-  
 catrices extenuat, & c. ut uidere poteris iuxta Mathiolum Se-  
 nensem cap. de uite nigra a cart. 376.

Vitis syluestris græce ἀμπελος ἀγρία omnibus nota, longas  
 enim ex se mittit uiticulas uinum uitis modo ferentes ligno-  
 sas & asperas, Folia solatro similia latiora tamen & longio-  
 ra, florem ceu musculosum capillum, fructum exiguis uuis si-  
 milem, radices in aqua decoctæ dantur contra cutem subeun-  
 tes aqua, acini uuarum asperam & discolorem cutem, om-  
 nesq; alias maculas repurgant. Dioscorides cap. 175. quarti  
 Gale. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. germina abstergunt & non ni-  
 hil adstringunt.

Vrtica græce ἀκαλύφη, res notissima est, uide de eius uiri-  
 bus Diosc. cap. 89, quarti & Gal 6 de fac. simp. Plin. cap. 15.  
 lib. 21. Paul. lib. 7. tenuem habet substantiam citra rofionem  
 siccatur, tumores discutit abstergit & uentrem subducit.

Xanthion siue γαύθιον, uulgo lappa minor dicitur, inuenitur



# IN COGNO. SIMPLIC.

899

in pinguibus locis & in paludibus per æstatem siccatis, uide Dioscori id. cap. 133. quarti Gal. 8. de fac. simp. Pau. lib. 7. fructus discutiendi uires habet.

Xyris siue *Ξυρίς*, sunt qui eum esse uelint uulgarē acorum, ego eum nussiam uidi, scio tamen ex Gale 7. de fac. simpli. q. eius semen est ualidissimum in prouocanda urina & in duritie splenis, Dioscori cap. 24. quarti, Paul. lib. 7. tenuis & discussorie & extrahentis est facultatis ac etiam exiccatorie.

Zea nil aliud est q̄ nostra spelta uulgaris, dicitur etiā græce *Ζέα*, Dioscori cap. 80. secundi Plin. cap. 8. lib. 18. Gale 6. de fac. simp. pau. lib. 7. uiribus tritici respondet & medium inter calorem & siccitatem obtinet.

Zingiber siue *Ζιγγίβρις*, res nota est seplasiarijs, & affertur ex Arabia & ex Aegypto, germinat quotannis folia habens harundini similia Dioscori cap. 149. secundi. Gale 6. de fac. simpli pau. lib. 7. Impense calefacit.

Zedoaria radix est gingiberis similis odoratioꝝ tamen et aliquantulum amara non autem sic acuta ut gingiber impinguat, flatum discutit & comesta affert odorem allijs, caparum, & uini, confert etiam morsibus animalium uenenosis, resoluit apostemata matricis, curat uomitum & dolores colicos, & ut refert Auicennas est theriaca Napelli Serap. lib. 1. egr. cap. Zerūbet et Auic. lib. 2. calida et sicca est in 2. gradu.

Zythum siue *Ζυθός* nihil aliud est quā potus, qui ex hordeo & frumento paratur, quemadmodum ceruisia, uide Dioscori cap. 79. secundi. Plin. cap. ult. lib. 12. Paul. lib. 7. composita est substantie acris enim est & frigidus.

F I N I S.







